

针灸治疗血吸虫病

陳洪濤編著



2.271
318

3.1

湖北人民出版社

內容提要

本書總結了对 454 例早期血吸虫病病人用針灸治疗的初步經驗。通过臨床实践，詳細說明了用針灸治疗血吸虫病的方法和疗效，在理論上和技术上进行了闡述；同时对錫剂治疗血吸虫病发生中毒反映，用針灸防治的办法也作了介紹。

本書可供一般医务工作者在工作和研究上参考。

針灸治疗血吸虫病

陈洪壽編著

湖北人民出版社出版 (武汉解放大道355号)
武汉市书刊出版业营业許可證新出字第1号

湖北省新华书店发行
江汉印刷厂印刷

787×1092 1/32 · 7/8 印张 · 20,000字

1959年9月第1版

1959年9月第1次印刷

印数：1-1,350

統一书号：14106·51

定 价：(8)0.15元

前 言

武汉市东西湖地区是血吸虫病流行区，我在东西湖区中心医院工作，1958年夏季因为这个地区发生了大批的感染，农场医院曾用锑剂治疗了1000多名血吸虫病。因见用锑剂治疗有很多发生中毒性的反应。在党的中医政策号召下，由于医院党委的支持，我便试用针灸的方法来解除这种反应，从而试行单独用针灸的方法直接治疗血吸虫病。1959年元月农场医院与武汉市血防站合作，单用针灸的方法治疗了大批的血吸虫病，取得了显著的效果。从治疗这批病人的情况来看，可以初步肯定，针灸疗法对早期血吸虫病是有疗效的。这种方法简便、经济安全，而且在进行治疗时可以不妨碍生产。为了交流经验，便于进一步地研究和推广应用，所以我把自已用针灸治疗血吸虫病的初步经验和体会加以整理，结合介绍一些对用针灸治疗血吸虫病发生中毒反应的防治知识，编写成这本小册子，以供从事医务工作的同志们在工作和研究上参考。

册子中介绍的取穴方法，有些穴位针刺的深度要求比一般医书上记载的为深，作血防工作的同志，在参照进行实际工作时，必须谨慎，注意安全，针刺时应慢慢由浅而深，不可骤然刺的太深，以免发生危险。

册子中介绍的用针灸治疗的大批血吸病人，观察的时间一般不长，远期疗效尚有待进一步追踪观察。我对针灸治疗血吸虫病的经验不多，理论知识更是有限，因此册子中有些问题

的闡述是不够充实的，有的地方在解釋上也可能不够妥当。請大家批評指正。

这本册子在整理过程中曾得到李国彦同志的大力协助，整理之后，又承刘兆林同志进行了审校，特在此一并致謝。

編 者

1959年4月

目 录

一、用針灸治疗早期血吸虫病的經過	1
二、用針灸治疗早期血吸虫病的方法	2
三、針灸治疗 454 例早期血吸虫病疗效观察	13
四、針刺对錫剂毒性反应的治疗与預防	16
五、如何开展針灸治疗血吸虫病的工作	19
六、針灸治疗血吸虫病的簡單原理和技术	20

一、用針灸治疗早期血吸虫病的經過

血吸虫病在祖国医学文献中沒有这个名詞，只有蠱症之称，是指肝脾脏肿大、腹水形成的晚期血吸虫病。这一种病是由于血吸虫的感染而生，是我国一种危害性較大的地方病，流行区域极广，遍及长江流域及南方几省，受感染的人很多，严重地危害着人民的身体健康，影响国家的經济建設。目前对于这种病的治疗，較为有效的藥物为三价錫剂，但是这种藥对人体毒性較大，在应用时往往会引起毒性反应。近几年来，虽然对应用錫剂的方法作了不断的改进，但仍然經常出現錫剂中毒的現象，并引起死亡。根据国内外文献报告，用錫剂治疗血吸虫病的死亡率約为百分之0.5到千分之0.5左右；复发率一般为30%左右。因此应用錫剂治疗血吸虫病并不是一种理想的方法。

1958年秋季，武汉市东西湖医院，在用錫剂三日疗法治疗血吸虫病时，曾对三百多位有不同程度錫剂反应的病人試用針灸治疗获得了显著的效果，因而使所有用錫剂治疗的1000多位病人沒有发生死亡。我因在这个医院里工作，見到这种情况，便使我想到試用針灸直接治疗早期血吸虫病。在医院党委的大力支持下，当时选择了四例經三次粪檢阳性已确诊为血吸虫病的病人，单用針灸治疗，經過治疗的时间不长，結果均获得痊愈，不仅自觉症状完全消失，而且經過多次粪檢均为阴性。虽然仅从四个病例試驗的結果还不足以完全說明問題，肯定疗效，但是可以說明单用針灸治疗血吸虫病是有效的，这种疗法值得

进一步研究探討。因此，1959年元月医院与武汉血防站配合，便用針灸对大批血吸虫病人进行治疗，共治了450例，观察效果，早期病人疗效很好，治疗之后，94%的病人大便孵化为阴性，接近晚期的病人（指长期住在重感染区的、经过錐剂治疗后复发的以及肝脾脏輕微肿大的）效果也达到75%。这种治疗血吸虫病的方法比較簡單經濟，也比較用錐剂治疗安全。从治疗450个病例的情况来看，对早期血吸虫病的疗效，是可以初步肯定的。这充分說明祖国医学的丰富和偉大，也体现了党的中医政策的正确。现在我把自已用針灸治疗早期血吸虫病的点滴經驗和体会介紹出来，以便大家再进一步地共同研究，而为防止血吸虫病开辟一条新的途徑。

二、用針灸治疗早期血吸虫病的方法

1. 边工作边治疗：用針灸治疗血吸虫病比較方便，除了少数病人因體質較差应住院治疗外，大部分病人均可利用空隙時間，由医务人员深入基层到生产队、学校里去进行治疗，比如对学生可以利用下課時間針灸。一般病人，在針灸后休息十分鐘即可照常恢复工作或劳动，但个别身体較弱发生暈針的病人宜多休息，应休息30—60分鐘，再参加工作或劳动。

2. 疗程：治疗時間一般多是一周，个别病人有显著症状的需要延長時間，可以治疗10—15天以外。針刺最好每天2次，上下午各一次，留針30分鐘左右。这样治疗四天八次之后，大便孵化轉为阴性的可达60%—70%。我曾对55例早期血吸虫病人在治疗一周14次之后，进行观察，疗效达94%，所以規定一日針刺二次的疗程为一周。如果不能每日針刺二次，也可以每天針刺一次，留針一小时，这样治疗10天之后，根据經驗，同样

可以取得良好的效果。所以同时也规定一日针刺一次的疗程为10天。究竟应该采用哪一种疗程，应看病人的具体情况来定。

3.取穴：采取的穴位主穴有内关、合谷、外关、足三里、三阴交、太冲等六个穴位；配穴有曲池、阳陵泉、风池、大椎、肺俞、心俞、膈俞、肝俞、脾俞、肾俞、大肠俞、中脘、天枢、百会、太阳、人中、涌泉等17个穴位。这些主穴和配穴在治疗早期血吸虫病时可以按不同的症状互相配合加减循环取用。

合谷配三阴交作为一次的治疗穴；外关配太冲作为一次的治疗穴；内关配足三里作为一次的治疗穴。如有头昏、身体发软现象者，取合谷、三阴交加阳陵泉等穴；如有胸闷、胃胀痛、消化不良者，取足三里、内关加中脘等穴；如有头痛、恶寒、发热现象者，取外关、太冲加太阳、大椎等穴；如全身、四肢关节痛者，取外关、曲池、阳陵泉、三阴交等穴；如初起寒热往来发冷者，取外关、曲池、大椎、膈俞、风池、太冲等穴；如发高烧久而不退者，取合谷、曲池、大椎、膈俞、肝俞、肾俞、足三里等穴；如发热后出盗汗者，取合谷、三阴交、足三里等穴；如口苦、咽干、舌苔白者，取外关、阳陵泉、足三里等穴；如腹痛、腹泻者，取合谷、天枢、大肠俞、足三里、脾俞等穴。

血吸虫病还有几种比较常见的合并症，也可以按配合加减取穴的方法用针灸治疗：合并心律不齐、期外收缩症状者，取内关、心俞等穴；合并肺结核者，取合谷、足三里、肺俞、大椎等穴；合并胃溃疡者，取脾俞、内关、中脘、足三里穴；合并高血压症者，取风池、合谷、足三里、太冲等穴。

至于用针灸解除锑剂中毒的取穴方法，也是需要配合加减取用的。为了提供大家参考，这里也加以简单的介绍。锑剂中毒引起呕吐者，取内关、合谷等穴；腹痛者，加中脘、足三里

等穴；神志昏迷不省人事者，取百会、人中等穴；瞳孔散大、目不视人、牙关紧闭、心音脉搏消失、四肢强直、全身盗汗、小便失禁者，先取人中二寸深，再配内关、涌泉等穴，用强刺激手法。这些严重症状的发生，如果不超过三分到五分钟时，这样取穴进针治疗，是可以挽救死亡的。假若在针灸治疗时能配合用阿妥品，效果就会更好。

为了更清楚地说明问题，现在再把各个穴位的部位和取穴方法分别说明如下：

(1) 内关穴：

部位：在手掌后腕骨横纹上二寸两筋间。

取穴方法：把病人手仰放、端平微握拳，由掌后第二横纹向上二横指，于两肌腱间处取之，刺一至一寸半深，灸五壮。在临床应用此穴时，根据症状的需要，应掌握几种不同的取用法：对胸部和上腹部病的病人，以直刺靠近桡骨边缘、针尖稍触骨膜为止，用六合手法，感觉直达病灶；对头部病的病人，针尖刺进皮肤后向桡骨歪斜刺之，顶骨为止，用六合手法，感觉直达头部病灶；对腋下或肝脾脏病的病人，针进皮肤后向尺骨歪斜刺之，顶骨为止，用六合手法，感觉直达腋下病灶。“针灸大成”说：“阴阳既清，补泻既明，用之适当，取一可治百病；阴阳不清，补泻不明，用之不当，枉费劳神。”这说明取用同一穴位，由于手法不同在疗效上颇有出入。

治疗：可以治疗早期血吸虫病；配合中脘、足三里等穴，可治腹痛上吐下泻；配合合谷穴可治头昏、神经衰弱、失眠；配合心俞穴可治心悸亢进；配合中脘、脾俞等穴可治消化性溃疡。其他如胸部闷滞、肋间神经痛、锑剂中毒所引起的呕吐、心律不齐等症，在临床上也可以取内关穴进行治疗。

(2) 合谷穴：

部位：在手大拇指和食指歧骨間第一二掌骨之間處。

取穴方法：病人握拳，靠近食骨掌骨邊緣按之有微动脉者取之。取用此穴淺者五分即可，深者，斜向掌骨和橈腕骨結節處刺，可以透大陵穴；直靠近食指掌骨邊緣向下刺，可以透勞宮穴。淺刺多用在頭部疾患；斜深刺多用在腕關節疾患，直深刺多用在胸部疾患。最深者不超過二寸。可以灸五至七壯。孕婦禁針。

治療：因血吸蟲病頭昏痛、腹痛腹瀉者加天樞、足三里等穴；大便為紅白痢子者加大腸俞穴；嘔吐惡心者，取合谷加內關穴；支氣管炎哮喘者，取合谷加肺俞、足三里等穴；婦女月經不調取合谷加三陰交穴。其他如上牙痛、喉痛、感冒頭痛、神經性嘔吐、腮腺炎等症，也往往取用合谷穴治療。取用合谷穴時，用六合手法，使感應線直达病灶為宜。

(3) 外關穴：

部位：在手腕骨后尺骨橈骨之間二寸處。

取穴方法：把病人手伏放，于手背腕骨后之橫指橈骨和尺骨之間，稍微接近尺骨邊緣處取之。用此穴直深刺者，可以透內關穴。用六合手法感應線由手厥陰和少陰經的路線放射至胸部，此法多用于胸部和胃酸過多的疾患，往往在不易取內關穴時，多用此法代替。直淺刺者為五分深，或針尖接近骨髓，用六合手法，感應線由肘肩關節部直达背上，此法多用于背部疾患，如背部惡寒等症狀。斜向橈骨刺之，頂骨為止，用六合手法，感應線直达頭部，此法多用于頭部疾患。斜向尺骨刺之，頂骨為止，用六合手法，感應線直达背側部，此法多用于治疗背部兩側之疾患。

治療：血吸蟲病頭昏兩肋脹滿時，加陽陵泉穴，用六合手法，以達到兩個穴位刺激的感應能夠交接為宜，往往經過一次

針刺之后，症狀就可以消失；胃酸過多、消化不良者，加脾俞穴；寒熱往來者，取外關加大椎、陽俞穴；久燒不退者，加肝俞、曲池、三陰交、腎俞等穴；四肢酸軟、精神疲倦者，取外關加曲池、陽陵泉、太沖等穴。其他如耳鳴、耳聾、氣上沖者，取外關一穴即可。遇有上肢腕肘肩關節痛時，取此穴加灸五至七壯。

(4) 足三里穴：

部位：在下肢膝下前脛骨外側至膝眼下緣向下三寸脛骨外一寸處。

取穴方法：病人正坐或仰臥屈膝，由外膝眼下緣向下方三橫指脛骨外開一橫指取之，稍斜向脛骨處刺二寸深，或接近脛骨邊緣為止。

治療：血吸蟲病腹痛時，取此穴治療效果很好。如有腹瀉現象者，加天樞、大腸俞等穴；胃痛消化不良者，取足三里加中脘、合谷等穴；上吐下瀉者加內關穴；腹瀉帶紅白凍子、里急後重者，加大腸俞、天樞等穴；習慣性便秘者，取足三里、合谷等穴效果很好；哮喘咳嗽者，取足三里加合谷、肺俞等穴；頭昏目眩者，取足三里加百會、合谷穴；胃潰瘍者，取足三里加膈俞、肝俞等穴；腸胃炎者，取足三里加脾俞、中脘等穴；銹劑中毒引起腹痛脹滿或嘔吐者，取足三里、中脘、內關等穴。其他如胃痛、胃脹等病，有時只取足三里一穴就可以治愈。此穴經刺帶灸有預防感染疾病的作用，為足陽明經最常用之穴，主治腸胃消化系疾病，可灸十壯。

(5) 三陰交穴：

部位：在足內踝上三寸去脛骨內側一寸處。

取穴方法：病人正坐或仰臥，由足內踝上緣向上三橫指去脛骨內側一橫指，按之有酸麻感上下放射處取之。直刺者透絕

骨穴，以針尖接近骨膜為止。可以灸五至七壯。

治療：血吸蟲病下腹痛、婦女因血吸蟲病引起月經不調或痛經者，加足三里、曲池、合谷等穴；神經衰弱失眠者，加內關、合谷等穴。三陰交穴為脾經最常用之穴，凡屬血份之症，皆取此穴主治之。血吸蟲病亦是血份之症，取用三陰交穴，既可治療早期血吸蟲病，又可預防晚期脾肝腫大症狀。孕婦忌刺此穴。

(6) 太沖穴：

部位：在足大指和食指歧骨間本节后二寸。

取穴方法：患者正坐或仰臥，由足指和食指歧骨間本节后二橫指、按之有動脈应手者取之，斜刺、一寸至一寸半深。

治療：血吸蟲病頭痛者，加在陽穴；急性眼結膜充血者，加肝俞、太陽等穴；血壓高者，加合谷、風池等穴；尿丸炎者，加腎俞穴；婦女月經不調者，加三陰交穴。其他如熱血充睛痛難忍者，只刺太沖一穴即可治愈。太沖穴為足厥陰肝經之原穴，屬血出入之門戶，又是瀉血中熱之妙穴，加刺手少陽三焦之絡穴外關，有以氣引血行之作用。利用這種作用，此二穴相互配合，對血吸蟲病，可以達到治本的目的。

(7) 曲池穴：

部位：在上肢肘關節拱手橫頭外開一橫指處。

取穴方法：病人兩手拱胸肘關節有一橫紋出現、去橫紋頭一橫指按之有酸麻感處取之，直刺二寸深。可灸七至五壯。

治療：血吸蟲病上肢關節疼者，加合谷；久燒不愈神志不清者，取曲池配外關、大椎、膈俞、肝俞、腎俞、足三里等穴，每隔四至六個小時針一次，如第一次取左曲池配右外關、左足三里、大椎、肝俞等穴，第二次即取右曲池、左外關、右足三里、膈俞、腎俞等穴，以上諸穴循環取用，大多治療五——七次即可退燒。如久燒以致二目不識人者，取曲池、太沖、風池等穴，

每隔4—6小时針一次即可治愈。这是因为發燒是由血吸虫病而引起的。血吸虫在人体内放散毒素刺激体内組織而引起的發燒是有規律性的，多数在每天下午發燒，在發燒的同时并有惡寒、脈搏弦而有力、有时現蚊象、舌苔由淡黃色变为老黃色、面部潮紅、眼結膜充血等現象，大致發燒延長到4—6小时后，体温即降至37°C左右，病人感觉清醒，所以針灸要提前在开始發燒前一个小时进行，針后要經常动針，最好每五分鐘动針一次，用六合手法，留針時間一定要超过原来开始發燒的时间，虽然当时用針刺抑制住了發燒或減輕了症狀，但是等針的力量过了，馬上又發燒起来，为了抑制發燒必須繼續針刺，否則是不到疗效的。血吸虫病初期发现蕁麻疹者，取曲池加合谷、三阴交等穴；遍身发痒者，取曲池、外关、足三里等穴。

(8) 阳陵泉穴：

部位：在下肢膝下腓骨小头接近脛骨結节之下緣处。

取穴方法：病人屈膝，由膝下腓骨小头之前下方陷处向脛骨去之正中央按之有酸麻感处取之。直深刺可以透阴陵泉穴，一般刺二寸深，灸七至十壮。另在治疗中发现一穴，在腓骨小头的高骨下緣一横指按之酸麻感向上下放射处，暂定名副阳陵穴，治疗慢性病的效果，超过阳陵泉穴，針五分深或頂骨为止。特在此提出供大家研究参考。

治疗：血吸虫病四肢关节痛酸軟无力者，加三阴交、曲池等穴；胃酸过多、食欲不振者，加外关穴；錐剂中毒引起四肢痙攣者，取阳陵泉加三阴交、曲池、合谷等穴；两肋下痛者，取阳陵泉加外关穴。其他如腹部脹滿消化不良等症，針阳陵泉穴即可。

(9) 风池穴：

部位：在后头骨下，风府穴旁的一寸。

取穴方法：病人正坐稍向前低头，于耳后发际陷处和耳垂

平緩，按之有酸麻感處取之。橫刺可以透風府穴，針五至八分，灸五、六壯。

治療：血吸蟲病有頭痛、發燒、失眠、高血壓者取之。錐劑毒性反應引起頭痛、耳鳴、眼花時，亦可取之。

(10)大椎穴：

部位：在第七頸椎和第一胸椎之間處。

取穴方法：病人正坐低頭，在第七頸椎和第一胸椎之間取之。稍向下斜刺，一般病人可以刺一寸半至二寸深，此穴淺刺無什感覺，達不到治病目的。在斜刺此穴時，要注意病人的姿勢，千万不要使病人抬頭，否則會引起屈針和折針之危險，再者應注意掌握病人的體質，確定針刺的淺深，重刺延髓會引起四肢痙攣的現象。

治療：血吸蟲病發燒者，加外關穴；寒熱往來者，加風池、合谷等穴；脊椎和四肢關節痛者，加曲池、陽陵泉等穴；寒熱往來似發瘧疾者，取大椎加內關穴；感冒頭項強痛者，加外關、風池等穴。取大椎穴治瘧疾，往往只針一次就可以痊愈。

(11)肺俞穴：

部位：在第三胸椎、下各開二寸處。

取穴方法：病人正坐或側臥，在第三胸椎和第四胸椎之間除脊骨各開二橫指處取之。斜向外方刺七分至一寸深或頂骨為止。

治療：血吸蟲病合併支氣管炎或肺結核咳嗽者，加合谷、膈俞、足三里、風池等穴；血吸蟲病發黃疸、面部四肢有浮腫現象者，取肺俞加合谷、足三里、三陰交等穴，其他如背胸酸痛，刺肺俞一穴往往能收到很好的效果。可灸十至十五壯。

(12)心俞穴：

部位：在背部第五胸椎和第六胸椎之間各開二橫指處。

取穴方法：同肺俞穴。

治疗：血吸虫病发生心律不齐者，取此穴配内关穴；心悸、神昏、发烧、失眠者，加合谷、足三里等穴；其他对神经失常狂笑病人，取此穴治之有效。

(13)膈俞穴：

部位：在背部第七胸椎和第八胸椎之间各开二横指处。

取穴方法：同肺俞穴。

治疗：血吸虫病发烧者，加大椎、外关、曲池等穴。膈俞穴主治血份之热。其他如神经衰弱失眠的病人，在此穴按之有压痛点处刺之，效果很好。

(14)肝俞穴：

部位：在背部第九胸椎和第十胸椎之间各开二横指处。

取穴方法：同肺俞穴。

治疗：血吸虫病发冷、两胁下痛者，加阳陵泉、外关等穴；眼急性角膜充血者，取肝俞加合谷、太阳等穴。其他如肝脏病、妇女闭经、血份热等症，可以肝俞穴主治之，灸七至十五壮。

(15)脾俞穴：

部位：在背部第十一胸椎和第十二胸椎之间各开二横指处。

取穴方法：同肺俞穴。

治疗：血吸虫病腹泻腹痛者，加天枢、足三里等穴；腹泻带红白冻子者，加大肠俞、足三里等穴；全身浮肿者，加肾俞、足三里、三阴交等穴；黄疽腹水者，加肺俞、合谷、足三里等穴。其他腹泻腹痛小便短少者，以脾俞穴为主，运化脾土后，小便自利。

(16)肾俞穴：

部位：在第二腰椎和第三腰椎之间外开二横指处。

取穴方法：同肺俞穴。针一寸五分深，灸三至四壮。

治疗：血吸虫病伴有腹痛、便秘、浮言以及妇女月經不調时取之。

(17)大腸俞穴：

部位：在十六椎和十七椎之間，相当于第四和第五腰椎之間。

取穴方法：同肺俞穴。

治疗：血吸虫病腹瀉帶紅白次子者，加天樞、脾俞、足三里等穴；腰痛者，加陽陵泉穴；妇女月經不調者加合谷三阴交等穴。

(18)中脘穴：

部位：在腹部正中行臍上四寸处。

取穴方法：病者仰臥，由臍上緣向上四橫指处取之。直刺一至三寸深。灸十壯。

治疗：血吸虫病腹痛、腹脹者，加足三里穴；腹瀉者，加天樞、脾俞等穴；嘔吐者，加內关、合谷等穴，其他如胃痛、胃潰瘍、胃脹等症，取中脘一穴治之，往往效果很好。此穴深刺时，要加以注意，以慎重为宜。

(19)天樞穴：

部位：在腹部臍旁各开二寸处。

取穴方法：病者仰臥，由臍邊緣向左右各开二橫指处取之，直刺二寸深，灸十壯。

治疗：血吸虫病腹痛腹瀉者，加脾俞、足三里等穴；妇女月經不調或痛經者，加阴交、合谷等穴。

(20)百会穴：

部位：在头正当頂处。

取穴方法：病人正坐，由左右耳尖向上拉一直綫，再由前兩眉之間向大樞拉一直綫，于兩綫交叉、按之有一陷处取之。斜刺或向前、向后刺都可，沿皮下針三至五分深。如治疗脫肛

或偏墜遺尿症者，可以灸五壯。

治疗：錐劑中毒引起的神志昏迷不省人事以及中風、神經錯亂、頭目眩暈、氣虛引起的遺尿症等。治疗以此穴為主。

(21) 太陽穴：

部位：在頭部目外眦角外方一寸處。

取穴方法：病人正坐，由目外眦角向外平開一橫指處取之。斜向外刺一寸深或頂骨為止。治疗急性頭痛和眼疾，取此穴刺之須使出血。方法是：令病人閉氣一口，用手巾縛緊頸項，此穴帶脈自然脹起，即用粗針或三棱針刺之出血。

治疗：血吸虫病頭痛者，加合谷穴；錐劑中毒引起的頭痛，以此穴局部刺激，加外關、風池等穴。其他如三叉神經痛，急性眼角膜充血、感冒頭痛等症治疗以太陽穴為主。

(22) 人中穴：

取穴方法：病人仰臥，在鼻柱下由上口唇向上的溝中上1/3、用手按之正當上方左右第一門齒根部間之凹陷處取之。針尖斜向上與上唇交30°角針入，以手緩緩捻轉使針入一寸半至二寸深。根据醫書記載，此穴無深刺之說，同時此穴比較難于進針，一般多用淺刺法，往往只刺三五分深，此穴深刺淺刺在作用療效上各有不同，若遇嚴重症狀，那是需要深刺的。

治疗：錐劑中毒引起的不省人事脈搏消失、血吸虫病合併神經錯亂、其他如中風、中暑、神經錯亂、腰痛等症，均可用此穴治疗。深刺效果很好，取此穴針灸治疗癲癇症，可以倒痰，用粗針（比28號針較粗點）深刺二寸深，捻動針時，病人大口吐粘痰，針灸一次，吐的痰量很多。有時針灸一次，最多不過三次，病就可以痊愈。前面已經說過，對用錐劑治疗血吸虫病因中毒而引起的不省人事、牙關緊閉、脈搏心音消失、四肢強直、全身出汗、小便失禁的症狀，取此穴治疗，效果也好，針刺二