

疾病中草药原色图谱丛书 ZHONGCAOYAO YUANSE TUPU

肿瘤中草药原色图谱

黄燮才 / 主编 JBZHCHYSTP

广西科学技术出版社

将治疗某种疾病的一类中草药归在一起单册介绍其形态、作用及应用，实用性更强。每种中草药均以图文对照形式介绍，图片以原色照片制版，图像清晰，形态逼真，特征突出。
亦药亦医，对医药合一的基层医生、中医药爱好者尤为适用。



疾病中草药原色图谱丛书

肿瘤中草药原色图谱

主 编

黄燮才

编著者

黄燮才	黄贤忠	黄镇才	林云仙	黄 榆
陆 晖	黄 霞	杨松年	陈龙小	刘雪琼
黄橈林	韦家福	黄钰淇	刘红武	李宁汉
刘启文	严仲铠	张效杰	李延辉	邬家林
吴光弟	郑汉臣	刘玉琇	高士贤	彭治章
仇良栋	周小鸣	罗世经	江宏达	孙玉正
何光明				

广西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

肿瘤中草药原色图谱/黄燮才主编. —南宁:广西科学技术出版社, 2001

(疾病中草药原色图谱丛书)

ISBN 7-80666-165-4

I. 肿... II. 黄... III. 抗癌药(中药): 中草药—图谱 IV. R286.91-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 062500 号

疾病中草药原色图谱丛书

肿瘤中草药原色图谱

黄燮才 主编

*

广西科学技术出版社出版

(南宁市东葛路 66 号 邮政编码 530022)

广西新华书店发行

广西地质印刷厂印刷

(南宁市建政东路 88 号 邮政编码 530023)

*

开本 890×1240 1/32 印张 6 字数 160 000

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—6 000 册

ISBN 7-80666-165-4 定价: 33.60 元
R·20

本书如有倒装缺页, 请与承印厂调换

主编简介



黄燮才, 药用植物学专家(教授), 男, 汉族, 1936年3月出生, 广西桂平人。大学毕业。在广西中医药研究所、广西医药研究所和广西药品检验所从事中药、民族药和中药材质量标准研究近40年, 命名发表植物药新种18个, 在国内外学术刊物上发表论文45篇, 主编和参编的著作33部, 其中《中国本草图录》(共12卷, 为第10卷主编)获1992年第6届全国优秀科技图书奖特别奖, 1998年获国家中医药管理局中医药基础研究奖1等奖,《中药材真伪鉴别图谱》获中南区优秀科技图书2等奖,《实用中草药原色图谱》、《中国民间生草药原色图谱》和《广西中药材标准》均获广西壮族自治区人民政府广西桂版图书奖2等奖。荣获广西壮族自治区卫生厅优秀医学科技工作者称号, 1998年获中共广西壮族自治区委员会和自治区人民政府颁发的荣誉勋章1枚, 受邀参加第2届和第3届国际民族生物学大会、美国民族生物学会第15届年会、第3届国际传统药理学大会、防城金花茶国际学术会议, 1997年被联合国“国际保护自然与自然资源联盟”(IUCN)聘为金花茶提案评论员。1992年作为有突出贡献的专家, 荣获政府特殊津贴。

编写说明

1. 品种:本书收载治肿瘤病临床常用中草药 80 种。每种按名称(别名)、来源、形态、生境分布、采收加工、性能、用量、禁忌、选方和附注等项编写。全书还收载在临床上有治疗癌效果的选方 352 条,分别见于每种中草药选方项内。目录的编排按笔画多少为顺序。

2. 照片:每种中草药均有 1 帧形态逼真的彩色照片图。除了小草本拍摄全株外,木本、藤本和大型草本,只拍摄有代表性的局部,用局部的枝叶、花或果去表现全体,因此,在看图时,应对照形态项的描述,通过图文对照,提高识别能力。

3. 名称:中药原则上采用《中华人民共和国药典》、《部颁标准》或省、自治区《地方标准》所用的名称,草药一般采用多数地区习用名称,以求药名逐步统一。

4. 学名:每种中草药在来源项只选 1 个符合国际命名法规的学名(拉丁学名)。

5. 选方:中西医病名均予采用,所列使用分量可供参考,使用时可根据药物性能和患者体质强弱、病情轻重、年龄大小、发病季节、所处地域等具体情况进行加减,做到辨证论治。凡不明症状和病情严重的,应及时请医生诊治,以免贻误病情。对有毒药物,用量尤须慎重,以免发生不良作用。

水煎服:是指用清水浸过药面约 2cm 煎药,煎好后滤出药液再加清水浸过药面复煎,2 次药液混合,为 1 日量,分 2~3 次服;病情紧急的,则 1 次顿服。煎药容器以沙锅为好,忌用铁器。

先煎:矿物类、介壳类(如龟板等)应打碎先煎,煮沸约 10 分钟后,再下其他药同煎。

后下:气味芳香的药物(如薄荷、砂仁等)宜在一般药即将煎

好时方下，再煎4~5分钟即可。

布包煎：为防止煎药后药液混浊及减少对消化道及咽喉的不良刺激，有些药物（如灶心土、旋覆花等）要用纱布将药包好再放入锅内煎煮；或先煎去渣，然后再放入其余药同煎。

另炖或另煎：某些贵重药（如人参、鹿茸等），为了尽量保存其有效成分，以免煎时被其他药吸收，可另炖或另煎。就是将药切成小片，放在加盖盅内，隔水炖1~2小时。

另焗：含有挥发油，容易出味，用量又少的药物（如肉桂等），可用沸水半杯或用煎好的药液趁热浸泡并加盖。

冲服：散（粉）剂、小丸、自然汁及某些药物（如三七末、麝香、竹沥、姜汁、蜜糖、白糖或红糖即黄糖）等，需要冲服。

烱化（溶化）：胶质、粘性大且易溶的药物（如阿胶、饴糖等），与其他药同煎易粘锅煮焦，或粘附于其他药，影响药物成分溶解。用时应在其他药煎好后，放入去渣的药液中微煮或趁热搅拌，使之溶解。

烧存性（煨存性）：是将药物加热至焦化呈黑褐色，中心部分尚存留一点深黄色叫做“存性”，千万不能将药烧成炭或白灰，以致失去药效。

6. 附注：收录每种中草药的化学成分以及与肿瘤等有关的药理研究结果，供参考。

7. 计量：形态项的长度按公制用m（米）、cm（厘米）和mm（毫米）。验方中的重量以传统中药计量换成公制，如1斤（16两）=500g（克），1两=30g，1钱=3g，液体按1斤=500ml（毫升）。验方的用量，除儿科疾病外，均按成人量，儿童用时应酌减。儿童用量一般可按1~2岁用成人量的1/5量；2~3岁用1/4量；4~7岁用1/3量；8~12岁用1/2量。凡药名前冠有“鲜”字的，是指新鲜的药物，其他均为干燥药，如改为鲜药，一般用量可加倍。外用量可根据药物性能和病情等的不同情况灵活决定。

8. 附录：书后附有附注项的药物成分、药理参考文献及别名索引和学名索引，以便检索。

目 录

- 肿瘤简介…………… (1)
- 二画
1. 七叶一枝花 …… (3)
2. 八角莲 …… (6)
- 三画
3. 广王不留行 …… (8)
4. 广地龙 …… (10)
5. 三七 …… (12)
6. 三白草 …… (14)
7. 三叶香茶菜 …… (16)
8. 土茯苓 …… (17)
9. 大枣 …… (20)
10. 大蒜 …… (22)
11. 山豆根 …… (24)
12. 山芝麻根 …… (26)
13. 女贞子 …… (28)
14. 马齿苋 …… (30)
15. 马鞭草 …… (32)
- 四画
16. 王瓜根 …… (33)
17. 天南星 …… (36)
18. 木棉根 …… (38)
19. 长春花 …… (40)
20. 水田七 …… (41)
21. 水红花子 …… (43)
22. 水杨梅 …… (45)
23. 丹参 …… (47)
- 五画
24. 半边莲 …… (50)
25. 半枝莲 …… (52)
26. 玉米芯 …… (54)
27. 四叶参 …… (56)
28. 四叶葎 …… (58)
29. 田螺 …… (59)
30. 白头翁 …… (61)
31. 白英 …… (63)
32. 白花蛇舌草 …… (65)
33. 瓜蒌 …… (68)
34. 仙鹤草 …… (70)
- 六画
35. 灯笼草 …… (72)
36. 全蝎 …… (73)
- 七画
37. 补骨脂 …… (75)
38. 苍耳草 …… (77)
39. 两面针根 …… (79)

40. 牡蛎	(81)	62. 莪术	(122)
41. 灵芝	(82)	63. 夏枯草	(125)
八画			
42. 青黛	(84)	十一画	
43. 岩黄连	(86)	65. 黄毛耳草	(129)
44. 败酱草	(88)	66. 蛇莓	(131)
45. 肿节风	(90)	67. 蛇葡萄根	(134)
46. 鱼腥草	(92)	68. 野菊花	(136)
九画			
47. 穿山甲	(94)	69. 银花藤	(138)
48. 姜黄	(96)	70. 银杏树皮	(140)
49. 梔子	(98)	十二画	
50. 枳椇叶	(100)	71. 喜树果	(141)
51. 鸦胆子	(102)	72. 雄黄	(143)
52. 茵陈蒿	(104)	73. 黑眶蟾蜍	(146)
53. 茜草	(106)	74. 鹅不食草	(147)
54. 骨碎补	(108)	十三画	
55. 韭菜叶	(110)	75. 墓头回	(149)
56. 急性子	(112)	76. 蜈蚣	(151)
57. 重楼	(114)	十五画	
58. 香椿皮	(115)	77. 墨旱莲	(153)
59. 绞股蓝	(117)	十六画	
十画			
60. 浙贝母	(119)	78. 薏苡仁	(155)
61. 凉粉草	(121)	79. 壁虎	(157)
十九画			
		80. 蟾蜍	(159)

“附注”项的药物成分、药理参考文献	(162)
别名索引	(176)
学名索引	(179)

肿瘤简介

根据对人体的危害不同，肿瘤分为良性与恶性两类。良性肿瘤生长慢，一般不影响生命，但部分也可能转变成恶性肿瘤。恶性肿瘤又称为癌症（又分为癌与肉瘤两类）。癌生长快，易转移至其他脏器，危害生命。现将几种常见肿瘤的早期症状简介如下：

肝癌：早期症状往往不明显和缺乏特异性。常有食欲不振，黄疸，持续性低热或不规则或间歇性高热，恶心呕吐，消瘦等，以后有右上腹胀痛和肝脏逐渐肿大，肝质坚硬如石，表面凹凸不平，约90%的病人可触及到肿大的肝脏。晚期出现腹水，鼻衄，皮下出血，呕吐，便血，肝昏迷等恶病质。

鼻咽癌：多有不明原因的鼻出血和患侧断续性头痛，并有迅速消瘦现象。

肺癌：早期可无症状或症状轻微，仅在X线健康检查时发现。一般有长期咳嗽，痰中带血，胸痛，气急，发热等。癌肿转移到其他器官，则产生该器官病变的相应症状。肺癌晚期，癌肿毒素可导致消瘦和恶病质。

直肠癌：患者多在40岁以上，大多有顽固性便秘，肠功能紊乱如腹泻、便秘，腹泻与便秘交替出现，便中带血伴有粘液，大便逐渐变细，肠鸣，腹胀，全身衰弱，消瘦，恶病质等。

乳腺癌：早期表现为乳房内有无痛性的小肿块，皮肤有“橘皮样”的改变，乳头凹陷。

子宫颈癌，阴道癌：常有白带增多和不规则的阴道流血。

胃癌：40岁以上的中年人较多见。初起阶段临床表现不明显，

缺乏特征性，早期常有上腹饱胀、不适和疼痛，食欲减退，消化不良，恶心，呕吐，呕血（呕出咖啡色液）或黑粪（排出柏油样大便），暖气，反酸，胃灼热，消瘦，贫血，全身不适，疲乏无力。大都有长期溃疡病史。病变已属晚期，上述症状加剧。

膀胱癌，阴茎癌：常有小便刺痛，小便短赤，身体疲乏并消瘦。

食道癌：多发生在 40 岁以上，也有发生于较小年龄者。早期表现常有进食时心窝部有胀闷不适或有针刺样、烧灼样疼痛，吞咽时有异物通过感，咽喉部不适或异物感，由于症状较轻常易忽视。较后期表现为吞咽困难（食道癌最突出症状），咽下时常有不同程度的疼痛，咽下困难加重时出现食物反流，反流量内含食物和粘液，亦可含血液与脓液。晚期常有消瘦，营养不良，失水，甚至呈恶病质。

甲状腺癌：多发生于成年人，颈项部常感胀痛或呼吸困难。

喉癌：常有声嘶，咽喉干燥或喉痛，喉部有异物感。

声带癌：初期有声嘶或感喉部不适，逐渐发展为音哑，消瘦，乏力等。

脑癌：常有头晕或头痛，食欲减退，消瘦等。

骨癌：患部常持续性疼痛并逐渐加剧，局部温度升高或淋巴结肿大，有时可产生病理性骨折。

1. 七叶一枝花 (重楼、草河车)

来源 百合科 (或延龄草科) 植物华重楼 *Paris polyphylla* Smith var. *chinensis* (Franch.) Hara 的根状茎。

形态 多年生直立草本, 高 40~100cm。根状茎粗厚, 横卧, 圆柱形、稍压扁, 长 5~12cm, 直径 1~4cm, 外面棕褐色或黄褐色, 内面白色, 有少数密集成环的节, 节上有许多须根。茎单一, 圆柱形, 无毛。单叶, 5~8 片轮生于茎顶, 通常 7 片; 叶片倒卵状披针形, 长圆状披针形或倒披针形, 长 8~18cm, 宽 2.5~5cm, 先端尖, 基部狭, 边缘全缘, 两面均无毛; 叶柄长约 1cm。花梗由茎顶抽出, 长 5~16cm, 少有达到 30cm, 顶端着花 1 朵; 花被 2 轮, 外轮花被片叶状, 绿色, 通常 4~6 片, 狭卵状披针形, 长 4.5~7cm; 内轮花被片狭条形, 黄色, 短于外轮, 长 1.5~3.5cm, 宽 1~



1.5mm，通常中部以上变宽；雄蕊8~10枚，花药长1.2~1.5cm，长为花丝的3~4倍，药隔突出部分长1~2mm；子房有棱，侧膜胎座，1室，顶端有一盘状花柱基，花柱分枝粗短。果实近球形，成熟时紫绿色。种子多数，假种皮红色。花期5~7月，果期8~10月。

生境分布 生于林下阴湿处、沟谷边草丛中。分布于江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南等省（区）。

采收加工 秋季采，除去须根及杂质，洗净，晒干。用时洗净，润透，切片。

性能 苦，微寒；有小毒。清热解毒，消炎，止血，抗肿瘤。

用量 3~10g。

禁忌 孕妇忌服。

选方 1. 胃癌：七叶一枝花15g，白花蛇舌草（茜草科）、卫矛根（卫矛科）各30g。水煎服。

2. 乳癌：七叶一枝花、蛇莓（蔷薇科）各15g，蒲公英（菊科）、白英（茄科）、龙葵（茄科）各30g。水煎服。连服10日为1个疗程。

3. 食道癌：七叶一枝花、凤尾草（凤尾蕨科）、夏枯草、三棱、白花蛇舌草各10g，地榆（野牡丹科）15g。水煎服。连服30日为1个疗程。

4. 子宫癌：七叶一枝花15g，黄药子（薯蓣科）、伸筋草（石松科石松）、枫香树根（金缕梅科）、龙葵各30g。水煎服。

5. 脑癌：七叶一枝花、蒲黄根（香蒲科）各15g，苍耳草（菊科）、贯众（鳞毛蕨科）、魔芋（天南星科）各30g。先将魔芋水煎2小时（魔芋有毒，久煎可减少毒性），再加入余下4味药同煎，滤取清汁，内服。

6. 鼻咽癌：①七叶一枝花15g，魔芋、枸杞根（茄科）、鸭跖草（鸭跖草科）各30g。先将魔芋水煎2小时，再加入余下的3味

药同煎，滤取清汁，内服。②七叶一枝花 10g，苍耳草、鸭跖草、枸札根、魔芋各 30g。水煎服。喉干，加天花粉 15g；出血加马兰根（菊科）30g，同煎服。

7. 喉癌：七叶一枝花、蛇莓、野荞麦根（蓼科）各 15g，白英、龙葵各 30g，灯笼草（茄科）10g。水煎服。溃疡加蒲公英、半枝莲（唇形科）各 30g，同煎服。

8. 喉癌，食道癌：七叶一枝花、木鳖子仁（葫芦科）、大黄（蓼科）、马牙硝（矿物药）各 15g，制半夏 0.3g。共研细粉，蜜丸如黄豆大，含服，每次 1 丸，日 3 次。

9. 食道癌、胃癌、肺癌、肠癌：七叶一枝花、黄药子各 60g，山豆根（豆科或蝶形花科）、夏枯草（唇形科）、败酱草（败酱科）、白藓皮（芸香科）各 120g。共研细粉，炼蜜为丸，每丸重 9g，日服 3 次，每次 1 丸，开水送服。

10. 肺癌：七叶一枝花、紫草根（紫草科）各 60g，前胡（伞形科）30g，人工牛黄 10g。将前 3 味药制成浸膏，干燥研细粉，加入人工牛黄调匀，日服 3 次，每次 1.5g，开水送服。

11. 阴茎癌：七叶一枝花、半枝莲、土茯苓（百合科或菝葜科）、银花藤（忍冬科）、葎草（大麻科）各 15g，白英 30g。水煎服。

12. 淋巴肉瘤：七叶一枝花、黄药子、天葵子（毛茛科）、红木香（木兰科或五味子科南五味子根）各 15g，魔芋 30g。先用水煎魔芋 2 小时，再加入余下 4 味药同煎，滤取清汁，内服。

13. 乳腺癌：七叶一枝花、蛇莓、薜荔果（桑科）各 15g，蒲公英、白英、龙葵各 30g。水煎服。痛加苦楝子、延胡索（或乌药）各 15g；糜烂加银花藤、核桃夹（又名分心木，胡桃果核内的木质隔膜）各 30g，同煎服。

附注 七叶一枝花（华重楼根状茎）含皂苷 A、皂苷 B、皂苷 C、皂苷 D 及薯蓣皂苷元 2.5%。

药理研究证实，七叶一枝花有明显的止血作用，还有抗肿瘤、

抗生育、免疫调节及心血管等多方面的生理活性。对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、胸膜炎双球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌等有抑制作用。

2. 八角莲 (八角金盘、一把伞)

来源 小檗科植物八角莲 *Dysosma Versipellis* (Hance) M.Cheng et Ying 的根状茎。

形态 多年生直立草本，高 30~50cm。根状茎粗厚似连珠状，肉质，横生，有环状节，须根多数，直径约 2mm。茎单一，中空，粉绿色，无毛。叶 1~2 片生于茎顶，盾状着生；叶片圆形或近圆形，直径 25~35cm，边缘 4~9 浅裂或深裂，裂片边缘有刺状细齿，幼时疏生短柔毛，后变无毛，下面粉绿色。花暗红色或紫红色，5~8 朵簇生于近叶基处，花梗长 3~5 cm，结果时长可达



7cm，下弯，通常有毛，有时近无毛；萼片6片，外面有疏毛；花瓣6片，长约2cm；雄蕊6枚。浆果椭圆形或卵形，长约2cm，成熟时紫黑色。花期5月，果期秋季。

生境分布 生于山谷阔叶林下湿润处或竹林下阴湿处。分布于河南、江苏、浙江、江西、安徽、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南等省（区）。

采收加工 秋季采，除去须根，洗净，晒干。用时洗净，润透，切薄片，晒干。

性能 苦、辛，温；有毒。解毒散瘀，消肿止痛，抗肿瘤。

用量 3~10g。

禁忌 孕妇忌服。

选方 1. 乳腺癌：①八角莲、黄杜鹃根（杜鹃花科羊躑躅，有毒，民间称三钱三）各15g，红天葵块根（秋海棠科紫背天葵）30g。加入米酒500ml浸泡7日后内服兼外搽患处，内服每次10ml，日服2~3次。②八角莲适量。研细粉，用酒和醋调匀涂患处，或用鲜八角莲适量，捣烂外敷患处。

2. 癌症：八角莲30g，白花蛇舌草120g，红天葵块根100g，山芝麻60g，七叶一枝花、半边莲（桔梗科或半边莲科）各50g。共研细粉压片，每次服3~6g，日服3次，温开水送服。

附注 八角莲根茎含鬼臼毒素（0.057%），去氢鬼臼毒素，鬼臼酮，山荷叶素，4'-去甲基鬼臼毒素，picropodophyllone, isopicropodophyllone, physcion, 4'-去甲基鬼臼酮，八角莲酮醇，八角莲蒽醌，山柰酚-3-*o*- β -吡喃葡萄糖苷，槲皮素3-*o*- β -吡喃葡萄糖苷，山柰酚、苦鬼臼素，还含21种氨基酸。

药理研究证实，八角莲有抗癌、抗病毒和降血糖作用，对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌有抑菌作用，还有溶血作用，如大量服用，将会破坏红血球。

3. 广王不留行 (薜荔果、凉粉果、木馒头)

来源 桑科植物薜荔 *Ficus pumila* Thunb. 的花序托 (俗称果实)。

形态 木质藤本。新鲜嫩枝和果实折断有白色乳状汁液。枝叶二型，不结果的枝纤细，有短柔毛，节处有环状托叶痕迹以气根爬于墙壁、石壁或树干上；叶互生，单叶；叶片小而薄，心状卵形，长1~2.5cm，宽0.5~1.5cm，基部偏斜，边缘全缘；结果的枝粗壮，直立或斜升，叶片大而厚，长圆状椭圆形或卵状椭圆形，长4~10cm，宽1.5~4.5cm，基部微心形，边缘全缘，上面无毛，下面有短柔毛，网脉显著突起；叶柄粗而短；托叶长约1cm，早落，节处留下环状痕迹。花小，生于梨形或倒卵形的花序托内，此花序托(俗称果实)长2.5~6.5cm，宽1.5~4cm，单个生于叶腋，基



部收狭成短柄。聚花果长达7cm，宽达4cm，果皮无毛，成熟时淡黄色。榨取新鲜的聚花果汁，加入适量大米浆共煮熟，冷却后即成白凉粉，可食。花果期5~10月。

生境分布 常攀于墙上、岩石上或树干上。分布于江苏、浙江、江西、安徽、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南等省（区）；越南、日本等地也有。

采收加工 秋季采，放入沸水中约1分钟，取出，纵剖成2~4片，晒干。

性能 甘，凉。清热利湿，通乳，消肿。

用量 10~30g。

选方 1. 乳癌：广王不留行、鹿角尖（动物药）各等量。研细粉，每服10g，加黄糖适量调匀，陈米酒送服。

2. 胃癌：广王不留行、夏枯草、炙穿山甲各15g，生牡蛎30g（另包，先煎），丹参、郁金、石斛、姜半夏、赤芍、太子参各10g，五灵脂、蒲黄（炒香）、广木香各6g，陈皮5g。水煎服。

3. 直肠癌：广王不留行、白花蛇舌草（茜草科）、白英（茄科）、菝葜（百合科或菝葜科）、败酱草（败酱草科）、瓜蒌仁、生牡蛎、丹参、乌菟莓（葡萄科）、大血藤（木通科或大血藤科）各30g，炮穿山甲、八月扎（又名预知子，木通科）各15g，党参、枳实、地榆炭各12g。水煎服。

4. 乳腺癌：广王不留行、七叶一枝花、蛇莓（蔷薇科）各15g，蒲公英、白英、龙葵（茄科）各30g。水煎服。痛加苦楝果、延胡索（或乌药）各15g；糜烂加银花藤、胡桃夹（又名分心木，胡桃夹即核桃果核内的木质隔膜）各30g，同煎服。

5. 癌症：广王不留行（或薜荔全草）、夏枯草、铁线草（铁线蕨科扇叶铁线蕨）各100g。水煎服，另取药汁外搽患处。

附注 薜荔果（花序托）含中肌醇，芸香苷， β -谷甾醇， β -香树精乙酸酯，蒲公英赛醇乙酸酯，凝胶质等。