

湖北中药手册

湖北省卫生厅編




35

湖北人民出版社

湖北中药手册

湖北省医药科学出版社



湖北省医药科学出版社

湖北中藥手冊

湖北省衛生廳編

湖北人民出版社

1960年·武漢

內 容 提 要

本書介紹了湖北省的常用中藥 337 種。說明了每種藥材的產地、特征、加工方法、性味和用途等等，同時也介紹了鑒別藥材質量和真偽的方法。

本書可供一般中醫、藥工作者參考。也可以供采購藥材的人員參考。

湖 北 中 藥 手 冊

湖北省衛生廳編

*

湖北人民出版社出版（武漢 解放大道332號）

武漢市書刊出版業營業許可證新出字第1號

湖北省新華書店發行

武漢市國營武漢印刷廠印刷

*

787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ ·5 $\frac{13}{16}$ 印張·134,000字

1960年2月第 1 版

1960年2月第一次印刷

印數：1—2,000

統一書號：14106·58

定 價：（8）0.38 元

前 言

中藥是祖国医学极其重要的一个組成部分。最近几年来，党一再号召繼承和发揚祖国医学遺產，在党的中医政策指导下，这方面已經得到了很大的成績。

湖北省藥材資源丰富，蘊藏量大，品种很多。为了响应党的号召，充分發揮这些藥材的作用，我們特把它們作了整理并且編写成为本書。

这本书介紹的藥材只有 337 种，都是常用的藥材。它就这些藥材的特征、性味、加工方法和用途等等，都作了簡單明确的說明，同时也介紹了藥材質量和真偽的鉴别方法。对一般中医、藥工作者包括藥材采購人員，有一定的参考价值。

这本书的編写是由我們委托中国藥学会武汉分会，邀請武汉市藥檢所、武汉市藥材公司、中联藥厂等有关单位的有經驗的藥工同志組成整理委员会来进行的。在整理編写的过程中，对藥材实物标本进行了具体的研究，同时也吸收了藥农、藥工的实际經驗。自1957年9月份开始整理，历时一年多，到1958年11月止，才完成書稿。但是內容还不够完整，各种藥材的性味和用途，沒有說明，而是后来在出版之前委托湖北省中医学院补充的。

这本书的編成，虽然經過了很多同志的努力，但并不能說完美无缺。我們希望讀者多多提出意見，并且把意見写給我們，以便再版时作进一步的修改和补充。

湖北省卫生厅

1959年11月

目 录

植物部分 1

根和根莖类 1

大黃(馬蹄黃)..... 1

大蘄..... 1

大伸筋..... 2

土牛膝..... 2

土茯苓..... 3

山豆根..... 3

山藥(原名薯蕷)..... 4

小蘄..... 4

水菖蒲..... 5

天花粉..... 5

天南星..... 6

天麻..... 7

天門冬..... 8

天葵子..... 9

升麻..... 9

白朮..... 10

白芍..... 10

白芨..... 11

白芷..... 12

白前..... 12

白薇..... 13

白蘇..... 13

白藥..... 14

白附子..... 14

白茅根..... 16

白头翁..... 16

玉竹(又名萎蕤)..... 16

生地黃..... 17

甘遂..... 17

半夏..... 18

玄參..... 19

未牛膝..... 19

北柴胡..... 20

百合..... 21

百部..... 21

百節連..... 22

防己(漢防己)..... 22

防風..... 23

西芎(藁本)..... 23

地榆..... 24

赤芍..... 24

貝母(板貝)..... 25

何首烏..... 26

芎藭(卽川芎)..... 26

狗脊..... 27

青木香..... 27

明黨參..... 28

苦參..... 29

前胡..... 29

威靈仙..... 30

活血蓮..... 30

紅丹参	31
紅柴胡	31
香附子	32
南沙参(泡参)	33
茄根	33
草烏	34
草河車(即紅蚤休)	34
茶芎	35
茜草	35
秦艽	36
狼毒	36
烏藥	37
射干	37
結梗	38
骨碎补	38
黃連	39
黃耆	40
黃精	40
黃藥	41
常山	41
麥冬(麦門冬)	42
商陸	42
紫苑	43
紫草	43
紫竹根	44
貫众	44
草薺	45
当归	45
远志	46
葛根	47

蒼朮	47
漏蘆	48
独活	48
姜黃	49
龍胆	50
薤白	50
藜蘆	51
蘆根	51
党参	52
紫苏子	53
續斷	53
种子果实类	54
刀豆子	54
刀豆壳	55
八厘麻	55
大力子(牛旁子)	55
大胡麻	56
山楂	57
小茴香	57
女貞子	57
木瓜	58
火麻仁	59
木鱧子	59
五味子	59
王不留行	60
白果(銀杏)	61
冬瓜子	61
冬瓜皮	62
冬葵子	62
玉苏子	62

石榴皮.....	63	馬兜鈴.....	77
瓜蒌子.....	63	草決明.....	78
瓜蒌皮.....	64	梔子.....	78
奶母.....	64	麦芽.....	79
地肤子.....	65	連翹.....	79
皂角.....	65	蛇床子.....	80
車前子.....	66	牽牛子.....	80
青皮.....	66	豬牙皂.....	80
青葙子.....	67	楮實子.....	81
吳茱萸.....	67	黃荊子.....	81
芡莢(又名鷄頭米).....	68	萊菔子.....	82
花椒.....	68	无花果.....	82
芫荽子.....	69	絲瓜絡.....	83
金鈴子.....	69	槐角.....	83
金櫻子.....	70	韭菜子.....	84
刺楸藜.....	70	葶藶子.....	84
芥子.....	70	預知子.....	85
枳壳.....	71	路路通.....	85
枳實.....	72	谷芽.....	86
枳椇子.....	72	蒼耳子.....	86
柏子仁.....	72	蓖麻子.....	86
柿蒂.....	73	酸枣仁.....	87
白扁豆.....	73	榧子.....	87
苦杏仁.....	74	蓮子.....	88
郁李仁.....	74	蔓荊子.....	88
急性子.....	75	橙茄子.....	89
陈皮.....	75	薏苡仁.....	89
烏梅.....	76	复盆子.....	90
桑椹.....	76	藥桃仁.....	90
茺蔚子.....	77	鶴虱.....	91

草 类91

九头獅子草.....91

木賊草(即节节草).....92

分經草.....92

石葦.....93

仙桃草.....93

仙鶴草.....93

半边蓮.....94

地菜花(即蔞菜).....94

老鸛草.....95

伸筋草.....95

車前草.....96

旱蓮草.....96

荊芥.....97

青蒿.....97

金牛草.....98

佩兰叶.....98

岩白菜.....99

芫荽菜.....99

卷柏.....99

香薷.....100

肺經草.....101

茵陈(綿因陈).....101

細辛.....102

馬鞭草.....102

馬齒莧.....103

益母草.....103

浮萍草.....104

逍遙竹(即徐长卿).....104

寄生.....105

浸竹叶.....105

淫羊藿.....105

魚腥草.....106

紫苏.....106

紫花地丁.....107

寻骨风.....108

篇蓄.....108

蒲公英.....109

谷精草.....109

稀签草.....110

凤尾草.....110

刘寄奴.....110

澤兰叶.....111

醒头香(即省头草).....111

薄荷.....112

鮮石斛.....113

鮮藿香.....113

瞿麦.....114

鵝不食草.....114

叶 类.....115

十大功劳.....115

大青叶.....115

冬桑叶.....116

艾叶.....116

枇杷叶.....117

苦丁茶.....117

荷叶.....118

側柏叶.....118

花 类.....119

木槿花.....119

月季花	119	厚朴	135
合欢花	120	苦楝皮	136
辛夷	120	桂皮	136
芫花	121	桑皮	137
金銀花	121	釘桐皮	137
松花粉	122	黃柏	138
紅花	122	椿根白皮	138
厚朴花	123	姜皮	139
风茄花	123	藤木类	139
扁豆花	124	大风藤(青风藤)	139
夏枯草	124	山木通	140
密蒙花	125	天仙藤	141
旋复花	125	天丁片	141
野菊花	126	石楠藤	142
款冬花	126	白通草	142
鬧羊花(即羊躑躅)	127	竹茹	142
腊梅花	127	血藤	143
槐米、槐花	128	西河柳	143
葛花	128	忍冬藤(金銀花藤)	144
蒲黃	129	鬼箭羽	144
蓮須	129	夜交藤(即首烏藤)	145
鷄冠花	130	桑枝片	145
皮 类	130	鈎藤	145
五加皮	130	动物部分	147
白蘚皮	131	水蛭	147
杜仲	131	牛黃	147
全皮	131	五谷虫	148
地骨皮	133	五灵脂	148
合欢皮	133	全虫	149
牡丹皮	134		

虎骨	150
虻虫	150
紅娘	151
豹骨	151
夜明砂	152
桑螵蛸	152
干蟾	153
望月砂	153
刺猬皮	154
斑蝥	154
蜂房	155
蜂蜜	155
熊胆	156
蜈蚣	156
猴骨	157
虻螂虫	157
龟板	158
螻蛄虫	158
龙衣	159
蟬蛻	159
蟾酥	160
鼈甲	160
雞內金	161
麝香	161
蚕砂	162

矿物部分.....163

石膏	163
白石英	163

赤石脂	164
青礞石	164
活磁石	164
阴起石	164
硫磺	165
阳起石	165
滑石	165
无名异	166
紫石英	166
寒水石	166
龙骨	167
黛赭石	167
鵝管石	168
鍾乳石	168

其他部分.....169

五倍子	169
石耳	169
血木耳	170
松茯苓(野茯苓)	170
茯苓	170
馬勃	173
海金砂	173
海风藤	174
雷丸	174
銀耳	175
猪苓	175
樟腦粉	175

植物部分

根和根莖类

大黃(馬蹄黃)

产地：恩施、宜昌专区等地。

栽培、野生：栽培，也有少数野生。

采集季节：二、八月采。

藥用部分：根莖。

鉴别特征：外表黑褐色，內黃褐色，周圍長五、六寸至尺許，呈蘿卜形、圓筒形或球狀，一面扁平，一面凹凸。橫切馬蹄片為馬蹄大黃，片面有大理石紋，邊緣粗糙，味苦，瀉泄峻快，有將軍之稱。俗稱生大黃為生軍。

加工方法：挖回去掉須根，刮去粗皮，切成二寸厚的片子，晒干或炕干。

品質規格：以色黃、身干、無虫傷的為好。色發紅帶黃色而質細嫩的最佳。

性味：苦、寒。

用途：下積滯、泄實熱。治大便秘結、癥瘕、瘀血。

大蓴

产地：孝感专区。

栽培、野生：野生。

采集季节：夏季。

藥用部分：根。

鑑別特征：莖大，根粗如指，彎曲形，有分枝，長達五六寸，有根須，外表灰褐色，內部紫褐色，質韌不易折斷，有粗筋，皮上微有縱皺紋。味微苦帶澀。

加工方法：挖回洗淨泥土晒干。

品質規格：以身干、去蘆、根粗大、無泥土的為好。

性味：甘、平。

用途：破血消瘀，涼血止血。治吐衄崩中，痛腫金瘡。

大伸筋

產地：孝感專區。

栽培、野生：野生。

採集季節：夏季。

藥用部分：根。

鑑別特征：地下莖莖一根長二、三寸，彎曲形，周圍須根叢生，長尺許，形如未夕，根灰黃色，皮薄，中心有骨，堅韌不易折斷。味甘淡。

加工方法：挖回後去蘆梗，洗淨泥土晒干。

品質規格：不分等級，以莖大、根須長、色黃白、身干的為好。

性味：待考。

用途：治關節不利，筋骨疼痛。

包裝：簍裝。

土牛膝

產地：湖北漢陽、武昌等地。

栽培、野生：野生。

採集季節：四季採，鮮用。

藥用部分：根。

鉴别特征：上有蘆莖四、五寸长，色青有空心，自根莖分枝，粗如笔杆，长五、六寸至尺許，色黃白，質硬有筋。味苦。

加工方法：藥鋪挖回栽培，随用随取，或挖出洗淨泥土、晒干备用。

品質規格：鮮貨以根肥、色白黃的为好。干貨以身干、去蘆、无泥土的为好。

性味：苦、微寒。

用途：破血泻热，散結杀虫。治鼻衄咽喉肿痛及血癥諸毒疮肿。

土茯苓

产地：孝感专区。其他各地也有。

栽培、野生：野生。

采集季节：四季都可采集。以春、秋为好。

藥用部分：莖根莖。

鉴别特征：形状莖不整齐，表面粗糙，凹凸不平，有疤痕，并生有刺。外皮为褐色。切片后新鮮时切断面为黃白色，放置后則从黃白色轉为粉紅色。干时起粉，遇水后起泡沫粘手，汁厚而滑。味甘淡微苦。

加工方法：挖出后，除掉泥土和須根，乘新鮮时切成薄片，当天晒干。

品質規格：不分等級，以片薄、色黃白、起粉、无丁角碎杂的为好。色全紅者不合規格。

性味：淡、平。

用途：除湿解毒。治梅毒瘰癧，骨病恶疮。

山豆根

产地：襄陽、孝感、黃岡专区及其他地方均有。

栽培、野生：野生。

采集季节：秋、冬二季。

藥用部分：根。

鉴别特征：外皮褐黄色，有皺紋及細小点不規則弯曲形，全长7—10寸，內黄色，外皮脫落后，內現木質圓柱，味苦。

加工方法：采回，去泥土毛須，折去蘆头晒干。

品質規格：以身干、无細枝、无蘆、无毛須的为好。

性味：苦、寒。

用途：清热解毒、消肿止痛，治喉风咽痛，諸热肿毒。

备考：有一种西豆根，产于綏远一带，又名苦甘草，外形內面均与甘草相似，唯味颇苦。山豆根及西豆根均用于治喉症。

山藥(原名薯蕷)

产地：利川、光化等地。

栽培、野生：家种。

采集季节：霜降后。

藥用部分：根。

鉴别特征：原植物根皮灰黄色，刮去外皮搓成圓柱形，为光条；扁圓形不搓者为毛条。味甘。

加工方法：取根时勿伤苗，来年再結根。①用竹刀刮去毛須及粗皮，上硫磺炕熏后晒干，即为毛条。②粗肥者同法去皮毛，温水浸洗，硫磺熏一天，晒干，用木板搓圓再晒，用刀切齐两头，用水潤浸后，被盖发汗，再搓，用木賊草或砂紙打光，晾干。

品質規格：分光条、毛条。光条以白色有粉性的为佳。

性味：甘、平。

用途：补脾健胃。治虛劳咳嗽，泄瀉久痢，遺精带下。

小薊

产地：孝感专区。

栽培、野生：野生。

采集季节：夏季。

药用部分：根。

鉴别特征：莖状，形略如白薇而粗壮。一莖莖上生根十数枝不等，长三五寸。质坚肉细，易断，外面灰黄色，内部白色。味甘，有一点烟黄香气。

加工方法：挖回去蘆，洗净泥土晒干。

品质规格：不分等级，以身干无蘆、无泥土为佳。

性味：甘、平。

用途：功同大蘆，其力较小。

水菖蒲

土名：臭牡丹。

产地：汉阳、武昌、鹤峰及其他各处水地均产。

栽培、野生：野生。

采集季节：秋季。

药用部分：根。

鉴别特征：根多直生，多歧，枝节密，形如竹根，长尺许，外皮棕褐色，内部淡白色，质肥大坚硬，有筋。气香烈，味辛。

加工方法：挖回去掉苗叶毛须，洗后晒干。

品质规格：以根条粗肥、无泥土的为好。

性味：甘、温。

用途：去虫解毒。治风湿咳逆，断蚤虱疥瘡。

备考：另有一种石菖蒲，又名九节菖蒲，根浅莖横生，长约一寸左右，外皮黄色内面白色，粉性，有清芬香气，味甘微辛。

天花粉

产地：以嘉魚县蔣州产者为好，其他县亦产。

栽培、野生：野生。

采集季节：立秋后采挖。

藥用部分：根。

鉴别特征：为不规则的圆柱形，半圆柱形或块状，长短不一。外皮去净的现白色，或黄白色，并有黄色导管露出；外皮未去净的现土黄，或黄褐色，质地坚硬，但较易折断，断面白色，粉质，并有细小孔洞的导管分散其中。无臭，味酸甘苦。嘉魚产者为圆柱形而弯曲，色白、粉多、筋少、质坚、细嫩，味淡而微甜。其他各地产者，切片形状不一。外皮上的筋较粗。

加工方法：①嘉魚产者，刮去粗皮，清水漂四、五天，捞出，条粗者切对开片，晒干，雨天用小板灰火烘干，忌烟熏。②鄂西产者有一部切开后，泡入石灰水中三天后，用清水洗净晒干或烘干。③襄阳产者刮皮，切成小块，晒干。

品质规格：不分等级，以身干白色、起粉、筋少者为好。

性味：苦甘、寒。

用途：清热生津。治烦热作渴、痈肿折伤。

伪品名称：过去有用木别子根充花粉者，质较花粉孢松。

备考：加工方法，最好采用①法。

天南星

土名：独角莲根。

产地：恩施、宜昌专区以及其他山区各县。

栽培、野生：野生。

采集季节：处暑节前后。

藥用部分：球莖。

鉴别特征：白色粉果状，体扁、上部有凹窝如臼形，窝边