

诊断学多选题



主编 王申生 俞茂华



上海医科大学出版社

诊断学多选题

主 编 王申生 俞茂华

编写者 (以姓氏笔画为序)

王 赞 王申生 卢 清 江 勤

李益明 邹和健 陈勤奋 张 玉

单玉明 俞茂华 段 澜 顾美娣

董乃琪

上海医科大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

诊断学多选题/王申生,俞茂华主编. --上海:上海医科大学出版社,1999.12

ISBN 7-5627-0532-1

I. 诊… I. ①王… ②俞… II. 诊断学-自学参考资料
IV. R44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 63331 号

责任编辑 冯 晓

责任校对 赵 霞

诊断学多选题

主编 王申生·俞茂华

上海医科大学出版社出版发行

上海市医学院路 138 号

邮政编码 200032

新华书店上海发行所经销

上海新文印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5 字数 148 000

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—10 500

ISBN 7-5627-0532-1/R·502

定价: 7.50 元

如遇印、装质量问题,请直接与印刷厂联系调换

(地址:上海共和新路纪蕴路 14 号 邮编:200435)

前 言

本书的编写是根据《诊断学》教学大纲,以林果为教授主编的《内科诊断学》教材为命题依据,并参考卫生部规划教材《诊断学》。本书的编写目的是为了帮助医学院校学生、研究生和青年临床医师复习用。由于《诊断学》是一门培养临床实践能力为主的学科,很多应用能力的试题很难用文字题来表达,如心肺听诊、技能操作、血液细胞和寄生虫卵检验等内容,以多媒体计算机技术予以表达和采用计算机进行考试为宜。因此,在本书出版的同时,配有多媒体计算机软件,以弥补本书的不足。

本书心电图部分承蒙华山医院心血管科主任范维琥教授审阅,在此谨表诚挚的感谢!

上海医科大学华山临床医学院

王申生

目 录

检体诊断	(1)
1. 病史缮写及体检方法(1-1~142)	(1)
2. 消化系统症状与体征(2-1~110)	(28)
3. 循环系统症状与体征(3-1~130)	(44)
4. 呼吸系统症状与体征(4-1~91)	(64)
5. 其他症状与体征(5-1~30)	(76)
实验诊断与心电图诊断	(81)
6. 实验诊断(6-1~136)	(81)
7. 心电图诊断(7-1~122)	(103)
答 案	(148)

检 体 诊 断

1. 病史缮写及体检方法(1-1~142)

- 1-1 在主诉的书写要求中,下列哪项是不正确的()
- A. 指出患者本次发病主要属何系统
 - B. 指出本次疾病是急性还是慢性
 - C. 指出疾病并发症的可能
 - D. 文字精练,用语准确
 - E. 指出疾病的发展及预后
- 1-2 病程记录的书写要求中,下列哪项是不正确的()
- A. 病程中症状和体征的变化
 - B. 辅助检查的结果及临床分析
 - C. 各级医师查房及会诊
 - D. 临床诊断操作及治疗措施
 - E. 每天均应记录1次
- 1-3 主诉的含义下列哪项是正确的()
- A. 指患者的主要症状或体征,及其就诊的时间
 - B. 指患者的主要症状或体征,及其起病的时间
 - C. 指患者的主要症状或体征,及其发病的频率
 - D. 指患者的主要症状或体征,及其严重的程度
 - E. 指患者的主要症状或体征,及其发生和持续的时间
- 1-4 儿科患者的过去病史应包括下列哪项()
- A. 患病史,喂养史
 - B. 生长发育史
 - C. 预防接种史
 - D. 生活史

E. 以上均应包括在内

1-5 传染病的潜伏期与下列哪些因素有关()

- A. 感染病原体的毒力
- B. 人体的免疫状态
- C. 感染病原体的数量
- D. 感染病原体的种类
- E. 以上均有关

1-6 过去病史应包括下列哪几项()

- A. 传染病史及传染病接触史
- B. 外伤手术史
- C. 预防接种史和过敏史
- D. 家族史
- E. 以上均应包括在内

1-7 转科记录的书写应该是()

- A. 由转出科的住院医师(或实习医师)或主治医师书写(或复签)
- B. 有接受科的住院医师(或实习医师)或主治医师书写(或复签)
- C. 由转出科的护士长书写
- D. 由转出科和接受科的住院医师(或实习医师)或主治医师同时书写(或复签)
- E. 以上均可以

1-8 手术记录的书写者应是()

- A. 负责病人的实习医师
- B. 负责病人的住院医师或主治医师
- C. 手术医师或手术医师指派的第一助手书写,由手术医师审阅修改后复签
- D. 参加手术的医师均可以负责书写
- E. 以上均可以,有人负责即可

1-9 新病人的入院录和完整病史应在多少时间内完成()

- A. 24h 内
- B. 48h 内
- C. 按各医院规定
- D. 负责的床位医生夜休时,可以允许延长时

- E. 以上均可,只要上级医师同意即可
- 1-10 死亡录应在多少时间内完成()
- A. 死亡当天
B. 在尸体火化前
C. 在家属办理手续前
D. 可与家属协商决定
E. 以上均可
- 1-11 再入院录中可以省略的病史部分是()
- A. 既往史,个人史和家族史
B. 个人史和家族史
C. 手术史和过敏史
D. 既往史
E. 以上均不可省略
- 1-12 现病史应包括下列哪些内容()
- A. 起病时间,起病情况和可能的诱因
B. 主要症状的描述
C. 病情的发生、发展过程
D. 起病后诊疗过程以及与本次疾病相关的病史
E. 以上均应包括在内
- 1-13 关于叩诊问题,下列哪项是不正确的()
- A. 直接叩诊法,难于精确定位,只适于面积较广病变的检查
B. 病变范围小,部位浅者,间接叩诊叩击力量宜稍轻些
C. 病变范围大,部位深者,间接叩诊叩击力量宜稍轻些
D. 间接叩诊法叩诊时,应以腕关节及掌指关节运动叩击,而肩、肘关节不参与运动
E. 以上均不正确
- 1-14 关于叩诊音,下列哪项是不正确的()
- A. 正常肺组织的叩诊音为清音
B. 气胸含气量多,叩诊音为过清音
C. 肺气肿时肺组织松弛,叩诊音为鼓音
D. 被少量含气组织覆盖的实质脏器的叩诊音为过清音
E. 实质脏器的叩诊音为实音
- 1-15 按下列哪项推测年龄是不正确的()
- A. 皮肤弹性随年龄增长而减低
B. 牙齿脱落,大多数人已属老年

- C. 头发变白肯定已属老年
D. 角膜老年环见于 60 岁以上老年
E. 老年人大多肌肉萎缩松弛
- 1-16 第二性征的区别,下列哪项是不正确的()
A. 体毛和阴毛分布的特征 D. 皮肤色素分布
B. 乳房发育及皮下脂肪 E. 声音强弱和音调
C. 肌肉发达程度
- 1-17 肺和胸膜触诊下列哪项是不正确的()
A. 呼吸运动度检查时,病人应该深呼吸运动
B. 应在胸廓对称部位作比较检查
C. 以手掌或掌侧缘作语震检查
D. 胸膜摩擦感以胸侧壁下部较易触及
E. 触诊应自上而下循序进行
- 1-18 关于肺部叩诊下列哪项是不正确的()
A. 叩诊的顺序为,自上至下,由前至后,左右对称比较叩诊
B. 叩诊时应注意音响变化
C. 叩诊前胸与侧壁时,板指与肋间平行
D. 叩诊肩胛间区板指应与脊柱平行
E. 叩肩胛下区时板指放置应与肋间隙呈垂直位
- 1-19 区别腹部肿块来自腹腔或腹壁最简易的方法是()
A. 胃肠钡餐检查 D. 腹部 X 线平片检查
B. 超声波检查 E. 放射性核素扫描
C. 腹部体检诊断
- 1-20 肝硬化所致腹水和下肢水肿与左心衰竭所致者最可靠的鉴别点是()
A. 肝脏是否肿大 D. 脾脏是否肿大
B. 颈静脉是否怒张 E. 以上均不是
C. 有无呼吸困难
- 1-21 关于腹部体检下列哪项是错误的()
A. 振水音见于幽门梗阻
B. 右肋下扣及肝脏提示肝肿大

- C. 脾脏正常时不能触及
 D. 肠鸣音消失可见于肠麻痹
 E. 腹主动脉搏动在正常人也触及其
- 1-22 检查发现患者胸廓的前后径等于横径,并伴肋间隙增宽者,应考虑为()
- A. 扁平胸
 B. 鸡胸
 C. 桶状胸
 D. 漏斗胸
 E. 佝偻病胸
- 1-23 风湿性心脏病二尖瓣狭窄最具诊断价值的检查是()
- A. 心电图检查
 B. 胸廓 X 线平片
 C. 检查关节有无红肿、热、痛表现
 D. 心脏 CT 和磁共振检查
 E. 心脏听诊
- 1-24 正常成人血压标准(WHO)是()
- A. $\leq 18.7/12 \text{ kPa}$ (140/90 mmHg)
 B. $< 18.7/12 \text{ kPa}$ (140/90 mmHg)
 C. 收缩压 $< 18.7 \text{ kPa}$ (140 mmHg)
 D. 舒张压 $< 12 \text{ kPa}$ (90 mmHg)
 E. 以上均不是
- 1-25 测血压时,袖带过窄将使测得的血压()
- A. 较实际增高
 B. 较实际降低
 C. 舒张压较实际降低,而脉压差增大
 D. 脉压差较实际降低
 E. 不受影响
- 1-26 测血压时,听诊器胸件应放置在()
- A. 袖带内血管搏动处
 B. 袖带下血管搏动处
 C. 袖带下 2~3cm 血管搏动处
 D. 袖带能压住胸件且能触及血管搏动处

E. 以上均可

1-27 正常人心尖搏动应位于()

A. 左第 5 肋间隙锁骨中线内侧 0.5~1.0cm

B. 左第 5 肋间隙锁骨中线上

C. 左第 5 肋间隙锁骨中线内侧 2cm

D. 左第 6 肋间隙锁骨中线内侧 1.0cm

E. 左第 6 肋间隙锁骨中线内侧 0.5~1.0cm

A 1-28 正常人心尖搏动的范围为()

A. 2.0~2.5cm

D. 1.0~2.5cm

B. 1.5~2.5cm

E. 1.5~2.0cm

C. 1.0~2.0cm

1-29 关于心脏听诊,下列哪项是错误的()

A. 听诊顺序一般由二尖瓣区开始,依次为主动脉瓣区,第二主动脉瓣区,肺动脉瓣区及三尖瓣区

B. 听诊内容应包括心率、心律、心音、杂音及心包摩擦音

C. 成人正常心率应在 60~100 次/分

D. 听诊杂音时应注意杂音的部位、时期、性质、强度及传导

E. 健康青年及儿童可有窦性心律不齐,表现为呼气时心率增速,吸气时心率减慢

1-30 关于乳房的检查下列哪一项是不正确的()

A. 挤捏乳房可助于良恶性肿瘤的鉴别

B. 检查乳房内半侧肿块时,嘱病人举臂触诊

C. 检查乳房下部肿块时,嘱病人平卧举臂触诊

D. 检查乳房外半侧肿块时,嘱病人垂臂触诊

E. 应用手指掌面循序轻轻触按乳房

1-31 三叉神经的功能不包括()

A. 面部表情肌运动

D. 下颌反射

B. 面部感觉

E. 角膜反射

C. 咀嚼运动

1-32 病理反射的出现是由于()

A. 脊髓反射弧的损害

B. 神经系统兴奋性增高

- C. 脑干网状结构损害
D. 锥体束受损
E. 基底节受损

1-33 关于皮肤检查描述下列哪项是不正确的()

- A. 皮肤粘膜出血,形成红色或暗红色斑,压之不褪色
B. 皮肤粘膜出血,不高出皮肤,<2mm者,为出血点
C. 荨麻疹呈苍白或片状发红改变,不突出皮肤表面
D. 皮肤粘膜出血,高出皮肤,有波动,>5mm为血肿
E. 皮肤有小红点,高出皮肤表面,压之退色者为丘疹

1-34 下列哪项体检不属于腹部触诊的内容()

- A. 压痛及反跳痛
B. 腹肌紧张度
C. 振水声
D. 肝脏
E. 脾脏

1-35 鉴别颈动脉搏动与颈静脉搏动具有价值的是()

- A. 搏动的位置
B. 搏动的范围
C. 搏动部位是否伴有血管杂音
D. 触诊指尖的搏动感,颈动脉的搏动感较强
E. 以上均不是

1-36 下列指标中,哪项不是判断成年人发育正常的指标()

- A. 胸围约等于1/2身高
B. 坐高约等于下肢长度
C. 身高约等于两手平展之间的距离
D. 头长为身高的1/7
E. 正力型体型

1-37 判断人体脂肪充实程度最方便、最适宜的部位是()

- A. 前臂曲侧或上臂背侧下1/3
B. 大腿内侧中部
C. 腹壁中上方
D. 上肢鱼际部
E. 腹壁脐部

1-38 消瘦的诊断标准是()

- A. 体重至少减轻正常的 10%
 - B. 体重至少减轻正常的 15%
 - C. 体重至少减轻正常的 20%
 - D. 体重至少减轻正常的 25%
 - E. 以上均不是
- 1-39 肥胖的诊断标准是()
- A. 体重至少超过标准体重的 20%以上
 - B. 体重至少超过标准体重的 15%以上
 - C. 体重至少超过标准体重的 10%以上
 - D. 体重至少超过标准体重的 5%以上
 - E. 以上均不是
- 1-40 单纯性肥胖的特征中,下列哪项是不正确的()
- A. 全身脂肪分布均匀
 - B. 常有一定的遗传倾向
 - C. 青少年期有时可见外生殖器发育迟缓
 - D. 一般无自觉症状
 - E. 青年期表现为成长较一般为快
- 1-41 关于意识状态,下列哪项是不正确的()
- A. 意识状态是大脑高级神经中枢功能活动的综合表现
 - B. 凡能影响大脑功能活动的疾病皆会引起不同程度的意识障碍
 - C. 根据意识障碍的程度可分为嗜睡、意识模糊、昏睡、昏迷及谵妄
 - D. 临床上可用问诊方法来检查病人的意识状态
 - E. 以上均不正确
- 1-42 关于腮腺检查,下列哪项是不正确的()
- A. 腮腺位于耳屏、下颌角和颧弓所构成的三角区内
 - B. 正常的腮腺边缘清楚无压痛
 - C. 腮腺炎症时,边缘不清,有压痛
 - D. 腮腺导管开口于上颌第二磨牙对面的颊粘膜上
 - E. 腮腺肿大时可见的耳垂为中心的局部隆起

- 1-43 关于腹部检查,下列哪项是不正确的()
- A. 正常人肝上界为右锁骨中线第 5 肋间
 - B. 正常人脾浊音区为左腋中线 9~11 肋间
 - C. 正常人空腹时不能听到振水音
 - D. 正常人肠鸣音约 10 次/分
 - E. 正常人的脾脏不能扪及
- 1-44 心脏瓣膜听诊区,下列哪项是正确的()
- A. 主动脉瓣区在胸骨左缘第 2 肋间
 - B. 肺动脉瓣区在胸骨右缘第 2 肋间
 - C. 三尖瓣区在胸骨左缘第 3、4 肋间
 - D. 二尖瓣区在心尖区
 - E. 第二主动脉瓣区在胸骨左缘第 4、5 肋间
- 1-45 下列腹部脏器检查采用的方法,哪项是不正确的()
- A. 检查腹壁紧张度及压痛,宜用深触诊法
 - B. 检查肝、脾宜用深部滑行触诊法
 - C. 检查肾脏宜用双手触诊法
 - D. 腹水时检查腹内肿块宜用冲击触诊法
 - E. 腹壁薄软者和儿童患者宜用钩指触诊法
- 1-46 关于腹部触诊和反跳痛,下列哪项是不正确的()
- A. 正常腹部无压痛和反跳痛
 - B. 腹内脏器的炎症未累及壁层腹膜时仅有压痛
 - C. 腹内脏器的炎症累及壁层腹膜时可有反跳痛
 - D. 腹膜刺激征包括腹肌紧张度增加、压痛及反跳痛
 - E. 将腹痛区腹壁抓起,若腹痛加剧,则提示腹痛并非来源于腹壁或腹部皮肤
- 1-47 关于肝脏的触诊,下列哪项是不正确的()
- A. 右肋下扪及肝脏,提示肝肿大
 - B. 肝脏的长径为 9~11 cm
 - C. 在肝下缘扪及时,应叩肝上界,方能确定是否有肝肿大
 - D. 肝脏触诊时应注意肝脏大小、质地、压痛、表面形态、边缘、搏动及摩擦感

E. 肝上界消失提示膈下有游离气体

1-48 关于病人的体位,下列哪项是错误的()

- A. 病人的体位是指安息状态所采取的体位
- B. 自动体位是指正常人的体位
- C. 被动体位是指病人自己不能调整或变换体位
- D. 强迫体位是指病人为减轻疼痛被迫采取的体位
- E. 以上均是错误的

1-49 下列哪项不属于生命体征()

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 意识

1-50 关于体温测试,下列哪项是错误的()

- A. 正常人口腔温度为 $36.3 \sim 37.2^{\circ}\text{C}$
- B. 小儿和昏迷病人不宜使用口测法
- C. 肛测法体温通常比口测法高 $0.3 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$
- D. 幼儿和神志不清病人应采用腋测法
- E. 肛门疾患病人不宜采用肛测法

1-51 关于淋巴结的检查,下列哪项是不正确的()

- A. 淋巴结检查的内容应包括淋巴结的部位、大小、数目、硬度、压痛、活动度和粘连融合等情况
- B. 颈部淋巴结检查时,检查者应站立在病人背后或前面
- C. 检查者手指紧贴检查部位,由浅入深滑动触摸
- D. 触诊时病人头稍低或偏向检查侧
- E. 触诊时病人头稍抬或偏向检查对侧

1-52 关于锁骨上淋巴结检查,下列哪项是不正确的()

- A. 左侧锁骨上淋巴结群收集食管、胃等器官的淋巴液
- B. 右侧锁骨上淋巴结群收集气管、胸膜、肺等器官的淋巴液
- C. 锁骨上淋巴结群收集头颈部淋巴液和胸部淋巴液
- D. 检查时被检查者取坐位或卧位
- E. 检查时被检查者头部偏向前屈,用双手进行触诊,左手触诊右侧,右手触诊左侧

- 1-53 关于淋巴结检查,下列哪项是不正确的()
- A. 淋巴结分布全身,体检时一般只能检查身体各部浅表淋巴结
 - B. 正常淋巴结直径多为 0.2~0.5cm
 - C. 正常淋巴结直径多<1cm,无压痛
 - D. 正常淋巴结质地柔软
 - E. 正常淋巴结表面光滑,与周围毗邻组织无粘连、无压痛
- 1-54 关于浅表淋巴结的淋巴液回流,下列哪项是不正确的()
- A. 耳后、乳突区淋巴结群收集头皮范围的淋巴液
 - B. 颈深淋巴结上群收集鼻咽部淋巴液
 - C. 颈深淋巴结下群收集咽喉、气管和甲状腺等处淋巴液
 - D. 颌下淋巴结群收集唇、舌部和颌下三角区内淋巴液
 - E. 腹股沟淋巴结群收集下肢和会阴部淋巴液
- 1-55 关于非特异性淋巴结炎的淋巴结肿大,下列哪项是不正确的()
- A. 化脓性扁桃体炎、牙龈炎所致的淋巴结肿大属于非特异性淋巴结肿大
 - B. 非特异性淋巴结炎的淋巴结肿大:柔软,有压痛
 - C. 非特异性淋巴结炎的淋巴结肿大表面光滑,无粘连
 - D. 非特异性淋巴结炎的淋巴结肿大,肿大到一定程度可停止
 - E. 非特异性淋巴结肿大至慢性时,质地增加,再就不会缩小或消退
- 1-56 关于淋巴结结核的淋巴结肿大,下列哪项是错误的()
- A. 肿大的淋巴结常发生在颈部血管周围
 - B. 多是多发性,质地稍硬,大小不等
 - C. 可相互粘连或与周围组织粘连
 - D. 晚期可溃破并成瘻管,愈合后可成瘢痕
 - E. 有红肿、热、痛,但不会有波动感
- 1-57 关于恶性肿瘤淋巴结转移,下列哪项是错误的()
- A. 肿瘤转移性淋巴结质地坚硬,但表面常光滑
 - B. 胸部肿瘤多向两侧锁骨上窝和腋窝淋巴结群转移
 - C. 胃癌多向左侧锁骨上淋巴结群转移

- D. Virchow 淋巴结为胃、食管癌转移的标志
- E. 肺部恶性肿瘤多向右锁骨上淋巴结群转移

1-58 下列哪项疾病不会发生全身性淋巴结肿大()

- A. 急、慢性淋巴结炎
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 淋巴瘤和急、慢性白血病
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 原发性血小板减少性紫癜

1-59 关于 Virchow 淋巴结()

- A. 是胸导管进颈静脉入口处的淋巴结群
- B. 是胃癌转移的常见部位
- C. 是食管癌转移的常见部位
- D. 是肺癌转移的常见部位
- E. 是胃癌和食管癌转移的常见部位

1-60 测量头围的方法是()

- A. 软尺自眉间绕到颅后通过枕骨粗隆
- B. 软尺环绕颅部最宽处
- C. 软尺自眉间绕到颅后通过两侧乳突
- D. 软尺自两颊部绕到颅后通过枕骨粗隆
- E. 以上均不是

1-61 新生儿头围变化的正常规律,哪项是不正确的()

- A. 新生儿头围约 34cm;出生后前半年增加 8cm;后半年增加 3cm;
- B. 第 2 年增加 2cm;第 3、4 年内增加 1.5cm
- C. 4~10 岁共增加约 1.5cm,到 18 岁可达 53cm 左右
- D. 新生儿出生后每年增加 2cm,至 18 岁为止
- E. 18 岁以后可无变化

1-62 关于新生儿头颅的发育,下列哪项是不正确的()

- A. 矢状缝和其他颅缝大多在出生后 6 个月内骨化
- B. 小儿囟门多在出生 12~18 个月内闭合
- C. 小儿囟门闭合过早可形成小头畸形