

婦科學目錄

總論

診療法

各論

第一章 外陰部病

- (一) 外陰部炎(陰門炎).....四
- (二) 外陰部搔癢症.....六

婦科學目錄

(三) 陰瘻.....七

(四) 外陰部尖圭贅肉.....八

第二章 陰道病.....八

(一) 鎖陰.....九

(二) 陰道炎.....九

第三章 子宮病.....一三

(一) 子宮內膜炎.....一三

(二) 子宮實質炎.....一六

(三) 子宮外膜炎.....一七

(四) 子宮癌腫.....一八

(五) 子宮肌腫.....二〇

第四章 卵巢病.....二一

(一) 卵巢炎.....二一

(二) 卵巢囊腫	一二二
第五章 輸卵管病	一二三
(一) 輸卵管炎	一二三
第六章 膀胱病	一二四
(一) 膀胱炎	一二四
(二) 膀胱結石及異物	一二八
第七章 月經病	一二八
(一) 月經困難	一二八

(二) 月經過多	一二三
(三) 月經過少及無月經	一二三
(附) 不妊症	一二五
第八章 女子淋病	一二六
第九章 女子梅毒	一二四
第十章 白帶	一二四
(附) 婦科各種新藥	一二六
(附) 編者實驗摘要	一二五

婦科學

張崇熙醫師編

總論

診察法

診察婦科疾患。須先問診。詢其既往症與現在自覺症。次行他覺的檢查。茲述其概要如下。

(一) 既往症

既往症宜注意者。有下列種種。

(1) 姓名，年齡，住址，職業，分娩回數等。

(2) 父母，兄弟，姊妹之健否，遺傳素因之有無（例如結核，精神病，梅毒，惡性腫瘍等）。

(3) 月經初潮之時間，其後之經過，血量多寡，有否苦痛，及其程度，最後月經之時期及經過。若係老人。則詢閉經期之時日，其後之經過，有否障礙等。

(4) 有無結婚，婚時之年齡，並詢其夫之健康狀態（殊於梅毒淋病時須注意）。

(5) 分娩之次數，及分娩產褥之經過，小兒發育狀態等。

(二) 現在症

起病之日期。其後之經過及主訴。(殊於疼痛，月經異常，白帶，出血等之有否，及其性狀，程度，部位須注意)。有腫瘍者。須留意其大小，硬軟，移動性，部位，以及對於鄰接臟器(膀胱直腸)之影響。

最後乃問食慾，消化，大便，小便，睡眠，以及其他神經系統之狀況，體重等。

(三) 他覺的診察

他覺的診察。以診察生殖器及與之有密接關係之器官爲主。此外尙須診察患者之體格，營養狀態，姿勢，胸廓，乳腺，脈搏，體溫，呼吸，大小二便，循環器，呼吸器，泌尿器，神經系統，及五官等。至視診，觸診，打診，聽診等。則皆與內外科同。

(四) 子宮鏡診

法以子宮鏡(一名陰道鏡)插入陰道。露出子宮腔部及腔壁而視察之。但子宮鏡種類甚多。通常吾人最實用者。爲苦斯高(Cusco)氏子宮鏡。此鏡形如鴨嘴。由兩瓣而成。當檢查時。令患者脫去下衣。露出外陰部。檢者以一手之拇指及示指

充分將陰唇向左右撥開。他手取此鏡（須先用石炭酸水消毒，塗橄欖油或凡士林於鏡之兩瓣）。斜向陰道內插入。且輕迴轉將瓣放開。以露出子宮陰道部。而詳察其病狀。視察完畢。先閉鎖子宮鏡之兩瓣。而後徐徐拔出。

（五）直腸診

法先用橡皮手套或指套。套着左手。以示指由肛門插入直腸內。則能觸知子宮之下部。若欲觸診子宮之上部。則再插入中指。倘同時以拇指插入陰道內。則所觸更明瞭。

（六）雙合診

行此法時。須先使患者膀胱直腸空虛。取尾骶背位。臥手術台上。下肢稍屈曲。勿故意努責。俾腹壁弛緩。檢者立於患者股間或其右側。以消毒之右手示指。塗布橄欖油或凡士林。而以左手之拇指及示指。撥開陰唇。右手示指。勿觸及外陰部。沿後陰道壁依骨盤軸之方向深入陰道內。此際右手之中指環指小指。須曲於掌內。置於會陰部。拇指置大陰唇之上或其側方。次乃以左手置於下腹部。其手掌對恥骨縫際部。指頭向臍窩。輕壓腹壁。挾內生殖器於內外兩手間。則可觸知其位置，大小，硬軟，移動性及壓痛之有無矣。

(附註) 女性病關於生殖器之事項。欲使盡情診查。吐露真相。實際上誠非易事。蓋婦人羞恥之感。總不能免。醫師祇能隨機應變。擇要診察。此外婦女陳述。往往好作欺詐夸大之詞。尤不可不注意焉。

各論

第一章 外陰部病 *Krankheiten der Vulva*

(一) 外陰部炎 (陰門炎) *Vulvitis*

(原因) 陰部不潔。房事過度，尿道癢，直腸癢，子宮內膜炎，手淫，外傷，糖尿病，淋病等而起。在敗血性產褥傳染及急性傳染病（傷寒，痘瘡，白喉，猩紅熱）。亦有發重病外陰部炎。其他因梅毒，結核而來者有之。

(症狀) 外陰部發赤腫脹，灼熱搔痒，步行疼痛，分泌增加。甚至發生糜爛。排泄粘液及膿液。

梅毒性者。於外陰部生特殊之潰瘍或贅肉。發大小陰唇浮腫。兼有硬固無痛之鼠蹊腺腫脹。梅毒初期硬結。無論何處。均可發生。最多者為陰蒂，繫帶，小陰唇內面等。軟性下疳。生於繫帶部。為多發性。邊緣銳利。發疼痛性鼠蹊腺腫脹。

(療法) 以除去原因爲最要。次患部之清潔。先以二%石炭酸水，或○・一%昇汞水，或○・一%過錳酸鉀液洗滌。其疼痛腫脹者宜令安臥。施以一至二%鉛糖水或醋酸礬土水罨包。急性症已去或不十分腫痛者。則洗滌後即可撒布 Dermatoī，或用後列處方。上貼棉花。施丁字帶。既變慢性者。剃除陰毛。用上述藥水洗後。塗布 Dermatoī，亞鉛華軟膏。搔痒劇甚者。可與陰門搔痒症同一處置。此外對於特殊原因傳染之陰門炎。各用原因療法。例如梅毒，試行水銀療法或注射六○六。急性傳染病，注射血清等是。

(處方)

海碘方 Jodoform

一・○

重曹 Natrium Bicarbonicum

五・○

澱粉 Amylum

五・○

上爲撒布劑

亞鉛華 Zincum Oxydatum

五・○

澱粉 Amylum

五・○

上同上

代馬妥耳 Dermati

五・○

亞鉛華 *Zincum Oxydatum*

五〇〇

澱粉 *Amylum*

五〇〇

上同上

溴化鉀 *Kalium Bromatum*

三〇〇

莨菪膏 *Ext. Scopoliae*

〇〇〇一

上分爲三包一日三次分服

(二) 外陰部搔痒症 *Furitus Vulvae*

(原因) 本症多見於年老肥胖婦人，或神經質婦人。又多起於閉經期之後。其原因爲糖尿病，白帶，手淫，腎臟膀胱等結石，黃疸，寄生蟲等。亦有並無上述誘因。而由神經障礙而起者。

(症狀) 外陰部有灼熱，搔痒之感。排尿及勞動後尤甚。外陰部皮膚有肥厚乾燥。因搔爬而生爬創。濕潤糜爛。又每誘發炎症。

(療法) 探求原因務除去之。以一或二%石炭酸水，利沙耳水，〇・二%過錳酸鉀水洗滌陰道及外陰部。大都可癒。搔痒劇甚時。用五%石炭酸罨包，或用五至一〇%科卡音，或沃度丁幾，硝酸銀濃溶液塗布。新藥可用五%甘羅美爽溶液洗

滌。對營養衰弱患者可內服砒素劑。神經質婦人。可試服溴素劑。

(處方)

硝酸銀 Argent Nitricum

一・〇

溜水 Aq. Dest

三〇・〇

上爲塗布用

鹽酸科卡音 Cocain Hydrochlorium

〇・一五

薄荷腦 Mentholum

一・〇

薩羅耳 Salolum

二・〇

橄欖油 Ol. Olivarum

二・〇

羊毛脂 Lanolin

三八・〇

上爲軟膏塗布用

俄耳妥方軟膏 五——二〇% Ung. Orthoform 一〇・〇

上爲塗布用

(二) 膣痙 Vaginismus

(原因)

本症因處女膜之知覺過敏而起。多見於 Hysterie 素因之婦人。

(症狀)

陰道入口。由陰莖或手指插入。雖僅輕度接觸。已覺劇強疼痛。而發陰

道括約肌，骨盤底諸肌，提肛肌，肛門括約肌等痙攣性收縮。終至不能交接。

(療法) 避免生殖器之刺戟。禁止交接。以管狀子宮鏡插入而擴張之。每星期二三次。漸次將陰道擴大。倘擴張時覺疼痛者。則可先塗布科卡音液而後行之。神經質婦人。投以鎮靜劑。其他增進營養，溫泉療法亦有小效。

(處方) 鹽酸科卡音 Cocain Hydrochloricum

1.00

溜水 Aq. Dest

110.00

上爲塗布劑

(四) 外陰部尖圭贅肉 Condylomata Acuminata Vulvae

(原因) 本症好發於妊婦。其原因爲白帶異常增加(淋毒性者居多)刺戟而起。
(症狀) 外陰部及其週圍皮膚。密生小贅肉。狀如鷄冠。小者無自覺症狀。大者表面發生有臭氣之分泌物。或妨礙尿之放射。或略覺疼痛者有之。

(療法) 最妙除去其原因。局部治療。以杜松子末與甘汞等分混和撒布。或以硝酸銀桿或以二五%鉻酸腐蝕之。

第二章 陰道病 Krankheiten der Scheide

(1) 鎖陰 Gynatresie

(原因) 爲炎症，潰瘍，外傷，腐蝕，麻疹，猩紅熱，白喉，外陰部炎，子宮頸部癌腫等而起。

(症狀) 依閉鎖之部位而異。最多者爲陰道及處女膜之閉鎖。

(1) 處女膜閉鎖 或由於上皮癒合。或爲真正之癒着。

(2) 陰道閉鎖 多爲膜狀之閉鎖。

(3) 子宮閉鎖 以子宮外口爲主。

不論何稱閉鎖。其症狀大致相同。在思春期。月經來時。不見出血。覺腰痛，下腹痛。每月反覆一次。而閉鎖之生殖管內。滯留月經血液。隨月增大。而形成血腫。既形成之血腫。漸變爲濃粘稠液或竟成膿。

(療法) 就專門醫師診斷準確後。施行手術除去之。

(11) 陰道炎 Vaginitis

(原因) 爲淋菌，釀膿菌，蟻蟲，手淫，感冒，不潔，腺病，萎黃病，房事過度等而起。

(症狀) 急性期。陰道壁紅腫。流出白色粘液，或似膿之液。全身疲倦，腰腿痠

痛。往往發熱。陰道及外陰部。有灼熱搔癢之感。慢性期。陰道壁不甚紅腫。灼熱搔癢。惟陰道排泄物仍有多量排出。

(療法) 急性期。以消毒藥水注入陰道洗滌。例如一至二%石炭酸，二至三%硼酸水，〇·一%過錳酸鉀液等。發熱者投以退熱劑，清涼劑。安臥靜養。力戒勞動。慢性期。則用收斂，防腐劑(處方見後)。

此外陰道栓劑。亦有良效。常用者為五至一〇%單寧酸甘油，一〇%蛋白化銀甘油，五%伊克度甘油，二〇%明礬甘油等。或改用亞採多那陰道藥球，安期福祿渦林，萬宜散白堊藥片等新藥栓塞亦可。內服藥不論急慢性均宜用尿防腐劑。例如烏羅透賓，午乏午耳西葉，海而密妥，獅牌藥用美趣靈藍等。均可內服。

(處方) 單寧酸 Acid Tannicum

三·〇—六·〇

溜水 Aq. Dest

三〇〇·〇

上為洗滌用

明礬 Alumen

一〇·〇

溜水 Aq. Dest

五〇〇·〇

上同上

硫酸鋅 *Zinc Sulfuricum*

溜水 *Aq. Dest*

上同上

硝酸銀 *Argentum Nitricum*

溜水 *Aq. Dest*

上塗擦陰道潰瘍面用

乳酸 *Acid Lacticum*

溜水 *Aq. Dest*

上同上

海碘仿 *Jodoform*

甘油 *Glycerin*

薄荷油 *Ol Menthae*

上塗布陰道用

單寧酸 *Acid Tannicum*

甘油 *Glycerin*

五〇〇五〇〇

一〇〇二〇〇

一〇〇一〇〇

一〇〇一〇〇

二滴

一〇〇一〇〇

上以綿花飽蘸藥液。栓塞陰道內

伊克度 Ichihyol

二・五
五〇・〇

甘油 Glycerin

上同上

蛋白化銀 Protargol

一〇〇・〇
一〇〇・〇

甘油 Glycerin

上同上

碘化鉀 Kali Jodatum

一〇〇・〇

碘 Jodi

一〇〇・一

甘油 Glycerin

三〇〇・〇

上同上

烏乏午爾西葉 Folia Uvae Ursi

一五・〇

上自行煎服。一日量

海而密安 Helmitol

六片

上一日三回分服

烏羅透賓 Urotropin

三・〇

醋酸鉀 Kali Aceticum

三・〇

溜水 Aq. Dest

一〇〇・〇

上一日三回分服

第三章 子宮病 Krankheiten des Uterus

(一) 子宮內膜炎 Endometritis

(原因) 本症有急性慢性兩種。常由病原菌傳染而起。其病原菌。以連鎖狀球菌，葡萄狀球菌，淋菌，結核菌等為主。故其原因。多為淋病，產褥熱，腹膜炎，月經時不攝生，手術不潔等而來。慢性者多由急性遷延不治而轉成。

(症狀) 急性症。初覺下腹部有不快感。兼惡寒發熱。壓之覺痛。子宮腫脹而柔軟。帶下增加。排泄似膿之液。或混血液。有惡臭。此外併發噁心，嘔吐，頭痛，食慾缺損，胃痛，精神憂鬱等。慢性症。月經來時常現過多。在月經前或月經初期。有極強之月經痛。分泌增多。如稀薄水樣。亦有精神與食慾方面萎頓。以及訴頭痛，胃痛等之苦者。本症對於生命。雖無危險。然頗難治愈。即治愈亦易

再發。

(療法) 急性症。禁交媾。宜靜臥。服緩下藥。腹都施溫濕布罨法。或行溫坐浴。以微溫消毒藥液灌注腔內。下列處方。亦可應用。

(處方) 鹽酸嗎啡或莨菪膏 Ext. Scopolia od. Morphin Hydrochloricum 〇・一

可可脂 Oleum Cacao 三〇・〇

上為陰球十個。栓塞陰道內。每日交換二次。

莨菪膏 Extracum Siopolia 一・〇

阿片膏 Extractum Opium 二・〇

水銀軟膏 Ung. Hydrargyri Cinereum 一〇・〇

凡士林 Vaseline 二〇・〇

上為軟膏。塗擦下腹用

凡拉蒙 Veramon 三片

上每日三回。每回一片

慢性症亦宜安靜。整通大便。行腔灌注法。常用藥液為三%明礬液，一%單寧酸液，二%石炭酸水，一或二%利沙耳水，一%硝酸銀液，〇・一%過錳酸鉀液