

SHIYONG ZHONGCAOYAO YUANSE TUPU

实用中草药

原色图谱

(四)

草药图

肖培根 杨世林 主编



中国农业出版社

4

实用中草药原色图谱(四)

草药类

肖培根 杨世林 主编



中国农业出版社



Z0074846

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中草药原色图谱. 4, 草药类 / 肖培根, 杨世林
主编. —北京: 中国农业出版社, 2001.8

ISBN 7-109-06910-9

I . 实... II . ①肖... ②杨... III . 中草药—图谱
IV . R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037531 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 沈镇昭

责任编辑 朱朝伟 赵立山

北京日邦印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 12


字数: 186 千字 印数: 1~6 000 册

定价: 60.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编 肖培根 杨世林
副主编 连文琰 刘玉琇
编 者 连文琰 刘玉琇
林余霖 李葆莉
潘瑞乐
摄 影 刘玉琇 林余霖
顾志平 张效杰
郭绍荣 彭治章
吴光弟 郑汉臣
李延辉 高士贤
严仲铠 巫金华





序

中医中药是

中华民族优秀的文化遗产，

在长期实践中，形成自己独特的

理论体系和诊治方法，特别是对人体的

病理状态和亚健康状态能发挥出多层次、多

靶点的整体治疗和调整作用，也就是通常所说

的“有病治病，无病防病”的医疗防治作用。由于

其疗效确切，正确使用不具或很少具有毒、副作用，因

而，在“人类要回归大自然”思潮的影响下，愈来愈受

到国际上的重视和青睐。

中草药则是中医用来防治疾病和医疗保健的物质基础，是中华民族几千年来与自然和疾病作斗争、经过亿万人的亲身体验所精选出来的有效武器，是一个伟大的宝库。对这个伟大宝库，一方面要很好地开发利用，另一方面又要很好地加以保护，做到资源的可持续利用。其中最为基本的，首先是要正确地去认识这些中草药，《实用中草药原色图谱》(1~4册)便是为了这个目的应运而生的。

《实用中草药原色图谱》是我们多年来对中草药进行实地调查研究的成果。全书4册，收集常用中草药总计632种。前3册主要是常用中药，《中华人民共和国药典》中的种类，基本上均已收集在内。

第四册则是常用的草药180种。每种均分品名、来源、原植物、采收加工、药材性状、性味功能、主治用法以及附方等简要地叙述。

本书所收集的图片，真实可靠，大都均是在产地拍摄，如实地反映了这些中草药的生态环境，药材照片均选自正名，具有一定的代表性。本书取名为《实用中草药原色图谱》，希望能对读者在中草药的利用和保护方面发挥应有的作用。同时也要严肃地指出：在中草药的临床使用方面，必须要在医生的指导下进行，以免产生不良后果。

总之，本书对从事中药及生物资源的生产、科研、教学、经营的专业人员，甚至对这方面有业余爱好的人员均是一部很好的参考书。

衷心希望广大读者对本书不吝指正。

中国工程院院士

中国医学科学院

药用植物研究所

世界卫生组织传

统医学合作中心

名誉所长

主任

肖培根 教授

2001年2月5日



编写说明

《实用中草药原色图谱》(以下简称《图谱》)，全书收载植物药632种，为了鉴别和比较，全书共分四册。第一册为根及根茎类(144种)，第二册为花类及种子果实类(166种)，第三册为全草类、叶类、皮类、藤本类、树脂类、藻菌类及其他类(142种)，第四册为草药类(180种)。每种中草药除文字描述外，均附上植物和药材彩色照片(草药除外)。书后附有药材、原植物的药名、植物名及植物拉丁学名索引。

1.《图谱》中每种中草药均按正名(以药材名为主，个别草药则以植物名为正名)及汉字拼音，文字描述按来源、原植物、采收加工、药材性状、性味功能、主治用法、附方等项的顺序编写。

2.来源：记载该中草药所属的科名(包括科的拉丁学名)及该中草药的原植物名称或多来源的原植物名称和药用部分，如中药淫羊藿，其原植物来源于心叶淫羊藿、箭叶淫羊藿、柔毛淫羊藿、巫山淫羊藿等的全草。

3.原植物：由于植物图片及《图谱》篇幅的原因，不能全部收载；该中草药若有2种以上的多来源原植物，也只收载1~2种，如上述中药淫羊藿有4种原植物，仅收载心叶淫羊藿和箭叶淫羊藿等2种植物。

原植物项下包括原植物名称、别名、植物拉丁学名、植物形态、生境分布等内容。

植物名称：以中草药常用的原植物名称为准，如中药广豆根，原植物为越南槐。

别名：全国各地的地方名称较多，只记载常见的别名，并注明其省(区)，以示不同省(区)的不同名称，对应用中草药有所帮助。

拉丁学名：除植物拉丁学名的正名外，如有常用拉丁学名的异名，则在正名后用括号或方括号加以注明。

植物形态：主要描述中草药原植物的形态特征(包括药用部分)，如有并列品种，则重点记

述其与前种形态上的主要区别点。形态描述的高度、长度、宽度均采用 m (米), cm (厘米), mm (毫米)。

生境分布：生境是指植物在野生状态的生长环境。了解和掌握其植物生长环境，对采集中草药有所帮助。分布也是指野生植物的自然分布区域或注明是否为栽培植物。

4. 采收加工：重点记载该中草药的采收季节、采收和加工方法，以及野生品和栽培品的不同采收时间，并对某些药材简要地介绍其炮制的方法，以保证其药材质量或减轻其毒性。

5. 药材性状：简要记述该中草药药用部分的外部形态特征、形状、大小、色泽、质地、断面、气味等内容的药材特征。

6. 性味功能：此为中医用药的准则，先写味，后写性。功能只写该药本身的主要作用，不写与其他药物配伍后的效用。对某些有毒中草药，在此项下内，按毒性大小，写明有毒、小毒、大毒等，以便在利用时引起注意。

7. 主治用法：主治一般只记载该中草药所治的主要病症，但中医治病多采用复方，故也包括某些以该药为主与其他药物配伍后的主要病症。用法：除浸酒服、研粉吞服、冲服、入胶囊吞服或入片剂服或鲜品捣汁服，以及外用鲜品捣烂外敷或干品研末撒敷或水煎熏洗等加以写明外，其余未写明用法的均为水煎服。用量是指该中草药（干品）成人每日的常用量，附方中的用量亦是如此，但不限于此量，要根据具体的病情，酌情增减。对某些中草药有其特殊作用的，也注明不宜与甘草同用，并写明孕妇及体虚寒者忌用。剂量单位：采用 g (克), mg(毫克), kg (千克)，或采用 ml (毫升)，时间单位：采用 h (小时), min (分钟)。

8. 附方：主要征集广大群众和医务工作者从临床实践中总结出来的简验的方药，也收载中医临床常用的方剂及有关中草药书籍。附方主治病症，中西医病名均予采用。在临床选用时，一定要结合患者病情的轻重等不同情况作为辨证论治的依据。



目 录



序

编写说明



1一叶萩	14	19 山苦荬	50
2一点红	16	20 千日红	52
3一枝黄花	18	21 千里光	54
4十大功劳	20	22 小花黄堇	56
5八角枫	22	23 飞廉	58
6九里香	24	24 飞扬草	60
7了哥王	26	25 马兰	62
8三叉苦	28	26 马甲子	64
9三叶青	30	27 天胡荽	66
10三加皮	32	28 元宝草	68
11三尖杉	34	29 无花果	70
12三颗针	36	30 无患子	72
13土人参	38	31 木耳	74
14土牛膝	40	32 木防己	76
15土荆芥	42	33 木棉花	78
16大青木	44	34 瓦松	80
17山姜	46	35 牛筋草	82
18山芝麻	48	36 手掌参	84

37 毛茛	86	59 白花丹	130
38 长春花	88	60 白屈菜	132
39 长萼鸡眼草	90	61 白药子	134
40 化香	92	62 白背叶	136
41 凤尾草	94	63 白花蛇舌草	138
42 乌柏	96	64 瓜子金	140
43 乌蔹莓	98	65 半边旗	142
44 六月雪	100	66 地菍	144
45 文冠木	102	67 地耳草	146
46 火炭母	104	68 地胆草	148
47 水龙	106	69 芒萁	150
48 玉簪	108	70 百蕊草	152
49 玉米须	110	71 当药	154
50 玉叶金花	112	72 竹叶椒	156
51 节节草	114	73 朱砂根	158
52 石蒜	116	74 血水草	160
53 石椒草	118	75 向日葵	162
54 龙葵	120	76 合掌消	164
55 叶下珠	122	77 多花蔷薇	166
56 四季青	124	78 灯盏细辛	168
57 仙人掌	126	79 羊蹄	170
58 白英	128	80 羊耳菊	172





81	农吉利	174	103	垂柳	218
82	红毛七	176	104	爬山虎	220
83	红旱莲	178	105	金丝草	222
84	杠板归	180	106	金丝桃	224
85	豆薯	182	107	兔儿伞	226
86	苏铁	184	108	油茶	228
87	还亮草	186	109	油桐	230
88	岗松	188	110	泡桐	232
89	牡荆叶	190	111	泽漆	234
90	沙枣	192	112	空心莲子草	236
91	陆英	194	113	珍珠菜	238
92	鸡矢藤	196	114	柘树	240
93	松萝	198	115	枸橘	242
94	刺针草	200	116	胡颓子	244
95	苦木	202	117	南天竹	246
96	苦瓜	204	118	南瓜子	248
97	茅莓	206	119	南蛇藤	250
98	拐枣七	208	120	草本水杨梅	252
99	虎耳草	210	121	芥菜	254
100	肾蕨	212	122	荔枝草	256
101	罗勒	214	123	点地梅	258
102	败酱草	216	124	肺形草	260



125 绞股蓝	262	147 猕猴桃	306
126 桂花子	264	148 望江南	308
127 桃金娘	266	149 绿豆	310
128 铁苋菜	268	150 博落回	312
129 倒地铃	270	151 棉花根	314
130 海芋	272	152 醋浆草	316
131 通经草	274	153 莼草	318
132 柊树根（皮）…	276	154 落葵	320
133 檵木	278	155 落新妇	322
134 萝藦	280	156 喜树	324
135 萝芙木	282	157 紫茉莉	326
136 菊叶三七	284	158 紫荆皮	328
137 黄杨	286	159 紫珠叶	330
138 黄药子	288	160 鹅肠菜	332
139 蛇莓	290	161 番石榴	334
140 蛇葡萄	292	162 楤木	336
141 野茄树	294	163 檵桐	338
142 铜锤玉带草	296	164 蕺草	340
143 犁头尖	298	165 雷公藤	342
144 盘龙参	300	166 蜀葵	344
145 猫须草	302	167 照山白	346
146 猫眼草	304	168 矮地茶	348





169 满山红	350	175 滴水珠	362
170 榕树	352	176 醉鱼草	364
171 萍菜	354	177 缠草	366
172 算盘子	356	178 薯莨	368
173 鲜黄连	358	179 薜荔	370
174 辣蓼	360	180 蟠蝶菊	372
药名、植物名索引		374	
拉丁学名索引		378	
参考文献		381	



一叶萩

Yiyeqiu

来 源

本品为大戟科(Euphorbiaceae)植物一叶萩的嫩枝、叶及根。

原 植 物

一叶萩 别名：马扫帚牙(山东)，孩儿拳(安徽)，横子粉条、花扫条(辽宁)，叶下珠(浙江)。

Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.

落叶灌木，高1~3m。根浅红棕色。树皮浅红棕色。茎多分枝，新枝浅黄绿色，有棱角，多下垂。单叶互生，叶柄短；叶椭圆形、长圆形或卵状长圆形，长1.5~6cm，宽1~3cm，先端短尖，基部楔形，全缘或有不规则波状齿或细锯齿，两面无毛。花小，单性，雌雄异株；萼片5，卵圆形，黄绿色，无花瓣；雄花每3~12朵簇生于叶腋；雄花花盘腺体5，分离，2裂，与萼片互生，雄蕊5；退化子房小，圆柱形，2裂；雌花单生或2~3朵簇生，花盘不裂，子房球形，3室，花柱3裂。蒴果三棱状扁球形，直径约5mm，下垂，基部有宿萼，熟时红褐色，3瓣裂。种子三角状卵形，平滑，褐色。花期6~7月。果期8~9月。

生于山坡、路旁、沙地、田边、水沟旁及向阳灌丛中。

分布于东北、华北及陕西、甘肃、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、福建、湖南、四川等省。

采收加工 春末秋初均可采收，割取带叶嫩枝条，扎成小把，晒干；根全年可挖，除去泥土，洗净，切片晒干。

药材性状 嫩枝条圆柱形，稍有棱角，长30~40cm，粗端直径约2mm。暗绿黄色，有时稍带红色，有纵细纹理。质脆，断面周围纤维状，中央白色。叶多皱缩破碎，有时杂有黄色花朵或灰黑色果实。气微，味微辛、苦。

根圆柱形，有不规则分枝，红棕色，有细纵皱纹，疏生突起小点或横向皮孔。质脆，断面不平坦。木质部淡黄白色。气微，味淡转涩。

性味功能 枝条、根：味辛、苦，性温，有毒。有活血舒筋，健脾益肾，强筋骨的功能。

主治用法 用于风湿腰痛，四肢麻木，偏瘫，阳痿，面神经麻痹，小儿麻痹后遗症，眩晕，耳聋，神经衰弱，嗜睡症。用量9~15g。叶、花用于神经系统，为强壮兴奋剂，治阳痿。

附 方

① 小儿疳积：一叶萩根15~18g，紫青藤(鼠李科枯岭勾儿茶)、白马骨根(茜草



科六月雪)、野刚子(马钱科醉鱼草)、倒压刺根或茎(豆科云实)各15~18g, 炒黑大豆(半生半熟)14粒, 红枣5粒。水煎服, 冲红糖, 早、晚空腹各1次。

②阳痿: 一叶萩根15~18g。水煎服。

③面神经麻痹: 面部穴位注射本品提出的硝酸一叶萩碱3~4ml, 每日1次, 每次12~16mg, 12次为1个疗程。

④眩晕, 耳聋, 兴奋性降低的神经衰弱, 嗜睡症: 硝酸一叶萩碱2ml, 皮下或肌肉注射, 每日1次, 10~15次为1疗程。

2 一点红

Yidianhong

来 源 本品为菊科(Compositae)植物一点红的全草。

原 植 物

一点红 别名：叶下红(通称)，红背叶(广东、广西)，野苦菜、旱地蒲公英(云南)。

Emilia sonchifolia (L.) DC.

一年生或多年生直立或半直立草本，高10~50cm，有乳汁。茎少分枝，枝条柔弱，粉绿色或淡紫色，无毛或有疏毛。叶互生，稍肉质，茎下部叶长卵形，长5~10cm，宽4~5cm，琴状分裂，边缘有钝齿；上部叶较小，无柄，卵状披针形，先端锐尖，基部耳状，抱茎，有牙齿，上面深绿色，下面常紫红色，两面疏生短毛。头状花序，直径1~1.3cm，有长梗，常2~5个头状花序形成伞房状，总苞绿色，筒状，总苞片1层，约与花冠等长；花冠紫红色，5齿裂，全为两性管状花；雄蕊5，花药上方有附片；子房下位，花柱分枝上端有短刚毛附片。瘦果圆柱形，长约4mm，有棱，冠毛白色，柔软。花期6~9月。果期7~10月。

生于山野、路旁、田畦、村边及草丛中。

分布于陕西及长江以南各地区。

采收加工 夏、秋季采收全株，去净杂质，晒干，或趁鲜切段晒干。

药材性状 全草长约30cm，根茎细长，圆柱形，浅棕黄色。茎少分枝，细圆柱形，有纵纹，灰青色或黄褐色。叶纸质，皱缩，灰青色，基部叶卵形或琴形，抱茎，无柄。头状花序干枯，花多脱落，存留花托及总苞，苞片茶褐色，干膜质。瘦果浅黄褐色，冠毛较多，白色，有干草气，味淡稍咸。

性味功能 味微苦，性凉。有清热解毒，散瘀消肿，凉血，利尿消肿的功能。

主治用法 用于上呼吸道感染，咽喉肿痛，口腔溃疡，感冒，结膜炎，肺炎，急性肠炎，细菌性痢疾，尿路感染，睾丸炎，乳腺炎，疖肿疮疡，皮肤湿疹，跌打扭伤。用量6~15g，鲜品15~30g。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

附 方

①大叶性肺炎：一点红、岗梅各30g，十大功劳15~30g。水煎服，每日1剂，分2次服。

②泌尿系感染，睾丸炎：一点红、狗肝菜各30g，车前草15g。水煎服。

③小儿上呼吸道感染，急性扁桃体炎：一点红、古羊藤各等量，每500g煎取浓液500ml。3个月~3岁儿童，每次20~40ml；3岁以上酌增。