


1997年版

檢覈考・高考・二技考・私醫考

護理師試題全輯

(13版)

華杏編輯部 編著



華杏出版股份有限公司



1997年版

檢覈考・高考・二技考・私醫考

護理師試題全輯

(13版)

華杏編輯部 編著



華杏出版股份有限公司

本書介紹

本書係供護校、護專及大學護理系畢業生參加國考或升學考試之用，收錄最近四年最新考題，試題種類包括「護理師檢覈考」、「公務高考」、「專技高考」等國家考試及「二技考」、「私醫聯招」升學考試題目。讓讀者透過本書的導引，掌握考試重點與趨向。對於各項考試簡介如下：

1. **檢覈考**——全名為「專門職業及技術人員醫事人員檢覈筆試」，簡稱「專技檢覈考」或「檢覈考」。其中護理師類科簡稱「護理師檢覈考」，應考及格者，可取得執業資格，即領取執照。
2. **公務高考**——全名為「公務人員高等考試」，簡稱「公務高考」。應考及格，可取得公務人員任用資格。
3. **專技高考**——全名為「專門職業及技術人員高等考試」，簡稱「專技高考」。應考及格者，可取得執業資格，並可依「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」轉任公務人員。
4. **二技考**——全名為「技術學院二年制聯合招生考試」，提供二、三專畢業的學生繼續升學的管道。
5. **私醫聯招**——全名為「私立醫學院聯合招考轉學生考試」，包括北醫、高醫、中國、中山、長庚、慈濟等六所醫學院，故簡稱「私醫聯招」（原五醫聯招）。

有關考試詳細資料，可參見本書附錄之招生簡章節錄表。

華杏編輯部 謹識

1997年9月

目 錄

八十六年 二月護理師檢覈考

護理學及護理技術·····	1
內外科護理·····	13
產兒科護理·····	27
精神科及公共衛生護理·····	39
基礎醫學·····	51

八十五年 公務高考

解剖學、生理學及病理學·····	1
基本護理學與護理行政·····	11
精神科與公共衛生護理學·····	23
內外科護理學·····	33
藥理學、微生物學與免疫學·····	45
產兒科護理學·····	55
中華民國憲法·····	69
國文·····	77

八十五年 二技考

基本護理學·····	79
解剖生理學·····	89
國文·····	97
英文·····	103

八十五年 七月護理師檢覈考

護理學及護理技術·····	109
內外科護理·····	123
產兒科護理·····	137

精神科及公共衛生護理·····	151
基礎醫學·····	163

八十五年 二月護理師檢覈考

護理學及護理技術·····	177
內外科護理·····	189
產兒科護理·····	201
精神科及公共衛生護理·····	213
基礎醫學·····	225

八十五年 專技高考

護理學導論·····	235
內外科護理學·····	245
藥理學、微生物學及免疫學·····	259
生理學及病理學·····	273
婦產科及小兒科護理學·····	285
精神科及公共衛生護理學·····	299
中華民國憲法·····	313
國文·····	321

八十四年 專技高考

護理學導論·····	1
內外科護理學·····	15
藥理學及微生物學·····	29
生理學及病理學·····	41
婦產科及小兒科護理學·····	53
精神科及公共衛生護理學·····	65
中華民國憲法·····	79
國文·····	87

八十四年 公務高考

解剖學、生理學及病理學·····	89
基本護理學與護理行政·····	99
精神科與公共衛生護理學·····	111
內外科護理學·····	123
藥理學、微生物學與免疫學·····	135
產兒科護理學·····	147
中華民國憲法·····	159
國文·····	166

八十四年 五醫聯招

國文·····	167
英文·····	171
普通生物學·····	175
普通化學·····	181

八十四年 二技考

基本護理學·····	187
內外科護理學·····	195
產兒科護理學·····	203
解剖生理學·····	211
國父思想·····	217
國文·····	223
英文·····	227

八十四年 七月護理師檢覈考

護理學及護理技術·····	233
內外科護理·····	245
產兒科護理·····	257
精神科及公共衛生護理·····	271

基礎醫學·····	283
-----------	-----

八十四年 三月護理師檢覈考

護理學及護理技術·····	293
內外科護理·····	305
產兒科護理·····	317
精神科及公共衛生護理·····	331
基礎醫學·····	343

八十三年 專技高考

護理學導論·····	1
內外科護理學·····	13
藥理學及微生物學·····	23
生理學及病理學·····	35
婦產科及小兒科護理學·····	45
精神科及公共衛生護理學·····	57
國父遺教及中華民國憲法·····	71
國文·····	79

八十三年 公務高考

解剖學、生理學及病理學·····	81
護理學及護理行政·····	91
精神科及公共衛生護理學·····	101
內外科護理學·····	113
藥理學、微生物學及免疫學·····	125
產兒科護理學·····	137
中華民國憲法·····	149
國文·····	153

八十三年 五醫聯招

國文·····	155
---------	-----

英文·····	159
生物·····	163
化學·····	169

八十三年 二技考

基本護理學·····	175
內外科護理學·····	183
產兒科護理學·····	191
解剖生理學·····	199
國父思想·····	207
國文·····	211
英文·····	217

八十三年 七月護理師檢覈考

護理學及護理技術·····	223
內外科護理·····	235
產兒科護理·····	247
精神科及公共衛生護理·····	259
基礎醫學·····	271

附錄····· 283

附錄一 護理類科檢覈考簡章節錄表·····	284
附錄二 護理類科專技高考簡章節錄表·····	285
附錄三 護理類科公務高考簡章節錄表·····	286
附錄四 台北護理學院二年制護理學系招生簡章節錄表·····	287
附錄五 六醫聯招簡章節錄表·····	288

86年2月 護理師檢覈考

護理學及護理技術

解析：吳雪菁

答案為考選部公佈

- (C) 1. 指出勿需記錄在護理記錄單的內容：(A)滿足病人特殊需要之護理 (B)病人之健康有關的行為 (C)病人所有的主訴 (D)病人對護理的特殊反應。
- (A) 2. 有關備藥的注意事項，下列何者錯誤？(A)在熟悉藥物的狀況下，可以一面備藥一面和他人交談 (B)不可從標籤模糊的藥袋（或藥罐）中取藥 (C)確實執行備藥「三讀」 (D)準備好的藥物，最好不脫離視線範圍。
- (A) 3. 王太太主訴排便的顏色較暗色，經護理人員評估為柏油便(Tarry stool)，解此便之可能情形為：(A)上腸胃道出血 (B)服用腸道抑菌劑 (C)食入過量之咖啡 (D)腸道攝影使用之硫酸鋇造成。

解析：解出黑色柏油便，可能是服用鐵劑、次氧化鉍、活性碳後或上消化道出血經胃酸消化所致。若食入過量的咖啡會排出暗紅或巧克力便。服硫酸鋇則會產生錫粉色便。

- (B) 4. 等張性溶液是指該溶液的滲透壓近乎血漿，其值約為：(A) 200 mOsm/L (B) 275~295 mOsm/L (C) 305~325 mOsm/L (D) 325~355 mOsm/L。
- (A) 5. 消毒地板、牆壁、病床及家具常用的Lysol濃度為多少？(A) 1~5% (B) 6~10% (C) 15~20% (D) 25~30%。
- 解析：Lysol（苯酚）0.2%可制菌，1~5%可消毒地板、牆壁、病床、傢俱等；10%可消毒排泄物。其缺點為高濃度會腐蝕皮膚黏膜，但對芽胞無效。
- (B) 6. 病人主訴頭痛、頭暈、肩膀酸、心悸、顏面潮紅，應如何處理？(A)要病人多休息，可能是感冒 (B)馬上測血壓，看是否有高血壓 (C)問他是不是扭傷 (D)問他是不是喝了咖啡。
- (A) 7. 呼吸困難或用力呼吸的主要徵象是甚麼？①張口呼吸②鼻翼呼吸③皮膚發紅④使用呼吸輔助肌呼吸⑤呼吸有鼾聲⑥不正常的肋間肌肉收縮或膨出⑦

杵狀指。(A)①②④⑥ (B)②③④⑤ (C)③④⑤⑥ (D)④⑤⑥⑦。

解析：呼吸困難(apnea)為氧氣缺乏，二氧化碳增加，使呼吸深度變大、費力、疼痛及起伏不定。

(B) 8. 具有精密診斷與高技術醫療服務，且估計約須服務四十萬人的醫療機構，稱為：(A)醫學中心 (B)區域醫院 (C)地區醫院 (D)基層醫療單位。

(B) 9. 護士在與張先生交談時，談到其家人情況時，個案沈默不語，此時護士之反應，下列何者為佳？(A)立刻將話題轉開，以免個案不自在 (B)保持沈默，並觀察個案之反應 (C)打破沈默，深入追究 (D)終止此次交談，減輕彼此的不自在。

解析：治療性會談時，利用沈默技巧，主要讓病人重整思路，護理人員可藉機觀察病人的非語言行為。

(A) 10. 有關護理觀察之敘述，何者正確？(A)必須是審慎且有意識的 (B)是臨時或偶發的活動 (C)是片段性的過程 (D)其觀察時間是集中在治療時間。

(A) 11. 護理人員的權利，下列何者錯誤？(A)每位護理人員都可開設護理機構 (B)有權要求服務的報酬 (C)有權對他人提供協助與支持 (D)有權尋求諮詢。

解析：護理人員法第19條：護理機構應置負責資深護理人員一人，對其護理業務負責，其資格條件由中央主管機關定之。

(A) 12. 導尿時，消毒小陰唇與尿道口的溶液，何者為最佳？(A) Aq. betadine (B) Alcohol betadine (C) 75% Alcohol (D) Normal saline。

(C) 13. 李太太正常分娩後，尚未自解小便，護士為李太太檢查宮縮情形：宮底臍平，子宮偏右稍軟，會陰傷口及惡露正常，膀胱膨脹，此時護士應先採取下列何種措施？(A)通知醫師 (B)導尿 (C)誘導小便 (D)給予子宮收縮劑。

解析：一般在正常分娩後，易造成尿滯留現象，故應於產後6~8小時內確定病人是否排尿。若無，則應給予誘尿以協助排尿。

(C) 14. 體重10公斤以下之嬰幼兒，進行骨髓穿刺時，宜選擇何部位進行穿刺？(A)胸骨 (B)腸骨 (C)脛骨 (D)腓骨。

(C) 15. 送病人入手術室接受子宮切除手術時，護士為病人做適當的覆蓋，以減少病人暴露部位，是滿足病人下列何項需要？①生理②安全③愛與所屬感④自尊。(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④。

(B) 16. 下列何者是胸腔引流的目的是？(A)利用重力原理，引流肋膜積水 (B)重建胸

腔負壓，使肺擴張 (C)重建胸腔正壓，使肺擴張 (D)移除肋膜積水，使心臟規律跳動。

- (D) 17.護理目標是「三天內能建立一天一次排便的習慣」，下列敘述的護理指導，何者不宜？(A)每日早餐後養成排便習慣 (B)每日攝水量達2000 mL (C)增加每日的活動量 (D)每日以甘油球灌腸。
- (C) 18.教導長期使用胃造瘻管灌食病人，製作管餵食飲食時，下列何者錯誤？①注意均衡飲食②飲食須經過濾網過濾③濃度愈濃愈好④每 c.c. 產生之熱量以5卡為佳。(A)①④ (B)②③ (C)③④ (D)②④。
- (B) 19.下列何種患者不宜靜脈輸入低張性溶液？①濃內壓高者②嚴重燒傷者③嚴重脫水者④營養不良者。(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④。
- (C) 20.老年人較年輕人容易發生體液不平衡的主要原因是：(A)老年人一盤喝水量較少 (B)老年人的體溫較低 (C)老年人之體液與體重比例較年輕人低 (D)老年人排尿量減少。

解析：60歲以上的人，男性水份佔體重的52%，女性佔體重的46%；一般年輕男性佔60%，女性佔55%。

- (B) 21.可緩解輕微酸中毒的靜脈輸液是下列那一種？(A)Normal saline (B)Lactated Ringer's solution (C)Ringer's solution (D)5% Dextrose in water。
- (C) 22.1c.c.等於15滴，又等於多少小滴(Microdrip)？(A)30 (B)45 (C)60 (D)90。
- 解析：1c.c.=15滴=60小滴(microdrip)。
- (D) 23.給予病人使用高張性溶液時，下列敘述何者錯誤？(A)高張性溶液，不宜給予脫水的病患 (B)心臟、腎臟功能不佳者，不宜使用高張性溶液 (C)高張性溶液最好由大靜脈給予且緩慢注射 (D)高張性溶液會降低血漿的滲透壓，過量會引起細胞性脫水。
- (C) 24.一盎司(Ounce)大約等於多少ml？(A)15 mL (B)20 mL (C)30 mL (D)45 mL。
- (B) 25.病人口服藥物後十分鐘內突然發生嘔吐現象，護理人員應做下列何項處理？(A)安慰病人，立刻再給一次藥 (B)告知醫師，視情形決定是否補給藥 (C)建議醫師，改變給藥途徑 (D)教導病人多休息，直至下一次給藥時間，再按原醫囑給藥。
- (C) 26.在緊急狀況下，二位護士須立即將一位不能自行移動且無法在沒有支托下獨自坐著的病人，移離危險區，最適當的方法為：(A)輪流背扛法 (B)一人

抬膝，一人抬腋下 (C)兩手坐法 (D)四手坐法。

- (D) 27. 二位護士協助體重較重之病人由病床中央移向床邊時，甲護士負責頸肩至臀部，乙護士負責臀至足踝部位，此時二位護士的身體狀況上，甲應比乙：
(A)高 (B)重 (C)輕 (D)有力量。

- (C) 28. 在火災發生時，護士獨自搬移體重比自己重、不能自行走路、但雙臂能活動、意識清楚之病人離開危險區時，最適當方法為：
(A)抱法 (B)肩扛法
(C)背扛法 (D)臀扛法。

- (B) 29. 欲增加吸收輻射熱的效果時，可穿著下列何種衣物？
(A)顏色淺 (B)顏色深
(C)表面光滑 (D)絲織品。

- (C) 30. 在王常用熱時間內使用溫和熱度，可達到之效果包括：①止血②使組織凝結③促進睡眠④解除痙攣⑤減輕疲勞及疼痛。
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤。

- (B) 31. 協助左側肘肘關節附近行靜脈注射的病人更換上衣之正確方法為：①脫右手袖子②脫左手袖子③穿右手袖子④穿左手袖子。
(A)①→②→③→④ (B)①→②→④→③
(C)②→①→③→④ (D)②→①→④→③。

解析：助病人更衣時，脫衣是先脫健側，再脫患側或靜脈注射之手；穿衣則先穿患側或靜脈注射之手，再穿健側。

- (A) 32. 協助床上沐浴時，為避免病人不適，宜採用之措施包括：①尊重病人，讓其自行清洗會陰部②若病人希望家人執行時，允許之③男護士為女病人執行前，宜取得病人同意④不要暴露病人，在被蓋下執行⑤讓病人決定多久沐浴一次並尊重之。
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤。

- (B) 33. 護士協助病人處理指甲肉刺之最佳方法為：
(A)以冷霜往外按摩指甲周圍
(B)將肉刺剪掉，以消毒溶液擦拭
(C)將近指甲周圍之表皮修剪平整
(D)將指甲周圍之表皮往後推。

- (A) 34. 執行背部護理，在起始與結束按摩時，最宜採用的按摩法為：
(A)按撫法 (B)揉捏法
(C)重擦法 (D)叩擊法。

解析：執行背部按摩時，開始與結束最好採用按撫法，促使肌肉放鬆並增進舒適。

- (C) 35. 溫水拭浴後所測得之體溫，在體溫單上正確之記錄為：
(A)在40℃以上的位置寫酒精拭浴後之體溫
(B)在35～37℃之間寫酒精拭浴後之體溫
(C)在該

度數以紅色空心圈畫上並以虛線和拭浴前體溫相連 (D)在該度數以藍色實心圓畫上並以實線和拭浴前體溫相連。

解析：溫水拭浴前後半小時均應量體溫，測得之體溫以紅色空心圓記錄，並以紅色虛線連接執行前之體溫。

- (A) 36.病人裝置全口假牙，但吃飯時才戴上，護士在鼓勵病人配戴時，所給予的說明正確者為：①假牙能使說話清晰②假牙可改善唇形③假牙促進正向自我心像④假牙經常取下、戴上易有口腔感染。(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④。
- (B) 37.指（趾）甲護理時，正確修剪的方法為：①指甲剪成弧形②指甲剪成平形③趾甲剪成弧形④趾甲剪成平形。(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④。

解析：指甲剪成弧形，趾甲剪成平形，防嵌甲的肉刺形成。指甲的生長，夏天較冬天快，右手比左手快。肉刺的處理方法為將肉刺剪掉並消毒治療。

- (A) 38.為口腔手術後之病人施行特別口腔護理時，正確措施包括：①核對醫囑上所用之口腔溶液②執行時同時準備抽吸用物備用③以牙刷徹底刷淨牙齒④每日執行一次。(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。
- (C) 39.有關護理記錄的敘述，下列何者正確？(A)記錄須用鋼筆或原子筆書寫，如有錯誤要用橡皮或立可白擦塗之 (B)記錄要含有護士的意見或價值判斷，如「精神佳」 (C)病人的主訴應加引號並實錄之，如「我站立時，頭會暈」 (D)可請同仁代為記錄。

解析：護理記錄寫錯時，不可任意塗擦，應用紅筆劃「=」，其上註明「錯誤」。要客觀記錄、避免主觀之敘述。記錄完畢必須簽上職等、全名及時間。

- (C) 40.病人施行靜脈注射時，若注射部位有紅、腫、熱、痛之現象，經評估為靜脈炎，下列措施何者不宜？(A)應立即拔除，重新更換注射部位 (B)以濕冷敷減輕炎症反應 (C)給予濕熱敷以促進舒適 (D)可局部抬高患部，千萬不可按摩患部。

解析：靜脈炎應採溼冷敷，目的為降低局部體溫、減輕疼痛及炎症反應。

- (C) 41.有關醫囑的敘述，下列何者錯誤？(A)Demerol 50mg q.6.h. p.r.n.是屬於長期

醫囑 (B)臨時醫囑具時效性，需立刻且只能執行一次 (C)若情況緊急，護生亦可處理口頭醫囑或電話醫囑 (D)醫囑出現Order renew時，表示之前的醫囑自動無效。

解析：緊急情況時，醫生如以電話或口述方式說明醫囑，由接聽者以鉛筆抄錄在醫囑單上，並寫上醫師姓名，註明為電話或口頭醫囑，並儘快請醫師在24~48小時內補寫，但是護生不可接受此醫囑。

- (B) 42.施行主動運動之主要目的為：(A)刺激血液循環 (B)增加肌肉力量 (C)維持關節之活動度 (D)預防壓瘡形成。

- (A) 43.長期臥床之病人易導致靜脈回流受阻或靜脈血管內膜受損之原理為：①血液黏稠度增加②血液滯留③血管受外在之壓力④血流增加⑤靜脈瓣缺損。
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤。

- (B) 44.病人上石膏之肢體部位，適合做下列那種運動？(A)被動運動 (B)等長運動 (C)等張運動 (D)伸張運動。

解析：等長運動是主動運動，乃病人持續的增加其肌肉緊張度，但關節與肌肉長度皆不變。此無關節的活動，又稱為「肌肉固定運動」，可維持或增加肌肉張力，故上石膏固定之肢體，可執行等長運動。

- (A) 45.頸椎損傷需持續牽引之患者，可使用下列何種床來協助其仰、俯翻身預防壓瘡？(A)史崔克床(Stryker frame) (B)電動旋轉床(Circle-electric bed) (C)克林尼強床(Cliniton bed) (D)高曲氏床(Gatch's bed)。

- (C) 46.協助長期臥床病人開始下床行走的過程中，在走路前之準備活動，其先後次序為何？①坐在床邊，將腳懸垂②坐起至能維持平衡無頭暈③肌肉力量增強運動④站立維持平衡。(A)①→②→③→④ (B)②→①→③→④ (C)③→②→①→④ (D)①→②→④→③。

- (A) 47.下列那些活動是等長運動(Isometric exercise)？①會陰肌肉收縮②收縮肌四頭肌③上肢之伸、屈④髖關節之過度伸展。(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。

解析：③④是屬於等張運動，是主動運動的一種，為肌肉之運動或肢體之移動。在等長運動中，肌肉主動地收縮或縮短，而引起肢體的移動，可增加肌力與張力及協助關節活動。

- (C) 48.造成壓瘡之誘發因素包括：①營養不良②體重過重③體重過輕④皮膚脫水

⑤皮膚潮濕浸潤⑥泌尿道滯留⑦活動過量。(A)①②④⑤⑥ (B)①③⑤⑥⑦
(C)①②③④⑤ (D)③④⑤⑥⑦。

- (A) 49. 長期臥床不動時，若肌肉完全失去活動，每天肌肉強度將減少多少？(A)3% (B)6% (C)9% (D)12%。

解析：當肌肉完全不活動時，48小時後關節開始攣縮，肌肉力量馬上開始減弱。

- (D) 50. 院內感染之影響產生的後果不包括：(A)延長病人住院日數 (B)增加工作人員的負擔 (C)易造成社區環境之污染 (D)易受到較好的護理照顧。
(B) 51. 消毒排泄物常用之Lysol濃度約為多少？(A)5% (B)10% (C)15% (D)20%。

解析：Lysol是50% Cresol（甲苯酚），當濃度1~5%可消毒地板、牆壁、病床、傢俱；10%濃度可用來消毒排泄物。

- (C) 52. 當環境之溫度和濕度都很高時，我們容易感到不舒服是因為：(A)呼吸道受刺激 (B)容易打寒顫 (C)汗液蒸發量減少 (D)出汗很多。
(A) 53. 病人在指導下收縮肌肉來抗拒重力，以增加肌肉的強度，稱之為：(A)主動運動 (B)被動運動 (C)加阻力運動 (D)等長運動。

解析：主動運動：指病人消耗自己的能量，以移動身體各部位，不需他人的協助。由於病人的參與，不但預防關節攣縮，亦增強肌肉張力及力量。加阻力運動：病人運動其肌肉來對抗一相反的力量，即嘗試去克服阻力，使肌肉在短時間內有效的加強。

- (A) 54. 死亡後屍體變硬，主要是下列那些變化引起？①肌肉化學變化②肝糖凝固③乳酸產生④蛋白質分解⑤脂肪變性。(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤。

- (C) 55. 使用黏性膠布固定敷料時，為保護皮膚，宜先在皮膚上塗擦的是：(A)Acetone (B)Ether (C)Tr. of benzoin (D)Tr. of betadine。

- (A) 56. 叩診胃、腸部位時，顯示的正常音是：(A)鼓音(Tympany) (B)回響音(Resonance) (C)濁音(Dullness) (D)實音(Flatness)。

解析：叩診肝臟會出現實音。若有腹水時，會有轉移性濁音。

- (D) 57. 當病人解出下列何種糞便時，則疑診為肝、膽方面的疾病？(A)Tarry stool (B)Brown stool (C)Bloody stool (D)Clay colored stool。

解析：(A)tarry stool（黑便）為上腸胃道出血或服用過多鐵劑等。(C)bloody

stool（血便、鮮紅便）為下腸胃道出血。(D)clay stool（土色便）可因阻塞性黃疸缺乏尿膽素、胰病脂肪過量或服用硫酸鋇所致。

- (C) 58. 林先生患有糖尿病(D.M.)，每日驗尿糖及血糖，下列何者為主要的目的？
 (A)協助疾病的診斷 (B)決定疾病的階段 (C)做為治療措施的依據 (D)發現潛在性的健康問題。
- (C) 59. 傷口引流中之Penrose引流管，其引流作用主要是藉由何種作用機轉？(A)重力作用 (B)真空抽吸原理 (C)毛細作用 (D)擴散作用。
- (C) 60. 全球第一所護校的成立，是設於那一個國家？(A)義大利 (B)美國 (C)英國 (D)法國。

解析：1860年護理鼻祖南丁格爾女士在聖多馬醫院成立護理學校，首創護理教育體制，以「教育為第一」、培養護理師資人才、造就優良醫院與家庭護士為目標，為世界第一所現代化護理學校。

- (D) 61. 病人出院前，護士教導病人居家自我照護的事項，下列何者例外？(A)告知服藥方法 (B)教導尋找資源 (C)告知每天日常活動的保健常識 (D)告知藥物服完後可自行購買。
- (B) 62. 最適合於人力嚴重短缺或降低人事成本之護理工作模式為：(A)Case method (B)Functional nursing (C)Team nursing (D)Primary nursing。

解析：功能性護理(functional nursing)：以工作為導向，將護理活動依工作性質，機械化地分配給護理人員，較少注重病人的整體性、個別性及心理因素。其優點為節省人力及經費。

- (C) 63. 下列有關「專業」的特性之敘述，何者錯誤：(A)專業的任務必須配合時代的需要 (B)使專業標準合法化 (C)專業與職業的工作內容是相同的 (D)對無能力和非道德的執業者具有處罰制度。
- (B) 64. 壓瘡形成的過程可分四期，其中缺血期是指：(A)壞死部分擴及深部的肌肉骨頭 (B)受壓部位皮膚發紅、腫脹、有水泡 (C)骨突出處呈現紅、腫，但未破損 (D)傷口周圍出現壞死組織，有滲液、會痛。

解析：壓瘡形成過程可分四期1. 充血期：皮膚冷紅，因血液循環不暢所致。
 2. 缺血期：在受壓2~6小時，局部皮膚因缺血而呈現紅腫情況，會起水泡、有滲出液、疼痛，此現象在壓力除去後36小時才會消失。
 3. 壞死期：此時皮膚呈藍色、觸之有硬節。
 4. 潰瘍期：若壓力持

續存在，則約2星期後變為潰瘍。

- (A) 65. 在我國醫療保健體系中，衛生所是屬於何類體系？(A)預防保健體系 (B)疾病治療體系 (C)繼續照護體系 (D)居家護理體系。
- (D) 66. 人格與氣質(Personality and temperament)，是影響健康的因素之一，下列有關「人格與氣質」的敘述，何者不適宜？(A)個人的人格特質和氣質都不同 (B)個人每天每分鐘都面臨改變 (C)個人對於改變後表現出的舒適度都不一樣 (D)個人的一些奇特行為表現，護士可不接受與不須了解。
- (A) 67. 下列對健康與疾病的持續性之解釋，何者正確？①健康或生病乃是一直在改變的②健康與疾病可視為一連續性的狀況③健康與疾病之間是有明顯的界限④健康與疾病是有明顯的範圍。(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。
- (D) 68. 病人想要行走，但主訴：「疲倦、軟弱無力，稍一活動即覺不適，休息就不會」，最可能之護理診斷為：(A)活動無耐力 (B)舒適情況改變 (C)身體活動障礙 (D)無法自我照顧。

解析：疾病之接受期，病人會將注意力集中在疾病上，只注意自己的症狀，常以自我為中心，出現依賴性增強和退化行為；關心自己和周圍環境。(D)屬於疾病開始期。

- (D) 70. 疾病恢復期護理的重點，下列何者正確？(A)協助恢復生理功能 (B)觀察疾病的治療效果 (C)維護病人的依賴角色 (D)增加病人自我照顧的能力。

解析：疾病恢復期應給予病人支持和鼓勵，協助病人漸漸獨立，早日回到社會，並對自己負起自我照顧的責任。

- (B) 71. 下列何種病人，應使用滾木式翻身法？(A)頭部外傷 (B)脊椎受損或手術 (C)一側偏癱 (D)多發性硬化症。

解析：利用滾木式翻身法協助脊椎受損或手術的病人改變臥姿，必須保持挺直呈一直線之部位為：頸→胸椎→腰椎。

- (C) 72. 有關「否認」(Denial)的敘述，下列何者錯誤？(A)處在疾病的初期(Initial stage)，大部分人會否認患病的事實 (B)否認是一種自我防衛機轉 (C)護理措施應強迫病人放棄否認，面對事實，而接受治療 (D)否認是暫時維持心理平衡的方法。

- (A) 73. 下列四位個案，何者心理健康狀況最差？(A)甲，18歲，男，高二，成績優，獨來獨往，內向，很少到室外活動 (B)乙，30歲，老師，教學認真，人