


家畜普通病學

羅清生編譯



畜牧獸醫圖書出版社

家畜普通病學

羅清生編譯

畜牧獸醫圖書出版社

• 內容提要 •

本書係家畜普通病各論，內容包括消化器官疾病，呼吸器官疾病，循環器官疾病，泌尿器官疾病，造血器官疾病，代謝疾病，中樞神經系疾病及皮膚疾病。每種疾病均簡略地討論了病原、病狀及療治，間亦涉及剖檢。本書的材料主要是從外文翻譯而來，但亦結合了一些我國獸醫工作者的實踐和經驗。可作為讀者學習家畜普通病的參考讀物。

本書初版於1950年5月，此次印刷已由編譯者作了部分修改，並增加人眩暈和癲癇兩病。

家畜普通病學

編號1 開本787×1092耗1 25 印張4 19/25 字數100千字

編譯者：羅清生

出版者：畜牧獸醫圖書出版社

南京湖南路獅子橋十七號

江蘇省書刊出版營業許可證出〇〇二號

總經售：新華書店江蘇分店

南京中山東路八十六號

印刷者：私營華東印刷廠

1950年5月初版 1955年6月初版第五次印刷 (9,501—11,000)

定價八角一分

目 錄

消化器官疾病	1—45
卡他性口膜炎	1
小泡性口膜炎	2
哺乳獸鵝口瘡炎	3
牛傳染性丘疹狀口膜炎	3
鵝口瘡	4
膿性蜂窩織口膜炎	4
潰爛性口膜炎	5
流涎	6
腮腺炎	6
咽炎	7
咽麻痺	10
增生性口膜炎及食管炎	10
食管炎	11
食管痙攣	12
食管阻塞	12
嘔吐	13
反芻獸前胃疾病	14—18
甲、瘤胃舒張	14
乙、急性臌氣	16
丙、前胃弛緩病	17
反芻獸損傷性胃炎	18

胃急性卡他.....	21
急性胃舒張.....	22—25
甲、馬急性胃舒張.....	22
乙、其他家畜急性胃舒張.....	24
外物在胃.....	25
胃潰瘍.....	26
胃扭轉.....	26
胃出血.....	27
急性腸卡他.....	28
幼畜急性腸胃卡他.....	29
卡他性腸痛，痙攣性腹痛.....	30
腸胃炎.....	31
腸臌氣.....	33
腸閉結.....	34—38
甲、馬腸閉結.....	34
乙、肉食獸腸閉結.....	36
丙、反芻獸腸閉結.....	37
丁、豬腸閉結.....	37
腸內梗阻.....	38
腸狹窄.....	39
腸系膜動脈梗阻.....	40
腸內性絞窄.....	41
腸扭轉.....	43
腸套疊.....	44
呼吸器官疾病.....	46—65
鼻竇.....	46

鼻卡他，感冒.....	47
猪傳染性鼻炎.....	48
格魯布性鼻炎.....	49
喉卡他.....	49
格魯布性喉卡他.....	51
喉水腫.....	51
枝氣管卡他.....	51
肺充血及水腫.....	53
肺出血.....	54
肺小泡氣腫.....	54
肺間質氣腫.....	55
大葉肺炎，格魯布性肺炎.....	56
枝氣管肺炎，卡他性肺炎.....	58
幼畜地方性肺炎.....	61—63
甲、犢地方性肺炎.....	61
乙、幼猪肺炎.....	62
丙、綿羊地方性肺炎.....	63
吸入性肺炎，肺壞死.....	63
肺膿腫，膿性肺炎.....	65
胸膜炎.....	65
水胸.....	66
氣胸.....	67
循環器官疾病.....	68—76
心包炎.....	68
心包積水.....	68
心包積氣.....	69

心悸.....	69
心動徐緩.....	70
心衰弱.....	70—71
甲、高山病.....	71
乙、牛胸脯病.....	71
心舒張.....	71
心臟肥大.....	72
心肌炎.....	73—74
1. 急性心肌炎.....	73
2. 慢性心肌炎.....	73
心破裂.....	74
急性心內膜炎.....	74
慢性心內膜炎，慢性心臟病.....	75
泌尿器官疾病.....	77—85
血尿.....	77
尿毒症.....	77
腎炎.....	78
膿性腎炎，腎膿腫.....	80
腎盂腎炎.....	80
腎孟炎.....	81
腎石病.....	82
腎盂積水.....	83
膀胱卡他.....	83
膀胱性血尿.....	84
造血器官疾病.....	86—90
貧血.....	86

三葉草	87
產後血紅素血病	88
白血病	89
小豬貧血病	89
代謝疾病	91—105
氮質尿	91
生產癱瘓	93
醋酮血病	95
運輸搐搦	97
青草搐搦	98
續搐搦	99
綿羊妊娠病	99
骨軟病	100
骨質軟化病	101
骨纖維化病	102
碘缺乏	103
鐵缺乏	103
鈷缺乏	103
羔羊僵病	104
中樞神經系統疾病	105—122
腦疾病之症狀	105
腦及腦膜貧血	108
腦及腦膜充血	109
中熱，日射病	110
腦挫傷及受震	111

觸電.....	112
腦及腦膜出血.....	112
腦膜炎， 腦膜腦炎.....	113
急性腦炎.....	114
膿性腦炎， 腦膿腫.....	115
腦室積水.....	116
腦瘤.....	117
脊髓挫傷及震盪.....	118
急性脊髓膜炎.....	119
脊髓炎.....	119
脊髓受壓.....	120
眩暈.....	120
癲癇.....	121
皮膚疾病	122—128
癩瘡.....	122
多汗症.....	122
禿毛.....	123
皮屑， 皮脂溢出.....	124
風疹塊.....	124
濕疹.....	125
皮膚炎.....	126
光敏感作用.....	127
皮膚壞疽.....	127
痤瘡.....	128

消化器官疾病

卡他性口膜炎

(Catarrhal stomatitis, Buccal Catarrh)

病原 卡他性口膜炎可分爲初發性與繼發性。初發性病由於口膜受傷：如誤食堅利物質（釘、骨及植物之堅硬部份），牙齒欠平，不適當馬銜；粗魯檢查口腔，穀類之芒及殼，飼料過熱或刺激性藥品。間有母畜染口蹄疫，乳房炎或痘；幼畜哺乳亦可致病。

繼發性病由於換牙齒或齒齦炎。間有鄰近器官（咽，喉或涎腺）發炎，亦可蔓延至口腔。家畜有骨軟病，貧血及消瘦其口腔粘膜易於發炎。口蹄疫，馬傳染性膿皰口膜炎，牛瘟，惡性卡他熱及犢白喉之經過期中，常有卡他性口膜炎。

病狀 病狀可分爲急性與慢性兩種。

一、急性病 口膜感覺過敏，食物及咀嚼慢而當心，大都口渴增加。檢查口部粘膜感熱，一部或全部呈紅色，兼有韌性粘液。口膜有時腫脹，馬之硬腭腫脹尤顯。舌有時水腫，易爲牙齒所傷。間有粘液腺管阻塞，則有灰色小結子散佈各處，尤以脣內面爲夥。此種小結子可變爲潰瘍，小者不久自癒，而大者可蔓延至脣及鼻附近之皮膚，如是則鄰近淋巴結及淋巴管亦腫大。唾涎增加，流出口外，脣旁有氣泡液體。因唾涎腐化，上皮脫屑，致發生一種惡臭氣味。

二、慢性病 家畜染有慢性病者，對於健康常無大影響。其症狀類似急性，惟無如是之劇烈。牛舌背面常有潰瘍。豬頰粘膜則有稍尖

銳的纖維樣沉着物，長約四分之三吋，常位置於頰粘膜及第一磨齒齦之間。若飼料粗硬，則咀嚼之時忽然停止食物，頭部舉起，似感疼痛；若不醫治，數星期之後漸見消瘦。

療治 調制飲食，去其病原，常不藥而癒。食草獸宜給以青料或糠麩；猪可用稀飯及糠麩，加豆漿或乳水；肉食獸則以牛奶，肉湯及磨碎肉為佳。

飼料不良者宜改換，尖利外物用手術拔除，傷口塗上碘酒或其他消毒藥。牙齒磨平，有必要時拔去。清水常置於病畜之前，聽其自飲。口腔可用 4% 氯酸鉀，1% 高錳酸鉀或 2% 明礬沖洗。慢性潰瘍試塗搽硝酸銀(10%)。猪頰膜上之沉着物用手術除去。

小泡性口膜炎

(Vesicular stomatitis)

病原 痘常發生於牛馬，普通為散發性，有時地方性或流行性。凡放牧於油菜或金花菜之地區，則有此病之發現。植物本身應無致病之理，大概由於霉菌之寄生。

病狀 馬口膜色紅，感痛，體溫稍高，同時小泡發現在脣內面，齒與齒齦之間，口角附近或舌旁。小泡大者如豆，小者如粟，內含無色液體或黃色漿液。泡膜薄，形扁平，甚至凹下，三四日後破裂，表面糜爛，約一星期新上皮生長，而恢復原狀。病最劇烈時流涎甚多，至痊癒方止。食物及咀嚼稍有妨礙。

牛口膜紅色，硬腭及脣之內面有小泡，大者如蠶豆，小者如黃豆，流涎不顯，數日破裂，糜爛部份一二天即癒。

療治 改換飼料，用高錳酸鉀(1—2%) 或氯酸鉀(4%) 沖洗口腔。病有傳染之可能，故宜隔離。

哺乳獸鵝口瘡炎

(Aphthous Stomatitis in Sucklings)

此病有傳染性，其特徵為口膜有沉澱物長成，初色白，後變灰色或灰黃色。撕脫呈潰爛表面。

病原 痘常為流行性，小羊最易傳染，小貓、犢及駒次之。幼畜染病常在哺乳時間，斷乳後極少發生。病原為一種細菌，據 Mohler 以為由於壞死桿菌；Besnoit 分離一種大球狀菌，呈革蘭氏陽性染色，人工注射病可傳染於小羊及小貓；Joest 從病部尋出化膿桿菌。

病之誘因為消瘦及貧血。凡居處不潔或低濕者，易感性亦大。強壯幼畜及管理良好者間可染病。

病狀 初口膜色紅，兼稍腫脹。一二日後有膜狀沉着物發生於粘膜上。口腔現有小白點，漸增大而厚，色灰後變黃，環以極紅之暈輪。假膜難於除去，若強撕去則留下一鮮紅易出血之表面。假膜質脆，狀如軟乾酪。脣邊有小泡，破裂後成棕黃色痂塊。病有轉機則假膜漸脫，新上皮生長而復原。

病勢加重則假膜繼續發生，許多小塊變成一大塊，色棕黃。齒齦腫大，藍紅色，易出血；齒腐爛侵入齒槽，則牙齒搖動或脫落。

口部疼痛，食物艱難或完全停止。流涎甚多，發出一種惡臭氣。病畜消瘦，間有腹瀉或便祕，甚至腹痛。苟侵入肺部，死亡隨之。

療治 痘畜應即隔離，廄舍及一切用具消毒。幼畜不能哺乳，可用人工飼養。口腔常用無刺激性消毒藥水（高錳酸鉀、氯化鉀）洗滌。

牛傳染性丘疹狀口膜炎

(Infectious Papulous Stomatitis of Cattle)

病原 據前人之研究，病原菌極小，顯微鏡不能見。細菌生存於粘

膜分泌液及血。病之天然傳染不大明瞭，可能從傷口侵入。

病狀 人工傳染病之潛伏期約二星期。初有扁平丘疹發生於脣邊及內面、硬腭、舌、頰內面及軟腭，間有發生於鼻部，其體積不一，大者如豆，小者如粟。丘疹及其周圍鮮紅，後變黃白或黃灰色，有紅暈環繞。丘疹粘連於附近組織，不易除去。病再進展，雖無水泡之長成，但上皮脫落。丘疹中央呈圓形凹下，其底不整齊，色鮮紅或深紅。約一星期新上皮生長而漸癒，但可復發，故病期常可延長至數月，然皆有自癒之可能。

療治 病畜隔離及口腔消毒。

鵝 口 瘡

(Stomatitis oidica, Thrush)

病原 此病家畜不常見，患者多屬家禽（鷄、鴿及吐綬鶴），人工接種可傳染於犬及豬。病原為一種霉菌(*Oidium albicans*)，天然傳染由於飼料及飲水。

病狀 痘之潛伏期為十至十五日。初口膜有灰白或黃點，後變棕色，亦有發生假膜者，但無炎性症狀。有謂乳豬染病呈吞嚥困難，口常張開，消瘦迅速，常有死亡。假膜可蔓延至咽及嗉囊，病禽精神委頓，食慾雖佳終不免死亡。顯微鏡檢查假膜或口腔粘液有霉菌之存在。

治療 口腔及嗉囊用5%硼砂或0.1%昇汞洗滌。病禽隔離，屋舍及用具消毒。

膿性蜂窩織口膜炎

(Phlegmonous Stomatitis)

病原 飼料含有大量毛蟲或霉菌，家畜食之可發生劇烈炎症，致粘膜下層組織化膿及壞死。藥物如鹼、酸及巴豆油；有時外傷，亦可致

病。間有繼腺疫，豬肺疫，炭疽及惡性卡他熱而發。

病狀 口膜紅、痛及腫。體溫增高。脣、頰及舌俱腫大。炎症蔓延至咽則飲食停止。間或蔓延至鼻腔，則有棕黃色粘性液體從鼻孔流出。頷下及咽周圍淋巴結腫脹，硬而痛。至此症狀漸減，有自癒之可能。若病勢轉重，則腫大粘膜上有淡黃色沉着物及膿泡，大小如青豆，破裂而成潰瘍。間有發生膿腫，流出不潔淨黃色濃液，內含腐爛組織及其他物質。

療治 飼料不良宜調換，病部用無刺激性消毒藥水沖洗，每日二三次。膿腫長成宜即割開，施以適當醫治。

潰爛性口膜炎

(Ulcerative Stomatitis)

病原 此病多發生於肉食獸，其特徵為口膜呈迅速潰爛及壞死，而無假膜沉澱物之長成。病原細菌有多種，如化膿菌，壞死桿菌等。凡家畜有齒石、齲齒、消瘦及貧血等症則易感性大。

病狀 發炎始端於犬齒及門齒之齦及頸，尤其是齒間隙；後可延及臼齒之齦，病部腫脹，色藍紅或黑紅，疼痛及易出血。一二日後齒齦之邊變為淡黃或不潔淨綠黃色物質，有如粉糊，極易脫落，成為潰瘍，周圍組織呈藍紅色兼腫脹。若侵入齒槽則牙齒搖動，易於拔除或自行脫落。病再延長則脣及頰之粘膜發生潰瘍及腫脹。更甚則炎症侵入下頷骨，致骨部分壞死。

病畜流涎，口腔有一種惡臭氣，唾涎夾雜壞死組織條片，頷下及頸淋巴結腫大，亦有延及涎腺者。口部疼痛，飲食困難，苟轉為敗血病，則體溫上升，脈搏快而細；繼之腹瀉，衰竭及消瘦，不久死亡。

療治 除用無刺激性消毒藥水沖洗口腔外，潰瘍塗搽 1—2% 硝酸銀、碘酒或 2% 木色質。飼料宜柔軟而易於消化。牙齒搖動應即拔除。

若有中毒現象，內服礦胺類藥。

流 涎

(Ptyalism, Salivation)

病原 流涎為病狀之一。普通而言，唾涎分泌並未增加，不過病畜不吞嚥，致流於口外。流涎見於咽炎，食管阻塞，口膜炎或口腔有外物。藥品如水銀，尼羅卡品 (Pilocarpine)、檳榔鹼、碘或鉛俱可增加唾涎之分泌。飼料含辛辣性物質或霉菌，偶多食之則有流涎之徵候。妨礙吞嚥（咽喉炎，咽瘻攀或麻痺及食管疾病），唾涎亦外流。傳染病如牛瘟、口蹄疫及貓傳染性腸胃炎流涎亦顯。

病狀 唾涎自口角外流，成線狀或泡狀。病期長遠則呈消瘦。

療治 流涎不過為某種病之症狀，無醫治之必要。若祇有流涎，可試用阿托品 (Atropine)，大家畜 0.03—0.1，小家畜 0.003—0.005，但其效力為時甚暫。Dieckerhoff 用砒治癒一馬。Zundel 用碘化鉀醫治一牛，結果良好。

腮 腺 炎

(Parotitis)

病原 初發性病由於腮部受傷。據有些獸醫的意見，馬膿性腮腺炎常由於燕麥芒穿入腺管。流行性病不常見，若有發現則由於細菌之傳染。腮腺炎常繼咽炎而發，腺管有砂石亦可致病。

慢性腮腺炎由於重複受傷或刺激、腺石及放線菌病。

剖檢 急性病則腺小葉色紅而腫脹，小葉間結織組織漿液浸潤。小葉或有膿點，溶合而成膿腫。慢性病則小葉間結織組織增生，腺小葉部分萎縮及硬化。

病狀 急性發炎腮部有瀰漫性或限界性腫脹，漸伸至鄰部，致咽喉

稍變狹窄，呼吸及吞嚥呈困難（牛最顯著）。腮部疼痛，致頭頸硬直。若一邊有病，則頭部傾斜。食物之時咀嚼遲慢，祇能吞嚥小塊。唾涎分泌如常或增加。間有腮腺未發炎之前已有口膜炎及咽炎，或舌及齒齦有腫脹之存在。膿性炎常引起炎性水腫，蔓延至頸及喉，待病部呈波動，自行破裂，膿液外流。

腮腺炎常為良性，苟有膿腫，破裂或割開之後，傷口痊癒迅速；間有涎瘻管遺留，施以適當醫治，短期亦可以恢復原狀。偶有神經受壓迫或發炎之後患，而致臉麻痺。

傳染性腮腺炎呈高熱，一邊或兩邊腫大，但無化膿之現象。據說乳牛染染，同時或有輕性乳房卡他。

慢性炎則有堅韌無痛之腫脹，發生於腮部，需與瘤體區別。

療治 病勢劇烈內服磺胺類藥，并局部熱敷。若急性症狀已退，而有硬結存在，試塗搽軟膏劑（碘仿，樟腦或碘），以利吸收。膿腫破宜割開，用消毒藥水注洗。慢性腫脹可注入碘酒或內服碘化鉀。

咽 炎

(Pharyngitis)

咽炎為咽之粘膜及粘膜下層急性發炎，咽後淋巴結常有膿腫長成。附近器官如鼻、喉、咽門及腮囊多少有波及。臨診之顯著徵狀為大量鼻液及飲水之時有水從鼻孔反流（馬）。

病原 此病常發生於馬及豬，偶見於肉食獸，牛羊極罕。初發性急性病由於咽膜損傷。故凡堅利物質，過熱飼料，刺激性或腐蝕性藥品及呼吸刺激性氣體，皆可致病。天氣嚴寒之時，較常有之病原為受冷，如風雨暴露，長途運輸及較少見之食冰凍飼料或飲冷水；此種情形恐為病之素因。

咽炎為馬腺疫之一部分。輕性馬腺疫間祇有咽炎之症狀。據 Hoare

之意見，所謂地方流行性咽炎，其實不過馬腺疫或流行性感冒。在維也納獸醫院，Wirth 經多年之觀察，凡染有咽炎之馬，最少百分之九十腮下及咽後淋巴結有膿腫，尤其是所謂腮囊淋巴結。此種淋巴結位置於披裂軟骨之上，在腮囊粘膜及後咽壁之間。從此種膿液所作塗抹片，其細菌形態與馬腺疫之病原菌無異；因此 Wirth 謂馬之咽炎，幾全為馬腺疫。

病有時為流行性，則由於細菌傳染，如鏈球菌屬，壞死桿菌或出血性敗血病桿菌。

病可繼出血性敗血病，流行性感冒，炭疽及出血性紫癜而發。鄰近器官（口、鼻、喉、食管或腮囊）發炎，間可蔓延至咽。

慢性咽炎頗為常見，但無重要病理變化；其發生由於長期刺激或急性變為慢性。

剖檢 粘膜充血及腫脹，面上有膿性粘液或出血性滲出物。淋巴濾泡及粘液腺腫脹。炎症深入則有假膜長成，粘膜部分壞死，壞死組織脫落而成潰瘍。間有粘膜下組織成一厚膠狀塊，有膿液浸潤；兼有血點。咽後淋巴結有時成膿腫。扁桃體常增大，其濾泡充滿黏性膿液或乾酪樣塊，惡臭異常。

慢性咽炎則粘膜變厚，後部尤顯，藍紅色。淋巴濾泡及粘液腺增大有如栗粒。粘膜間嵌有肉芽狀乳頭。咽肌或有結締組織增加。馬犬之扁桃體有時腫大如指，色藍紅。

病狀 馬染有咽炎，其全體症狀以病之輕重而異。初呈精神萎頓，飲食減少或完全停止。有疼痛而抑制之咳嗽。吞嚥困難，飲食之時有一部分從鼻孔反流。咽腫痛，頭頸伸直。兩邊鼻孔有膿性液體流出，由於咽後淋巴結膿腫破裂。體溫增加（華氏 103—105 度）。若病期規則，第四至第六日病達最高點，四至六星期恢復原狀。苟膿腫範圍廣大，則呼吸困苦，兼有局部腫脹，如是則病期不定，而痊癒期亦延長。病畜常呈衰竭及消瘦。間有敗血病或肺炎之併發。腮囊之膿腫可能自行吸收，