

皇漢醫學叢書

0059000

中國藥物學大綱



伊豫專安著

皇漢醫學叢書

中國藥物學大綱

人民衛生出版社

## 出版者的話

我國醫學，遠自公元六世紀已開始傳入日本。此後，歷代以來，日本又不斷派遣留學生到我國專門學習我國醫學。這樣，日本在「明治維新」以前的醫學，幾乎完全與我國醫學相一致；即在「明治維新」以後，有關中醫中藥的著作，也是繼承我國醫學思想體系的。因此，在今天看來，這類著作，對進一步加強學習與研究我國醫學遺產，仍有一定參考價值。

「皇漢醫學叢書」原書，係輯自日本人所研究的中醫、中藥著作，初版於一九三六年發行。現為適應社會需要，本社決定重印出版。惟原書係合訂本，卷帙過大，不便選購。今為便利讀者閱讀，在形式上盡量利用原有紙型，不作大的變動，祇精簡其一部分參考價值不大的著作，其餘一律改為單行本，以符節約和實用的原則。

本書因係日本人的著作，書中除了有如稱我國為「漢土」、「彼邦」，稱中醫藥為「漢醫」、「漢藥」等一類不適宜的辭彙外，尤其是有許多觀點，不符合今天的要求。這是由於社會制度不同和著者受歷史條件的限制所產生的。因此，希望讀者要端正觀點，用科學的批判態度來閱讀和研究，以作為一種輔助學習的資料，而更好地接受祖國醫學遺產。

# 中國藥物學大綱補正

【人參條】真判事 達按昔時韓人某氏官判事者始將來之故名。乃上好韓參也。今藥家稱判事者賈舶將來標京參者以形色相似僞充之。乃上好漢參也。又藥家稱唐參者多是女直參也。其形膨大輕虛氣味極劣。明一統志所謂女直國歲貢人參八十萬斤是也。

【小人參】根橫生如竹節者此往年賈舶將來標竹節參者味苦惡不堪用。乃參鬚之橫梁根也。或曰古人言參蘆吐人疑指此歟。附其橫根生細鬚名參鬚出張璿玉本草遼原和邦稱鬚人參稍粗者稱折人參蓋往昔所不用者近始用之。

【蔓人參】蔓生一枝四葉形如茜草柔軟有毛摘之有白汁出其氣極臭四五月葉間著花紫白色形頗類鈴鐸但比沙參花極膨大一處著一花爲異根條直圓圓不一皮上有疣瘤斷之又有白汁出故名羊乳乃沙參別種也出陳藏器本草拾遺。

【蔓人參】一名日光人參乃上條三枝五葉草根鬚也非別種須擇用似人形者達按孩兒參說就人字附會宜擇用單股者凡如黃芪防風輩擇用單股者有女萎之名。

而不用多歧者云殺人豈人參獨貴多歧乎。又一種近世賈舶所將來稱廣東人參今藥家又呼芍藥樣人參其根似參輕虛味甘氣薄皮色黯黑未詳何物或曰近廣東人有栽數根獻于官者詳其形狀卽本邦所產零餘子人參是也用者宜察稻若水云救荒本草地瓜兒卽是。

【沙參條】一名羊乳根多白汁羊乳卽蔓人參沙參卽土土岐今按沙參蘇莞形狀相類達爾沙參與蘇莞不同李時珍綱目以蘇頌圖經所載杏葉沙參爲蘇莞故形狀相類然此物乃沙參圓葉者而不似桔梗不可稱甜桔梗讀者審焉救荒野譜野譜當作本草。

【鬆沙參】東細長根爲圓此非細長根乃擘開其根欲易乾者且云其色黃與本草說不合恐不然此經久變黃色者近有一種以防葵根僞造者宜辨别。

【萎蕤】女萎苗葉類冬青云云按是乃李仲立言而本書抄略失義今補之李仲立曰女萎苗葉類冬青但冬青凌冬不凋故得女直之稱此草未秋卽萎故有女萎之名。

【天麻】出奧州。他處未聞有之。按天麻諸州又間產之。不止奧州。

【白朮】和產多是蒼朮。按一種。關東產者葉如棠梨。

稍軟。根如雲頭。味最佳。

但藥家未鬻。

【遠志】小葉者爲是。按遠志大葉者根大。小葉者根細。

宜採大葉大根者供藥用。近檢近江州伊吹山所

產者。根基肥大。氣味極厚。可用。

【黃芩】擇用深色堅實者。按堅實而小者爲條芩。一

名子芩。輕腐爲片者爲腐芩。一名片芩。各有所用。本

草詳辨之。

【前胡】有數種。今和產無數種。按和名溪芹者。諸州

山野多產之。河內州產一種。細葉者葉類芹葉。及當

歸。是乃本草當歸葉者。

【防風】今稱山人參者真。但有兩種。藝州人呼山人參

者。乃真。京洛山中又多產之。有一種相似而有毛者。參

相模州鎌倉山中多產之。根比山人參強硬。味薄爲

劣。予往來經過河內州諸山。乃二物並生。土人俱稱

山人參。又近江州伊吹山產一種防風。葉似山人參。

極纖細。氣味極厚。土人稱細葉防風。

【廷胡索】今漢波者。有大小二種。大者味厚爲佳。藥肆稱

【貝母】今漢波者。有大小二種。大者味厚爲佳。藥肆稱

大貝母。顧元交本草彙箋名象山貝母是也。本草引頤生微論云云。其說極好。

【補骨脂】近世傳種子栽之。與漢物一般。

【澤瀉】和名那那都(北國稱呼)匙於茂多嘉。(幾內稱呼)

【細辛條】細葉細辛。此稱柳葉細辛者。乃徐長卿也。

【木香】和產根無香氣非真。按此說恐非也。香之有無。

因地產之異。

【三稜條】莪蕘根。和名蛟帳張草。觀子苗。和名

久具。俱出救荒本草。

【香附條】夫須。按雅爾云。藝夫須乃賤夫所須。此草

可爲箋笠者。乃今之須化。非香附之。本草襲李氏之

誤。

【蘆香】和稱蘆香者。乃月令廣義所載蘆菜。

【荆芥條】河豚。和名布具。又名布久登。黃頸魚。

和名岐岐。字佐岐牟滿。

【旋覆花】按一名野油花。出小兒衛生總微論。

【地黃】服地黃人忌蘿蔔葱蒜。謂之三百。今服地黃人。

知忌蘿蔔。而不知忌葱蒜。可笑。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.er Tongbook.com

# 中國藥物學大綱目錄

甘草	一	前胡	一
黃耆	二	防風	一
人參	三	獨活	一
沙參	四	升麻	一
桔梗	五	苦參	一
萎蕤	六	白蘚皮	一
黃精	七	延胡索	一
知母	八	貝母	一
天麻	九	茅根	一
白朮	一〇	龍膽	一
遠志	一一	細辛	一
玄參	一二	當歸	一
地榆	一三	川芎	一
紫草	一四	藁本	一
黃連	一五	白芷	一
胡黃連	一六	芍藥	一
黃芩	一七	牡丹皮	一
柴胡	一八	木香	一
	一九	良薑	一

草豆蔻	一八	旋覆花	三九
白豆蔻	一八	紅花	四〇
縮砂	一九	大薊小薊	四〇
益智	一九	牛蒡子	四一
肉豆蔻	一九	麻黃	四一
補骨脂	一九	木賊	四二
蕷黃	一九	燈心草	四二
鬱金	一九	生熟地黃	四三
莪朶	一九	牛膝	四五
三棱	一九	紫苑	四五
香附子	一九	麥門冬	四五
藿香	一九	款冬花	四六
澤蘭	一九	瞿麥	四六
香薷	一九	葶苈	四七
荆芥	一九	車前子	四八
薄荷	一九	連翹	四八
紫蘇	一九	蒺藜	四九
茵陳	一九	海金沙	五〇
菊花	一九	常山	五一
益母草	一九	大黃	五〇
夏枯草	三九	附子	三九

川烏頭	五二	生蠶	六四
白附子	五二	乾薑	六四
天南星	五三	茴香	六五
半夏	五四	山藥	六五
五味子	五四	薏苡仁	六六
栝樓仁	五四	黃檗	六六
天花粉	五四	厚朴	六六
葛根	五四	杜仲	六八
天門冬	五六	訶子	六八
何首烏	五六	杏仁	六九
威靈仙	五七	烏梅	六九
防已	五八	桃仁	七〇
木通	五九	大棗	七〇
釣藤鈎	六〇	木瓜	七一
忍冬	六〇	陳皮	七二
澤瀉	六一	山楂	七二
菖蒲	六一	青皮	七三
白扁豆	六二	龍眼肉	七三
神麆	六三	檳榔	七四
麥芽	六三	大腹皮	七四
吳茱萸	六三		七四

蓮肉	七五
肉桂	七五
沉香	七六
丁香	七六
烏藥	七八
桑白皮	七八
枳實	七八
枳殼	七八
山梔子	七八
酸棗仁	七八
山茱萸	七九
地骨皮	八〇
葛荳子	八一
茯苓	八二
猪苓	八三
桑寄生	八三
竹茹	八三
竹瀝	八四
蠶蠶全蠶	八四
蟬蛻	八五

阿膠	八五
犀角	八六
鹿茸	八六
石膏	八七
滑石	八八
芒硝	八九
人中白	八八
童便	八九
補正	一二

# 中國藥物學大綱

甘草 本經上品

伊豫專安氏著

【釋名】根因味甘甜。遂名『蜜甘』、『蜜草』。蜜有沉香之一名。謂其氣味如蜜。此草最爲衆藥之王。猶如

香中有沉香。『路草』、『靈通』、『偷蜜』、『珊瑚』、『太歟』、『美草』。以上各義未詳。國老、國老卽帝師之稱。雖非君而爲君所宗。

【各方記述】甘草枝葉悉如槐。高五六尺。但葉端微尖而縷瀉似有白毛。結角子。扁如小豆極堅。齒嚼不破。(略文)○今出山西省汾州府及南京市盧州府。福州府可共用。一種有稱阿蘭陀及朝鮮者。皆不堪用。○延喜式載常陸、陸奧出羽三國獻之。近世自甲斐出。與唐來者不少異。吾聞之出甲斐者葉如麻。而尖有毛。

【辨別道地】今藥肆所稱豎鞭者。長大也。稱中鞭者。細也。稱切込者。短也。稱良姜樣者。揀餘之麤者也。稱糞甘草者。細小曲弦者也。時珍曰。大徑寸而結緊斷文者爲佳。謂之粉草。選其壯大皮薄。色黃者。堅實無

文者爲上。是藥肆所謂豎鞭也。

【修治】刮去龜皮剉用。製法頗多。宜從本方。生寒。炙溫。補中宜炙用。瀉火宜生用。指節頭三者皆生用。

【氣味】甘平無毒。

【功用】氣薄味厚。升而浮陽也。入足太陰厥陰經。通入手足十二經。白朮苦參乾漆爲使。惡遠志。反大戟。芫花。甘遂。海藻。忌豬肉。中滿嘔家酒家諸濕脹滿。咸不宜服。『梢』止莖中癰瘍。『節』主癰疽。消腫導毒。主治五藏六府寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉。倍氣力。金瘡瘻(腫也)解毒。溫中下氣。煩滿短氣。傷臟咳嗽。止渴。通經脈。利血氣。解百藥毒。安和七十二種石。一千二百種草。主腹中冷痛。除腹脹滿。補益五藏。腎氣內傷。婦人血虛腰痛。凡虛而多熱者用之。解小兒胎毒。驚癇。降火止痛。

黃耆 本經上品

【釋名】耆。長也。色黃。爲補藥之長。故名。『黃耆』今俗

通作芪。『載移』『載椹』『獨椹』『芟草』『蜀脂』。以上名義未詳。『百草』耆誤作耆。乃耆龜之耆音尸。今按稱百本。耆與耆字相似。故誤名之乎。耆一根百莖。謂百本亦疑此之謬乎。『王孫』『百藥錦』義未詳。

【各方記述】黃耆葉似槐葉。而微尖小。又似蒺藜葉。而微闊大。青白色。開黃紫花。大如槐花。結小尖角。長寸許。根長二三尺。以緊實如箭鈞爲良。○松岡先生曰。和產有二種。生北國者。莖葉堅似木葉。有毛。此本草所謂本黃芪。而不堪用。又有半齒葉者。出關東。共木黃芪也。此二種。今人家藥圃多栽此二種。未知有真種也。京都北山中間有之。東國呼之綿黃芪。以合漢名。○陳承曰。黃芪本出綿上者爲良。故名綿黃芪。非謂其柔軟如綿也。○松岡先生曰。綿黃芪形軟如綿。絮以名之。謂產綿州故名誤矣。

【辨別道地】選單股不歧者。色潤柔軟。肉心黃。甘甜者

用之。世多以首蓿根充賣。謂土黃耆。不知首蓿根堅

而脆。肉黃。黃芪軟而如棉。肉白。此爲異耳。

【修治】去頭刮皮。以蜜水塗炙。亦有以酒或鹽酒炒之。酒欲其達表。又行其泥滯。鹽欲補腎。及崩帶淋燭達

其下。

【氣味】甘微溫無毒。

【功用】味甘氣溫平。氣薄味厚。可升可降。陰中陽也。入手足太陰氣分。又入手少陽足少陰命門。茯苓爲之使。惡龜甲白鮮皮。黃芪功能實表。有表邪者勿用。能助氣。氣實者勿用。能內塞。補不足。胸膈氣閉悶。腸胃有積滯者勿用。能補陽。陽盛陰虛者忌之。上焦熱甚。下焦虛寒者忌之。病人多怒。肝氣不和者勿服。痘瘡血分熱盛者禁用。

【主治】癰疽。久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘡。補虛。小兒百病。婦人子癥風邪。逐五藏間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴。腹痛。洩痢。益氣。利陰氣。主虛喘腎衰。耳聾。療寒熱。治發背。內補助氣。壯筋骨。長肉。補血。破癩癧。瘰疬。壅贊。腸風。血崩。帶下赤白。利產前後一切病。月候不勻。癥瘕。頭風。熱毒。赤目。治虛勞自汗。補肺氣。濡肺火。心火。竇皮毛。益胃氣。去肌熱。及諸經之痛。主太陰瘧疾。

人參本經上品

【釋名】『人蔭』人蔭年深。蔭漸長者。根如人形有神。故謂之人蔭。浸亦浸漸之義。『黃參』『血參』其

在五參。色黃屬土。而補脾胃。生陰血。故名之。『人衛』衛乃薦字之訛也。『鬼蓋』此草背陽向陰。故云『神草』。下有人參。上有紫氣。又曰搖光星散爲人參。土讀地精。得地之精靈。故有此名。『海腴』『皺面還丹』二名未詳。或曰本邦產人參之地。深山陰谷。雖夏亦陰。冷氣甚。而蚊蚋可以遁去。故名未知是否。各方記述。人參生上黨山谷。及遼東。上黨在冀州西南。今來者形長而黃。狀如防風。多潤實而甘。俗乃重百濟者。形細而堅白。氣味薄於上黨者。次用高麗。即是遼東。形大而虛軟。不及百濟。并不及上黨者。其草一莖直上。四五相對。花紫色。高麗人作人參讚云。三極五葉。背陽向陰。欲來求我。根樹相尋。或云。根我邦謂登知者未詳。○松岡先生曰。今人參以朝鮮產爲上。中夏次之。其中好惡真僞。互有之。形小而堅。色帶黃褐。嘗試之。有餘味者。最爲上。近來有判事手。此又有真僞。真判事今無之。唐參中以肥大而蠟色者充之。是女直參。近來稱唐參者。非韓參。而多是女直參也。此種今多渡日本。雜韓參以貨之。當審擇。○和產『小人參』始出自薩摩州。今處處有之。三極五葉。四五月有花。細小紫白色。結子生青熟紅。根橫生狀如竹節。其味太苦者多。甘者少。以甘者用之。其鬚嘴

之。甘苦氣味微與人參相近。又名『三枝五葉草』。苗葉花狀。雖與圖經之說相合。根形不同。浸煎甘草湯。以代人參用之。稱『蔓人參』者。半乳根而蔓生。花如鈴鐸。乃沙參類也。近來種防葵。以爲人參。摶州『平野人參』是也。稱『節人參者』。三七草根也。藝州有稱『山人參』者。真防風也。豫州稱『日振人參』。亦防風類而粗大也。近來有稱『鬚人參』者。出于東國。是亦小人參之類。而形狀長大於小人參也。稱『參葉』者。近年從朝鮮來。乃人參莖葉也。予屢用試之。其氣烈。其味苦。有肺熱者。用之猶有效。甚勝於砂參。而亦實非補大虛者。用者審之。『服人參』本草所謂湯參。近來有『切人參』者。亦此類也。

【辨別道地】選要肥大。塊如鷄胚。併似人形。黃色者。乃藥鋪稱蝦樣者也。連皮者。黃潤色如防風。去皮者。堅白如粉。其似人形者。謂之孩兒參。尤多質僞。市之貨者。隨品立名。曰土佐。向單段。好人參也。延喜式載人參。古既有之。今所用之和人參。將用沙參嫩。不以可知焉。

【修治】去蘆頭用之。凡生用宜咬咀。熟用宜隔紙焙之。浸水少焙。則柔韌而易剉。或醇酒潤透焙熟用。宜從

本方雖忌鐵器。不必在忌列參。頻見風日則易蛀。惟

納瓦罐。雜細辛密封。可留經年不壞。

**【氣味】**甘微苦溫。無毒。

**【功用】**氣味俱薄。浮而升。陽中之陽。又曰陽中微陰。入

手太陰經。與藜蘆相反。茯苓馬蘭爲之使。惡溴疎鹹。畏五靈脂。惡皂莢黑豆。動紫石英。得升麻補上焦

之元氣。得麥門冬則生脈。得乾姜則補氣。得黃芪甘草除大熱。若血證驟起。肺脈獨實。脰證暴成。九候堅強。痧疹初發。斑點未彰。傷寒始作。邪熱昌熾。血熱妄行。諸痛不可驟用。邪氣方銳。宜散不宜補故也。

**【主治】**補五藏。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目開

心益智。療腸胃中冷。心腹鼓痛。胸膈逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脉。徹堅積。令人不忘。主五勞七傷。虛損瘦弱。止嘔噦。補五藏六府。保中守神。消胸中痰。治肺癰及癰疾。冷氣逆上。傷寒不下食。凡虛而多夢

紛紛者加之。止煩燥。酸水。消食開胃。治氣。殺金石藥。

瀉心肺脾胃中火邪。止渴生津液。治男婦一切虛證。頻數。淋瀝。勞倦。內傷。中風中暑。痿痺。吐血。嗽血。下血。血淋。血崩。胎前產後諸病。「參蘆」苦溫。「主治」

吐虛勞痰飲人等者。以參蘆代瓜蒂。  
沙參 本經上品

**【釋名】**沙參白色。宜砂地。久服益氣。有參贊之功用故

名。「白參」白色名之。「知母」莖有白汁如乳故名。未詳。「半乳」根多白汁。俚人呼爲半婆奶。「鈴兒草」象花形也。「虎鬚」說同上。「苦心」此物無心而味不苦。不知其謂也。「文希」「識美」「志取」三名未詳。因地名亦異。逐一不載之。

**【各方記述】**所生山原有之。二月生苗。葉如初生小葵

葉。而圓扁不光。八九月抽莖高一二尺。莖上之葉。則尖長如枸杞葉。而小有細齒。秋月葉間開小紫花。長二三分。狀如鈴鐸。五出。白蘿亦有白花者。並結實。大如冬青實。中有細子。霜後苗枯。其根生砂地者。長尺餘。大一虎口。黃土地者。短而小。根莖皆有白汁。

**【辨別道地】**今謂釣鐘草者是也。其草亦有杏葉與竹葉之別。花有紫白二種。而花狀根形。氣味不異。所生砂地有之。而今藥鋪不別沙參與蘇草。而混售之。今唐來者。東細長根而爲圓。其色黃。謂之鬆沙參。然與時珍取說不合。今濟亦用之。和產符合時珍說。則不爲不佳。用者審擇之。「半乳」根狀如蘇草而圓。大

小如掌。上有角節。折之有白汁。人取根當莽荳。味甘潤。實大勝於砂參。不得止則代用人參亦可。今藥鋪稱弦砂參者也。『莽荳』『釋名』『杏葉砂參』根如砂參。而葉如杏葉。故呼之。『甜桔梗』梗甜葉如桔梗故名之。○今按沙參莽荳形狀相似。其說亦相混同。效荒野譜。既謂本草所載之杏葉沙參。則分明一種也。欲知其誠否。則繙諸本草。可以審擇之。而今不云云。

【修治】去頭剉用。或少焙用。

【氣味】淡甘微寒。無毒。

【功用】入手太陰。足厥陰經。惡防己。反藜蘆。藏府無實熱。肺虛寒客之作嗽者。勿服。

【主治】血結癰氣。除寒熱。補中益肺氣。療胸悶。心腹結熱邪氣。頭痛皮間邪熱。安五藏。久服利人。『羊乳』

『主治』頭腫痛。益氣長肌肉。去皮肌浮風。疝氣下墜。治常欲眠。養肝氣。宜五藏風氣。補虛止驚煩。益心肺。並一切惡瘡疥癬。及身癰。排膿消腫毒。清肺火。治久嗽肺痿。『莽荳』『主治』解百藥毒。利肺氣。和中明目。止痛。主欬嗽消渴。強中瘡毒。丁腥。沙參羊乳。莽荳。一物別種。故功用亦有大同少異也。

【釋名】桔。結也。梗。梗也。其文縷結如梗也。因名。『白藥』『梗草』『莽荳』。桔梗莽荳乃一類有甜苦二種。故俗呼莽荳爲甘桔梗也。

【各方記述】春生苗高尺餘。葉似杏葉而長橢。四葉相對而生。嫩時亦可飮食。夏開小花。紫碧色。頗似牽牛花。秋後結實。根如指大。黃白色。花有紫白單子瓣者。宜用紫色單瓣者。

【辨別道地】凡使勿用木梗。真如桔梗。咬之只是腥而不堪用。根有細大。藥家謂小稱楊枝梗。以資之。然不可拘泥之。應用大小俱選堅實肥白者。

【修治】剉去浮皮。及尖。浸米泔水一夜。切片。微炒用。或以百合搗爛同浸一日。剉碎微焙用。○今按在藥肆者。欲其色白。以米泔浸暴乾數日。則其色潔白。浮皮亦隨去。醫家再浸米泔一夜。則恐氣味倍薄。用者審之。宜只去頭剉用。或微炒亦可。

【氣味】苦辛微溫。有小毒。○氣味有諸說。繆仲淳曰。觀其主諸病。應是辛苦甘平微溫無毒。

【功用】味厚氣輕。陽中之陰升也。入手太陰肺經。氣分及足少陰經。節皮爲之使。畏白及龍膽。忌猪肉。得牡蠣遠志。療恚怒。得消石。石膏。療傷寒。白粥解其毒味。風症。鬱症。肺症。皆不可缺。若病氣逆上。與以補下焦。

藥中勿用。病不屬肺者亦不益。○時珍曰。伏砒。節皮不知謂何物也。

【主治】胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴。幽幽驚恐悸氣。利五藏腸胃。補血氣。除寒熱風婢。溫中消穀。療喉咽痛。下蠭毒。治下痢。破血積氣。消聚痰涎。去肺熱。氣促嗽逆。

除腹中冷痛。主中惡。及小兒驚癇。下一切氣。止霍亂轉筋。心腹脹痛。除邪辟瘟。破癩痕。肺癰。養血排膿。補內漏。及喉痺。利竅。除肺部風熱。清利頭目。咽喉。胸膈。滯氣。及痛。除鼻塞。治寒嘔。主口舌生瘡。赤目腫痛。

萎蕤本經上品

萎蕤根長。莖亦如桃枝。葉短青白色。黃精葉尖。萎蕤葉如七。二種共劈根長二三寸栽種也。子復種之易繁生。

【辨別道地】肆中名地黃樣黃精者是也。以肥潤而大爲佳。○今按黃精萎蕤性味功用大抵相近。而萎蕤功爲勝。然世人只知黃精之有功。而不知萎蕤之可作用。況亦黃精不可用煎服。而今萎蕤代人參。故特舉之。而後黃精者也。

【修治】忌鐵。竹刀刮去節皮。蜜水浸蒸焙用。或微炒。或水浸飯上蒸透。或酒浸蒸透用。○今按此物暴乾。經日難乾。瓶上一蒸。當風日克乾。不失潤。而后洗剉。從本方製之。今售藥肆亦酒浸蒸用而良。

【氣味】甘平無毒。

【功用】能升能降。陽中陰也。入手太陰足太陰厥陰少陰經。甘入脾。柔潤入腎。畏鹹。土材曰。滋益陰精。與地黃同功。增長陽氣。與人參同力。潤而不滑。和而不偏。譬諸盛德人無往不利。繆仲淳曰。純而不駁。和而不偏。有益無害。故無簡謬。可謂知萎蕤者也。

【主治】主中風暴熱。不能動搖。趺筋結肉。諸不足。久服去面黑黯。好顏色。主潤澤。心腹結氣。虛熱濕毒腰痛。萎蕤相似。最難辨。黃精根如佛掌薯。葉青黃色。而長。根種之。極易繁也。嫩葉及根。並可煮淘食茹。○黃精

勞客熱。頭痛不安。補中益氣。除煩悶。止消渴。潤心肺。  
補五勞七傷。虛損腰脚疼痛。天行熱狂。服食無忌。主  
風溫自汗灼熱。及勞瘞寒熱。脾胃虛乏。男子小便頻  
數。失精。一切虛損。

黃精本經上品

【釋名】以其得坤土之精粹。故謂之黃精。

【各方記述】苗葉與萎蕤相似。根如白芨。多生北方山

中。大者苗高五六尺。根如拳。夏月開小白花。結子如

葵粒。

【辨別道地】肆中稱生姜樣黃精者。真也。

【修治】洗淨後蒸。從已至子。薄切暴乾用。

【氣味】甘平無毒。

【功用】忌梅實。

【主治】補中益氣。除風濕。安五臟。補五勞七傷。助筋骨。  
耐寒暑。益脾胃。潤心肺。補諸虛。填精髓。下三尸蟲。

知母本經上品

【釋名】補陰藥用之。以其能知血之母故名。「蟻母」

宿根之旁。初生子根狀如蟻蟲之狀故名。「連母」

「蟻母」蟻音提。蟻訛爲提。「水母」「地參」「水

參」「蓀」音覃。「蓀蕘」音沉煩。「苦心」「兒草」諸名未詳。

【各方記述】葉如葷。花如葷。故一名韭。逢四月開青花。  
八月結實。

【辨別道地】和漢俱皆真。擇其黃色有毛。似菖蒲而肥。  
潤用之。廣者不可用。

【修治】須以竹刀去毛剉。勿令犯鐵器。損腎。引經上行  
用酒浸焙。下行鹽水潤焙。久炒如褐色。

【氣味】辛苦寒。無毒。

【功用】氣味俱厚。沉而降陰也。陰中微陽。入足陽明手  
太陰經氣分。得黃柏及酒良。能伏鹽及蓬砂。陽痿及  
易舉易痿。洩瀉脾弱。飲食不消化。胃虛不思食。腎虛  
瘡潰等證。法並禁用。

【主治】消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足。益氣。  
癥傷寒久。瘧煩熱。脇下邪氣。膈中惡。及風汗內疽。心  
煩燥悶。骨熱勞往來。產後蓐勞。腎氣勞。憎寒虛煩熱。  
勞。傳尸疰病。通小腸。消痰止嗽。潤心肺。安心止驚悸。  
涼心去熱。治陽明火熱。瀉膀胱。腎經火熱。厥頭痛。下  
痢腰痛。喉中腥臭。瀉肺火。滋腎水。治命門相火有餘。  
安胎止子煩。

天麻宋開寶

【釋名】以形名。形如黃瓜。味辛而辣。故呼爲瓜天麻。『赤箭芝』芝類莖如箭幹赤色。葉生莖端。遠見箭有

羽故名之。『獨搖芝』有風不動。無風自搖。『定風草』二名以性異而名。『離母』『合離草』二名以根異而名。『神草』『鬼督郵』以功而名。

【各方記述】葉如芍藥而小。當中抽一莖直上如箭幹。

莖端結實狀若續隨子。其根連一二十枚。猶如天門冬百部之類。四月開花。○今考中華產有葉。見和產一莖一花。如葱花。而無枝葉。餘皆相同。和產出奧州。他處未聞有之。

【辨別道地】和漢可俱用。破開明亮堅實者佳。

【修治】濕紙包於糠火中熗熟。取出切片。酒浸焙用。

【氣味】甘辛平。無毒。

【功用】苦平。陰中之陽也。入足厥陰太陽經。風藥多燥。

風能勝燥故也。凡病人覺津液更少。口乾舌燥。咽乾爲痛。大便閉滯。病火炎上。頭暈。血虛頭痛及南方似

中風。皆禁用之。

【主治】消癰腫。下支漏。寒疝下血。諸風濕痺。四肢拘攣。

小兒風癇驚氣。利腰膝。強筋力。治冷氣滯痺。攤緩不隨。語多恍惚。善驚失心。助陽氣。通血脉。治風虛眩暈。頭痛。

## 白朮 本經上品

【釋名】有白朮。赤朮。故以名分之。朮字篆文象其根幹枝葉之形。『山薑』其葉似薑。而味似姜芥。一名山芥。一名天薑。『揚枹』揚州多種白朮。其狀如鼓枹。故有揚枹抱蕷之名。『馬薑』馬者以大名乎。『山姜』以形味而名。『山連』未詳。『吃力伽』西域名之。

【各方記述】朮有兩種。白朮梢大有毛。而無梗。根甜而少膏。可作丸散用。赤朮葉細無梗。根小苦。多膏可作煎用。春生苗。青色無梗。莖作蕕幹狀。青赤色。長二三尺以來。夏開花紫碧色。亦似刺薑花。或有黃白色者。入伏後結子。至秋而苗枯。根似姜。而旁有細根。皮黑心黃白色。中有膏液。○和邦稱白朮者。高一二尺。葉三葉。一朵似杏。而鋸齒。莖強直。四五月開青白花。形如夏枯草花狀。而中有子。是乃蒼朮也。

【辨別道地】和漢俱有之。而漢爲真。今所渡者。合雲頭尤。鷄腿朮之說。最爲上品。一種稱片白朮。川白朮者。性味功用稍劣之。和邦蒼白二朮。同一物。藥肆以老根爲蒼朮。以嫩根爲白朮。以售之。今醫家亦以老爲白。以嫩爲蒼而用之。俱皆不是。白朮可必用漢產。和