

一九五八年  
痢疾防治工作資料彙編  
第一集

北京市卫生防疫站編印  
1959.2.

# 北京市1958年度痢疾防治工作

## 資料彙編(第一集)

### 一、中共中央国务院关于除四害講卫生的指示

### 二、1958年痢疾防治工作計劃

防治痢疾綜合計劃.....	5
春季除四害講卫生运动工作綱要（重点摘要）.....	10
五月分除四害講卫生工作計劃.....	10
夏秋季（6—9月）除四害講卫生工作計劃.....	12
关于开展夏秋季灭蝇防病的战斗計劃.....	15
儿童防病計劃綱要.....	17
夏秋季第二次全市大突击計劃綱要.....	18
附：进一步开展防痢灭蝇工作.....	19
10月分除四害講卫生工作重点.....	20
附：秋后痢疾防治战斗計劃綱要.....	22
宣武区防治痢疾突击战斗計劃.....	23
东城区消灭蚊蝇战胜痢疾脑炎战斗計劃.....	26

### 三、痢疾防治工作須知

北京市痢疾类疾病統一报告应用指征.....	29
腸道传染病管理須知.....	30
慢性痢疾調查方法.....	32
痢疾漏报調查方法.....	35
集体单位（厂矿、建筑工地、学校、机关）防治痢疾須知.....	36
綜合医院、机关、企业医院防治痢疾須知.....	38
基层医疗机构（区門診部、联合診所、开业中西医）防治痢疾須知.....	39
儿童机构防治痢疾須知.....	41
关于飲食制售营业的几項卫生要求.....	43

### 四、痢疾防治工作經驗交流資料

西斜街痢疾疫源地調查及控制續发病例工作介紹.....	44
东单区建立群众疫情报告站情况的介紹.....	46

地区红十字会在痢疾防治工作中的作用	48
地段保健工作“儿童会”	49
蘆草园地段的儿童卫生习惯培养試驗工作点滴經驗	51
崇文区防病工作介紹	53
宣武区防治痢疾突击治疗情况简介	54
市立第三医院防痢工作情况介紹	55
传染病医院地段工作跃进情况	57
海淀区清河医院防治痢疾情况介紹	58
宣武区下斜街联合診所痢疾防治工作情况介紹	59
崇文区西湖营办事处建立消毒站的初步經驗	60
生吃凉拌菜可用乳酸来消毒	61
漂白粉消毒冰鎮西瓜、汽水、梅湯的冰水的方法介紹	62
灭蝇防痢的紅旗——桃园居民委員會	63
无蝇无痢大杂院的一面紅旗	64

## 五、痢疾宣传資料

(一) 宣传材料	65
“四要”“三不”做的好，痢疾准保得不了	65
預防痢疾	65
怎样防治小孩的痢疾	66
痢疾病人应当注意的几件事	67
人人动手，消灭蒼蠅	67
預防儿童痢疾不吃不卫生的另食	68
痢疾病的家庭消毒方法	68
(二) 地段医务人员編写宣传品的参考材料	69
1958年痢疾防治措施內容是什么	69
要打破痢疾流行規律	70
痢疾病人哪个年齡多	71
痢疾病人的职业	72
痢疾在哪类地区多	72
怎样感染痢疾的?	72
痢疾患者住宅內的痢疾菌检出率	73
手的傳佈	73
各种食品檢驗情況	75
蒼蠅帶菌情況	75
痢疾菌在外界生活有多長時間	75
痢疾杆菌在干燥糞便中生存的时间与溫度的关系	76
痢疾的菌型有哪些变化?	76
为什么要管理痢疾带菌人和慢性痢疾病人	76

痢疾糞便簡便消毒法	77
傳染痢疾的真人真事	77
(三) 防痢的文艺創作	79
“四要”与“三不”(順口溜)	79
預防痢疾并不难(快板)	80
預防痢疾(快板)	82
不要吃爛西紅柿(街头活报剧)	83
除蚊灭蝇(小京剧)	84
(四) 防痢工作的报导	87
首都痢疾发病率要比去年减半	87
医务人员广泛出动，文艺团体上街演出，大规模宣传防痢灭蝇	87
七大战役全获胜，灭蝇防痢起高潮	88
首都三万人参加儿童防痢遊园大会	89
家长切实教育小孩，坚持四要三不要，严防儿童患中毒性痢疾	89
如果患中毒性痢疾最好就近医治	90
警惕中毒性痢疾，別讓儿童生食不洁瓜果	91
发揚共产主义精神一切为了病人，儿童医院千方百计搶救病儿	92
北医附属医院人人獻計急性痢疾患儿无一死亡	93
严防感染痢疾，保障人民健康	93
生吃蔬菜和瓜果用什么方法消毒好	94
处处为顧客健康着想的地安門商場	94
把卫生红旗插遍首都	95
整洁的桃园	95
第三皮毛厂作到无蝇无病	97
北門仓小学利用废料做成洗手池	97
崇文区防痢成績好发病率比去年低70%	98
深入发动群众，做好卫生工作，丰台区痢疾发病率显著下降	98
抓紧飲食卫生和个人卫生，34个机关痢疾发病率降低	99
<b>六、防痢總結</b>	
大搞群众运动削平痢疾高峯	100
<b>七、編后語</b>	

中共中央国务院

# 一、关于除四害講卫生的指示

(一九五八年二月十二日)

一个以除四害为中心的爱国卫生运动的高潮已經在全国形成。在全国各省市，广大群众正在大規模地行动起来，消灭老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子，提倡卫生，扑灭危害当地人民最严重的疾病，并且紛紛提出规划，准备在几年時間內提前实现全国农业发展綱要（修正草案）所提出的要求。截至目前为止，据不完全統計，提前实现“四无”的省和直属市，已經有北京定为两年，河南定为三年，上海定为三至五年，江苏定为四年，山东、山西、浙江、福建、广东、云南、甘肃、辽宁、黑龙江定为五年，安徽定为五至八年。决定在今年就实现“四无”的市和县，有江苏的南京、常州、鎮江、南通，山东的济南、阳信、单县，河南的郑州、开封、洛阳、焦作、登封，甘肃的兰州，山西的屯留，河北的蠡县、河間。干部和群众在这一运动中充滿了干劲和信心，运动每天都有新的进展。目前党和政府的迫切任务，就是要坚决地积极地领导这一运动，在今年春夏两季把这一运动发展到全国一切已經基本上实现了社会主义所有制改造的地方，真正达到家喻户晓、人人动手的程度。要在今年春季，使每一省、市、自治区，每一县区，每个乡镇，每个合作社、厂矿企业、机关、学校部队，都訂出自己除四害、講卫生的年度計劃和长期計劃，而且务必在今年內打下实现长期計劃的巩固基础。

除四害、講卫生的根本要求，如全国农业发展綱要所說，是要达到消灭疾病、人人振奋、移风易俗、改造国家的目的。自有人类以来，人們一直受着疾病和各种害虫害兽害鳥的威胁。我国人民在反对疾病的长期斗争中創造了丰富的經驗，但是只有社会主义革命胜利以后，才能够在党和政府的领导下一致动员起来，有计划有組織地为消灭疾病而斗争。消灭疾病，保卫人民的生命和健康，这就是保护世界上最重的财富和最重要的生产力。为此目的，必須講求环境卫生和个人卫生，必須預防疾病的发生，制止疾病的传播。蒼蠅传播痢疾、伤寒、霍乱、肝炎、脊髓灰白质炎，蚊子传播疟疾、乙型脑炎、血絲虫病，老鼠传播鼠疫、血吸虫病、鉤端螺旋体病、恙虫病、鼠型斑疹伤寒、鼠咬热。为了保卫人民的健康，必須消灭蒼蠅、蚊子、老鼠。老鼠除了传播疾病以外，还大量損耗粮食，破坏衣物、房屋以及田梗堤坝。同老鼠一样，麻雀也是农作物的大敌。消灭蒼蠅、蚊子、老鼠、麻雀，是我們征服疾病和消灭危害人类的害虫害兽害鳥的一个重要步骤。在这一斗争的过程中，我們要大大提高人民的卫生水平和健康水平，逐步控制在各个地区、各种职业中为害最烈的疾病蔓延和发生，使广大群众对于控制自然环境增加信心和勇气，以便进而征服一切疾病，消灭一切害虫害兽害鳥。我們不但要征服人类的疾病，而且要征服家畜、家禽和作物的病害、虫害和兽

害。这个斗争，是人类征服自然改造自然的伟大战争的一个重要方面，是我国人民轉病弱为健强、轉落后为先进的伟大文化革命的一个重要方面，对于提高劳动效率、发展工农工业經濟、改善人民生活有密切的关系。任何忽視这一斗争的意义、認為是无关的小事的想法都是錯誤的。

除四害講卫生的主要障碍，除了上述認為这是小事，是“小題大做”的想法外，就是許多人害怕这一斗争中的困难，不相信四害和許多不卫生的习惯能够除掉。但是1952年以后的爱国卫生运动的經驗，特別是最近时期各地大規模展开的冬季除四害講卫生运动的經驗，充分說明了这种怀疑論的破产。事实証明，只要那里的共产党员和政府工作人員能够真正用革命精神把群众领导起来，就能够使那里的除四害講卫生运动得到迅速的发展，并且在很短期間根本改善当地的环境卫生。值得特別指出的是，很多除四害講卫生的先进地区，并不是卫生设备較好的机关学校，而恰恰是生活条件比較困难的劳动人民聚居的地方，甚至是偏僻貧苦的山区。这些地区成績的获得，主要也不是由于政府和合作社花了很多錢，而是由于群众的决心、力量和智慧。从最近时期的情况看来，消灭老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子和基本上消灭危害人民最严重的疾病的要求，不但可以在十年內实现，而且完全可能提前实现。

为了领导好以除四害为中心的爱国卫生运动，各地应当切实注意以下几个問題：

#### （一）除四害講卫生的运动必須同城乡生产相結合，使运动直接为生产服务，並且把除四害講卫生的計劃放在总的生产建設計划之內。

在农村，要同农业生产結合起来。人畜粪便的处理問題对于卫生和积肥都关系重大，必須首先解决。要在全国普遍做到人有厕所，并且做到牛馬有栏，猪羊有圈，家禽有窝。在某些人畜同居的地方，要有步骤地实现人畜分居。厕所要加棚，糞桶糞缸糞池要加盖。牲畜栏圈，要勤垫土，勤起粪，勤打扫。要經常疏通沟渠，修整坑洼，排导污水，鏟除杂草，打扫垃圾，收集粪便，大力推广泥封堆肥办法。要使挖蛹灭蛆，防蝇灭蝇、整理厕所、管理糞便、打扫庭院、改善环境卫生的工作同增加肥料、保护和提高肥效的工作結合进行，使除草灭蚊、疏沟挖塘排水防孑孓灭钉螺的工作，同沤压綠肥、兴修农田水利、引污水取塘泥肥田、水塘水沟养魚的工作結合进行，尽可能地把卫生工作和发展农业生产的工作合而为一。

在城市，要同市政建設、工商业管理、城乡互助和学校教育結合起来。为了在城市除四害講卫生，必須解决城市的糞便、垃圾、污水的处理，改造、疏浚或者填垫不清洁的河沟坑洼，妥善安置和管理一些最容易吸引蒼蠅老鼠和最容易传染疾病的行业（例如动物毛羽皮骨血肉的加工业、糖果油醬制造业、豆腐房、粉房、飲食业、飼养业等）。城市的糞便、垃圾、污水的处理必須尽可能地为附近的农业服务，可以采取由企业、机关、学校与农业社定立长期合同的方式，积极发展市区同附近的农业社在这一方面的合作。在一切公共活动場所和公共娛樂場所，必須注意清洁和防止传染病的传播。在厂、矿、工地和新开发地区，除了必須注意糞便、垃圾、污水的处理和蚊、蝇、老鼠的消灭以外，还需要特別注意飲食的管理，宿舍的清洁，工人健康的保护，职业病和多发病的防止。企业、机关、学校不但必须接受城镇的区街組織对于卫生工作的检查管理，而且應該充分利用自己的有利条件，克服目前某些单位的落后状态，积极地在除四害講卫生的运动中起带头作用。在学校中，要加強卫生教育，把养成卫生习惯作为操行成績的一个方面，并且要把学生参加校内外除四害講卫生的活动作为整个劳动教育的一个部分。机关和部队都必须参加城市除四害講卫生的义务

劳动。

## （二）在除四害講卫生的运动中，必須使群众力量和技术力量相结合，使突击工作和经常工作相结合。

除四害講卫生必须彻底依靠群众的力量，贯彻卫生工作中的群众路线和勤俭精神，反对那种认为講卫生就必须花很多钱、购置很多器械、调集很多专家的错误观点。为了充分发动群众，必须把工会、青年团、妇女联合会的组织动员起来，把一切宣传力量动员起来，针对当地具体情况、当时具体要求和群众中存在的具体思想顾虑；进行生动有力的宣传。各种宣传形式，例如报刊、广播、幻灯、电影、大字报、宣传画、街道宣传、挨户宣传、参观、展览、群众大会、居民小组会等等，都应尽量采用。关于除四害、講卫生、防治疾病的基本常识和先进经验，报刊广播必须经常认真介绍，并且必须编印成小册子和画页，大量发刊到基层去。群众中的除四害講卫生的积极分子和先进集体，应该给予表扬和奖励。麻雀可以作食品，为了鼓励捕捉麻雀，可以实行收购。

但是为了使群众运动迅速见效，必须同时使技术力量赶上去。这里包括对于四害和其他危害人类的生物的生活规律的研究，对于当地严重疾病的发生和流行的规律的研究，有效地消灭四害、消灭疾病的技术认识和经验的传播，具体计划（特别是消灭当地严重疾病的计划）的制订，大规模消灭四害、消灭疾病所必需的药物器械的介绍、生产和供应，必要的技术人员的训练和分配等等。现在许多地方的情况是，群众运动起来了，但是技术指导和科学研究所远远地落在后面，这种情况必须迅速改变。所有医药卫生机构和有关的科学研究院、卫生人员和红十字会会员，都应积极投入除四害講卫生的群众运动中去，并且努力加强自己的工作，力求站到群众运动的前面来促进运动的发展。

由于要动员千百万群众在短时期内改变千百万年的积习，由于群众的忙闲各个时间不等，而四害和许多病媒、病菌的活动又有一定的季节性，所以除四害講卫生运动必须依靠一定的突击活动。在一年中间，春初四害开始活跃的时候是一场大战斗，夏秋间传染病猖獗的时候是一场大战斗，冬季结合积肥、修水利、改善卫生条件、消灭越冬蚊蝇又是一场大战斗。配合春节、五一节、国庆节举行大扫除，也是一种突击活动。除此以外，因时因地因事，配合检查评比，还会有突击活动。1958年是全国向四害和疾病大进军的第一年，今年的突击活动必然要比平常花费较多的时间。各基层单位（例如一个生产队，一个工段，一条街道）的除四害講卫生工作，应该每星期检查一次，各较大单位（例如一个合作社，一个乡，城市一个工厂，一个区）应该每月检查评比一次，年终应该大检查总评比一次，以便为实现长期计划打下基础。

在除四害講卫生的斗争中，除了搞好突击活动，使运动一步一步更深入更前进以外，还要使每一个单位每一户人家订出经常的工作计划，尽量使工作经常化，以补充突击活动的不足，巩固突击活动的成果。各个地方要根据当时当地的具体条件，有计划地循序渐进地向群众提出一些可以普遍做到的有关环境卫生和个人卫生的要求，并且要逐步把各级爱国卫生运动委员会、基层医疗机构和城乡的群众性卫生组织健全起来（在各企业、机关、学校、部队、街道、合作社都应该成立爱国卫生小组），使每一户人家每一个单位的卫生状况和卫生工作状况都经常有人检查、督促和指导，使各地的卫生工作能够月月改进，年年更新。

（三）除四害講卫生运动的决定关键，在于党的领导。各级党组织的第一书记对于这一运动必须亲自动手，抓规划，抓宣传，抓检查评比，并且要推动各单位的行政负责人同样亲自动手。

各地方各单位的规划必须适合本地方本单位的情况。当地究竟有哪些严重疾病，有哪些主要的必须消灭的害虫害鸟害兽，各需要多长时间消灭，先后次序怎样摆，主要依靠什么力量什么方法，怎样同生产建设工作结合，在制订计划的时候一定要心中有数。向群众提出具体口号各地可以因地制宜，例如除四害在有血吸虫病地区要加上消灭钉螺，有黑热病地区要加上消灭白蛉子，有臭虫、跳蚤的地区要加上消灭臭虫、跳蚤，讲卫生在城市中可以包括劝止随地吐痰，在工厂中可以着重防治职业病等等。工作任务在几年中间需要分几个段落（例如首先着重除四害，随后转入消灭重要疾病），在一年不同时间中也要定出不同的重点（例如何时集中消灭老鼠，何时集中消灭麻雀）。

实现计划的时间要看群众运动发展的状况。凡是确有条件提前实现的应该争取提前实现，计划的内容也可以逐年有所补充修改。抓先进和落后的两头，带动中间，组织参观展览，这是领导生产的好方法，也是领导除四害讲卫生的好方法。各地必须善于运用这些方法，大力传播先进单位的经验，消灭运动中的“死角”，使全区的工作不断地向先进单位的水平看齐。

各省、市、自治区和专区都必须在今年上半年定出本区的除四害、讲卫生、消灭重要疾病的年度计划和长期计划，并且必须按月按季对所属单位的工作状况加以检查评比通报，以便表扬先进，督促落后。十年看三年，三年看头年，只要各级党政组织认真负责，雷厉风行，坚持到底，我们就一定能够在今年为这一工作打下巩固的基础，在几年内消灭四害，基本上消灭危害人民最严重的疾病，使全国的卫生状况大为改观。

# 二、一九五八年防治痢疾計劃

## 北京市防治痢疾綜合計劃

根据中共中央国务院的“关于除四害、講卫生的指示”的精神：开展爱国卫生运动，除四害、講卫生、消灭疾病，首先消灭危害人民健康最大的疾病，人人振奋、移风移俗、改造国家。

本市防治的法定传染病中，痢疾发病人数多，死亡人数也不少，尤其是儿童中毒性痢疾；同时，因患痢疾损失劳动日也相当严重。

根据几年来的調查和研究，痢疾流行因素，可能有：

一、一般人对輕的痢疾不重视，发病后不能早治根治，变成慢性痢疾，长期排菌，扩大传播。据調查每年由急性变成慢性者約为12~15%；另外病疾菌对磺胺抗药性是逐年增长，也是慢性痢疾增多原因之一。

二、有些病人的隔离、粪便消毒等疫源地处理工作做得不够彻底，造成病家日常生活接触感染，而发生續发。例如，1956年西斜街調查病家有74%的病儿隨地大便。又据調查2858例患者中，有31.2%的病人是接触感染續发的（家庭为19.2%、同院为12%）。

三、飲食卫生还做得不够，尤其生吃的蔬菜和瓜果，都有大腸菌污染現象，很多凉拌菜未消毒，切开西瓜也有污染情况。另外还有1%的飲食从业人員带菌，未能很好的管理，粪便处理未能系統、彻底解决，蒼蠅孳生条件还大量存在等等，这都是痢疾传播的重要因素。

本市痢疾流行特点，发病以学龄前儿童为最多，占总发病数的45%。痢疾有显著的季节性高峯，七、八、九月痢疾发病数占全年总数的74.8%，高峯，主要在八月。

为此，本市为了保証人民健康、保証生产建設，把痢疾的防治工作列为爱国卫生运动的重要任务之一，在党的领导下，要克服保守思想、克服一切困难，依靠广大群众的无穷智慧，发挥敢想、敢說，敢作的精神，开展竞赛，比先进、比干劲，中西結合，土洋并举搞好試驗田，以点带面，为保証工农业生产大跃进而奋斗。

1958年是向痢疾作斗争的第一年，要求在1957年的痢疾发病率的基础上降低50%。茲提出综合措施如下：

### 一、預防措施

#### (一) 改造城乡厕所

全市城区厕所台低、坑浅、无盖、漏水的約占三分之一。郊区农村厕所更为簡陋，1958年开始有計劃的修整和改造。

1. 城区和郊区重鎮的不合格的戶內厕所，逐步改用水泥預制廁坑，一律加盖，有条件

的应增加防蝇设备和冲水设备，露天的争取加修简易屋顶。

2. 公共厕所，新建区户外厕所，在春季修整或增加防蝇设备，厕坑一律加盖；并修建洗手设备。

3. 农村厕所，结合积肥，在惊蛰前普遍翻挖，增加厕台，厕坑改用水泥预制厕坑，砖坑或缸罐，一律加盖。农村厕所提倡适当归并，改建公共厕所。井旁厕所必须远离距水井30公尺以外。为了积肥和保持清洁，厕所里增设储尿桶或储尿缸。

城乡厕所都应经常打扫，保持清洁，在滋生蛆虫的季节，经常撒布666粉。

改造厕所的工作，由市上下水道工程局统一领导。城区由各区清洁队分区推动；郊区由乡镇人民委员会、农业社负责推动。一般厕所的改造由居民自办，民用公产由房管局负责；各公共场所厕所由各主管单位负责。市、区爱国卫生运动委员会于4月上旬作一次大检查。

## （二）妥善处理粪便垃圾

1. 推广泥封堆肥。城区粪便在运往郊区堆肥站后，由农业社清洁积肥队把粪便与脏土混合作大型泥封堆肥。农村的粪便、脏土、牲畜粪、猪泥等，按实际情况混作泥封堆肥或沤肥。

粪稀池、沤肥坑加盖。郊区菜田粪稀池应改成沟形，一律加盖；沤肥坑加盖或以土封闭。井旁粪稀池也应改为洋灰池或砖石砌抹洋灰。

3. 及时清掏厕所。公共厕所、居民户内厕所按日清掏。农业社负责的掏粪地段，必须保证经常，每日清掏一次。厕所必须彻底掏净。农村厕所每二日清掏一次。

4. 城内一律不准养鸡、养猪；粮库及新建居民区由区人民委员会划定禁止养猪的范围。牛羊奶场及大车间应增加储粪设备，其粪便必须每日清除。农村做到鸡有栏、猪有圈。牲畜棚圈必须勤起、勤垫、勤打扫。

5. 进一步改善和推行垃圾分类收集。已实行垃圾分类收集地区的脏土箱，必须严密加盖，夏、秋季必须按日清除。郊区重镇，工矿区和在郊区的机关、学校也应推行垃圾分类收集。

6. 严格管理兽力车遗落粪便。城郊区兽力车一律配带有效的马粪斗；并大力推广木制粪箱。大车工人应自带清扫工具，消灭街道遗落兽粪的现象。

## （三）积极消纳污水

除上下水道工程局增设6千公尺下水道支线外，1958年上半年采取民办或单位自办的方法，大力解除污水消纳问题。

1. 有下水道的地区，由居民集资修建污水池；无上下水道地区，由居民挖渗水井，各区清洁队组织协助。不适合挖渗水井、污水池的地区采取民办公助办法组织污水车收运。1958年6月底以前完成。

2. 机关、工厂、学校、部队由本单位接修下水道支线。

3. 现有的污水池、渗井口一律加盖。由居民自办。

## （四）改进卫生重点行业

全市有易于招蝇生蛆的行业14种（即骨油、血料、猪鬃、肠衣、制革、废皮毛、鸡毛、熟皮毛、屠宰场化制站、废油提炼、大车皮件、制革制革、骨制品、粉房养猪等），这

些地方大量滋生蛆虫，必須采取綜合措施：

1. 在惊蛰前普遍、彻底挖蛹、砸蛹；翻挖、改造厕所。
2. 晒晾原料、废毛、废皮处，修建水泥或焦碴地面及灭蛆沟；存原料处必须有防蝇、防雨罩棚和防蝇黑巷；储存容器必须加盖；运输工具必须严密。这些措施必须在4月底以前完成。
3. 生蝇季节，对生蝇、招蝇地方必须喷药控制，并增设扑蝇笼、粘蝇纸等灭蝇设备，并经常扑打。
4. 废弃物必须及时清除，妥善处理。
5. 有条件的要迁往郊区的要做好预防生蝇工作。

此外，油盐酿造行业的酱缸、菜缸必须有防蝇、防尘、防雨设备，保证缸内无蛆。

#### (五) 扑打蒼蠅

在3~4月大力消灭初生的蒼蠅；5~8月繼續扑杀成蠅；并要求做到室内外无蝇、厕所无蛆。

#### (六) 改善水井

郊区的饮用水井和灌溉饮用的两用水井应积极进行改善，做到：(1)加高井台；(2)设备井栏、井盖；(3)设公用打水桶，用毕悬挂高处；(4)修建井挡墙，有条件者应搭井棚或井房；(5)水井半径30米内不许有厕所、猪圈、粪坑、污水灌溉沟渠、堆肥等污染源。

#### (七) 食品卫生監督

1. 凉食：(1)冰棍、汽水等，城郊区，有计划的逐步做到分批检查合格出厂；(2)严禁吃天然冰，并不准接触直接入口食物，改善天然冰运输车的设备。

2. 加强生吃的瓜果、蔬菜管理：(1)葡萄、桑椹、樱桃等，冲洗干净售卖；并设防蝇设备；(2)香瓜、老秧瓜应保洁；(3)建立西瓜售买消毒制度，不符合卫生条件者，不准切开售买；(4)黄瓜、水萝卜、西红柿、大葱、香菜等，要求零售店铺冲洗干净售卖；并保证不售卖腐烂蔬菜。

3. 扒糕、凉粉制造和售卖，不合卫生条件者不准售卖；对儿童食品只进行调查分类处理。

4. 要求公共食堂，对生吃食品在制造前要彻底洗干净或消毒，生吃凉盘在制造后不可用手抓，食具要煮沸消毒。职工患病疾肠炎或经检查带菌者应暂调工作，直到治愈检查三次大便细菌阴性为止。

城市服务局、付食品商业局、市供销合作社、地方工业二局、农林局、园林局、商业局、市手工业生产合作社等，对所属的食品单位必须垂直布置，经常督促检查，并保证执行饮食行业从业人员做好带菌检查工作，对发现的带菌者应停止或调动工作。

#### (八) 带菌检查和管理

1. 检查对象：(1)水源工人；(2)直接制造食品的冷食业、食堂、饭、铺、肉业、糖业糕点、奶站等职工；(3)直接接触食品的饮食摊贩、综合商场门市部等人员，(4)较大的厂

矿、工地、机关、医院等的食堂炊事人员；（5）儿童机构的炊事、保育人员；（6）屠宰工人。检查人数约计两万人。每人检查三次，于第二季度内完成。

2. 检查办法：有化验设备的区，各自负责本区的对象检便工作；水源工人、八大饭店、屠宰场和东郊区由市站负责检便，但东郊区应负责检便组织工作。

3. 建立带菌者卡片登记管理制度，由区站负责监督。对检便后带菌者，必须调劝工作，一直治疗至检便三次细菌阴性方准复职。

## 二、防疫措施

积极消灭传染源，要做到早报告、早治疗、彻底治疗。

### （一）加强疫情报告

各区医疗预防机构及开业医务人员必须做到早诊断、早报告，并应有专人负责；健全登记制度，做到不漏、不迟、不错；并要组织群众疫情报告网，训练疫情报告员。

此外为确实掌握发病率，要求各基层医疗机构在区卫生防疫站统一领导下，于6月、9月各进行一次漏报调查。

### （二）、划片包干，组织门诊，消灭传染源

通过分级分工诊疗，广泛宣传就近就医，及时控制传播。要求本段病人有80%以上能够就近就医在本段的医疗机构。门诊治疗的患者，应预约复诊，治疗到临床症状消失大便正常（性状、次数正常）为止，对不来预约复诊者应进行追踪治疗。

慢性病人搜索：各区、各系统、各单位于3月、10月份，普遍搜索慢性患者各一次，对慢性患者应进行彻底治疗。

为减少死亡，各区集中人力、设备，组织中西医合作互相学习，充分发挥祖国医学的作用，加强急性中毒性疾病急救工作。

### （三）积极隔离病人

1. 为控制续发和流行，从四月份开始收治患者，首先收容学龄前儿童、集体宿舍职工、饮食行业人员、儿童机构工作人员和大杂院的患者。有医务室的系统和单位应开辟隔离室，住集体宿舍的职工和家庭隔离条件不好的患者，应设法全部隔离完全治愈。为了保证大量病人住院，应准备足够的病床。要求急救站适当调配或增加车辆，保证急重症患者及时入院。市卫生局负责编造有关防治费用及统一调配病床，医药公司负责药品供应与调配。

### （四）疫源地处理

1. 及时访视。要求地段基层医疗机构做到全部病家访视，对门诊发现的和其他机构转来的本段患者，必须在24小时内进行访视；并在初访两周后进行复访。

访视任务：1. 指导病家隔离和粪便器具等消毒示教；2. 劝导病人彻底治疗；3. 观察病程控制续发；4. 对病家及近邻进行卫生宣教，改善卫生习惯（个人卫生与饮食卫生）和环境卫生。

2. 病家消毒：对不住院的患者，要协助日常消毒与指导。各区应组织红十字会会员和

卫生负责人进行病家消毒指导工作，组织训练消毒技术由各区卫生防疫站负责。患者住院或死亡在家的于接到通知后24小时内，进行细致地终末消毒。

### 三、干部培养与群众宣传教育

防治痢疾综合计划的实现，关键是在党的领导下，全市医务人员成为骨干，发动广大群众，人人动手改善环境卫生、讲究个人卫生与饮食卫生。

#### (一) 部培养训练

1.由市卫生局负责组织全市临床医师（内科、儿科、中医），进行痢疾防治工作学习。内容：本市痢疾综合措施计划；2.痢疾的流行病学，痢疾防治的地区负责制；3.痢疾的诊断与治疗；4.儿科痢疾诊疗；5.痢疾的中医疗法。

2.基层防疫人员训练，由市区站负责组织学习痢疾的流行病学及临床知识。并组织全市化验人员讨论痢疾病源的培养与粪便镜检问题，统一技术。

3.由区站组织红十字会员、院卫生负责人、饮食行业人员、炊事员、中小学教师、儿童机构工作人员分批组织学习，在4个月内学习1~2天。

#### (二) 宣传教育

1.市教育局与各区在爱国卫生运动委员会领导下，设宣传组，组织医务人员，广泛开展宣传教育，尤其应发动青年团、工会、妇联、红十字会员、中小学生深入群众，分片包干，可利用居民大辩论的方式做到家喻户晓；以家庭主妇、学龄前儿童为重点，有计划地培养卫生习惯；并应定期进行效果检查。

宣传内容：以个人卫生与食品卫生为主，要做到“四要”“三不”。“四要”即：要彻底消灭苍蝇；饭前便后要洗手；生吃蔬菜瓜果要洗净；得了痢疾要早报、早治、粪便消毒。“三不”即：不随地大便；不吃腐烂不清洁的食物；不喝生水。

3.医疗预防机构应进行候诊教育，并结合地段工作利用生动实例进行宣传。

4.教育局、文化局、广播事业局、团市委、市工会、市妇联、北京市红十字会、北京日报、科普协会等文教群众团体应积极进行卫生宣传教育。

### 四、痢疾科学的研究工作

(一) 在本市科学研究委员之内，组织有关部门成立痢疾研究专业委员会，领导全面研究工作，进行计划安排与督促。

(二) 要求各区卫生防疫站，搞痢疾的“试验田”，研究痢疾发病率、痢疾传播因素（生吃蔬菜、水果、冰棍，郊区井水与痢疾的关系及防治效果的观察，）情况在这个地段采取综合措施，通过一切方法降低发病率。

(三) 市站与中国医学科学院、进修学院、北京医学院分别合作，继续在西斜街、东不压桥地段进行痢疾流行病学研究工作。

为了保证上述防治措施的完成，要在各级党、政的领导下，做到条条贯彻、块块负责、明确分工。

1.各区各级爱国卫生运动委员会，在除四害、讲卫生的运动中，应将消灭痢疾列为中

心工作之一；各系統、各单位必須黨委負責親自动手，抓規劃、抓宣傳、抓檢查評比，在市區愛國衛生運動委員會的統一領導下，在三月底前訂出本單位消灭病疾的規劃。

2. 条條貫徹、塊塊負責：各系統必須垂直布置，條條包干認真貫徹防病措施的要求。各地段應以辦事處為核心與基層醫療機構、紅十字會衛生站等共同組成病疾防治小組，發動群眾劃片包干，並與段內各單位密切配合，統一安排。

3. 檢查評比：消灭病疾必須發動廣大群眾，做到防治病疾人人有責，各級領導必須抓兩頭，帶動中間，組織參觀展覽，定期檢查評比；各條條塊塊必須每月檢查一次，四月份檢查制訂規劃，五月份檢查防治病疾準備工作，六月份檢查宣傳效果，七、八月份各檢查一次病疾防治和發生情況，十月份全市進行大檢查。

4. 技術指導：在市區愛國衛生運動委員會領導下，成立防疫指揮部，並組織有關部門分工負責進行群眾經驗總結和技術指導工作。

1958年3月5日

## 春季除四害講衛生運動工作綱要 (重點摘要)

今將綱要中與防病有關的預防和消灭疾病工作摘錄于下：

(六) 加強預防和消灭疾病工作，為爭取在一年內降低病疾發病率50%打下基礎。適應春季多發病，加強搞好飲食衛生；加強對飲食行業從業人員的衛生教育。各醫療機構應加強對地段內傳染病人的訪視和治療指導工作，作到早期發現病人，早期消毒隔離、早期治療。工廠、機關、學校、工地、部隊等集體單位必須加強傳染病的預防工作，带头搞好飲食衛生，带头做到不發生或少發生傳染病患者。

3、4月間，全市將發動三個大高潮，由3月6日到16日以挖蛹、改善廁所和處理坑洼為中心的第一次大高潮；4月6日到13日以掏窩捕雀和毒鼠為中心的第二次大高潮；4月25日到30日以搞好個人、環境、飲食衛生為中心的第三次高潮，其他各項工作圍繞三次高潮配合進行。

## 1958年5月份“除四害、講衛生”工作計劃

目前，天氣漸熱，蒼蠅、蚊子日漸增多，因此，全市人民必須大力撲打蒼蠅、蚊子；消滅蚊蠅滋生條件，減少和預防病疾的發生。

### 第一，大力撲打蒼蠅、蚊子，繼續消滅鼠雀

1. 从5月9日至15日，各區可根據具體情況，開展三至七天撲打蒼蠅、蚊子的活動，大力消滅成蠅、成蚊。5月24至26日，全市動員、統一行動，大規模的撲打蒼蠅、蚊子。組織全市二部制學生、家庭婦女、兒童、紅會會員和積極分子等參加成立撲蠅隊，採取邊宣傳、

边扑打、边检查的方法，扑打成蝇、成蚊。机关、工厂、学校、企业利用中午业余时间，发动职工，进行扑打。特别是重点卫生行业和饮食业除大力扑打苍蝇外，并要加强对蝇设备，防止生蛆。

2. 5月13日在前门、崇文、宣武三个区，5月20日或21日在东单、西单、东四、西四四个区，统一进行硫磺薰灭沟鼠工作，各区事前要作好宣传、组织训练，并动员各家各户断绝鼠粮，扑打家鼠，逼鼠下沟，便于薰杀。在进行薰鼠时要特别注意安全。同时，各郊区也要进行扑打家鼠。

城、郊各区在5月26日以前，要自行安排时间继续扑打麻雀。对有零星的一、二只麻雀的地区，可采用掏窝、枪打的办法；对麻雀三、五成群的地区，以施放毒饵、枪打、掏窝的办法；对麻雀成群的重点地区，应组织精干队伍，采取哄、毒、打、掏分片消灭的办法，积极的进行突击歼灭。

## 第二，减少和预防痢疾的发生

1. 各区、各系统应加强预防痢疾的措施，要求在1957年痢疾发病率的基础上，降低50%。

2. 5月15日及24~26日结合扑蝇蚊工作，大力开展预防痢疾的宣传工作，讲清痢疾的危害和防治方法。

3. 号召人人做到不随地大小便，饭前便后洗手，不吃腐烂变质食物，生吃瓜果、蔬菜洗干净再吃；发生痢疾病人应做到早报告、早隔离、早治疗。

4. 各集体单位和饮食业的炊事人员和从业人员中，如发现痢疾带菌人，应监督治疗必要时调换工作和隔离治疗，控制传染源。

5. 各区应发动医务人员开展地段的宣传，进行家庭访视，各医院对应住院的痢疾病人及时收容治疗。

6. 要求各机关、厂矿、学校、企业等集体单位，作出防治痢疾的计划，各居民住户也作出防治痢疾的公约。

7. 最近，召开一次小型防治痢疾现场经验交流会，介绍基层地段防治痢疾的方法和经验，6月初，全市召开一次防治痢疾竞赛大会，提倡“四比”（比干劲、比指标、比措施、比效果），组织各区、各系统进行挑、应战竞赛。

## 第三，消灭蚊蝇滋生条件

1. 大力处理积水坑洼。本市积水坑洼原有3543处（约2400万平方公尺），已经处理的536处（约111万平方公尺），正在处理的259处（约580万平方公尺），尚待处理的还有1988处（约1330万平方公尺），为防止滋生蚊子，必须采取有效措施：（1）各区应继续发动群众进行利用、疏导、填垫积水坑洼；（2）要分别轻重缓急，尽先处理城厢和郊区镇、村附近的坑洼，以及道路两旁的积水明沟；（3）一时不能处理的应整修割平堤岸，经常打捞杂草。（4）已改造完竣的人工湖由本区负责使用管理；由农林、水利和园林局作技术指导。

2. 解决居民污水的消洩。在有下水道地区以民办公助方式发动群众修建污水池支管和污水池口。在无下水道地区以民办公助方式发动群众修户内简易渗井或山区清洁队添置污水泵，收运由居民担负。

3. 加强厕所的整修和保洁。在普遍改造户内厕所的基础上，各区应大力发动群众添设坑盖，经常利用，有条件的添设防蝇设备。各区应督促清洁队对于街道公厕，要大力进行一次整顿，整修防蝇设备，整顿标牌，设蝇拍或苍蝇纸，定期作药物喷射，加强厕内、外保洁，并定期大扫除。

4. 郊区菜田粪稀池要严密加盖或用灰土封好，保证不生蛆，推行泥封堆肥代替晒粪干方法；加强乡、社清洁积肥队的管理，建立经常清扫保洁制度和垃圾收运、粪便清除制度。

#### 第四，检查评比

1. 5月27、28日进行全市大检查。检查内容为“四无”（室内外无苍蝇、厕所无蛆；室内外无蚊子；院内无孑孓；无鼠洞，无鼠迹、无鼠害；无雀窝，经常看不到麻雀），“三洁”（室内清洁、院里清洁、街道清洁）和街道的公共厕所防蝇保洁情况。检查方法以街道办事处（乡、村）为单位进行检查，并组织互相交换检查。检查时要作好记录，各区将本区检查情况附表报市。

2. 5月29日至31日，全市进行老鼠的密度调查。由市、区卫生防疫站在有代表性的地区，支放一百把鼠夹，连放三天，观察家鼠和沟鼠的密度。各街道办事处（乡），也要按照此方法，互相进行家鼠的密度调查。同时，市、区卫生防疫站要进行蚊、蝇指数调查。

3. 六月初，根据五月底大检查的结果，召开全市评比、发奖大会。

夏秋季节是全年消灭“四害”，减少疾病的时期。因此，各区、各系统必须抓紧进行上述各项工作。

北京市爱国卫生运动委员会

1958年5月6日

## 北京市夏秋季(6~9月)除四害讲卫生 工作计划

(1958年6月4日市人民委员会第30次行政会议通过)

### (一)

首都广大人民在党的领导下进行除四害讲卫生运动，经过从去年冬季到今年春节半年以来连续不断的突击，已经取得很大的跃进，使首都卫生面貌有了显著的改变，四害大大地减少了。目前已进入夏季，正是苍蝇、蚊子大量滋生，痢疾、脑炎的传染日趋蔓延，也就是今年除四害讲卫生最紧要的季节，对厕所改进，城区虽然基本完成，可是还有许多厕所保洁不够好，郊区厕所还要大力进行改造，农村粪便处理还没有普遍进行，城郊灭蝇防病还要大力开展。积水坑洼，城区只处理了四分之三，郊区绝大部分没有处理。对老鼠、麻雀还没有做到完全消失。这些情况要求我们首都人民遵循着“鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”的总路线，对除四害、讲卫生再取得一次大跃进。要发动更广泛的群众，下定决

心，在六、七、八、九四个月中，連續进行几次的战役，并且要不断地巩固提高，来大力消灭蒼蠅、蚊子，把往年照例出現的痢疾、脑炎流行的高峯削掉，对城郊厕所要进一步进行改造和保洁。通过突击运动对农村粪便处理，要取得进一步的改善，对积水坑洼要定期分批的取得普遍的处理。对老鼠、麻雀还要坚持反复斗争。

夏秋季除四害講卫生的跃进，要求城郊各区在全市指标总的要求下，根据本区具体情况，作出具体計劃，訂出跃进指标。全市总的指标是：城区在九月底以前都作到基本“四无”、“三洁”郊区在九月底以前爭取半数以上的乡（鎮）作到基本“四无”、“三洁”。在城区，应当着重加强块块领导，机关、工厂、企业各系統，要大力发动群众認真貫彻。在郊区，要善于結合生产和文化普及工作，按排力量，大力改变不平衡的情况，使先进带动落后，落后赶上先进。我們城郊各区都要通过六、七、八、九四个月的坚决奋斗，爭取使除四害、講卫生的紅旗到处插遍。

## （二）

夏秋季（6～9月）主要任务如下：

一、从6月8～15日开展以灭蝇防病为中心的全市大突灭。（1）全 民 一 致 动 员，大力扑打蒼蠅；（2）消灭蒼蠅滋生条件；（3）整頓街道，改进环境卫生，要求作到：城区室內外无蠅、郊区室內无蠅，廁所无蛆。

消灭蒼蠅必須采取扑打、誘捕、药物噴撒和消灭滋生条件相結合的綜合措施，要求全民动员、家家戶戶、各行各业，人手一拍見蠅就打。在蒼蠅大量集中的地方要广設扑蠅籠、粘蠅紙或噴撒666，廁所要普遍用666控制生蛆（根据西四区廢綏境办事处經驗，一角錢的666可用一季度）。

消灭滋生条件是灭蝇的根本措施。城区廁所爭取作到三有（有牆、有頂、廁坑有蓋），并加强保洁，作到三无（无蠅、无蛆、无痰）。郊区提倡建立公共廁所，适当的归併私廁，农业社应建立常年积肥队或指定专人清掏廁所，每日清掏一次，糞稀池、沤肥坑一律加盖，并噴撒666或用土封閉。人、畜糞便要采用泥封或土封的办法封閉，逐步取消晒糞干。

結合灭蝇开展群众性防病宣传活动，大力改进飲食卫生，特別是集体单位更应做好防病和預防食物中毒的工作。

整理街道：城区要保持街道整洁，郊区要結合积肥整修路面，村里村外主要干綫提倡修魚脊式的大路，并建立清扫保洁制度。

二，在7月第一周开展以灭蚊为中心的第二次全市大突击。（1）集中力量消灭蚊子；（2）大力消灭积水坑洼，要求作到：城区室內、外无蚊、郊区室內无蚊，院內无孑孓。

扑灭蚊子要采取扑打成蚊和打撈孑孓相結合的方法，蚊子集中的地方要噴射666或使用煙薰剂，要求家家戶戶作到：翻盆倒罐堵树洞，及时清除雨后积水，飲水缸和太平水缸要加盖和定期換水。

处理积水坑洼要求：城区和郊区重鎮主要于綫两旁和人口集中的机关、工厂、学校，在6月底以前处理完毕，郊区在七、八月份选择距乡、鎮較近的积水坑洼重点处理一批，九月份再按輕重緩急处理一批，其余在年底以前处理完毕。明沟也要根据以上精神进行处理。

三，在8月第一周开展以扑灭蚊蝇为中心的第三次全市突击，要求全市人民鼓足干勁，大干特干，向蚊蝇展开一次猛烈的攻击，穷追猛打，進一步扑灭蠅蚊。同时，对廁所和积水