

240038

2

浙江民間常用草藥

(第二集)



藏

浙江民間常用草藥

(第 二 集)

浙江省革命委员会
生产指挥部卫生局主编

浙江人民出版社

一九七〇年五月

浙江民间常用草药

(第二集)

浙江省革命委员会
生产指挥组卫生局主编

*

浙江人民出版社出版
杭州印刷厂印刷
浙江省新华书店发行

*

1970年5月第一版

1970年5月第一次印刷

书号：14103·49

定价：(平)二角

救死扶傷實
革命的人道主義
白求恩

这夜神：活
 个：明三和人的
 江：天丁
 中：活

何：甜
 人造：美产
 唱：生地
 入：天
 何：生活

拂照，旭
 南天，
 子：以
 新：素

何：神子，一
 造：到
 子：柳

六侯神州書畫
孔雨田書畫
浪生書畫
楊天連書畫

天賜明眼
先生

張繼良地
王三誠研
楊清福書
心佳子

毛 主 席 语 录

**领导我们事业的核心力量是中国共产党。
指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。**

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词，一九五四年九月十六日
《人民日报》

备战、备荒、为人民。

转引自一九六七年六月十四日《人民日报》
社论《三论节约闹革命》

卫生工作必须面向工农兵，为绝大多数劳动人民服务。

转引自一九六五年九月一日《人民日报》社论《切实把医疗卫生工作的重点放到农村去》

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

转引自《红旗》杂志一九六八年第三期《从
“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向——上海市的调查报告》

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

《论联合政府》，《毛泽东选集》第三卷第
一〇八三页

用心寻找当地群众中的先进经验，加以总结，使之推广。

转引自一九七〇年四月三日《人民日报》
《群众办医，备战、备荒、为人民》

编 者 的 话

中草药是祖国医药学宝库中的一个重要组成部分，具有简、便、廉、验四大特点，在我省广大农村，有着极其丰富的资源。为了落实战备，迅速普及中草药防病治病知识，使祖国医药学更好地为工农兵服务，促进合作医疗制度的巩固和发展，加速中西医结合，我们在省革命委员会的领导下，继续编写了《浙江民间常用草药》第二集。

遵照伟大领袖毛主席“提高警惕，保卫祖国”，“备战、备荒、为人民”的教导，我们在这集里，主要介绍了适用于外伤止血、跌打损伤和具有抗菌消炎等疗效的常用中草药。

在编写这本集子的过程中，我们采用了走下去、请上来的办法。编写人员深入农村，拜贫下中农、“赤脚医生”和老药农为师，虚心向他们学习，接受他们的再教育，广泛收集资料、征求意见，写出初稿。在此基础上，邀请有实践经验的“赤脚医生”和老药农，参加修改、定稿，根据“少而精”的原则，保留了通过临床实践证明确有一定疗效的中草药。

另外，中草药的“性”、“味”往往和它的实际功效不一致，不能正确地全面地反映中草药防治疾病的本质。因此，在这集里，我们不叙述“性”、“味”，只记载通过临床实践证明所具有的功能。这是一个尝试。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，书中缺点、错误一定很多，望读者批评指正。

编 者

一九七〇年四月二十四日

编写说明

一、本书（包括第一集）处方剂量，按中医习惯一斤十六两计。除注明儿科疾病外，其它疾病处方均为成人量。

二、书中处方所列的草药，除了用鲜的外，其余都是指干的（鲜的也可以，但剂量要作适当增加）。指明用鲜的草药，一般不要用干的代替。

三、草药的药用部分，“全草”是指植物的地上部分，采集时不必连根拔起，以保护药源。但对一些植株较小，根细又入土较浅的植物，如半边莲、葡伏堇等，就用其连根的整株植物。

四、植物图旁边的比例尺，是帮助了解植物的实际大小用的。如第一图石松，比例尺长度作为3厘米，再用这个长度量石松图，就可知道图中这一段石松的原植物实际长度约11厘米。

五、为了便于鉴别，促进交流和推广，书中草药的中名和学名，基本上采用中国科学院编译局编订的《种子植物名称》、《孢子植物名称》和中国科学院编译出版委员会名词室编订的《拉汉种子植物名称（补编）》所采用的名称。并在本书末补印了第一集的植物学名。

目 录

石 松(石松科石松属)	(2)
卷 柏(卷柏科卷柏属)	(4)
海金砂(海金砂科海金砂属)	(6)
阴石蕨(骨碎补科阴石蕨属)	(8)
槲 蕨(水龙骨科槲蕨属)	(10)
水龙骨(水龙骨科水龙骨属)	(12)
石 韦(水龙骨科石韦属)	(14)
侧 柏(柏科侧柏属)	(16)
三白草(三白草科三白草属)	(18)
山 莧(胡椒科胡椒属)	(20)
银线草(水晶花)(金粟兰科金粟兰属)	(22)
及 己(金粟兰科金粟兰属)	(24)
杨 梅(杨梅科杨梅属)	(26)
薜 荔(桑科榕属)	(28)
桑(桑科桑属)	(30)
葎 草(荨麻科葎草属)	(32)
糯米团(蔓苧麻)(荨麻科蔓苧麻属)	(34)
马兜铃(马兜铃科马兜铃属)	(36)

篇 蓄(蓼科蓼属)	(38)
何首乌(蓼科蓼属)	(40)
荭 草(蓼科蓼属)	(42)
杠板归(贯叶蓼)(蓼科蓼属)	(44)
支柱蓼(蓼科蓼属)	(46)
金线草(蓼科金线草属)	(48)
千日红(苋科千日红属)	(50)
马齿苋(马齿苋科马齿苋属)	(52)
繁 缕(石竹科繁缕属)	(54)
莲(睡莲科莲属)	(56)
威灵仙(毛茛科铁线莲属)	(58)
单叶铁线莲(毛茛科铁线莲属)	(60)
天 葵(毛茛科天葵属)	(62)
大血藤(大血藤科大血藤属)	(64)
长叶小蘗(小蘗科小蘗属)	(66)
南天竹(小蘗科南天竹属)	(68)
木防己(防己科木防己属)	(70)
荠 菜(十字花科荠菜属)	(72)
枫 香(金缕梅科枫香属)	(74)
野山楂(蔷薇科山楂属)	(76)
枇 杷(蔷薇科枇杷属)	(78)
苞蔷薇(蔷薇科蔷薇属)	(80)

金樱子(蔷薇科蔷薇属)	(82)
地 榆(蔷薇科地榆属)	(84)
铁扫帚(绢毛胡枝子)(豆科胡枝子属)	(86)
昆明鸡血藤(豆科鸡血藤属)	(88)
苦 参(豆科槐属)	(90)
老鹳草(牻牛儿苗科老鹳草属)	(92)
竹叶椒(芸香科花椒属)	(94)
臭 椿(樗)(苦木科樗属)	(96)
瓜子金(远志科远志属)	(98)
京大戟(大戟科大戟属)	(100)
算盘子(大戟科算盘子属)	(102)
叶下珠(大戟科叶下珠属)	(104)
乌 柏(大戟科乌柏属)	(106)
盐肤木(漆树科漆树属)	(108)
卫 矛(卫矛科卫矛属)	(110)
扶芳藤(卫矛科卫矛属)	(112)
蛇葡萄(葡萄科蛇葡萄属)	(114)
乌菰莓(葡萄科乌菰莓属)	(116)
草 棉(锦葵科草棉属)	(118)
木 槿(锦葵科木槿属)	(120)
梵天花(锦葵科野棉花属)	(122)
猕猴桃(猕猴桃科猕猴桃属)	(124)

小连翘(金丝桃科金丝桃属)	(126)
南岭堇花(丫哥王)(瑞香科堇花属)	(128)
胡颓子(胡颓子科胡颓子属)	(130)
八角枫(八角枫科八角枫属)	(132)
地 茄(地稔)(野牡丹科野牡丹属)	(134)
细柱五加(五加科五加属)	(136)
岩 风(白花前胡)(繖形科当归属)	(138)
苦爹菜(繖形科茴芹属)	(140)
鹿蹄草(鹿蹄草科鹿蹄草属)	(142)
龙 胆(龙胆科龙胆属)	(144)
飞来鹤(耳叶牛皮消)(萝藦科牛皮消属)	(146)
萝 藦(萝藦科萝藦属)	(148)
徐长卿(萝藦科徐长卿属)	(150)
华紫珠(马鞭草科紫珠属)	(152)
兰香草(马鞭草科菰属)	(154)
大 青(马鞭草科臭牡丹属)	(156)
牡 荆(马鞭草科牡荆属)	(158)
藿 香(唇形科藿香属)	(160)
丹 参(唇形科鼠尾草属)	(162)
光叶水苏(唇形科水苏属)	(164)
蚊母草(玄参科婆婆纳属)	(166)
车 前(车前科车前属)	(168)

水杨梅(茜草科水杨梅属)	(170)
黄梔子(茜草科梔子属)	(172)
牛皮冻(鸡矢藤)(茜草科牛皮冻属)	(174)
茅 苳(桔梗科沙参属)	(176)
球子草(石胡荽)(菊科石胡荽属)	(178)
大 蓟(菊科蓟属)	(180)
一点红(菊科一点红属)	(182)
鸡儿肠(菊科鸡儿肠属)	(184)
腺梗豨薟(菊科豨薟属)	(186)
蒲公英(菊科蒲公英属)	(188)
玉蜀黍(禾本科玉蜀黍属)	(190)
水蜈蚣(莎草科水蜈蚣属)	(192)
石菖蒲(天南星科菖蒲属)	(194)
大 蒜(百合科葱属)	(196)
菝 葜(百合科菝葜属)	(198)
黄 独(薯蓣科薯蓣属)	(200)
中草药常用剂型加工和贮藏	(202)
保护药源	(207)
治疗病症索引	(209)
《浙江民间常用草药》第一集	
植物名与学名对照表	(218)

中 西 医 結 合，
开 展 群 众 性 的 草 医
草 药 运 动。

石 松

地方名 伸筋草(中药名,通称),蜈蚣藤(开化),狮子毛(丽水、缙云、遂昌、云和、天台、淳安、临安),大地毛公(东阳),缠身龙(武义),全身龙(丽水),过山龙(龙泉、青田、余姚、奉化、嵊县),猫藤草(平阳),通伸草、山猫儿、老虎垫坐(泰顺),盘龙草(衢县、永康),烂腰蛇(江山),宽筋草(余姚),穿山龙(云和),地套(景宁)。

形态特征 多年生常绿草本,长3寸到1尺2寸。茎匍伏地面,有直立或斜上的分枝。叶细小。孢子囊穗圆柱状,长1寸到1寸5分,通常有2至5个或更多,生于分枝的顶端。孢子期6到8月。(图1)

分布和生长环境 全省都有分布。生在山坡路边、岩石上或山麓溪沟边草丛中,在酸性土壤较阴湿地方常成片蔓生。

采季 全年可采。

功效和主治 舒筋,消炎。

1. 关节痠痛:全草三钱,加虎杖(见第一集)根五钱、大血藤(见第64页)藤三钱,水煎服。

2. 带状疱疹:全草焙干,放凉研粉,用青油或麻油调成糊状,外涂患处,一日数次。

附注:与本种形态相似的铺地蜈蚣 *Lycopodium Cernuum* Linn. 其孢子囊穗较小,直接着生于分枝顶端,无总梗与小梗,功效相同。