

馬牛病例汇集

裴耀卿 著

农业出版社



.3092
72
.1

馬牛病例彙集

裴耀卿 著

农业出版社

內 容 介 紹

本書是山西省榆次專區兽医站名中兽医裴耀卿先生的新著。作者有三十多年的臨床經驗，最近整理出這 50 個馬牛騾驢的主要病案。全書共分十章，包括傳染病、普通病及奇難雜症等，都是他自己歷年的體驗心得以及得自他的祖父著名中兽医裴義宅先生的口傳。這些病例方藥對於交流中兽医診療經驗、推廣研究成果，都是非常有用的。書中不少論點是作者的創見，值得各地兽医工作者探討；關於病的分類，也是作者根據自己的體驗而劃分的，可能與現代兽醫學上的分類有出入，也希望大家來研究。

馬 牛 病 例 彙 集

裴 耀 卿 著

农业出版社出版

(北京西总布胡同 7 号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 106 号

新华書店科技發行所發行 各地新华書店經售

农业杂志社印刷厂印刷

767×1092 毫米 1/32 · 3 印張 · 62,000 字

1959 年 7 月第 1 版

1959 年 7 月北京第 1 次印刷

印數: 00,001—7,300 定價: (9) 0.31 元

統一書號: 16144.679 59. 8. 京型

目 录

第一章 傳染病	7
1. 破伤風(强直症)	7
2. 脑黃(脑炎)	9
3. 槽結(腺疫)	10
4. 牛流行性感胃(牛流感)	11
第二章 消化系	14
1. 木舌、爛舌(口炎)	14
2. 胃冷吐血涎(急性空水伤胃)	15
3. 伤料和胃結(胃擴張)	16
4. 牛口吐糞水	17
5. 牛百叶干(第三胃食滯)	18
6. 腸結症(便秘)	20
7. 腸黃(腸炎)	24
8. 腸入陰	28
9. 牛馬肚脹(牛馬風氣疝)	30
10. 馬牛努伤拉稀病	31
11. 冷疹(痙攣疝)	33
12. 外感不吃草	35
13. 換水土病	37
第三章 呼吸系	39
1. 气毒(顎竇炎、蓄膿症)	39
2. 急性喉头炎(喉骨脹)	42

3. 肺气腫	43
4. 假死病(悶气)	45
5. 罗膈損(横膈膜痙攣)	46
6. 啞嗽(咳嗽)(气管支炎)	49
7. 吊鼻病	51
第四章 泌尿生殖系	56
1. 尿血	56
2. 膀胱疼	57
3. 垂縷不收(陰莖浮腫)	58
4. 种公馬陽痿	59
5. 公畜陰莖血瘕	60
6. 陰囊生蛆	62
第五章 黃腫类	64
1. 鎖口黃	64
2. 腮骨脹	66
3. 胸結腫	63
4. 奶黃(乳房炎)	69
5. 黃病变症	71
第六章 运动器病	74
1. 五攢疼	74
2. 跌伤及踢伤	76
第七章 胎产科	78
1. 流产病(小产)	78
2. 母畜胎衣不下	79
第八章 眼科	81
1. 眼生云皮病	81
第九章 外科	88
1. 耳下腺化膿(腮腺疫)	83
2. 化膿疮	84

第十章 雜症門	85
1. 骨眼病	85
2. 黑汗風	87
3. 長舌病	89
4. 急性脫毛病	90
5. 髓家風(陰風入內)	91
6. 勞伤心脾病(心勞脾黃合併症)	92
7. 五臟炎	93
8. 九般干	95

第一章 傳染病

(一)破伤风(强直症)

例一：1956年4月21日，榆次县志村农业社青驃一头，头部脑后患破伤风。其症状：耳紧尾直，脊梁四肢都为强直，牙关紧闭，口开二指，舌僵不灵，水草不进。内服烏蛇散一付，外放胸堂血、交当血，未扎火針。处方如下：

烏蛇二兩	白花蛇 ^{一条(重六分)}	胆南星五錢	全蝎八錢
鈎藤鈎一兩	天竺黃一兩	荆芥四錢	防風四錢
明天麻五錢	当归八錢	川芎四錢	羌活五錢
独活五錢	知母六錢	浙貝八錢	苏叶四錢
桔梗五錢	蟬蛻八錢	木通四錢	南紅花三錢
生姜一兩为引			

共研末灌之。23日复診，能吃草一斤。照方又服一付。26日复診，口开三指，吃草二斤，能喝水。又照方服一付就全好。

例二：1956年3月7日，榆次市东順城街許孝先黑驃一头，患鞍伤破伤风。症状：耳、尾、脊、腰、四肢都强直，口开一指，口流涎沫，水草不进，閃骨生瘀。内服烏蛇散一付，处方如上述。外放胸堂血、交当血，火針大小風門百会穴。9日复診，口开二指，能吃草一斤多。又灌原方一付。12日大效，又服一付而愈。

例三：1957年12月16日，榆次县聶村东升农业社八队对牙灰驃一头，脑后患破伤风。口紧不吃不喝，渾身强直，很

严重。火針大小風門、百会、腎棚、大小膀胱穴。又放胸堂血，注射油質盤尼西林一支，內服烏蛇散一付，处方如上述。因口紧利用鼻腔投药器。护理因无空房，就在大群馬棚隔槽喂养，每天从鼻腔灌米粥湯半斤一次，如此連續七日。12月18日照原方內服一付，这时能吃草半斤。21日复診見效，能吃草一斤。又服一付，24日檢查全好。

此外如榆次专区农場栗色驃脑后破伤風，东关五星社黑驃膊部破伤風，赵村农业社黑驃头部破伤風，王湖村赵希哲黑驃破伤風，都是渾身强直，口紧不吃，經過上述內服烏蛇散，外扎火針放血而愈。

未經治好的有安宁村黑驃脑后破伤風，使赵农业社黑驃，南关黑驃，都是口紧涎多，搶救无效。

破伤風口开二指无涎者疗效高，口开一指有涎者疗效低。治疗中須派专人护理，厩舍不宜太热或太冷，温度正常就行。不要缺水。此病能出汗就有希望。針灸法宜先放血，后扎火針。夏天放血不扎火針亦可。服药以清热、活血、表風为原则。

药理說明

烏蛇、白花蛇、南星、全蝎、鈎藤鈎、天竺黄、蟬蛻、荆芥、防風、天麻、羌活、独活为“表風药”。

“治風先治血，血活風自灭”。当归、川芎、紅花为“活血药”。如扎胸堂等血，亦为活血法，又为清火法。

“有風就有火、有火就有風”、“無火不生風”、“热生風”，冷热空气互相交換就是風。風症的屍体解剖，大部肺臟脹大。知母、貝母、苏叶、桔梗、木通为清热瀉火药。

(二)脑黄(脑炎)

例一：1957年3月，榆次县内白农业社黑驃一头患此病，在我站治愈。

其病因：劳动过度，心肺壅热，上冲于脑，以致脑部昏晕而成此病。症状：双眼失明，向前直碰，一时狂暴，一时沉郁，如此反复交替，病势十分严重，已将头及四肢，碰擦皮破血流，水草不吃、痴迷瞪眼、生命危殆。

治法：中西合治，集合护理。較前单独治疗，效果显著提高。

西药处方：每天静脉注射烏洛托品 50 毫升一支，連續三天。第一天肌肉注射油質盘尼西林一支。第二、三天每天肌肉注射二十万单位水質盘尼西林二支。

中药处方：加味降气散

生石膏一兩	酒黃連四錢	酒黃芩五錢	酒黃柏一兩
酒知母一兩	酒梔子五錢	蒼朮四錢	醋香附一兩
广木香五錢	桔梗五錢	木通四錢	煨石決明一兩
硃砂三錢	党参五錢	芒硝一兩	

共研末，麻油半斤为引，同調灌之。隔一天一付，如此連服三付。

扎針法：放太阳血、胸堂血一次。在第一天扎放。

护理：固定六柱栏(保定架)内，以扁繩吊肚，勿使摔头碰跌及臥倒。不要缺水，飲以冷开水，次多量少。再灌米粥，每天一斤(分两次)。使其安靜休养。此驃在我站住治半月出站。

1956年9月我到中央开会畢，参加河北定县防治馬脑炎时，就是用上述一系列办法进行的。其疗效重点在于护理，不受碰跌，腦及內臟不至损伤者，經過治疗，是可以痊愈。否則

单纯治疗，不会好转。

例二：1958年8月，榆次县东阳农业社黑馬患脑黄，其病发作时，头向前碰，或折筋斗，臥倒在地，昏暈不醒，耳聾眼瞎。如此数十分鐘，过时眼肿痴睡，水草少进，有时靠牆站立，或躺臥不动。治法亦是中西合治，就是一天灌降气散一付。一天靜脉注射50毫升烏洛托品一支。如此連續治疗，各用三次。逐漸好转痊愈。

藥理說明

石膏降胃火治头疼特效；芩、連、知、柏、梔为泻各臟腑火毒之药；蒼朮、神附、木香为配合諸药引热气下降之药；煅石决明养陰明目；硃砂鎮靜；党参补心；桔梗載药上升；木通引火下行；芒硝泻火通下；麻油降火潤腸。

(三) 槽結(腺疫)

此病虽屬傳染病，原是胎毒流傳，馬騾在幼年，个个发生，一般只要患过即不再发生。但偶有少数老年馬，已患过又发生此病，是为料毒，其毒較輕易治。症状的不同点，胎毒槽結双鼻流涕，料毒槽結无鼻涕。历年用以下二方治此病，不下千余头，茲举一例：

1957年榆次县大張义村农业社有新买幼馬十四头，前后半月之間，都患此病。开始有八头馬患病，槽結核还未成熟，曾經一医先开刀切口，膿虽有，但不多，皮厚血多。在这种情况下，看到患畜伸头直項，疮痕肿烂，不見好转，痛苦非常。拖延一月，才算全好。后来又有六头馬患病，都到我們专站診治。先灌追膿开口药一付，讓其自开。比如今天灌药，隔一天就可皮薄

熟透，自然开口。再配合外科进行治疗。这样七天，就可痊愈。

甲刺昆海湯：（治馬槽結未熟透追膿开口藥）

炮甲珠一兩	皂角刺一兩（熬水）	昆布一兩	海藻一兩
甘草五錢	金銀花一兩	乳香六錢	沒藥六錢
荊芥三錢	防風四錢	薄荷四錢	連翹一兩
桔梗五錢	牛蒡子八錢	郁金一兩	酒知母二兩
酒黃柏二兩	木香五錢	香附一兩	

共研末，麻油四兩為引灌之。

芪風湯：（治馬槽結已化膿开口，腐盡生肌藥）。

生黃芪一兩	防風五錢	連翹八錢	桔梗五錢
金銀花五錢	香附一兩	乳香六錢	沒藥六錢
蒲公英五錢	元參一兩	木通四錢	蒼朮四錢
甘草三錢			

共研末，無引灌之。

藥理說明

甲刺昆海湯：炮甲珠、皂角刺二藥并用，為促進結腫，未成者消散，已成者化膿之藥；昆布、海藻、甘草三藥并用，能互相激動，軟堅化硬；連翹、桔梗、金銀花、牛蒡子、郁金、蒲公英為解毒藥；乳香、沒藥為護心散；荊芥、防風、薄荷引毒從表而散；知母、黃柏酒炒降陰火，為根治槽結之胎毒；木香、香附順氣解郁。

芪風湯：黃芪補元氣而瀉火，氣足則血旺，加強新陳代謝，根治化膿之藥。防風配合黃芪互為功用，其妙不可盡述。元參清無根浮游之火，瀉火可以防腐生肌。

（四）牛流行性感冒（牛流感）

這病多在每年春分秋分之際流行，特別是雨潦和天旱，特

湿特燥的气候下，更屬流行感染的严重时期。虽然死亡率不高，但是往往傳染大批牛群，不能从事劳动，直接妨害生产，危害性是很大的。这种病有燥感、湿感之分，治法不同，1956—1957 两年中，我們榆次专区兽医站門診就曾使用了两种不同治法：1956年大雨連綿，气候特湿，治宜除湿，药宜温燥。如天麻散，一付就輕，两付就好。1957 年天高地旱，气候特燥，治宜清热，药用寒凉。灌清解散，一付輕，两付好。总之都为外感，病因不同，症状粗看一样，細看不同，治法亦应分別处理，才能生效。

湿感症状：体温39.5—41.5度，舌温与体温一致。舌津滑利，鼻津珠，忽有忽无；体温乍寒乍热，精神一时兴奋，一时沉郁，不吃不喝不倒嚼，渾身疼痛，或輪流疼，表現行走拘束，四肢傳經拐疼，甚至蹄不着地，不开步，躺臥不起。

燥感症状：体温39.5—41.5度，舌温与体温一样。舌津很少，或干燥，或粘沫，鼻津无，皮温特热，精神痴睡，不吃不喝不倒嚼，渾身痠痛，四肢軟弱，多臥少站，呼吸气热。

天麻散：治牛由于風寒湿气的流行性感胃。

明天麻五錢	白芷四錢	荆芥四錢	防風五錢
薄荷五錢	陈皮四錢	青皮四錢	澤兰叶五錢
蒼朮五錢	柴胡八錢	当归八錢	川芎四錢
厚朴四錢	檳榔五錢		

共研末，生姜一两为引灌之。

清解散：（治牛由于暑燥火气的流行性感胃）

殭蚕五錢	蟬蛻四錢	金銀花一两	連翹八錢
蒲公英八錢	丹皮五錢	神曲一两	生地八錢
木通四錢	黃柏五錢	桔梗五錢	滑石一两
香薷五錢	甘草四錢		

共研末，麻油四两为引灌之。

1956—1957两年用这二方治愈五百余头，輕者一付，重者两付，必效。

藥理說明

天麻散：天麻为表陰風主藥；白芷入血除風；荆芥、防風、薄荷驅逐表邪；青、陈、澤兰为和解要藥；当归、川芎和血活血；蒼朮、柴胡燥湿健胃；枳榔、厚朴健胃壯食；生姜發汗开胃。

清解散：僵蚕、蟬蛻升清降濁；銀花、連翹、蒲公英清熱解毒；香薷、滑石解暑利尿；丹皮、黃柏制止陰火；生地涼血；神曲化食；桔梗載藥清上焦火；木通引火从小便出；甘草既能泻火，又能解毒；麻油潤腸下火。

第二章 消化系

(一)木舌、烂舌(口炎)

例一：1957年六堡农业社黄牛患木舌病。原因劳动过度，心肺热毒，上冲于舌，以致满舌木硬，不能转动，舌色赤红，口内流涎，水草难进。先扎舌下两旁，通关血。又在舌根木硬处乱刺，流出紫红稠血。内服解毒汤三付，隔一天一付，外噙青黛散而愈。

解毒汤：(内服药)

酒黄连五钱	酒黄芩一两	酒黄柏一两	酒知母一两
酒栀子一两	黄药子五钱	白药子五钱	生石膏一两
桔梗五钱	木通五钱	大黄一两	芒硝一两半
枳壳五钱	厚朴五钱		

共研末，麻油四两为引灌之。

青黛散：(口噙药)

青黛三钱	黄柏五钱	儿茶四钱	生石膏五钱
枯矾二钱	大黄五钱		

共研末，以白布缝一长条口袋，长三寸，宽一寸，将药面装入，两端封口，缝带挂于口角外之笼头上，吃草摘掉，下槽带上噙之。隔一日换一次。

例二：太原市东红农业社黑骡，舌根烂斑很重，已有月余，口内流涎，水草少进，体瘦，精神倦怠。初经他医治疗无效，后服解毒汤二付，又服知柏汤二付而愈。解毒汤如上所述。

知柏湯即：

知母四兩(白酒炒) 黃柏四兩(白酒炒) 木香一兩
共研末灌之。

此外，在1956—1957兩年，用解毒湯及知柏湯、青黛散、扎放通關血、玉堂血，共治過舌瘡、舌疳七十三頭，都告痊癒。此病死亡不多，但舌爛不能吃草，影響勞動，妨害生產，就有莫大的損失。

藥理說明

舌瘡一症，總說是火，無火不爛。舌上及舌尖為陽火，舌根為陰火。陽火內服解毒湯，陰火內服知柏湯，無不應手而愈。

芩、連、知、柏、梔、黃白朮子、石膏都為瀉火之藥，其中白酒炒的意義，是因酒可宣行病勢，使其經過胃內時不至停留涼胃，引起消化不良的反應，很快達于病所，發揮其應有的作用。桔梗載清火藥達于病所；木通引火下行；大黃、芒硝從大便瀉火外出，為釜底抽薪之法；枳殼、厚朴健胃助消化，使食物不再化生火毒，防患于未然。

(二)胃冷吐血涎(急性空水傷胃)

這個病例是在1927年我祖父尙在世時治過的。當時平遙縣西卜宜村一馱患此病，原因是本院有井，因勞動將回，虛火未降，飢渴太甚，在井台石盆內自行喝空水過多而成此病。

症狀：滿口流拉絲滑涎，連連不斷，由口到地，連水帶血。這時草料不吃，起臥遲緩，耳鼻俱涼，腸內大鳴，便糞稀薄。如此兩天，經我祖父確診為空水傷胃。治法：火針右脾腧穴，內服暖胃利水藥二付(隔一天吃一付)而愈。

處方：

桂心一兩

母丁香五錢

小茴五錢

當歸五錢

菖蒲五錢	蒼朮八錢	柴胡五錢	炒扁豆一兩
白茯苓一兩	生二丑八錢	青皮五錢	陳皮五錢

共研末，生姜一兩為引灌之。

藥理說明

桂心、丁香、小茴煖腸胃；當歸、菖蒲強心促進循環；蒼朮、柴胡、扁豆健胃助消化；云苓、二丑利水分清濁；青皮、陳皮舒肝調脾，為和解要藥，生姜煖胃發汗，疎通表里。總的方法，就是“煖胃、強心、利水、和解”而已。

(三) 傷料和胃結(胃擴張)

慢性叫傷料，又名過食疝，又名胃食滯。急性叫胃結，又名大肚結，又名胃擴張。慢性者輕，急性者重。總而言之是胃內容物停滯不動，而成起臥之病。此病若不預以時合理的治療，或在硬地臥滾跌摔，逼胃破裂，立時就可死亡。

例一：1956年榆次市馬車合作社閻臭小黑驢，因勞動過度，飢渴太甚，吃草撒料，既快又多，以致消化不及，而成急性胃擴張。其症狀特徵：食道下端和胃之上噴門部不時返咽，行步拘束，站立不安，仰頭伸脖，氣粗鼻咋，情況非常緊急。胸前已經出汗。遂灌豬油四兩，經過半小時，才算和緩而安。

例二：1958年8月2日，榆次縣榆城坪農業社郭雙海牽一黑驢進城。一到店內，該驢呼吸未定，虛火未降，即急忙乘飢喂草，然後上街辦事。及至回店見該驢起臥不安，乃牽站就診。其症狀：食道返咽，氣粗鼻咋，舌熱口沫，臥地打滾，牽拉不起。經集合問診，確診為胃食滯。立即灌以新止疼散一包。其成份及含量如下：