

續刊經驗集目次

瘡疹選要

五臟五液論
黃連解毒湯

至寶丹
通神散

吹耳散
移山過海散

四將軍散
絳雪散

痔瘡神驗方
調氣湯

瀉肝湯
益肺湯

雜症經驗

雄鳩丸
胃脘痛方

夢中遺溺方
膿窠瘡

養營解毒湯
溫經解毒湯

培疳丸
洗肝散

明目方
蠶繭散

金鞭散
二黃丹

瘡後咳嗽總論
加減甘桔湯

瘡疹要訣總論

苓香丸
天龍丸

痔瘡方
胎瘡方

黃水瘡方

治吐血方

乳巖散

蛇纏方

洗凍瘡方

治四日兩頭

小兒疳泄方

治悶痘不發

一筆勾

治跌撲損傷

疔瘡猪膽膏

治疔瘡初起

治咽喉爛方

治冷哮

治繡毬瘋

托盤疔方

皮症神方

吐血不止方

走避風方

脚氣腫痛方

治呃逆不止

治螺蜂刺

治翻胃

治水厥氣厥

鐵井闌

治跌撲傷筋

疔瘡良方

勞傷鬱悶吐血方

小產保胎方

治咳嗽

無名腫毒方

治腸紅

黃疸方

治噤口痢方

仙傳洗眼方

治目中起星

治大麻瘋方

治中鳥瘡

治中藥箭

治刀傷

治金蠶蠱

治暑熱中渴

治紅白走遊風

肥皂治癩方

蓮花貼天泡瘡方

菊花葉治疔方

香櫟散

治箭頭不出

治中蠱

治無名腫毒

洗風火眼方

醒迷至寶丹

芙蓉治癰方

赤小豆敷疽方

豨薟治傷方

續刊經驗集上

武林孫復初輯

汪玉璋 鮑 燧同校

五臟五液論

凡見瘡五液俱全。不潮無害。心主汗。肝主淚。脾主吐。肺主涕。腎主瀉。如少何液。則知何臟毒重。而施治之。

瘡不收斂症

瘡不收斂。其症有二。一曰血不歸經。二曰血死肌表。瘡疹九潮已完。血歸經絡。則遍身赤痕漸退。如久不退。卽是血不歸經。若痕跡爲青紫黑者。卽是血死肌表。血不歸經者。用養營解毒湯治之。血死肌表者。用溫經解毒湯治之。

養營解毒湯

治瘡後血不歸經

生地

當歸

白芍

川芎

丹皮

連翹

丹參

銀花

黃芩

知母

木通

燈心

溫經解毒湯

治瘡後血死肌表

生地

當歸

赤芍

川芎

桃仁

紅花

獨活

山查

連翹

銀花

如見惡寒發熱加桂枝

發熱成疔症

發熱成疔人多易視不知此症極危有三年死有一年死有百

日死有四五日死者惟在夜熱緩急以定遠近瘡後初起急

發夜熱得自汗即退日即無恙或有至日晡時面紅神倦嗜臥微熱得汗稍解日復如是防成瘡疔亟宜早為施治若少遲延必不可救矣宜黃連解毒湯治之

黃連解毒湯

治瘡後發熱成疔

- | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|
| 黃連 | 生地 | 當歸 | 白芍 | 木通 | 鱉甲 |
| 柴胡 | 銀花 | 黃芩 | 連翹 | 麥冬 | 丹皮 |
| 犀角 | 人中黃 | | | | |

至寶丹

治瘡疔如神

- | | | | | | | |
|-----|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 蛇合石 | 一兩 | 醋 | 陳膽星 | 白附子 | 硃砂 | 各五錢 |
| 煨透 | | | | | 水飛過 | |

共為細末。用櫻子尖角杵勻為錠。燈心湯磨服。凡十歲以上者每服五分。十歲以下者每服三分。

瘡疔丸

生地

山查

當歸

麥冬

知母

鱉甲

熟地

白芍

天冬

右共為末。蜜丸。服至寶丹後。即服此丸。

通神散

治瘡後。疔瘡。入目。生翳障。

甘菊花

菘豆皮

穀精草

右各等分。為粗末。同柿餅。用粟米泔。慢火熬乾。去藥渣。食柿餅。不過十餘箇。立效。

洗肝散

治痘瘡後餘毒入目翳膜遮睛。或成珠目蟹眼。此方其效如神。

蛇蛻 全者 一條

馬屁勃 一兩

皂角子 十四枚

共入磁罐內。鹽泥封固。燒赤。勿令出氣。候冷存性。出火氣。研白湯調下。

吹耳散

治痘瘡後目內起星障。

真淨輕粉 五分 飛黃丹 一錢

共為細末。左目患吹右耳。右目患吹左耳。神效之至。

明目方

治瘡後餘毒壞眼。服此即可復明。

黑豆皮 穀精草 眞蛤粉 各一兩

右用猪肝一具切開入藥於內。麻線紮住。米泔水煎熟。臨臥時服。

移山過海散

治毒生於致命處。用此移於無害部位。

雄黃 小麥麩 新鮮蚯蚓糞

右其爲末。用醋調。漸漸塗遍。致命處半邊。自能移過。不致命處。

蠶繭散

治痘瘡後遍身生瘡。

出蛾蠶繭 爲君 枯礬 滑石 黃柏 胡粉

龍骨 煨

右各等分共研爲末用蘇油調搽

瘡後馬脾風症

瘡後餘毒不散挾痰與火留於心胞絡傳於肺經忽然昏仆不省人事口眼歪斜手足搐搦痰涎壅滯鼻鼾如雷與癇相似發過卽醒數日復發竟有發而不醒遺尿卽死名爲馬脾風症以四將軍飲主之

四將軍散

大黃

檳榔

葶藶

牽牛

右藥各味論兒之大小輕重施之立效

瘡後走馬牙疳症