

中医中药 防治六病手册

(流行性感冒、麻疹、百日咳、流行性脑脊髓膜炎、白喉、痢疾)

上海市卫生局 合編
上海市中医学会



上海科学技术出版社

內 容 提 要

本书叙述祖国医学对于六种急性傳染病——流行性感
冒、麻疹、百日咳、流行性脑脊髓膜炎、白喉、痢疾的防治方
法。每病列为一章，每章分为三节。第一节为概述，扼要的
介绍病因、症状及治疗原则。第二节为预防，第三节为治
疗，所载应用方药有内服、外用及针灸诸法，大多是前人经
验，通过现时临床实践，证明确属有效的，或是久已流传于
民间，效验卓著的。间或附述防治效果，也信而有征。对于
各种方法的使用，列述详明，颇便临时撷取。

本书可以提供临床医师及一般医药卫生工作者的阅读
和参考。

中医中药防治六病手册

上海市卫生局 合編
上海市中医学会

*

上海科学技术出版社出版

(上海南京路2004号)

上海市书刊出版业营业许可証出093号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海市印刷六厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 1 14/32 字数 32,000

1959年9月第1版 1959年12月第2次印刷

印数 5,001—18,000

統一書号：14119·837

定 价：(八)0.14元

前 言

在祖国医学书籍中，很早就有关于傳染病方面的記載。因为这些病，一旦流行，往往沿門合境普遍发生，不論男女老幼，其病象往往相似；如素問六元正紀大論說：“溫厲大行，远近咸若。”礼記月令載：“季春行夏令，則民多疾疫。”汉书順帝紀：“上干和气，疫癘为灾。”曹植說：“建安二十二年癘气盛行，家家有僵尸之痛，室室有号泣之哀。”所以古代医籍、史籍所記載的“疫癘、天行、时气”等，就是指这类急性傳染病。在素問熱論和仲景傷寒論中所記載的病症，以及后世的溫病学說中，就包括了許多傳染病在內。根据这些資料，可見“疫癘”的流行，历代均有，为禍甚烈。

在反动統治时期，对人民疾苦漠不关心，如霍乱、天花、白喉、脑脊髓膜炎等，听其广泛流行。解放后，由于党和政府的英明領導，大力开展爱国卫生运动，把除四害、讲卫生、努力消灭危害人民最严重的疾病，作为一項重要的政治任务，积极采取防治措施，有不少傳染病已經消灭或逐步消灭，如霍乱、天花已經絕迹；这对于保护人民身体健康，提高劳动效率，促进工农业生产大跃进，起着重要的作用。

祖国医学认为疫癘的发生，在于天时乖常。人生活在天地气交之中，由于饮食不节，起居失常，触冒天地之“厉气”，“邪气”因此乘虛而入，其中以时令反常为因素之一，如时令論：“反时令則有大疫。”其次，认为战乱也是疫癘流行的因子，如唐書馮盎傳：“大兵之余，疫癘方作。”到明吳又可著瘟疫論，特別強調“厉气”为疫病的主要因素，他說：“疫者感天地之厉气，

……此气之来，无论老少强弱，触之者即病”，认为与一般的感冒时气有所不同。总之由于寒暖不时，气候乖常，所以厉气流行；加以起居不慎，饮食失节，天时人事两相感召，因而发病。

历代医家在与危害人民健康最大的疫病作斗争的过程中，积累了不少经验，并在这种基础上找到治疗的规律。对于每种传染病，其论症处治，都有一定的原则，也发现了不少特效方药。事实证明，中医中药在消灭疾病的工作中，不论预防和治疗，都发挥了很大的作用，前人已有很多急救验方，如蟾酥痧气丸、飞龙夺命丹、辟瘟丹、纯阳正气丸、诸葛行军散、红灵丹等，都是防治疫气的常用药品；其中还有用卧龙丹以取嚏开窍法，以及民间常用的刮痧法等，都是屡试有验的防治方法。所以我们必须认真地贯彻党的中医政策，发掘祖国医学遗产为当前的生产服务。

这份材料，初步将流行性感、麻疹、百日咳、流行性脑脊髓膜炎、白喉、痢疾六种传染病的防治方法，参考古人经验，结合现在临床实践心得，作了一些归纳；在治疗原则方面，也提供了若干法则，以便在辨证论治过程中作为参考之用。在所蒐集的预防和治疗方剂中，也指出了适应范围，以便在临床上具体掌握而灵活运用。但是资料还是不够充实的，有待今后继续补充和修正。

1959年8月

目 录

第一章 流行性感胃	1	第三节 治疗	10
第一节 概述	1	一、内服方剂	10
第二节 预防	1	1. 解肌透疹散	10
1. 藿佩汤	1	2. 银翘散(汤剂)	10
2. 贯众汤	2	3. 麻杏石甘汤	11
3. 天中茶	2	4. 加味三拗汤	11
第三节 治疗	2	5. 无价散	12
一、内服方剂	2	6. 加味四逆汤	12
1. 荆防败毒散(汤剂)	2	7. 加味桑菊饮	13
2. 桑菊饮	3	8. 加味大青龙汤	13
3. 银翘散(汤剂)	3	9. 加味泻白散	13
4. 藿香正气丸(汤剂)	4	10. 加味凉血解毒汤	14
5. 甘露消毒丹(汤剂)	4	二、外用方剂	16
6. 香薷饮	4	三、针刺疗法	16
7. 葱豉汤	5	第三章 百日咳	17
8. 五虎汤	5	第一节 概述	17
9. 三拗汤	5	第二节 预防	18
10. 桂枝汤	6	第三节 治疗	18
11. 麻桂各半汤	6	一、内服方剂	18
二、针刺疗法	6	1. 金沸草散(汤剂)	18
三、拔罐疗法	7	2. 加味小青龙汤	18
第二章 麻疹	8	3. 加味大青龙汤	19
第一节 概述	8	4. 麻百兜铃汤	19
第二节 预防	8	5. 天冬合剂	19
1. 加味雷击散	8	6. 北贝合剂	20
2. 贯众紫草汤	9	7. 川贝蜂蜜姜汁散	20
3. 银花茅根汤	9	8. 天竹百甘汤	20
4. 三豆汤	9	9. 鸢尾涎丸	21
5. 丝瓜藤根	10	10. 猪苦胆散	21
		二、针刺疗法	21

第四章 流行性腦脊髓

膜炎 22

第一节 概述 22

第二节 預防 23

一、外用方劑 23

1. 雷击散 23

2. 拔風散 23

3. 紫金錠 23

4. 絳矾散 23

二、內服方劑 23

二味代茶飲 23

第三节 治療 24

一、外用方劑 24

1. 貼臍法 24

2. 蟾蜍吸法 24

3. 芥子敷法另服紫金錠
方 24

二、內服方劑 25

1. 龍胆瀉肝湯合羚羊角
散加減合劑 25

2. 清溫安胎湯 25

3. 蟾尿吞蝎尾法 26

三、針灸療法 26

第五章 白喉 26

第一节 概述 26

第二节 預防 27

1. 青龍白虎湯 27

2. 土牛膝方 27

第三节 治療 28

一、外用方劑 28

1. 麝梅浸 28

2. 白喉散 28

3. 錫類散 28

4. 冰硼散 28

5. 獨蒜散 29

二、內服方劑 29

1. 除瘟化毒散 29

2. 神仙活命飲 29

3. 土牛膝 30

4. 六神丸 30

5. 養陰清肺湯 30

6. 養正湯 30

三、針刺療法 32

第六章 痢疾 32

第一节 概述 32

第二节 預防 33

一、內服方劑 33

1. 六神曲 33

2. 天中茶 33

3. 大蒜頭 33

4. 山查湯 33

二、灸法 34

第三节 治療 34

一、外用方劑 34

1. 敷臍法 34

2. 馬齒莧灌腸法 34

3. 鼻飼法 34

4. 黃連灌腸法 35

二、內服方劑 35

1. 藿香正氣丸 35

2. 香連丸 35

3. 木香檳榔丸 35

4. 枳實導滯丸 36

5. 白頭翁湯 36

6. 綠茶煎 37

7. 馬齒莧湯 33

8. 苦參子 38

9. 金星鳳尾草 38

10. 加減理中湯合四逆散 39

11. 駐車丸 39

12. 阿膠梅連丸 39

13. 真人養脏湯 40

三、針灸療法 40

第一章 流行性感冒

第一节 概 述

流行性感冒是傳染性极大的一种疾病，因其流行广泛，傳播迅速，威胁广大人民的健康，严重地影响了生产。

初起症状与普通伤风相似。在祖国医学文献里，虽无“流行性感冒”的病名，但有关此病的症状、預防及治疗，則散見各书中；如伤寒論所提到的“中风”、金匱要略所說的“中寒家喜欠，其人清涕出，发热……”等，都是指感冒初起的症状。

論其病因，乃风寒之邪侵入腠理而发，所以属于外感症之列。外感症的变化規律，总是根据由表入里的原則而递变的。它的治法，可以根据一般治疗热病的法則施治。初起时其病在表，宜宣表达邪，以疏散风寒为主；及其病邪內进，热势渐壮，当以清热、泄热为主；至于出現高热、咽痛、剧咳等严重症状者，尤宜以清肺热为当务之急。这是治疗方法的一般步骤。

第二节 預 防

1. 藿佩湯

〔药物〕 鮮藿香一两，鮮佩兰一两，鮮薄荷二錢（如无鮮的，可用干的，但用量宜減半）。

〔制法〕 上药盛入布袋內，用清水 5,000 毫升煮沸，煮沸后再煮三分钟，盛入清淨的茶缸內。

〔服法〕 代茶飲之（可供五人一日量）。

〔效果〕 1956 年夏季，本市流行性感冒盛行，曾將上方推广使用，以作預防，效果良好。

附注 (1) 如在夏秋季流行时，用本方预防更为适宜。(2) 本方不但可以预防流感，同时对于湿盛之体，舌有浊垢，时常漾漾欲泛者，饮之亦甚佳。惟对于舌燥光滑，津液不布者，勿用此方，可改用其他预防方药。

2. 贯众汤

〔药物〕 贯众三钱，荆芥三钱，紫苏三钱，甘草一钱半（儿童酌减）。

〔制法〕 上药加水 400 毫升，煎成 150 毫升。

〔服法〕 一次温服，每日一剂，连服三天。或隔日服一剂，服完三剂为一个过程。如半月后流感仍流行未衰，可再服一个过程。

〔效果〕 据湖南新化、醴陵、邵阳等地，应用此方后作重点观察，认为此方对预防流感、麻疹、流行性脑脊髓膜炎等，均有很高的效果。

3. 天中茶

〔药物〕 厚朴，茅朮，莱菔子，冬朮，猪苓，草果，广皮，白芥子，槟榔，藿香，神曲，苏子，车前子，杏仁，荆芥，藁本，山查，大腹皮，柴胡，泽泻，羌活，木通，姜半夏，独活，茯苓，苏叶，前胡，甘草，枳实，青皮，麦芽，白芍，秦艽，生姜，香薷，川芎，防风，薄荷，白芷，桔梗。上药拌武彝茶，晒干，密收（中药店有制成品出售）。

〔服法〕 每日取二、三钱，开水泡服。

附注 武彝茶味苦而酸，性温，能消食下气，醒脾解酒，兼治休息痢，所以天中茶又可预防痢疾。

第三节 治 疗

一、内服方剂

1. 荆防败毒散（汤剂）

〔适应症〕 恶寒发热头痛，骨节痠楚，鼻塞声重，舌苔薄白，胸闷咳嗽等症。

〔药物〕 荆芥穗一錢半，防风一錢半，羌活、独活、柴胡、桔梗、川芎各一錢，前胡、枳壳各一錢半，赤苓三錢，甘草五分。

〔加减法〕 恶寒甚者加葱白三个。

〔制法〕 上药加水 500 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加水 120 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每天一剂，分二次温服。

附注 本方适用于流感病的症状偏于风寒者。

2. 桑菊飲

〔适应症〕 头痛发热咳嗽。

〔药物〕 桑叶三錢，菊花一錢半，杏仁三錢，連翹一錢半，桔梗一錢半，甘草八分，蘆根三錢，薄荷八分。

〔加减法〕 口渴者加天花粉三錢，肺热甚者加黄芩一錢半。

〔制法〕 上药加水 500 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加水 120 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每天一剂，分二次温服。

附注 本方适用于流感病的症状偏于风温者。

3. 銀翹散(湯剂)

〔适应症〕 流感发热，咽痛喉肿。

〔药物〕 銀花、連翹各三錢，牛蒡子一錢半，桔梗、薄荷各八分，荆芥三錢，淡豆豉三錢，生甘草五分，竹叶三十片，蘆根一支。

〔加减法〕 胸悶加郁金三錢；渴甚加天花粉三錢；咽喉肿痛加馬勃八分，元參三錢；鼻衄去荆芥、豆豉，加鮮茅根一两，梔子炭三錢；咳嗽加杏仁三錢。

〔制法〕 上药加水 500 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加

水 120 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每天一剂，分二次温服。

附注 本方适用于流感病热盛者。

4. 藿香正气丸(汤剂)

〔适应症〕 畏寒发热，头痛嘔逆，胸悶腹脹。

〔药物〕 藿香、紫苏、腹皮各三錢，白芷、陈皮各一錢半，白朮三錢，厚朴一錢半，桔梗八分，半夏一錢半，甘草六分，生姜三片，大枣三枚，茯苓三錢(藿香正气丸，中药店有成品出售)。

〔加减法〕 痰食气滞者去白芷，加木香；湿重舌苔厚膩者去白朮，加蒼朮。

〔制法〕 上药加水 500 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加水 140 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每天一剂，分二次温服。

附注 本方适用于流感病挟湿者；亦可作預防用。

5. 甘露消毒丹(汤剂)

〔适应症〕 身热稽留不退，汗出头痛胸悶，口苦，咽喉干痛，倦怠，尿赤，苔膩或微黃者。

〔药物〕 藿香三錢，薄荷一錢，茵陈三錢，滑石三錢，木通三錢半，連翹三錢，貝母三錢，菖蒲一錢半，黃芩三錢，射干一錢半，薏仁六分(儿童酌減)。

〔制法〕 上药加水 500 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加水 140 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每天一剂，分二次温服。

附注 本方适用于夏秋間患流感而挟暑湿者。

6. 香薷飲

〔适应症〕 恶寒发热，头痛，煩躁，口渴，腹痛吐瀉。

〔药物〕 香薷二錢，厚朴(姜汁炒)一錢，白扁豆(炒)一錢

半，炙甘草六分。

〔加减法〕 心煩口渴甚者，去扁豆，加黃連。

〔制法〕 上药加水 400 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加水 120 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每天一剂，分二次溫服。

附注 本方适用于夏日流感，兼見吐瀉者。

7. 葱豉湯

〔适应症〕 感冒，惡寒，頭痛，发热。

〔药物〕 帶須葱白三个，香豉三錢。

〔加减法〕 秋冬季加生姜二片。

〔制法〕 上药加水 300 毫升，煎成 80 毫升。

〔服法〕 一次溫服。如 4 小时后不解，再服一剂。

附注 本方适用于流感初起。

8. 五虎湯

〔适应症〕 流感，头脹痛。

〔药物〕 荊芥、防风各一錢半，杏仁三錢，薄荷八分，苏叶二錢。

〔加减法〕 咳嗽加前胡；夏天加藿香、佩兰。

〔制法〕 上药加水 500 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加水 120 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每日一剂，分二次溫服。

附注 本方适用于流感初起，有发热咳嗽者。

9. 三拗湯

〔适应症〕 流感鼻塞声重，头痛肢倦，咳嗽有痰。

〔药物〕 麻黄(不去节)六分，杏仁(不去皮尖)三錢，生甘草六分，生姜二片。

〔加减法〕 有微热者加前胡一錢半；咳而痰多者加桔梗一錢半，象貝母三錢。

〔制法〕 上药加水 120 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加水 100 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每日一剂，分二次温服。

附注 本方适用于流感初起，兼有咳嗽者。

10. 桂枝汤

〔适应症〕 头痛发热，有汗恶风，鼻鸣干呕，舌苔薄白腻。

〔药物〕 桂枝八分，炒白芍一钱半，炙甘草六分，生姜二片，红枣五枚。

〔制法〕 上药加水 400 毫升，煎成 80 毫升为头汁；再加水 120 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每天一剂，分二次温服。

附注 本方适用于流感病偏风寒而有汗者。

11. 麻桂各半汤

〔适应症〕 流感，发热恶寒，热多寒少。

〔药物〕 桂枝八分，麻黄六分，芍药一钱半，炙甘草六分，杏仁三钱，生姜二片，大枣四枚。

〔制法〕 上药加水 400 毫升，先煮麻黄一、二沸，去上沫，加入诸药，同煎成 80 毫升为头汁；再加水 120 毫升，煎成 80 毫升为二汁。

〔服法〕 每日一剂，分二次服下。

附注 本方适用于发热恶寒如疟状者。

二、针刺疗法

1. 疗法一

〔适应症〕 发冷发热，头痛眩暈，鼻流清涕，肢痠背痛，喷嚏咳嗽，或咽喉觉痛等症。

〔取穴〕 少商、中商、老商、中魁（即阳谿）、人中。

〔穴位〕 少商穴在手大指端内侧，去爪甲一韭叶许，是常

用的穴位。中商和老商二穴，不見于文献記載，是針家在臨床實踐中所發現的新穴。因為這兩個穴位，一個在大指端的外側，距離爪甲角的部位上與少商穴相對，故稱為老商；另一個在少商和老商穴的中間，离大拇指的爪甲根一韭叶處，所以取名中商。中魁在手腕上側橫紋前，兩筋間陷中。人中在鼻柱下，溝中央，近鼻孔陷中。

〔操作方法〕 先刺少商、中商、老商三穴，再刺中魁、人中兩穴。少商、中商和老商，左右兩大拇指上各三針，共六針。左右中魁各一針，共二針。再加人中穴一針。總共為九針。

〔加減法〕 若頭痛眩暈者，加配印堂、太陽穴。如惡心，加中沖穴。

附注 上述各穴刺後，都用手擠出血少許。

〔療效〕 據河北保定專區，在1956年春曾治療40例，治愈率達83%，有效率100%。

2. 療法二

〔適應症〕 發熱，微惡寒，頭痛，眩暈，鼻流清涕，咳嗽等症。

〔取穴〕 攢竹、迎香、合谷、肺俞。

〔穴位〕 攢竹在眉端；迎香在鼻孔旁八分；合谷在大指和食指歧骨間，即虎口斜骨間；肺俞在背部第三脊椎旁開三寸處。

〔操作方法〕 攢竹、迎香、肺俞，均針二分深，用補法；合谷針四分深，用瀉法。

三、拔罐療法

〔取穴〕 風門、列缺、外關。

〔穴位〕 風門在頸部第二椎下兩旁，相去脊各一寸五分；列缺在腕后橈側上一寸五分；外關在腕后二寸兩骨間。

〔加減法〕 頭痛加風池、太陽、印堂；音啞加天突、魚際，并可用照海。

第二章 麻 疹

第一节 概 述

麻疹是常見的小兒急性傳染病之一，本病的流行，與季節有着一定的關係，一般冬春發病者居多，夏秋較少。根據中醫文獻記載，對於麻疹的致病原因，大致可分為三類：1. 胎毒蘊於肺脾；2. 熱毒蘊於肺胃；3. 外感天行厲氣。

中醫治療麻疹着重於透發，也就是說麻疹能發得透，可使毒從外泄，變症就少；如發得不透，毒向內陷，則并發各種不同的變症。其治療的原則是：初期，疹尚未出，宜用解肌透表法；中期，疹已見形，當以清涼疏化為主；后期，疹已回收，宜清降瀉火為法；這是處理麻疹過程中的基本原則。但這個原則並不是一成不變的，在臨床上還須因時、因人、就症情的變化而靈活運用，要從整體觀念的基礎上進行辨證論治。

第二节 預 防

1. 加減雷擊散

〔藥物〕 牙皂三錢半，辛夷二錢，白芷一錢半，藿香二錢，貫眾二錢，朱砂二錢半，薄荷二錢，蒼耳子二錢，陳皮二錢，雄黃二錢半，防風二錢，蒼朮二錢，半夏二錢。

〔制法〕 將上藥研成極細末，每二錢半細末加甘油（或麻油）一兩，調和均勻，放置 24 小時，用消毒紗布過濾，將濾出油液裝入消毒玻璃瓶內，嚴塞瓶口，勿令泄氣。

〔用法〕 先将鼻孔中分泌物擦掉，在牙签端上卷以棉球如菽豆大（或用点眼小玻璃棒），蘸雷击散油液1~2滴，涂于左右两鼻中隔上，每隔一天涂一次，連續四次。以后每隔一星期，如前法涂一次。

〔效果〕

(1) 奉賢县于1959年1~2月間，曾用本方对2,315个易感儿童进行預防，結果未发病者达1,960人，在預防效果上有效率达84.67%；未用本方預防的369个易感儿童，发病人数达299人，发病率高达81.03%。

(2) 湖北省胡东樵大夫在1956年1~2月間正值麻疹流行时，以此方涂鼻作为預防試用，共施于213名未出麻疹的儿童，經二个月的观察，除1名在涂药时已現麻疹症状外，其余均未发病。

附注 雷击散原方見于陈修园七十二种急救經驗良方中。

2. 貫众紫草湯

〔药物〕 貫众三錢，紫草一錢，生甘草一錢。

〔制法〕 上药加水200毫升，煎成50~60毫升。

〔服法〕 每日一剂，一次服完，連服三天。隔一星期后，再如法連服三天。

3. 銀花茅根湯

〔药物〕 銀花三錢，白茅根二錢，甘草一錢。

〔制法〕 上药加水200毫升，煎成60毫升。

〔服法〕 临服时于药汁內加白糖一錢，一次服完。每星期服一至二次，連服二星期。

4. 三豆湯

〔药物〕 馬料豆三两，菽豆三两，赤豆三两，生甘草三两。

〔制法〕 将三豆淘净，同甘草用雪水或长流水1,500毫升，煮豆熟为度，去甘草。将豆捞出晒干，入豆汁中，再浸再

晒，汁尽为度。

〔服法〕 取豆給小儿常服，每日 10 粒，不必多吃。

〔优点〕 方出“幼幼全书”，未发者可以預防，已发者可以減輕。清代王孟英說：“此方药极簡易，性最和平，味不恶劣，易办易服，不必論其体质，久服无弊，誠尽善尽美之王道药也。”

5. 絲瓜藤根

〔药物〕 絲瓜藤近根部的三寸。

〔制法〕 燒灰存性研末。

〔服法〕 加砂糖少許和勻，給小儿服之。

第三节 治 疗

一、內服方剂

1. 解肌透疹飲(驗方)

〔适应症〕 麻疹初期，身热汗少，咳嗽噴嚏，涕泪俱多，胸悶，舌苔白膩，疹尙未透，病邪在表而未化热者。

〔药物〕 荆芥一錢半，葛根一錢半，前胡一錢半，蟬衣一錢，桔梗一錢，牛蒡子一錢半，薄荷八分，西河柳三錢，杏仁三錢，象貝三錢，枳壳一錢半。

〔加減法〕 无汗加麻黃；疹出不透加麻黃、浮萍；口渴心煩加山梔、茅根；大便溏瀉加黃芩、山查炭。

〔制法〕 上药加水 500 毫升，煎成 100 毫升为头汁；再加水 100 毫升，煎成 60 毫升为二汁。

〔服法〕 每日一剂，每隔 4 小时服一次。头汁分 4 次，二汁分 2 次，俱溫服。

2. 銀翹散(湯剂)

〔适应症〕 麻疹初見，寒热咳嗽，口渴咽痛，舌苔薄黃或微紅，疹尙未透，邪尙在表而其势已化热者。

〔药物〕 見第一章第三节3。

〔加减法〕 胸脘煩悶加枳壳、郁金；渴甚加天花粉；鼻衄去豆豉，加茅根、山梔；咳甚加杏仁、象貝；疹出不退加蟬衣、浮萍。

〔制法〕 上药加水500毫升，煎成100毫升为头汁；再加水100毫升，煎成60毫升为二汁。

〔服法〕 每日一剂，每隔4小时服一次。头汁分4次，二汁分2次，俱溫服。

3. 麻杏石甘湯

〔适应症〕 麻疹布发不多，面部不显，热盛口渴，煩躁，齟齿，咳嗽气粗，邪热盛者。

〔药物〕 生麻黄八分，生石膏六錢，光杏仁四錢，炙甘草六分。

〔加减法〕 疹出不透加蟬衣、浮萍；气急鼻煽加紫苑、郁金；痰多加川貝、胆星；舌紅絳加鮮生地、鮮石斛、茅根、蘆根；煩躁而見神昏者加鮮菖蒲、紫雪丹。

〔制法〕 上药加水400毫升，煎成100毫升为头汁；再加水100毫升，煎成60毫升为二汁。

〔服法〕 每日一剂，每隔4小时服一次。头汁分4次，二汁分2次，俱溫服。

附注 本方用于邪热俱盛的麻疹病者，疗效很高。例如榆林区二联于1958年11月25~30日共治疗240例，計1,020人次，包括麻疹发热开始到痊愈为止，内有高热者很多，用此方后，无并发症，亦无死亡，有效率达100%。

4. 加味三拗湯

〔适应症〕 疹发肢体已多，独面部不显，身热不揚，咳嗽气急，痰多煩躁，神迷昏睡，舌苔或白或淡黄而膩，邪热内閉，痰濁交阻者。