




广西珍贵动物

广西珍贵动物

申兰田 李汉华 编著

梁盈禧 封面设计、绘图

广西人民出版社



内 容 提 要

广西由于自然环境的优越,动物的种类和数量极为丰富。本书介绍的是广西具有的四十一种珍贵而稀有的动物。其中有世界著名的瑶山鳄蜥,广西特产的白头叶猴、珍贵稀有的华南虎、黑叶猴、原鸡、黑颈长尾雉、双带鱼鰍等。作者以有趣的文笔,生动形象地描述了这些动物的生态习性、栖息环境、野外识别方法,以及产地、经济意义等。除有十六种动物的彩色插页外,每种动物均绘有插图,作到图文并茂,生动活泼。对于农、林工作者,生物学师生、动物爱好者具有一定的参考价值,对于广大人民群众实属一本饶有兴味的科普读物。

广西珍贵动物

申兰田 李汉华 编著

梁盈禧 封面设计、绘图

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/20 印张2插页4 字数45,000

1981年8月第1版 1981年8月第1次印刷

印 数1—4,000 册

书号: 13113·24 定价: 0.48 元

编 者 的 话

广西地处祖国南疆，气候温暖，雨量充沛，石山林立，植物繁茂，适于动物生长繁殖的自然环境区域较广。因之，野生动物的种类繁多，并保存有一定的数量，为我国动物资源最丰富的地区之一。列为国家保护的动物就有四十多种，其中有世界著名的瑶山鳄蜥，广西特产的白头叶猴，珍贵稀有的华南虎、黑叶猴、原鸡、黑颈长尾雉、双带鱼鲙等。这些珍稀的野生动物是具有较高的科学价值和经济意义的，但由于盲目狩猎，有些已濒临绝迹，这是应该引起注意的。

本书介绍的是广西具有的四十一种珍稀动物。作者结合较丰富的野外实际经验，生动形象地描述了这些动物的生态习性，栖息环境，形态和在我区的分布，以及它们主要的经济价值。本书除有彩色插页外，每种动物均绘有较生动而形象的野外生态插图。

本书对于珍贵动物的保护和利用；对于科学知识的普及，将会起到很好的作用。对农林工作者、生物学师生和动物爱好者都具有一定的参考价值。对于广大人民群众实属一本饶有兴味的科普读物。

在本书编绘过程中，曾得到广西师范学院生物系、桂林市动物园、广西医学院等单位的大力协助，在此谨致谢意。

目 录

懒猴	(1)	梅花鹿	(21)
白头叶猴	(2)	苏门羚	(22)
黑叶猴	(4)	斑羚	(23)
金丝猴	(5)	鸳鸯	(24)
猕猴与熊猴	(6)	红腹角雉与黄腹角雉	(25)
短尾猴	(7)	白鹇	(26)
长臂猿	(8)	原鸡	(27)
穿山甲	(9)	黑颈长尾雉与白颈长尾雉	(28)
水獭	(10)	红腹锦鸡	(29)
大灵猫与小灵猫	(11)	白腹锦鸡	(30)
金猫	(12)	冠斑犀鸟	(31)
云豹	(13)	鼋和山瑞	(32)
虎	(14)	大壁虎	(33)
金钱豹	(16)	巨蜥	(34)
麝	(17)	瑶山鳄蜥	(35)
河鹿	(18)	蟒	(36)
毛冠鹿	(19)	大鲵	(37)
水鹿	(20)	双带鱼鳔	(38)



懒 猴

夜色笼罩着大地，在林中一棵高树的洞中，伸出一个圆的头，两只大眼睛在朦胧的月光下，隐隐地闪着光，一只懒猴开始了它一天的活动。它的头在不时地左顾右盼，行动缓慢得出奇，有时走动一步竟达12秒钟！突然，一只沉睡的昆虫被它捕获了，二只、三只，憩息一会儿以后，又爬向另一棵树上，在树冠的分枝处又找到了一个鸟巢，警惕的亲鸟扑的一声飞逃了，这时巢中的卵便成了懒猴的佳肴。在热带繁茂的树林中，果子样多而味美，它便一边采摘着果子，一边在树上漫步遨游，当月色西沉东方尚未破晓时，它早已又在树洞中卷成一团，抱头大睡了。难怪人们给它取了“懒猴”这样的美名。

懒猴和其它热带动物相似，一年四季均可繁殖，但其产仔期多在冬季，怀孕期约5个月，每次产1仔。

懒猴体重近1公斤。头形似猫，但耳朵短几隐于毛中。眼睛周围为黑色。体为黄棕色，背中央自后头到尾基有一条深棕色纵纹。当其声息毫无地在树上活动时，是极难被发现的。尾极短，隐藏在毛丛中。四肢的掌面较大，对它在树上攀爬是十分有利的。

懒猴属于灵长目，是动物进化过程中的高级种类。但是懒猴头骨上的眼窝是不完整的；虽然有扁平的指甲，但第二指、趾还保留着爪子，这些都是较低级动物的特征。懒猴证明了高级动物是由低级的动物逐步进化而形成的。因此具有较高的科学价值。

懒猴在广西仅分布在宁明至靖西一带。

白 头 叶 猴

白头叶猴是我国的特产动物，仅分布在广西的龙州、宁明、崇左、扶绥四县的大约200多平方公里的范围内。就数量而言比大熊猫还少，被列为国家保护动物。

白头叶猴体形纤瘦，四肢细长，修长的尾巴可达体长的1.5倍。全身的毛很长，头、颈、上肩及尾巴末端的三分之一至二分之一处的毛是白色的，其它部分全是黑色的。头顶正中有一撮直立的白色长毛，恰似戴了一顶尖帽，故名“白头叶猴”。由于主食叶类，它的牙比别的猴类尖、细而锐。胃很大，盲肠特别发达。

在产区的石灰岩山地，有不少几百甚至上千平方米的似刀截一样平整的绝壁。在绝壁上有大大小小的石洞、石隙和凹陷，当你发现有的洞隙下方有褐色的粪便污痕时，这便是白头叶猴的“家”了。早上天刚蒙蒙亮，它们便一个接着一个地、小心翼翼地走出洞口，横过绝壁爬到山腰，开始了新的一天。它们一边采食树叶、嫩芽，一边嬉戏玩耍，在树林中攀登跳跃，就这样愈走愈远……。中午在浓荫中躲避烈日和休息，当红日偏西时，又开始漫游、嬉戏和采食，最后停在离家很近的山顶上休息。直到夜幕降临，才一只接着一只地回到洞中，在这任何野兽也无法染指的绝壁洞府中度过黑夜。


白头叶猴过着小家族生活，每一家中由一个成年雄猴和三、四个雌猴及小猴组成。成年雄猴是一家中最有权威者，它总是担任着带路、警戒等重要任务，一有意外便发出“哇、哇”的叫声，带领着众家小逃窜。当小雄猴长大以后，便与大雄猴争夺“王位”，若不成功便带领几只猴子另组新家；若大雄猴被打败，就被赶出猴群而成为“独猴”。独猴另占山头，性情变得十分粗暴和孤僻，见了人常奋力摇树并发出威吓声。

白头叶猴是典型的石山动物，它们在悬崖绝壁的石山上跳跃自如，行走如飞。在运动中它那修长的尾巴并不碍事，而是极为灵活有效的平衡

器官。由于叶猴吃含水份较多的叶、芽等食物，所以平时很少喝水，只有在冬旱时才下到溪边饮水。它们在下雨之前常发出“吭、吭”的叫声，所以有的群众还把它当作晴雨表呢！

白头叶猴约3、4岁性成熟，雄猴较雌猴为晚。繁殖的季节性不太明显，四季几乎都可看到幼猴出世，但以冬末春初较为集中。每年1胎，每胎1仔。初生幼仔重不足1斤，全身毛均为乳黄色，随着幼仔的生长，头及尾的末端逐渐变成白色，身体和四肢逐渐变为黑色。

白头叶猴分布地区十分狭窄，数量很少，具有较高的科研价值。但由于缺乏有效的保护措施，近年来数量已减少。



黑 叶 猴



广西特产的“乌猿酒”驰名中外，其味醇香，对风湿病有卓著的疗效，这就是以黑叶猴之骨——乌猿骨为主，配以米酒等加工制成的。在动物园中由于黑叶猴体态俊秀，攀枝、跳跃极为轻盈，是非常受欢迎的观赏动物之一。以前捕来的黑叶猴极难驯养，往往九死一生。经过人们的不断努力，现在它们已能在人工饲养下正常地传种接代了。黑叶猴是典型的热带动物，以南宁地区西部的石灰岩山林中为最多，但在冬季瑞雪纷飞的大明山林区及贵州省的遵义和兴义地区也同样有黑叶猴的分布。生活在这些地区的黑叶猴毛较长而密，冬季皮下脂肪层较发达，能有效地抵抗严冬。这说明了动物对环境的适应能力是很强的。

黑叶猴的形态与白头叶猴非常相象，身上的毛很长，也拖着一条长尾巴，头顶上竖着一撮黑色的冠毛，与白头叶猴的显著不同点是全身为纯黑色，仅由嘴角到耳部各有一条白纹。

黑叶猴的毛色也有所变异，如雌者的臀部有一块白斑，但大明山林区所产的便没有。又如在大新县东部有一片石山林区，在该区的猴群中，曾多次发现全身为银白色的个体，还有一些身上具有白色斑块个体。它们与黑叶猴一样，都具有正常的生活能力。在猴类中这种白色的变异是极为罕见的现象。

黑叶猴的生活习性与白头叶猴是完全一样的。在地理分布上，白头叶猴产地的东、北、西三面均有黑叶猴的分布，它们之间仅以左江及明江为界。它们的亲缘关系最为密切，到底它们能否各自成为一独立的种，目前尚有争论。

金 丝 猴

在广西一提起金丝猴的名字，很多群众会说“我们那儿有”。其实不然，他们所说的金丝猴实际上是猕猴。真正的金丝猴身上有很长的金黄色毛，尤其是背部的毛更长。产在四川的金丝猴背部的毛可达330毫米以上，就象一件金黄色的“披风”。在广西由于气温较高，这里所产的金丝猴的毛也就较短了。金丝猴还有一个名字叫做“仰鼻猴”，那是由于它们生着一副鼻孔向上仰的“朝天鼻”，这样的鼻子在猴类中是绝无仅有的。金丝猴的脸是浅蓝色的，尾巴比身体长，体重约15公斤。



金丝猴也是一种群栖性猴类，每群约100—200只，小群的也有30—40只，无单独行动的现象。它们很喜欢在树上活动、觅食和休息。在树上活动时，会先摇一摇树，然后借助树的反弹力，一跃便可达到一丈开外。很少下地来活动。性机警，一有惊动便在树上连窜带跳地逃之夭夭了。它们主要以树叶、幼芽和松子、板栗等为食，有时也吃些鸟类、昆虫等动物性食物。金丝猴的怀孕期约为8个月左右，一胎一仔，初生幼猴体已被毛，并会紧紧地搂住母猴；母猴更是疼爱小猴，常将小猴抱在怀中，即便在奔逃时也不例外。

猴子多是怕冷的，仅分布在炎热和温暖的地区，但金丝猴却仗着那金色的“披风”和皮下脂肪，向北一直分布到陕西和甘肃一带。在广西分布于西部的一些山林中。

金丝猴为驰名世界的珍稀动物，也是逗人喜爱的观赏动物。它的皮毛制成的衣服，据说还有治风湿病的功效。

猕猴与熊猴



猴类在广西的资源是很丰富的。最常见的是猕猴，又称广西猴，体重约10公斤，身体背面为棕黄色，后腰及臀部毛色最深而且有金黄色光泽，腹部浅灰色。尾巴比后脚长。此外，熊猴的数量也不少，外形上极似猕猴，不同之处是身体背、腹面的颜色相似，都为暗褐色。尾巴没有后脚长。吻部粗长。头顶中央有个“毛漩”。

猕猴与熊猴多分布在石山地区的丛林中。好群栖，一群由几只到几十只不等。每一群中有一只强壮的大雄猴为首领，猴群行走时它常在前面开路，觅食时它常在高处瞭望。它们都是夜间休息白天活动的。早上最为活跃，在树上攀枝跳跃，一边采摘花、果、枝、叶，略咬几口便贮存在颊部的颊囊中，待安闲时再重新咀嚼吞咽。一边互相追逐嬉戏，甚至推动山石隆隆作响，性情十分活泼好动。猕猴与熊猴相比，后者的灵活性较差而性情较犷野。它们都是很善于表达感情的，发怒时眉部上扬、双耳后贴；恐惧时张着大嘴、皱着眉头；表示友爱时用

手在对方身上“找虱子”，表演得真是淋漓尽致。

猕猴与熊猴四季均有交配现象，怀孕期约6个月，多在春末及夏天产仔，每产1仔，产后不久仔猴便能紧紧抱住母猴，奔跑时也不会掉下来，母猴更是爱不释手地终日将仔猴抱在胸前，有时仔猴死了也不肯放手。

猴子在形态结构和生理机能方面与人较相似，因此在医学、药理学、生理学等方面均以猴作为最理想的试验动物；其肉与骨在民间作为药用；在动物园和马戏团中则更是必不可少的了。




短尾猴

短尾猴的尾巴不长，一般只有两寸左右。体型比猕猴、熊猴都大，成年公猴重达20公斤。短尾猴多喜在地面活动。它们在野外采食时与猕猴相似，不管是果是叶，先略咬几下便贮存在颊囊中，待安闲时再细细地咀嚼，这样可以充分利用采食的时间，减少与猛兽相遇的机会。待两个颊囊装满了，鼓成两个“小皮球”时，里面的食物已基本上够它饱餐一餐了。



广西的南边属热带气候，北部属亚热带气候，分布在两个不同地带的短尾猴，它们的外貌是大不一样的。分布在南边的，身体的毛较疏而长，全身均为黑色，头额部的毛多向左右拨开，恰似梳了一个“大分头”，面部的皮肤初生时与身体的肤色相同为乳白色，成年时转为红色，故有红面猴之称，老年时则转为紫黑色。分布在北部地区的短尾猴，身体的毛较短而密，基本上为青灰色，故有青猴之名，面部裸出的皮肤近于肉色，两颊及下颌的毛长，向四周呈放射状，恰似长了一脸“大胡子”。此外还有一些中间的类型。需要指出的是，不管青猴还是红面猴，它们初生的幼猴均近于乳白色。短尾猴是一个很好的例子，它说明了同一种动物，由于生活环境不同，它们会向不同的方向发生变异。至于短尾猴这种变异目前是否已经形成两个不同的种了呢？现在分类学家们意见还不统一。

长 臂 猿



清晨，在古木参天的大森林中，空气是十分新鲜的，绿色植物发出的清香沁人肺腑，阳光已从树叶的间隙中透入森林，当你正沉浸在这秀丽的自然景色中时，忽然从远处传来一阵阵“唔—唔—唔”的宏亮叫声。叫声很有规律，先短后长，最后是短促的几声结尾声。这是什么在叫呢？原来在树上有几只猴子，它们都没有尾巴，其中一、两只全身黑色的是雄的，其余灰棕色的是雌的或幼仔。它们的腿非常短小，两支手臂倒是又粗又长，连手指头都是很长的。它们就是长臂猿。长臂猿的运动方式很特别，是用荡秋千的方式向前进的，既会单手荡，又会双手跃，能一下子由这棵树飞荡到另一棵树。这个灵活劲

连飞鸟也十分叹服。别看它在树上那么灵活，但在陆地上就差多了，走路时向上举着两支长得出奇的手，两脚弯成罗圈形，左一晃、右一歪地在摆动着身体，难怪它是不轻易到陆地上的。

灵长目的动物大致可分为猴类、猿类和最高级的人类。猴与猿类的区别在于猴类有较发达的尾巴，臀部具胼胝，一般均具有颊囊，猿类则没有这些。长臂猿属于猿类，较猴类高级，可供研究猿类动物之用，也是动物园中珍稀动物之一。长臂猿壮语叫“杜杠”。从前数量较多，现在仅龙州及靖西县的边境地区，偶尔被人捕获。

穿 山 甲

穿山甲是人们比较熟悉的动物之一。

它那浑身呈鱼鳞状排列的圆形鳞片，乍看起来还以为是爬行动物，其实它是体上有

毛、胎生、哺乳的动物，因此是属于哺乳类的。不信你可以仔细地看一看，它身上稀疏的毛是被鳞片覆盖着的；在腹部没有鳞片的地方，毛和乳头都能清晰可见。

穿山甲是一种怯懦的动物。白天躲在洞中睡觉，晚上才出来活动，当你用一根棍子敲它时，它既不迅速逃跑，也不张口咬人，而是卷成一团，此时捕它真是垂手可得！可是千万别误会，上面谈的仅是在洞外的情形，一旦它钻到洞里后，捕捉就不那么容易了。由于它的前爪极为强大，挖洞速度之快实不亚于钻探机，不等你挖到，它早已逃之夭夭了。有时还能挖通单砖墙而逃遁。强大的前爪使穿山甲得益不少，但因爪过于长大，以致使前肢的掌无法着地，只能把爪子弯过来用爪背着地走路，显得极不方便。

由于穿山甲世代都以蚁类为食，因此它的牙完全退化了，下颌骨只剩下左右两条分离的骨签，嘴变成了一个小圆洞。但舌头却很长且富有粘液，当它捕食蚁类时，先以强大的爪抓破蚁巢，再用长舌伸入巢中粘食蚁类。

穿山甲多在山脚或丘陵地带掘洞而居，洞深数米，末端有巢，洞口有大量泥土堆积，猎人常根据这种特点来找它。冬末春初产1—2仔于巢中。幼仔鳞片很软，色淡，以后才逐渐变硬、并变为暗褐色，老年转为橙红色。因此常被误认为有铁甲和铜甲两种。

穿山甲在广西各地均有分布。

穿山甲嗜吃白蚁，对农、林业都有益；它的甲片又是传统的中药，有通经、催乳、消肿、止疼的功能；肉味鲜美，可供食用。



水 獭


水獭与黄鼠狼的亲缘关系较近，同属于食肉目鼬科。身体细长、四肢短小、勇猛而灵活。一只成年的水獭体重近10公

斤。暗褐色，颊及唇浅灰色。头较扁平，尾呈渐尖形。极善于游泳。食性较杂，包括鱼、蛙、鸟、鼠等。最喜欢捕食鱼类，而且捕杀量很大，它们毫无倦意地捕杀鱼类，似乎以此作为游戏，因而对养鱼业有一定危害。但有的渔民将幼水獭驯养调教，使它替人捕鱼，每天的收获量还是相当可观的。

水獭的毛非常致密、短而齐整，根根针毛都油光水亮，哪怕倒一杯水上去，只要轻轻一抖，便可将水抖得一干二净。保暖性强，即是在严寒的冬天，只要穿上一件水獭皮的大衣，便会感到春意盎然。水獭的毛皮质轻柔而坚韧，毛色美观大方，可制名贵的毛皮衣物，经济价值很高。

水獭的交配期较长，每年从3月至10月，有的年产2胎。怀孕期约2个月。每胎产仔2—5个。幼仔生后1个月才开眼，两个月后母水獭开始教学游泳，起初有的小水獭看见水就怕，站在岸边寸步不前，这时母水獭便水上水下地忙个不休，又是示范又是催促，有时甚至把胆怯的小水獭背到水中去，直到它们完全学会为止。3个月后，小水獭就能独立生活了。

广西的水獭数量虽不算多，但确有两种，一种是普通水獭，指、趾之间有发达的蹼，群众称为“鸭子脚”；另一种比前者体形较小，毛色较浅，爪子很小，名小爪水獭，群众称为“狗爪脚”。在广西小爪水獭的数量远比普通水獭为少。



大灵猫与小灵猫



灵猫是一群吻尖、体长、四肢短的食肉类动物，在广西有大灵猫与小灵猫两种。前者体重近10公斤，棕灰色，颈侧有3条黑纹，其间夹有两条宽的白纹。尾长，有4个白色和5个黑色环纹，又名五端虎或九节狸。后者体重在5公斤以下，暗棕灰色，背中央有几条黑色纵纹，体侧有黑斑，尾有黑白相间的环纹，其黑环为7—9个，故又叫七间狸。

在大灵猫和小灵猫的肛门附近都各有一对隆起的分泌腺，其分泌物叫灵猫香。这种分泌物具有一种恶臭，当它们遇到敌人时，可以大量分泌用以御敌。但这种分泌物经过人工精炼即成定香剂。掺有这种定香剂的香水，香味浓馥而持久。灵猫香在医药上的功用与麝香相似。灵猫的皮肤可制衣、领、褥。小灵猫的皮肤在商业上叫狸子皮，比较珍贵。针毛可制笔、刷，故又名笔猫。我国人工饲养灵猫用来取香已有悠久历史，一只成年大灵猫一年的取香量可达100克左右。大灵猫主要分布在广西的南部地区，小灵猫分布较广，而且数量较多。

灵猫平时是过“独身生活”的，居住在灌丛、混交林以及草丛中。白天多躲在洞中或高草丛中睡觉，晚上出来活动。常在林边、水畔以及村边觅食。食物包括鼠、鸟、蛙、蛇、鱼、蚯蚓、昆虫以及部分果实等。它们的嗅觉和听觉都很灵敏。走路时将爪子缩回而不发出声音，极有利于捕食。交配期多在春天，孕期约2个半月，每胎2—4个仔。



金 猫

在自然界中有很多动物，它们身体的颜色一般总是背面较深，腹面较浅，这些颜色常和它们生活的环境相协调。就尾巴来说，猫科动物尾巴的背、腹两面颜色都是一致的。但唯独金猫例外，尾巴背面的颜色与体背相同，腹面却很淡。在猫类中，金猫的体型算是最大的了，重达15公斤或更多。在眼的内上角有一条白纹，两侧镶以黑纹，身体多为暗棕色。但变异较大，有棕、棕红、橙黄甚至黑色的个体，身上还有着大小及多少不等的斑点或花纹。因之，人们还给它取了黄虎、红春豹、芝麻豹、原猫、花金猫等别名。

金猫多栖息在林木较繁茂的林沿或多岩石的地区。常独居。捕食能力强。夜间出来捕食鸟类、鸟卵、鼠类及小型有蹄类动物，也敢闯进村里盗食家禽及家畜。故有黄虎之称。由于性情悍野，在人工饲养下难以成活，更难驯化。成年的金猫被捕获后，虽经较长时间的驯养，但依旧保持夜间活动的本性，看见人时还要龇牙咧嘴以示威吓。金猫多在春季交配，怀孕期约3个月，常产1—3仔于树洞中，寿命约10余年。

金猫在我国仅分布于南方几省，数量很少，在广西的北部较南部更少，为稀有展出动物之一。由于濒临绝迹，应该禁止狩猎，给予保护。

