

全国卫生专业技术资格考试

内科学专业主治医师 资格考试习题集

中国协和医科大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

· 全国卫生专业技术资格考试内科学专业主治医师资格考试习题集/本书专家组编. - 北京:
中国协和医科大学出版社, 2003.3

ISBN 7-81072-371-5

I. 全… II. 全… III. 内科学-医师-资格考核-习题 IV. R5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 010433 号

全国卫生专业技术资格考试 内科学专业主治医师资格考试习题集

编 者: 本书专家组 编
责任编辑: 谢 阳

出版发行: 中国协和医科大学出版社
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com
经 销: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 北京竺航印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开
印 张: 24
字 数: 450 千字
版 次: 2003 年 3 月第一版 2003 年 3 月第一次印刷
印 数: 1—5000
定 价: 41.50 元

ISBN 7-81072-371-5/R·366

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

编者的话

为提高卫生专业技术人员队伍素质，向公众提供高质量的卫生服务，保障人民生命安全，建立客观、公正的人才评价机制，促进人才的合理流动，人事部、卫生部决定临床医学初、中级资格实行全国统一考试，为各地、各部门及用人单位提供卫生专业技术人才评价的服务。为了配合卫生专业技术资格考试，帮助广大临床医师能够在繁忙的临床工作的同时，系统而全面复习考试所需要的知识，我们组织国内多家医学院校、临床医院的专家学者共同编写了这套《主治医师资格考试习题集》。本套丛书的特点是：严格按照全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度编写，以高等医药院校规划教材为蓝本，以临床为重点，侧重于知识理论的综合运用，并结合作者多年的临床体会、教学经验以及近年学科的新技术、新进展，内容选择力求做到重点明确，难点突出，题目由浅至深，涉及范围广泛，题量大，适合广大考生全面复习，深入理解，扎实掌握，从容应考。

根据卫生专业技术资格考试专业目录，内科学专业开考内科学、心血管内科学、呼吸内科学、消化内科学、肾内科学、神经内科学、内分泌学、血液病学、结核病学、传染病学、风湿与临床免疫学、职业病学等专业，据此本习题集也相应按专业分章，以使考生既可全面复习，又能有针对性的进行强化训练。

本习题集包括四类题型：

(1) 题型一：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择出一个最佳答案 (A1、A2 型题)。

(2) 题型二：提供若干案例，每个案例下设若干个考题，根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案 (A3、A4 型题)。

(3) 题型三：提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个与问题关系密切的答案 (B1、B2 型题)。

(4) 题型四：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择备选答案中二个或二个以上的所有正确答案 (X 型题)。

本习题集不仅适合主治医师资格考试复习，也适用于研究生入学及本科生复习考试使用。随着我国对卫生人才评价、使用的标准不断地科学与规范，卫生专业技术资格考试的水平也将不断地提高，我们将根据情况，对本书进行不断地更新与完善，我们真诚欢迎广大读者对本书提出自己的意见与建议，共同为促进我国医师综合素质的提高做出积极的贡献。祝阅读本书的读者通过努力取得优异成绩！

本书专家编写组

目 录

内科学基础（常见症状与体征）	（ 1 ）
心血管内科学	（ 37 ）
呼吸内科学	（ 79 ）
肾内科学	（ 136 ）
消化内科学	（ 171 ）
神经内科学	（ 204 ）
血液病学	（ 227 ）
内分泌学	（ 259 ）
传染病学	（ 298 ）
风湿与临床免疫学	（ 329 ）
职业病学	（ 353 ）

内科学基础（常见症状与体征）

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择出一个最佳答案。

1. 体温 39℃ 以上，一昼夜间温差大于 2℃，但最低点仍高于正常水平的体温曲线类型属于

- A 稽留热
- B 弛张热
- C 间歇热
- D 不规则热
- E 回归热

正确答案：B

2. 体温明显升高，一昼夜间温差不超过 1℃，属于

- A 稽留热
- B 弛张热
- C 间歇热
- D 不规则热
- E 回归热

正确答案：A

3. 腋测法测量体温的正常值为

- A 36.3℃ ~ 37.2℃
- B 36.5℃ ~ 37.7℃
- C 36℃ ~ 37℃
- D 35.8℃ ~ 36.8℃
- E 36.8℃ ~ 37.8℃

正确答案：C

4. 感染性发热最常见的病原体是

- A 细菌
- B 病毒
- C 真菌
- D 立克次体

E 肺炎支原体

正确答案：A

5. 关于发热的分度（口腔温度）正确的是

- A 低热 36.5℃ ~ 37.5℃
- B 中度发热 38.0℃ ~ 39.0℃
- C 高热 38.5℃ ~ 39.5℃
- D 超高热 39.0℃ ~ 40.0℃
- E 正常 36.0℃ ~ 37.0℃

正确答案：B

6. 内源性致热源存在于

- A 单核细胞中
- B 微生物病原体中
- C 淋巴细胞中
- D 红细胞中
- E 坏死组织中

正确答案：A

7. 内源性致热源不包括下列物质

- A 淋巴细胞激活因子
- B 白细胞介素 I
- C 原胆烷醇酮
- D 抗原抗体复合物
- E 炎性渗出物

正确答案：B

8. 咳嗽无痰或其量甚少为干性咳嗽，其病因多见于

- A 肺脓肿
- B 慢性支气管炎
- C 大叶性肺炎
- D 急性咽喉炎
- E 肺结核空洞

正确答案：D

9. 下列哪项不是引起咳嗽的原因

- A 胸膜炎
- B 食管静脉曲张破裂出血
- C 慢性支气管炎
- D 二尖瓣狭窄致肺水肿
- E 中枢性因素

正确答案: B

10. 咯血最常见的原因是

- A 肺淤血
- B 肺炎
- C 肺结核
- D 支气管肺癌
- E 肺梗死

正确答案: C

11. 日咯血量多少时为中量

- A 50 ~ 100ml
- B 100 ~ 200ml
- C 300 ~ 500ml
- D 100 ~ 500ml
- E 大于 500ml

正确答案: D

12. 咯血与呕血的区别下述哪项不正确

- A 咯血前有咳嗽, 呕血前常有恶心症状
- B 咯血血色鲜红, 呕血常呈暗红色
- C 咯血为酸性, 呕血为碱性
- D 咯血较少伴有黑便, 呕血常有
- E 咯血常混有痰液, 呕血则混有食物残渣

正确答案: C

13. 抢救大咯血窒息时最关键的措施是

- A 立即输血
- B 立即吸氧
- C 呼吸兴奋剂
- D 立即解除呼吸道梗阻
- E 人工呼吸

正确答案: D

14. 周围血中还原血红蛋白浓度为多少时出现发绀

A > 20g/L

B > 30g/L

C > 50g/L

D > 70g/L

E > 100g/L

正确答案: C

15. 发绀的决定性因素是

- A 心脏有右向左分流
- B 心功能衰竭
- C 红细胞数量
- D 血液中还原血红蛋白的绝对量
- E 血压过低

正确答案: D

16. 下列各种常见的胸痛其疼痛性质叙述错误的是

- A 心绞痛——压榨性
- B 带状疱疹——刀割样或灼痛
- C 食管炎——绞痛
- D 干性胸膜炎——尖锐刺痛
- E 肺梗死——剧烈刺痛伴呼吸困难

正确答案: C

17. 下列哪项可导致吸气性呼吸困难

- A 急性喉炎
- B 支气管哮喘
- C 喘息性慢性支气管炎
- D 慢性阻塞性肺气肿
- E 左心功能不全

正确答案: A

18. 左心功能不全呼吸困难产生的最主要因素是

- A 肺泡弹性减退, 肺活量减少
- B 肺淤血使气体弥散功能降低
- C 肺泡张力增高, 反射兴奋呼吸中枢
- D 右心房与上腔静脉压升高
- E 血氧含量减少, 乳酸、丙酮酸积聚刺激呼吸中枢

正确答案: B

19. 下列哪项不是夜间阵发性呼吸困难的发

作原因

- A 睡眠时迷走神经兴奋性增高
- B 迷走神经兴奋，使冠状动脉收缩，心肌供血不足
- C 仰卧时肺活量减少
- D 卧位时下半身静脉回流量增多
- E 血中酸性代谢产物刺激呼吸中枢

正确答案：E

20. 在引起呼吸困难的病因中，下列因素除外

- A 胸腔积液
- B 肺栓塞
- C 肺气肿
- D 急性呼吸窘迫综合征
- E 支气管炎

正确答案：E

21. 右心衰竭时呼吸困难的机制，主要为

- A 迷走神经兴奋性增高
- B 心肌供血减少
- C 右心房及上腔静脉压力升高
- D 下肢静脉回流增多
- E 肺淤血

正确答案：C

22. 伴三凹征的呼吸困难，出现于下列哪种情况

- A 呼气性呼吸困难
- B 吸气性呼吸困难
- C 神经官能症
- D 中毒性呼吸困难
- E 脑膜炎

正确答案：B

23. 呼气性呼吸困难见于

- A 支气管哮喘
- B 气管异物
- C 气管肿瘤
- D 喉头水肿
- E 白喉

正确答案：A

24. 水肿产生的机制不包括

- A 钠、水潴留
- B 毛细血管滤过压降低
- C 毛细血管通透性增高
- D 血浆胶体渗透压降低
- E 淋巴液或静脉回流受阻

正确答案：B

25. 粘液性水肿患者，水肿主要表现为

- A 身体下垂部分
- B 眼面
- C 全身
- D 胸腔
- E 腹腔

正确答案：B

26. 肝源性水肿患者，水肿主要表现为

- A 下肢
- B 全身
- C 眼睑
- D 胸腔
- E 腹腔

正确答案：E

27. 尿毒症性全身水肿患者下列哪项体征几乎不出现

- A 心脏收缩期杂音
- B 肾区叩痛
- C 胸水体征
- D 心包积液体征
- E 肝颈静脉回流征阳性

正确答案：E

28. 全身性水肿伴胸腹水患者，下列哪项诊断不予考虑

- A 肺心病心衰
- B 晚期肝硬化
- C 营养不良
- D 肾病综合征
- E 血栓性静脉炎

正确答案：E

29. 人体呕吐中枢位于

- A 大脑皮层
- B 延髓外侧网状结构背面
- C 延髓第四脑室的底面
- D 丘脑
- E 脑桥

正确答案: B

30. 颅内高压症所致呕吐的特点是

- A 喷射性, 无恶心, 呕吐后不轻松
- B 喷射性, 有恶心, 呕吐后轻松
- C 喷射性, 无恶心, 呕吐后轻松
- D 非喷射性, 有恶心, 呕吐后轻松
- E 非喷射性, 无恶心, 呕吐后不轻松

正确答案: A

31. 下列哪项属于反射性呕吐

- A 洋地黄中毒
- B 妊娠
- C 尿毒症
- D 急性肝炎
- E 脑膜炎

正确答案: D

32. 关于牵涉痛, 下列哪种说法不正确

- A 十二指肠溃疡穿孔可放射至背部
- B 急性胰腺炎疼痛可放射至腰背部
- C 心绞痛可放射到右肩
- D 胆绞痛可放射至右肩
- E 肾绞痛常沿腹直肌边缘向腹股沟放射

正确答案: C

33. 以下疾病, 哪项不是急性腹痛的病因

- A 急性胰腺炎
- B 尿毒症
- C 过敏性紫癜
- D 泌尿系结石
- E 肠扭转

正确答案: B

34. 腹痛常放射至右肩的疾病是

- A 胰腺疾病
- B 消化性溃疡

- C 急性胃炎
- D 胆系疾病
- E 心绞痛

正确答案: D

35. 在左侧卧位时腹痛可减轻, 这种情况常见于下列哪种疾病

- A 胃粘膜脱垂
- B 胰腺癌
- C 急性胆囊炎
- D 急性胃炎
- E 阑尾炎

正确答案: A

36. 消化性溃疡常伴有下列哪种症状

- A 反酸、暖气
- B 呕吐
- C 腹泻
- D 便秘
- E 腰背放射性疼痛

正确答案: A

37. 下列哪种疾病不属于急腹症

- A 胃穿孔
- B 肝破裂
- C 胆系蛔虫症
- D 肠扭转
- E 铅中毒

正确答案: E

38. 慢性腹泻是指

- A 腹泻持续或反复发作超过 2 周者
- B 腹泻持续或反复发作超过 20 天者
- C 腹泻持续或反复发作超过 1 个月者
- D 腹泻持续或反复发作超过 2 个月者
- E 腹泻持续或反复发作超过半年者

正确答案: D

39. 胃酸分泌增多引起的腹泻是

- A 胃泌素瘤
- B 大部分肠切除术后
- C 服甘露醇
- D 服用乳果糖

E 肠易激综合征

正确答案：A

40. 盐类泻药导泻的机制是

- A 造成肠粘膜吸收障碍
- B 使肠腔内渗透压增高
- C 使肠粘膜分泌增多
- D 促进肠蠕动增快
- E 以上都不是

正确答案：B

41. 正常人每 24 小时进入小肠的液体量约为

- A 2L
- B 4L
- C 6L
- D 7L
- E 9L

正确答案：E

42. 下列慢性腹泻的病因中属于感染性因素的是

- A 溃疡性结肠炎
- B 缺血性肠炎
- C 憩室炎
- D 肠结核
- E 克罗恩（Crohn）病

正确答案：D

43. 上消化道出血最常见的病因是

- A 消化性溃疡
- B 急性胃粘膜病变
- C 食管胃底静脉曲张
- D 贲门粘膜撕裂症
- E 食管癌

正确答案：A

44. 上消化道出血呕出的血常呈咖啡样，这是因为

- A 血液与胃内食物混合所致
- B 血液与胃内粘液混合所致
- C 血液经胃酸作用而形成正铁血红蛋白所致

D 鲜血与唾液混合所致

E 血红蛋白的铁经硫化物作用生成硫化铁

正确答案：C

45. 下列疾病引起出血，除哪项外均属于上消化道出血

- A 出血性小肠炎
- B 胃癌
- C 胰腺癌
- D 食管裂孔疝
- E 十二指肠球部溃疡

正确答案：A

46. 下列哪个部位出血可见柏油样便

- A 十二指肠球部
- B 回盲部
- C 结肠
- D 直肠
- E 肛门

正确答案：A

47. 关于上消化道出血方式，哪种说法是不正确的

- A 幽门以下出血常表现黑便
- B 幽门以下出血量多时可引起呕血
- C 幽门以上出血常兼有呕血和黑便
- D 幽门以上出血量少时可以无呕血
- E 上消化道出血的方式与出血部位无关

正确答案：B

48. 呕血与咯血的鉴别，下列哪种说法不对

- A 呕血多呈咖啡色，咯血呈鲜红色
- B 呕血前常有恶心，咯血前常有咳嗽
- C 呕血者，多伴柏油样便
- D 呕血者，呕吐物内往往混有食物残渣
- E 呕血呈碱性，咯血呈酸性

正确答案：E

49. 急性上消化道大量出血是指

- A 24 小时内失血量超过 200ml 或循环

血量的 5%

- B 24 小时内失血量超过 500ml 或循环血量的 10%
- C 24 小时内失血量超过 1000ml 或循环血量的 10%
- D 24 小时内失血量超过 1000ml 或循环血量的 20%
- E 24 小时内失血量超过 2000ml 或循环血量的 20%

正确答案: D

50. 排便带血, 鲜红色, 不与粪便混合, 粘附于粪便表面, 常见于
- A 直肠息肉
 - B 阿米巴痢疾
 - C 血吸虫病
 - D 急性细菌性痢疾
 - E 结肠克罗恩病

正确答案: A

51. 粪便肉眼观呈果酱样脓血便, 病因多为
- A 阿米巴痢疾
 - B 出血性小肠炎
 - C 痔疮
 - D 急性菌痢
 - E 直肠息肉

正确答案: A

52. 消化性溃疡活动期大便隐血阳性提示每天出血量不少于
- A < 1ml
 - B 2~3ml
 - C 3~4ml
 - D 5ml
 - E 10ml

正确答案: D

53. 柏油样便提示哪部分出血
- A 结肠
 - B 回盲部
 - C 回肠
 - D 上消化道出血

E 以上均不是

正确答案: D

54. 血清碱性磷酸酶明显升高, 可见于哪种黄疸
- A 肝细胞性黄疸
 - B 阻塞性黄疸
 - C Roter 综合征引起的黄疸
 - D Gilbert 综合征引起的黄疸
 - E 溶血性黄疸

正确答案: B

55. Dubin - Johnson 综合征属于
- A 先天性溶血性黄疸
 - B 血清内非结合胆红素升高
 - C 缺乏葡萄糖醛酸转移酶
 - D 肝细胞对某些阴离子排泄障碍
 - E 核黄疸的主要病因

正确答案: D

56. 溶血性黄疸的病因有以下几项, 除外
- A 遗传性球形红细胞增多症
 - B 恶性疟疾
 - C 蚕豆病
 - D 蛇毒中毒
 - E 四氯化碳中毒

正确答案: E

57. 关于结合胆红素哪项是错误的
- A 结合胆红素是葡萄糖醛酸酯
 - B 非结合胆红素于肝细胞光面内质网中与葡萄糖醛酸结合
 - C 结合胆红素不能由肾小球滤出
 - D 结合胆红素是水溶性的
 - E 结合胆红素可以出现在尿内

正确答案: C

58. 旁路胆红素约占体内总胆红素来源的
- A 1%~5%
 - B 5%~10%
 - C 10%~15%
 - D 15%~20%
 - E 20%~25%

正确答案: D

59. 体内胆红素来源于以下各项, 除外

- A 衰老的红细胞的血红蛋白
- B 骨髓未成熟红细胞的血红蛋白
- C 肌红蛋白
- D 碱性磷酸酶
- E 肝游离血红素

正确答案: D

60. 隐性黄疸时, 血中胆红素浓度为

- A $< 17\mu\text{mol/L}$
- B $> 17\mu\text{mol/L}$, $< 32\mu\text{mol/L}$
- C $> 32\mu\text{mol/L}$
- D $> 34\mu\text{mol/L}$
- E $> 17\mu\text{mol/L}$, $< 34\mu\text{mol/L}$

正确答案: E

61. 血清胆红素正常值为

- A $< 34\mu\text{mol/L}$, 即 2.0mg/dl
- B $< 34\mu\text{mol/L}$, 即 1.0mg/dl
- C $< 17\mu\text{mol/L}$, 即 1.0mg/dl
- D $< 17\mu\text{mol/L}$, 即 2.0mg/dl
- E $> 17\mu\text{mol/L}$, $< 34\mu\text{mol/L}$

正确答案: C

62. 以下哪项是完全性阻塞性黄疸的表现

- A 尿胆原 (-), 尿胆红素 (-)
- B 尿胆原 (+), 尿胆红素 (-)
- C 尿胆原 (-), 尿胆红素 (+)
- D 尿胆原 (+), 尿胆红素 (+)
- E 以上都不是

正确答案: C

63. 下列关于黄疸的叙述, 哪项是不正确的

- A 眼结膜下脂肪积聚, 往往分布不均匀
- B 胡萝卜血症可引起皮肤黄染, 巩膜不黄
- C 胡萝卜血症可引起巩膜黄染, 皮肤不黄
- D 假性黄疸时血清胆红素浓度正常
- E 黄疸患者巩膜黄染, 首先出现在角

膜外周

正确答案: C

64. 平卧位时叩诊移动性浊音阳性, 腹水量至少已达

- A 500ml
- B 1500ml
- C 2000ml
- D 1000ml
- E 2500ml

正确答案: D

65. 肝硬化腹水患者的腹部外形是

- A 腹平坦
- B 局部膨隆
- C 舟状腹
- D 蛙状腹
- E 尖腹

正确答案: D

66. 下列哪种腹水不属于漏出性腹水

- A 肝源性
- B 心源性
- C 肾源性
- D 炎症性
- E 营养性

正确答案: D

67. 肝硬化大量腹水患者, 检查肝脏时应采用下列哪种触诊法

- A 冲击触诊法
- B 钩指触诊法
- C 双手触诊法
- D 浅部触诊法
- E 深压触诊法

正确答案: A

68. 关于腹水的叙述, 下列哪项是错误的

- A 血浆蛋白低于 25g/L 常出现腹水
- B 腹腔内血液 95% 经门静脉回流到体循环
- C 慢性右心功能不全时腹水为漏出液
- D 结核性腹膜炎腹水为渗出液

E 丝虫病常可引起血性腹水

正确答案: E

69. 腹腔穿刺抽液最常用部位为

A 右下腹脐与髂前上棘连线的中外 1/3 处

B 左下腹脐与髂前上棘连线的中外 1/3 处

C 下腹脐与髂前上棘连线的内 1/3 处

D 压痛最明显的部位

E 下腹正中

正确答案: B

70. 匀称体形正常人肝相对浊音界叩诊位置, 下述哪项是错误的

A 右锁骨中线第 5 肋间

B 右锁骨中线第 6 肋间

C 右腋中线第 8 肋间

D 右肩胛线第 10 肋骨水平

E 肝绝对浊音界比相对浊音界低 1~2 肋间

正确答案: C

71. 肝肿大伴扩张性搏动见于

A 严重的门静脉高压

B 二尖瓣关闭不全

C 主动脉瓣关闭不全

D 肝脓肿

E 三尖瓣关闭不全

正确答案: E

72. 关于肝脏触诊哪项是错误的

A 触诊须严密配合呼吸动作

B 触诊较多应用单手触诊法

C 肝脏位置较深时应用冲击触诊法

D 正常肝脏大小多在肋下 1cm 以内

E 正常肝脏多在剑下 3~5cm 以内

正确答案: C

73. 下列疾病, 哪项不出现肝脏肿大

A 慢性肝炎

B 亚急性肝坏死

C 脂肪肝

D 白血病

E 血吸虫病

正确答案: B

74. 下列哪项不属于淤血性肝肿大

A Budd - Chiari 综合征

B 心包炎

C 心包积液

D 慢性右心功能不全

E 肝内胆汁淤积

正确答案: E

75. 常出现淋巴结坏死破溃形成瘰管的疾病是

A 慢性淋巴结炎

B 淋巴瘤

C 结节病

D 淋巴结结核

E 恶性肿瘤淋巴结转移

正确答案: D

76. 检查淋巴结肿大时, 应优先注意弄清楚

A 大小、数量及活动度

B 硬度及有无压痛

C 原发病灶

D 有无红肿及粘连

E 有无瘢痕及瘰管

正确答案: C

77. 下列哪种情况可引起全身淋巴结肿大

A 急性咽炎

B 慢性鼻炎

C 淋巴结结核

D 再生障碍性贫血

E 足癣并感染

正确答案: C

78. 下列哪项一般不会引起全身淋巴结肿大

A 淋巴瘤

B 链霉素过敏

C 白血病

D 传染性单核细胞增多症

E 再生障碍性贫血

正确答案：E

79. 下列哪项是正确检查滑车上淋巴结的手法

- A 左手扶托患者的左前臂以右手向滑车上由浅入深进行触摸
- B 左手扶托患者的左前臂以右手向鹰嘴下由浅入深进行触摸
- C 左手扶托患者的左前臂以右手向鹰嘴上由浅入深进行触摸
- D 患者左前臂屈曲，检查者以左手向滑车上由浅入深进行触摸
- E 患者左前臂伸直，检查者以左手向滑车上由浅入深进行触摸

正确答案：A

80. Virchow 淋巴结指的是

- A 颈深淋巴结
- B 胸锁乳突肌上淋巴结
- C 右锁骨上淋巴结
- D 左锁骨上淋巴结
- E 耳后淋巴结

正确答案：D

81. 下列哪组淋巴结肿大见于脚气合并感染

- A 腠窝淋巴结
- B 腋窝淋巴结
- C 腹股沟淋巴结
- D 颌下淋巴结
- E 锁骨上淋巴结

正确答案：C

82. 过敏性紫癜最常见的类型为

- A 腹型
- B 关节型
- C 肾型
- D 紫癜型
- E 混合型

正确答案：D

83. 特发性血小板减少性紫癜急性型与慢性型的区别，下述哪项不正确

- A 急性型多见于儿童，慢性型多见于

青年

- B 急性型常有感染诱因，慢性型诱因不明显

- C 急性型血小板计数在 $(30 \sim 80) \times 10^9/L$ ，慢性型多 $< 20 \times 10^9/L$

- D 急性型起病突然，慢性型起病缓慢

- E 急性型病程短，常可自行缓解；慢性型多反复发作，无自行缓解

正确答案：C

84. 关于脾肿大的分级，以下哪项正确

- A 中度肿大——深吸气时，脾下缘超出左肋缘 3cm 至脐平线

- B 中度肿大——深吸气时，脾下缘超出脐平线

- C 高度肿大——深吸气时，脾下缘超出肋前上棘连线

- D 轻度肿大——深吸气时，脾下缘超出左肋缘 1cm 以内

- E 中度肿大——深吸气时，脾下缘超出左肋缘 1 ~ 2cm

正确答案：A

85. 重度脾肿大的标准

- A 脾肋下 2cm

- B 脾肋下 $> 2cm$ ，在脐平以上

- C 脾肋下 $> 5cm$ ，在脐平以上

- D 脾脏达脐平，但未超过

- E 脾大，超过前正中线

正确答案：E

86. 正常成人 24 小时尿量为

- A 500 ~ 1500ml

- B 1000 ~ 1500ml

- C 1000 ~ 2000ml

- D 1500 ~ 2500ml

- E 2000 ~ 2500ml

正确答案：C

87. 无尿是指 24 小时尿量少于

- A 30ml

- B 50ml

- C 75ml
- D 100ml
- E 200ml

正确答案: D

88. 多尿是指 24 小时尿量超过

- A 2000ml
- B 1500ml
- C 2500ml
- D 3500ml
- E 4500ml

正确答案: C

89. 少尿是指 24 小时尿量少于

- A 600ml
- B 500ml
- C 400ml
- D 300ml
- E 200ml

正确答案: C

90. 正常成人的尿比重为

- A 1.010 ~ 1.020
- B 1.101 ~ 1.015
- C 1.015 ~ 1.020
- D 1.015 ~ 1.025
- E 1.020 ~ 1.025

正确答案: D

91. 正常情况下, 肾小管将吸收肾小球滤过液总量的多少

- A 10%
- B 1%
- C 90%
- D 99%
- E 50%

正确答案: D

92. 每分钟肾血流约占心排出量的

- A 1/2
- B 1/3
- C 1/4
- D 1/5

- E 1/6

正确答案: C

93. 尿路刺激征的主要原因为

- A 泌尿系肿瘤
- B 异物
- C 药物如环磷酰胺等
- D 尿路感染
- E 放射线照射

正确答案: D

94. 尿频的定义是

- A 每次尿量增多
- B 夜尿次数增多
- C 排尿次数增多而每次尿量减少
- D 有尿意即迫不及待要排尿而不能自控
- E 以上都不是

正确答案: C

95. 偏头痛最常见的类型是

- A 偏瘫性头痛
- B 眼肌瘫痪型偏头痛
- C 典型偏头痛
- D 普通型偏头痛
- E 基底动脉型偏头痛

正确答案: D

96. 预防偏头痛发作的常用药物是

- A 地西泮
- B 消炎痛
- C 苯噻啶
- D 麦角胺
- E 英明格

正确答案: C

97. 偏头痛发作时, 常用的药物是

- A 苯噻啶
- B 普萘洛尔
- C 硝苯吡啶
- D 甲基麦角酸丁醇酰胺
- E 咖啡因麦角胺

正确答案: E

98. 确定深昏迷最有价值的体征是

- A 全身深浅反射消失
- B 生命体征有改变
- C 呼之不应
- D 眼球固定
- E 对外界刺激无反应

正确答案：A

99. 关于嗜睡下列哪项不正确

- A 为病理性持续睡眠
- B 可有定向障碍
- C 针刺能使之转醒
- D 可以发生错觉
- E 对言语无反应

正确答案：E

100. 下列各脏器的表现哪项不符合多器官功能衰竭的诊断标准

- A 心血管——心电图明显失常，收缩压 $< 10.6\text{kPa}$ 或低于平素血压的 $2/3$ ，需要药物支持
- B 肺——呼吸率 > 28 次/分，呼吸困难，烦躁，需吸氧支持
- C 肾——每小时尿量 $< 20\text{ml}$ ，或尿量持续增多
- D 血液——皮肤出血斑点，胃肠出血、咯血
- E 脑——意识障碍（Glasgow 平分 < 7 ）、瞳孔反应等失常

正确答案：B

101. 引起心源性休克最常见的病因是

- A 急性肺动脉栓塞
- B 急性心肌梗死
- C 扩张型心肌病
- D 急性肺水肿
- E 急性心脏压塞

正确答案：B

102. 下列哪项为早期休克的表现

- A 血压 $11.97/9.31\text{kPa}$ ($90/70\text{mmHg}$)
- B 尿量显著减少

C 肢端冰冷

D 表情淡漠

E 脉搏 $100 \sim 120$ 次/分

正确答案：A

103. 估计血容量最好的指标是

- A 中心静脉压
- B 动脉收缩压
- C 动脉舒张压
- D 脉压
- E 肺毛细血管楔压

正确答案：A

104. 女性，20岁，持续高热1周，胸、腹部出现皮疹，经检查确诊为伤寒，其皮疹特征为

- A 红色不凸出皮肤
- B 压之不褪色
- C 呈红色出血点
- D 直径 $> 2\text{cm}$
- E 呈粉红色丘疹

正确答案：E

105. 男性20岁，高热、寒战、咳嗽、咳铁锈样痰4天，X线胸片示右下肺中等密度片状阴影，其周围血象变化可能为

- A 中性粒细胞数增高
- B 淋巴细胞数增高
- C 嗜酸性粒细胞数增高
- D 嗜碱性粒细胞数增高
- E 单核细胞增多

正确答案：A

106. 男性，20岁，受凉后高热5天，咳嗽，咳铁锈色痰。检查：血白细胞数增高，胸片呈右上叶片状阴影，首选抗生素为

- A 青霉素
- B 红霉素
- C 庆大霉素
- D 头孢唑啉钠

E 丁胺卡那霉素

正确答案: A

107. 女性, 50岁, 一天来寒战、高热(体温 39.6℃), 咳嗽伴左胸痛, 咳痰呈砖红色胶冻状, 量多, 查体: 轻度发绀, 血压 10.7/6.7kPa (80/50mmHg), 右肺叩浊音, 呼吸音低。X线胸片右肺呈多发性蜂窝状阴影, 最可能的诊断为

A 大叶性肺炎, 休克型
B 克雷白杆菌肺炎
C 厌氧菌肺炎
D 军团菌肺炎
E 支原体肺炎

正确答案: B

108. 某糖尿病患者, 女性, 58岁, 突发高热、寒战、左胸痛, 咳嗽, 咳多量黄脓性带血丝性痰液。X线显示右下肺叶实变, 并多个液气囊腔。最可能的诊断是

A 干酪性肺炎
B 支原体肺炎
C 葡萄球菌性肺炎
D 克雷白杆菌性肺炎
E 大叶性肺炎

正确答案: C

109. 患者, 男性, 24岁, 低热、盗汗、乏力 6个月, 咳嗽痰中带血, 诊断考虑

A 慢性支气管炎
B 支气管扩张
C 肺结核
D 肺炎
E 结节病

正确答案: C

110. 女性, 23岁, 患肺结核 3年, 低热、咳嗽, 痰中带血, 2小时前突然大咯血不止, 急诊抢救措施首选为

A 镇静剂
B 吸氧

C 输血、补液

D 呼吸兴奋剂

E 血管升压素(又称垂体后叶素)

正确答案: E

111. 女性, 58岁, 夜间从噩梦中醒来, 感胸骨后压榨性闷痛, 伴呼吸困难, 胸痛及呼吸困难持续不能缓解, 患者出现面色苍白, 冷汗淋漓, 血压明显下降, 皮肤发绀, 此发绀属于

A 缺血性发绀
B 淤血性发绀
C 混合性发绀
D 心性混血性发绀
E 肺性发绀

正确答案: A

112. 女性, 56岁, 剧烈持续胸痛 6小时入院。心电图示 V_1 - V_6 ST段明显上抬。双肺闻及湿性啰音, 首选下列哪组治疗

A 哌替啶(原称度冷丁), 氢氯噻嗪(原称双氢克尿塞), 西地兰
B 硝酸甘油, 多巴酚丁胺, 低分子右旋糖酐
C 吗啡, 呋塞米(原称速尿), 多巴酚丁胺
D 毒毛旋花子苷 K, 呋塞米(原称速尿), 倍他洛克
E 哌替啶, 氨茶碱, 低分子右旋糖酐

正确答案: C

113. 男性, 56岁, 平卧时频发胸痛, 心率 110次/分, 血压升高至 165/95 mmHg, 并有左室舒张功能减退。首选哪种药治疗

A 卡托普利
B 维拉帕米
C 美多洛尔
D 硝苯吡啶
E 地高辛

正确答案: C

114. 患者, 男性, 72 岁, 常于休息或熟睡时发生心前区疼痛, 不易被硝酸甘油所缓解。此心绞痛为

- A 变异型心绞痛
- B 中间综合征
- C 卧位心绞痛
- D 恶化型心绞痛
- E 混合性心绞痛

正确答案: C

115. 男性, 4 岁, 在独自游戏时突然出现呼吸困难, 吸气时胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷, 其病因最可能是

- A 急性上呼吸道感染
- B 自发性气胸
- C 支气管哮喘
- D 气管异物
- E 脑外伤

正确答案: D

116. 女性, 38 岁, 剧烈咳嗽后突然出现呼吸困难, 胸透显示左侧气胸, 查体可出现的体征有

- A 语颤增强
- B 叩诊过清音
- C 呼吸音消失
- D 左侧布满湿啰音
- E 肋间隙吸气性凹陷

正确答案: C

117. 女性, 32 岁, 间断四肢关节疼痛 5 年, 近来感乏力、食欲不振、心悸、气短, 肝肋下一指, 轻触痛。查血红蛋白 96g/L, 尿蛋白 (+); 双下肢轻度水肿, 其原因可能为

- A 肝硬化
- B 慢性肾炎
- C 二尖瓣狭窄致右心衰
- D 粘液性水肿
- E 营养不良

正确答案: C

118. 男性, 28 岁。近 2 年反复发作左下肢红、肿、痛、热, 用抗生素可缓解。查体: 二尖瓣区可闻及舒张期隆隆样杂音; 左下肢肿胀, 压之无痕, 局部皮肤发红、皮温高; 右下肢无异常。其肿胀的原因是

- A 静脉炎所致水肿
- B 血丝虫病所致象皮肿
- C 慢性淋巴管炎所致水肿
- D 下腔静脉阻塞所致水肿
- E 营养不良

正确答案: C

119. 女性, 56 岁。腹胀、双下肢肿胀入院。查体: 心肺无异常, 肝肋下 2cm, 质中等, 腹部膨隆, 上腹及下胸部可见静脉显露, 双下肢水肿。实验室检查: 血清白蛋白正常。该患者水肿的原因可能是

- A 右心衰
- B 肝硬化
- C 下腔静脉阻塞
- D 上腔静脉阻塞
- E 腹腔结核

正确答案: D

120. 女性, 36 岁, 怕冷, 月经期延长, 量多, 腹胀, 全身肿胀, 以胫前为甚, 较硬。甲状腺 B 超显示 II° 肿大、肝脏肿大及脂肪肝。其皮肤肿胀的原因可能是

- A 粘液性水肿
- B 肝硬化
- C 右心衰
- D 淡漠型甲亢
- E 营养不良

正确答案: A

121. 女性, 16 岁。晚餐进食一碗剩饭。1 小时后出现上腹绞痛, 并持续性恶心、