

国家执业医师资格考试
临床助理医师考试
全真模拟及精解

《临床助理医师考试全真模拟及精解》编写组 编

● 考前实战训练

● 以国家执业医师资格考试大纲为依据

● 专家组题 全真模拟

● 内容涵盖资格考试的主要考点

助你顺利通过国家执业医师资格考试

北京医科大学出版社

国家执业医师资格考试

临床助理医师考试全真模拟及精解

《临床助理医师考试全真模拟及精解》编写组 编

北京医科大学出版社

LINCHUANG ZHULI YISHI ZIGE KAOSHI
QUANZHEN MONI JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

临床助理医师资格考试全真模拟及精解/《临床助理
医师资格考试全真模拟及精解》编写组编. —北京: 北京
医科大学出版社, 2001.3

(国家执业医师资格考试丛书)

ISBN 7-81071-192-X

I. 临… II. 临… III. 医师-资格考核-试题 IV.
R192.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 08072 号

北京医科大学出版社出版发行

(100083 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内)

责任编辑: 王凤廷

责任校对: 齐 欣

责任印制: 郭桂兰

山东省莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷 新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 13.5 字数: 341 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷 印数: 1-35000 册

定价: 23.00 元

版权所有 不得翻印

国家执业医师资格考试
临床助理医师考试全真模拟及精解

主 编 马明信 朱文玉

参编者 (按学科排序)

解 剖 学 吕证宝

生 理 学 朱文玉

生 物 化 学 梁 康

病 理 学 廖松林

药 理 学 张 远

内 科 学 马明信 谢鹏雁

外 科 学 高淑能 王维亮 刘占兵

妇 产 科 学 廖秦平

儿 科 学 马郁文 陈永红

卫 生 学 黄悦勤 王燕玲 刘宝花 易伟宁 谢 虹

医学心理学 洪 炜

医学伦理学 丛亚丽

卫 生 法 规 宋文质

出版前言

出版这套丛书的动机源自执业医师（助理医师）资格考试后的座谈会，与会的考生及有关人士一致认为这两届考试是成功的，试题内容涉及到作为合格医师必须掌握的基本理论、基本技能和相应的法规知识，对提高我国医师队伍的总体素质将起到积极的作用。但也有不少考生反映医学课程门类多，内容广泛，虽然经过较长时间的复习，临考前仍感到“心中无底，思路不清”；还有些考生对题意理解偏差而未能答对，尤其工作了多年的考生，对现行的试题题型不熟悉。基于此，为了帮助考生复习，增强应试信心；为了帮助考生熟悉试题题型，避免无谓的失误；为了帮助考生熟悉考试过程和自我测试，加强临考前的“冲刺”练习；我们组编了这套执业医师（助理医师）考试全真模拟及精解丛书，包括临床、口腔、公卫医师及助理医师共6册。

每本书的主要内容：①国家执业医师资格考试试题题型介绍及答题技巧；②三套全真模拟国家执业医师（助理医师）资格考试试卷，均是按照两届考试的试卷，在试题所侧重的知识点、各学科试题在试卷中的比重、各类题型的比例以及考试的时间要求等方面进行了全真模拟。

祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编者

目 录

考试题型介绍与答题技巧	(1)
临床执业助理医师全真模拟试卷 (一)	(4)
第一单元	(4)
第二单元	(21)
答题卡	(39)
试卷 (一) 答案及试题分析	(43)
第一单元	(43)
第二单元	(57)
临床执业助理医师全真模拟试卷 (二)	(73)
第一单元	(73)
第二单元	(90)
答题卡	(109)
试卷 (二) 答案及试题分析	(113)
第一单元	(113)
第二单元	(126)
临床执业助理医师全真模拟试卷 (三)	(142)
第一单元	(142)
第二单元	(159)
答题卡	(177)
试卷 (三) 答案及试题分析	(181)
第一单元	(181)
第二单元	(195)

考试题型介绍与答题技巧

1999年、2000年两届国家医师资格考试采用的题型有A型题和B型题。A型题中，A1、A2、A3、A4型题均出现了；B型题中只出现了B1型题。现分别介绍如下：

一、A1型题

A型题属于最佳选择题类型。A1型题为单个最佳选择题，每道题由1个题干和5个备选答案组成（见例题1）。要求应考者找出1个符合题干要求的最佳或恰当的答案，此为正确答案，其余4个则为干扰答案。5个备选答案之间往往具有比较意义，干扰答案或是完全不符合题干要求，也可以是部分符合题干要求，因此答题时应审慎选择，以排除似乎有理而实际是不合适的答案。有时在备选答案中出现“以上都不是”（见例题2），这有两种情况：①“以上都不是”作为正确答案，其他4个答案均是干扰答案，而且是绝对不符合题干要求的，真正的正确答案没有出现；②5个备选答案中已含有正确答案，而“以上都不是”只是1个干扰答案而已，答题者应慎之！在上两届试题中这类试题不多。A1型题中还有一种否定型形式，试题有多个正确答案或涉及不止1个相关问题时常采用否定型形式（见例题3）。题干中有1个特别标注的（用黑体或加着重号标注）否定词（不、不是、不能、除外、错误、无关等），要求应试者在5个备选答案中选出符合题干要求的答案，而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的，或者是最不合适的，或者是例外的，或者是用得最少的。

例题1 十二指肠大乳头位于

- A. 十二指肠上部
- B. 十二指肠降部
- C. 十二指肠水平部
- D. 十二指肠升部
- E. 十二指肠空肠曲

（2000年试题）

正确答案：B

例题2 患者从事每天日常活动即出现心悸、气短症状，休息后即缓解。其心功能分级应为

- A. 心功能Ⅰ级
- B. 心功能Ⅱ级

- C. 心功能Ⅲ级
- D. 心功能Ⅳ级
- E. 以上都不是

（2000年试题）

正确答案：B

例题3 有关胸内压的叙述，错误的是

- A. 一般情况下是负压
- B. 胸内压 = 肺内压 - 肺回缩力
- C. 胸内压有利于静脉回流
- D. 使肺维持一定的扩张程度
- E. 产生气胸时负压增大

（2000年试题）

正确答案：E

二、A2型题

A2型题是病历摘要型最佳选择题，多用于考查临床学科的知识与技能（见例题4），但基础医学与其他学科也常采用（见例题5）。试题由一个叙述性的简要病历（或其他主体）

作为题干和 5 个备选答案组成。也有否定型和“以上都不是”型。

例题 4 一位亚急性细菌性心内膜炎患者，下床活动后出现意识逐渐模糊至昏迷，并有右侧偏瘫。其最可能的原因为

- A. 肺动脉栓塞
- B. 脑动脉栓塞
- C. 心冠状动脉栓塞
- D. 右上、下肢动脉栓塞
- E. 右上、下肢静脉栓塞

(2000 年试题)

正确答案：B

例题 5 受检者端坐位，检查者用左手托住

受检者屈曲的肘部，并用左前臂托住受检者的前臂，将左手拇指按在受检者肘窝部肌腱上，然后右手持叩诊锤叩击检查者的左拇指，正常反应为肘关节快速屈曲，此反射为

- A. 腓肠肌反射
- B. 肘反射
- C. 肌腱反射
- D. 肱三头肌反射
- E. 肱二头肌反射

(2000 年试题)

正确答案：E

三、A3/A4 型题

A3 型题为病历组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床病例，然后在病例下提出若干道考题，每道考题均与病例有关，但测试点不同，各考题之间相互独立（见例题 6）。每道考题备有 5 个备选答案，要求选择 1 个最佳的答案，其余的答案可以是错误的，也可以是部分正确的，但只能有 1 个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3 型题多用来考查临床学科的知识技能，但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识技能。

A4 型题为病历串型最佳选择题，试题的结构类似 A3 型题，也是先叙述 1 个临床病例，然后提出若干个相关的问题，与 A3 型题不同的是当病情逐渐展开时，可逐步增加新的信息（见例题 7）。每个问题均与开始叙述的临床病例有关，又与随后增加的信息有关，所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4 型题中的每个问题也有 5 个备选答案，要求找出 1 个最佳的答案，其余的备选答案可以是部分正确，也可以是错误的。A4 型题也有否定型形式，否定词下常用着重号标出以提醒应试者。

例题 6 (1~2 题共用题干)

女性，24 岁，近日发现左膝关节疼痛，行走困难，休息缓解，自觉左小腿上内似有肿块，压痛。查体：左膝关节活动稍受限，胫骨上端内侧肿胀，压痛。X 线片所见左胫骨上端内侧有一肥皂泡样阴影，膨胀性生长。

1. 本例最可能的诊断是

- A. 骨结核
- B. 骨髓炎

- C. 骨坏死
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 骨软骨瘤

2. 本例适当的治疗方法是

- A. 休息、营养
- B. 广谱抗生素治疗
- C. 手术治疗
- D. 抗结核治疗
- E. 物理治疗

(2000 年试题)

正确答案: 1.D; 2.C

例题 7 (1~5 题共用题干)

某矿工, 男性, 40 岁, 因塌方事故时被泥土、矿石压埋致伤。当时不能站立, 腰部疼痛无力, 双下肢不能自主活动, 双腹股沟以下感觉消失, 急送医院。

1. 正确的搬运方法是

- A. 搂抱
- B. 一人背
- C. 一人抬头, 一人抬足
- D. 三人用手平直托起, 保持躯干平直
- E. 两人抬上肢, 两人抬下肢

2. 到医院检查, 发现病人腰背有后突畸形, 应首先考虑的诊断是

- A. 胸腰段棘突骨折
- B. 胸腰段横突骨折
- C. 胸腰段椎体骨折
- D. 肋骨骨折
- E. 局部血肿

3. 此时首选的检查方法为

四、B1 型题

B 型题为配伍题。B1 型题是标准配伍题, 试题的形式为开始是 5 个备选答案, 其后提出至少 2 道试题, 要求应试者为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案 (见例题 8), 每个备选答案可以被选用 1 次、多次或不被选用。

例题 8 (1~3 题共用备选答案)

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 股疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

1. 多见于老年人的是

- A. CT 检查
- B. MRI 检查
- C. X 线片检查
- D. 肌电图检查
- E. 核素检查

4. 假设患者经一周卧床观察后双下肢瘫痪明显恢复, 应考虑

- A. 脊髓震荡
- B. 脊髓受压
- C. 脊髓横断
- D. 马尾神经损伤
- E. 神经根损伤

5. 假设 X 线片显示椎体单纯压缩性骨折, 压缩不到 1/3, 其首选治疗方法是

- A. 仰卧于木板床上
- B. 两桌法过牵复位
- C. 手术脊椎融合
- D. 手术内固定
- E. 石膏背心外固定

(1999 年试题)

正确答案: 1.D; 2.C; 3.C; 4.A; 5.A。

2. 多见于中年女性的是

3. 多见于儿童及青壮年的是

(2000 年试题)

正确答案: 1.B; 2.C; 3.A

临床执业医师全真模拟试卷 (一)

第一单元

A1型选择题 (1~101题)

答题说明

每一道考试题目下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列关于骨的构造的叙述，正确的是
 - A. 新鲜骨的表面除关节面外都覆有骨膜
 - B. 成人长骨骨干中充满了红骨髓，有造血功能
 - C. 颅骨的外层为骨密质，内层为骨松质
 - D. 骨的有机质成分使骨坚硬
 - E. 骨的形态和构造终生不变
2. 关于十二指肠的叙述，正确的是
 - A. 起始处续于胃的贲门
 - B. 分为升部、降部和水平部
 - C. 十二指肠呈“C”字形，包绕胰头
 - D. 十二指肠大乳头位于水平部的后壁
 - E. 升部即十二指肠球
3. 心肌正常收缩的起搏点是
 - A. 窦房结
 - B. 房室结
 - C. 房室束
 - D. 房室交点
 - E. Purkinje 纤维
4. 成人脊髓圆锥下端平齐
 - A. 第1腰椎体下缘
 - B. 第2腰椎体下缘
 - C. 第3腰椎体下缘
 - D. 第1骶椎体下缘
 - E. 第2骶椎体下缘
5. 神经和肌肉细胞动作电位去极相的产生是由于
 - A. Na^+ 外流
 - B. Na^+ 内流
 - C. K^+ 外流
 - D. K^+ 内流
 - E. Ca^{2+} 内流
6. 通常所说的血型是指
 - A. 红细胞膜上的受体类型
 - B. 红细胞膜上凝集原的类型
 - C. 红细胞膜上凝集素的类型
 - D. 血浆中凝集原的类型
 - E. 血浆中抗体的类型
7. 心肌细胞中传导速度最高的是
 - A. 心室肌
 - B. 心房肌
 - C. 窦房结

- D. 房室交界
E. 浦肯野纤维
8. 生理情况下影响收缩压的主要因素是
A. 心率的变化
B. 每搏输出量的变化
C. 外周阻力的变化
D. 循环血量的变化
E. 大动脉管壁弹性的变化
9. 下列与呼吸有关的数值中哪一个是错的?
A. 正常成人安静时呼吸频率为 12~18 次/分
B. 正常成人男性的肺活量约为 3 500ml
C. 正常人时间肺活量的第 1 秒应为 60%
D. 正常成人无效腔气量约为 150ml
E. 正常成人安静时肺通气量为 6~8L
10. 营养物质的吸收主要发生于
A. 食道
B. 胃
C. 小肠
D. 结肠
E. 小肠和结肠
11. 大量饮清水后, 尿量增多主要是由于
A. 循环血量增加, 血压升高
B. 醛固酮分泌减少
C. 血浆胶体渗透压下降
D. 血浆晶体渗透压下降
E. 肾小球滤过率增加
12. 分布于植物性神经节突触后膜上的受体是
A. M 受体
B. N_1 受体
C. N_2 受体
D. α 受体
E. β 受体
13. 对非特异性投射系统的叙述, 正确的是
A. 由丘脑向大脑皮层投射具有点对点的投射关系
B. 引起特定感觉
C. 维持大脑清醒状态
D. 是所有感觉的上行传导道
E. 维持睡眠状态
14. 声音传入内耳的主要途径为
A. 外耳→鼓膜→听骨链→圆窗→内耳
B. 外耳→鼓膜→听骨链→卵圆窗→内耳
C. 外耳→鼓膜→鼓室空气→圆窗→内耳
D. 颅骨→耳蜗内淋巴
E. 外耳→鼓膜→圆窗→听骨链→内耳
15. 对糖皮质激素作用的叙述, 错误的是
A. 促进蛋白质分解, 抑制其合成
B. 分泌过多可引起向中性肥胖
C. 减弱机体对伤害刺激的抵抗力
D. 促进糖异生, 升高血糖
E. 增加血管平滑肌对去甲肾上腺素的敏感性
16. 变性蛋白质的主要特点是
A. 不易被蛋白酶水解
B. 生物活性丧失
C. 溶解度增加
D. 粘度下降
E. 容易扩散
17. 下列叙述哪一项是错误的
A. 四氢叶酸 (FH_4) 是一碳单位转移酶的辅酶
B. 一碳单位参与核酸合成
C. 叶酸缺乏时可引起巨幼红细胞性贫血
D. 维生素 B_{12} 含有金属元素
E. 维生素 B_{12} 和一碳单位代谢无关
18. 不参加脂肪酸 β 氧化的酶是
A. 脂酰 CoA 脱氢酶

- B. 烯脂酰 CoA 水化酶
C. β 酮酰 CoA 硫解酶
D. β 酮酰 CoA 转移酶
E. β 羟脂酰 CoA 脱氢酶
19. 鸟氨酸循环合成尿素，一个氮原子来自 NH_3 ，另一个来自
A. 谷氨酸
B. 谷氨酰胺
C. 天冬氨酸
D. 天冬酰胺
E. 氨基甲酰磷酸
20. 有关 mRNA 的叙述，哪项是错误的
A. 蛋白质合成的模板
B. 经过加工修饰后的 RNA
C. mRNA 上的密码子是不连续的
D. 在 mRNA 的 5' 端有起始密码子
E. 在 mRNA 的 3' 端有终止密码子
21. 关于结合胆红素的叙述，哪一项错误
A. 和清蛋白结合
B. 和葡萄糖醛酸结合
C. 极性强，便于随胆汁排出
D. 分子小，可被肾小球滤过
E. 与重氮试剂直接反应，呈紫红色
22. 骨盐的主要成分
A. 有机钙
B. 碳酸钙
C. 磷酸氢钙
D. 羟磷灰石
E. 蛋白质结合钙
23. 结缔组织玻璃样变性，常见于
A. 肉芽组织
B. 纤维肉瘤组织
C. 平滑肌瘤组织
D. 瘢痕组织
E. 血管壁组织
24. 脂肪变性常见于
A. 肝脏
B. 脾脏
C. 肾脏
D. 心脏
E. 肺
25. 坏死是指
A. 机体死亡后局部组织及细胞出现的变化
B. 生活的机体局部组织或细胞死亡
C. 局部细胞高度肿胀
D. 个别细胞程序性死亡
E. 可复性严重变性
26. 肉芽组织的主要成分是
A. 中性粒细胞
B. 纤维母细胞
C. 纤维母细胞及毛细血管
D. 淋巴细胞
E. 组织细胞
27. 下列哪项与血栓形成无关
A. 血管内膜损伤
B. 血流缓慢
C. 血流不规则，涡流形成
D. 血液凝固性改变
E. 血液量的改变
28. 下肢深静脉血栓形成，可引起
A. 下肢坏疽
B. 肺动脉栓塞
C. 门静脉栓塞
D. 脑动脉栓塞
E. 肠系膜动脉栓塞
29. 急性肾小球肾炎时常可引起
A. 眼睑水肿
B. 肺水肿
C. 下肢橡皮肿

- D. 皮肤粘液性水肿
E. 腹水
30. 下述关于动脉粥样硬化的叙述中, 哪一项是不正确的?
A. 可引起病变动脉溃疡
B. 可引起脑萎缩
C. 可引起下肢坏疽
D. 不会引起下肢坏疽
E. 可引起心肌萎缩
31. 高血压病引起心脏的特征性变化是
A. 右心肥厚
B. 左室向心性肥厚
C. 左心房扩张
D. 主动脉环扩张
E. 心壁肉柱扁平
32. 关于慢性支气管炎的描述, 下列哪项是错误的?
A. 中年以上男性多见
B. 与吸烟有关
C. 不会伴发肺动脉高压症
D. 可继发阻塞性肺气肿
E. 常反复咳嗽、咳痰
33. 慢性胃溃疡的好发部位是
A. 幽门部大弯侧
B. 胃体大弯侧
C. 贲门部
D. 胃体小弯侧
E. 幽门部小弯侧
34. 急性普通型肝炎的病变特点是
A. 肝细胞广泛变性, 而坏死轻微
B. 肝细胞广泛变性, 而坏死严重
C. 肝脏有广泛出血坏死
D. 肝脏有明显纤维
E. 肝细胞广泛变性, 炎症细胞浸润明显
35. 哪种给药方式有首先清除
A. 口服
B. 舌下
C. 直肠
D. 静脉
E. 肌肉
36. 毛果芸香碱对眼睛的作用是
A. 瞳孔缩小, 眼压升高
B. 瞳孔缩小, 眼压降低
C. 瞳孔散大, 眼压降低
D. 瞳孔散大, 眼压升高
E. 瞳孔不变, 眼压降低
37. 氯解磷定解救有机磷酸酯类(农药)中毒是因为
A. 能直接对抗乙酰胆碱的作用
B. 能使失去活性的胆碱酯酶复活
C. 有阻断 M 胆碱受体的作用
D. 有阻断 N 胆碱受体的作用
E. 能对抗有机磷酸酯分子中磷的毒性
38. 下列可用于抗晕动病的药物是
A. 山莨菪碱
B. 东莨菪碱
C. 阿托品
D. 毛果芸香碱
E. 氯丙嗪
39. 下列药物中可诱发支气管哮喘的是
A. 硝普钠
B. 洛贝林
C. 酚妥拉明
D. 酚苄明
E. 普萘洛尔
40. 主要用于癫痫大发作及持续状态的药是
A. 地西洋
B. 苯巴比妥
C. 异戊巴比妥

- D. 司可巴比妥
E. 硫喷妥钠
41. 可单独用于轻度高血压患者的药物是
A. 呋喃苯胺酸
B. 依他尼酸
C. 布美他尼
D. 氢氯噻嗪
E. 速尿
42. 肾性高血压患者可选用
A. 美加明
B. 普萘洛尔
C. 可乐定
D. 卡托普利
E. 氢氯噻嗪
43. 强心苷治疗心力衰竭的主要药理作用是
A. 降低心肌耗氧量
B. 正性肌力作用
C. 使已扩大的心室容积缩小
D. 减慢心率
E. 减慢房室传导
44. 喘息性支气管炎可选用
A. 特布他林 (博利康尼)
B. 肾上腺素
C. 异丙肾上腺素
D. 喷托维林
E. 溴己新
45. 治疗子痛的惊厥可选用
A. 氯化钙
B. 硫酸镁
C. 酚酞
D. 地西洋
E. 苯妥英钠
46. 抗绿脓杆菌感染有效药物是
A. 羟氨苄西林
B. 羧苄西林
C. 头孢氨苄
D. 头孢呋辛
E. 青霉素 G
47. 粉红色泡沫样痰多见于
A. 急性支气管炎
B. 急性肺水肿
C. 肺炎球菌肺炎
D. 克雷白杆菌肺炎
E. 支原体肺炎
48. 残气量及残气量/肺总量比值明显增加见于
A. 肺部炎症
B. 肺部纤维化
C. 阻塞性肺气肿
D. 胸腔积液
E. 气胸
49. 慢性阻塞性肺气肿的体征, 下列不正确的是
A. 肺肝浊音界下移
B. 心音遥远
C. 呼吸音减低
D. 胸膜摩擦音
E. 桶状胸
50. 下列各项中不符合肺心病的体征是
A. 颈静脉怒张
B. 肝颈静脉逆流征阳性
C. 心脏浊音界向左下扩大
D. 剑突下示心脏搏动
E. 肺动脉瓣区第二心音亢进
51. 慢性肺心病心力衰竭时, 哪种情况下使用强心剂
A. 感染已控制, 利尿剂无效
B. 心率大于 120 次/分
C. 明显气急紫绀

- D. 两肺底湿性啰音
- E. 肺动脉高压

52. 院内获得性肺炎, 最常见的致病菌是

- A. 肺炎链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 革兰阴性杆菌
- D. 厌氧菌
- E. 真菌

53. 关于休克型肺炎的治疗, 下列哪项是不正确的

- A. 抗休克治疗
- B. 控制感染
- C. 慎用糖皮质激素
- D. 防止心肾功能不全
- E. 支持疗法和监护

54. 关于支气管扩张的临床表现, 不正确的是

- A. 急性咳嗽
- B. 大量脓痰
- C. 反复咯血
- D. 病情严重者, 病变部位可有固定而持久的湿啰音
- E. 慢性病例可有杵状指(趾)

55. 肺结核最主要的传染源是

- A. 原发型肺结核患者
- B. 急性血行播散型肺结核患者
- C. 亚急性血行播散型肺结核患者
- D. 浸润型肺结核患者
- E. 慢性纤维空洞型肺结核患者

56. 关于结核性渗出性胸膜炎临床表现的描述, 以下哪项是不正确的

- A. 起病较急、发热较高
- B. 早期不会出现胸痛和干咳
- C. 大量胸腔积液时可引起呼吸困难
- D. 大量胸腔积液时喜患侧卧位

- E. 积液上方可闻及支气管呼吸音

57. 关于胸腔漏出液的描述, 不正确的是

- A. 外观无色透明或淡黄色
- B. 比重 < 1.018
- C. 粘蛋白定性试验阳性
- D. 蛋白定量 $< 20 \sim 30 \text{g/L}$
- E. 细胞数常 $< 100 \times 10^6/\text{L}$, 以淋巴细胞和间皮细胞为主

58. 关于肺淤血引起的心源性呼吸困难不包括

- A. 呼气性呼吸困难
- B. 劳力性呼吸困难
- C. 端坐呼吸
- D. 夜间阵发性呼吸困难
- E. 急性肺水肿

59. 心功能分级是根据

- A. 胜任一般活动所持续的时间
- B. 对体力活动的耐受性
- C. 出现症状的轻重
- D. 活动后心电图的改变
- E. 活动后心率、血压的变化

60. 关于左心功能不全不正确的是

- A. 呼吸困难是最主要的症状
- B. 夜间发作性呼吸困难又称心源性哮喘
- C. 为体循环静脉压增高产生的临床表现
- D. 常见于高血压性心脏病、冠心病等
- E. 由于心排血量减少, 出现疲倦、乏力

61. 右心功能不全的体征不包括

- A. 右心室增大, 心浊音界向左、右两侧扩大
- B. 颈静脉充盈
- C. 心尖部舒张期奔马律
- D. 肝脏肿大
- E. 肝颈静脉逆流征阳性

62. 急性左心功能不全时为减少回心血量可采取

- A. 平卧位
- B. 坐位
- C. 头低位
- D. 侧卧位
- E. 抬高下肢

63. 关于早搏, 错误的是

- A. 可有心悸
- B. 可有晕厥
- C. 可减少心绞痛发作
- D. 可有乏力
- E. 可有心跳停搏感

64. 二尖瓣狭窄典型的杂音是

- A. 心底部舒张期吹风样杂音
- B. 心尖部收缩期吹风样杂音
- C. 心尖部舒张期隆隆样杂音
- D. 心底部舒张期隆隆样杂音
- E. 心底部收缩期吹风样杂音

65. 亚急性感染性心内膜炎临床表现最常见的是

- A. 不规则发热
- B. 消瘦
- C. 贫血
- D. 脾肿大
- E. 杵状指趾

66. 高血压诊断标准正确的是

- A. 收缩压 $\geq 120\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 75\text{mmHg}$
- B. 收缩压 $\geq 135\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
- C. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 100\text{mmHg}$
- D. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
- E. 收缩压 $\geq 150\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq$

100mmHg

67. 缺血型心肌病是指

- A. 隐匿型冠心病
- B. 心绞痛型冠心病
- C. 心肌梗死型冠心病
- D. 心力衰竭和心律失常型冠心病
- E. 猝死型冠心病

68. 急性心梗的常见先兆症状是

- A. 心悸
- B. 气短
- C. 心绞痛
- D. 烦躁
- E. 乏力

69. 急性心包炎的下列病因中最常见的是

- A. 结核性
- B. 非特异性
- C. 化脓性
- D. 霉菌性
- E. 肿瘤性

70. 临床急性胃炎最为常见的病因是

- A. 化学性因素
- B. 物理性因素
- C. 应激性因素
- D. 感染性因素
- E. 血管性因素

71. 慢性萎缩性胃炎主要与下列哪种致病菌感染有关

- A. 大肠杆菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 痢疾杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 幽门螺杆菌

72. 溃疡病急性穿孔最有诊断意义的是

- A. 腹痛突然加重

- B. 出现腹膜炎体征
C. 肠鸣音减弱或消失
D. 休克征象
E. 气腹征
73. 抗胆碱能药一般不用于下列哪种情况
A. 十二指肠球部溃疡
B. 胃溃疡
C. 急性胃肠炎
D. 急性胰腺炎
E. 急性胆囊炎
74. 肝硬化患者出现肝掌、蜘蛛痣的机理是
A. 雄性激素减少
B. 肾上腺皮质功能减退
C. 雌性激素过多
D. 血管紧张素分泌过多
E. 门脉高压所致
75. 门脉性肝硬化并伴有上消化道出血时, 下列哪项可诱发肝性脑病
A. 口服去甲肾上腺素
B. 肥皂水灌肠清除积血
C. 硫酸镁导泻
D. 静脉输入止血芳酸
E. 静脉点滴支链氨基酸
76. 肝昏迷病人前驱期 (I 期) 最早的表现是
A. 扑翼样震颤
B. 性格改变
C. 脑电图异常
D. 定向力理解力障碍
E. 锥体束征阳性
77. 急性水肿型胰腺炎的表现不包括
A. 上腹部持续疼痛
B. 中等程度发热
C. 恶心、呕吐
D. 轻度黄疸
E. 上腹部有压痛、反跳痛与肌紧张
78. 急性胰腺炎患者, 哪项指标不提示病情危重
A. 血钙 1.50mmol/L
B. 血糖升高, $\geq 11.2\text{mmol/L}$
C. 脐部皮肤紫斑
D. 腹膜刺激征
E. 黄疸
79. 对疑是结核性腹膜炎患者哪项检查最有价值
A. 腹水穿刺检查
B. 结核菌素试验
C. 腹部平片
D. X 线胃肠钡餐
E. 腹部 B 超检查
80. 结核性腹膜炎的手术治疗指征不包括
A. 抗结核治疗后腹水不消退
B. 并发完全性肠梗阻
C. 并发急性肠穿孔
D. 抗结核药物无效的肠瘘
E. 与腹内肿瘤难以鉴别时
81. 以下哪个疾病不引起多尿
A. 肾小动脉硬化
B. 糖尿病
C. 垂体性尿崩症
D. 充血性心力衰竭
E. 癌病
82. 蛋白尿是指 24 小时尿蛋白超过
A. 100mg
B. 150mg
C. 200mg
D. 250mg
E. 300mg
83. 以下哪项不是肾小管性蛋白尿的常见病