
科学与卫生

15分钟讲演资料

人工流产的危害

琴

什么叫做人工流产？人工流产就是用人工的方法，把胎儿从子宫壁上剥离下来。有人把人工流产作为节育的办法之一，这是很不科学的。因为这种方法是违反生理的，而且有一定的危害性。

人工流产的方法有两种，一种是采用医学手术，还有一种是采用土方或者土法子来进行打胎的。但是不论采用那一种方法，人工流产对妇女的健康总是有害的。许多青年夫妇对人工流产有一种不正确的看法，认为反正有现代医学的保证，怀孕后可以去刮子宫的。于是不再坚持使用避孕的方法，结果受了孕，就想出各种理由向医院申请人工流产。他们不知道在做人工流产的时候或者在人工流产以后，都会发生危险的。

用医学手术做人工流产，最普遍的是刮子宫。刮子宫会发生各种并发症，主要的有下面几种：

第一是流血。医生在刮子宫的时候，除了有一部分能用眼睛观察以外，大部分是只凭器械接触到的感觉来进行手术的。把胚胎和胎盘强迫从子宫壁上刮下来，子宫壁上就出现了创伤

面，会造成大量的流血，这往往是很危险的。而且流血过多，短时期内是不容易恢复健康的。

第二是子宫穿孔。怀孕时的子宫非常柔软，即使在动手术时，医生万分小心，有时还可能有子宫穿孔的危险。子宫穿孔后，血液容易流入腹腔，出现内出血的现象；阴道里面的细菌也容易进入腹腔，造成急性腹膜炎，这是最严重的并发症。曾经有这样一个人，在施行人工流产时子宫穿了孔，肠子跟着器械经过子宫上的穿孔到阴道里面，情况十分危险，不得不立刻进行剖腹的手术把子宫截除掉，同时也把一段肠子切除了。这样造成大量的失血和严重的腹膜炎，使得她在手术后很久还不能恢复健康。

第三是感染。在妇女的阴道内，平时有很多细菌，但是子宫口的粘液能够阻止细菌侵入。在刮子宫的时候，就容易把细菌带进子宫，引起发炎，轻的会肚子疼、发热。如果不及时治疗，还会引起慢性盆腔炎。

第四是在多次人工流产以后，或者经过一段时期，会使月经不调。有一个妇女接连施行四次人工流产，子宫壁上留下了不少疤痕，使子宫肌肉失去收缩的能力，每次月经来潮的时候，肚子剧烈疼痛，大量出血；最后是把子宫切除了才免除痛苦。

第五是进行过几次刮子宫手术以后，会引起以后的自然流产。因为刮子宫后的子宫内皮有时就不很健全，当再怀孕的时候，不健全的子宫内皮不适宜胎儿的生长，结果就容易流产。

第六是人工流产后，还常常会引起输卵管发炎而有一部分粘连起来，这样在下次受孕的时候，受精卵不能通过输卵管到子宫里，而只能在输卵管或者卵巢里生长发育，造成宫外孕

孕，使輸卵管或卵巢破裂而引起大量出血，这是非常危險的。

从以上所講各种可能发生的不良后果看来，應該少采用或者不采用人工流产的方法。除非是一些有心臟病、高血压、結核病、糖尿病或者惡性腫瘤等病的孕妇，如果繼續怀孕將會使疾病惡化，甚至威胁生命，那就不得不采用人工流产的方法，不过千万不能吃土方或者用土法子。

有許多人采用了五花八門的土方土法来打胎，这样危險性更大。医院里象这样的記錄很多。

例如有一个农村妇女，因为生育过多，当她发现又怀孕了，决意要把胎打掉，她就把一根稻草塞到子宫里面去。第二天肚子痛起来，并且大量出血，当时胎儿总算下来了，流血也漸漸減少，可是到了第五天，她的嘴張不开了，当天送到医院去，但是破伤风菌已經侵入神經，2天以后终于抽搐而死。

另一个是已經有六个孩子的妇女，又怀孕了两个月，吃了十瓶“十滴水”要想把胎打下来，当时肚子痛得象絞起来一样，臉色蒼白，几乎昏厥过去，阴道也开始流血，但是后来胎儿仍旧沒有产下来。

还有人为了打胎吃下大量的奎宁片，弄得头昏眼花，心跳得非常厉害，甚至有严重的中毒的現象，这也是很危險的。

有些妇女在肚臍眼上貼上一个大膏药，这种局部的刺激，会引起子宫不正常的收縮，发生严重的出血。

有人故意拿重的物件，或者去軋公共汽車和电車，想把胎儿打下来，这种方法都是沒有效果的，但是身体的健康却受到了損害。这样做是太不值得了。

总之，人工流产的害处很大，而且也解决不了以后受孕的問題。就算这一次把胎儿拿掉了，如果不严格避孕，下次还会

再怀孕。所以凡是身体不好孩子太多的妇女，应该采用安全可靠
的避孕方法，或者做结紮輸卵管或结紮輸精管等絕育的手
术，靠人工流产来解决孩子太多的問題，实在是一种危害极大
的办法。