

国家医师资格考试用书

2014 修订版

国家医师资格考试

模拟试卷

临床执业助理医师

医师资格考试专家组



人民卫生出版社



国家医师资格考试用书

2014 

国家医师资格考试

模 拟 试 卷

临床执业助理医师

主 编 王斌全 晋建华

编者 (按姓氏笔画排序)

马志方	王立	王彦	王娜	王睿	王宏勤	王勤英
卢向东	付永良	代文娟	白淘	冯瑞铮	李阳	李志强
杨洋	杨露阳	余红梅	闵婕	宋建波	张瑾	张春明
张雪峰	张琼慧	张瑞平	陈玮	陈显久	武师润	范凝芳
庞敏	赵烨	党小红	徐勇	郭文玲	曹欣	章毅
董海	焦向英	温凯婷	裴彦江	魏志刚		

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2014 国家医师资格考试模拟试卷·临床执业助理医师/
王斌全,晋建华主编. —北京:人民卫生出版社, 2013

ISBN 978-7-117-18342-0

[I. ①2… II. ①王…②晋… III. ①临床医学-医师-
资格考试-习题集 IV. ①R192.3-44]

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 258080 号

人卫社官网 www.pmph.com 出版物查询, 在线购书
人卫医学网 www.ipmph.com 医学考试辅导, 医学数
据库服务, 医学教育资
源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

**2014 国家医师资格考试
模 拟 试 卷
临床执业助理医师**

主 编: 王斌全 晋建华

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京市安泰印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 **印 张:** 12

字 数: 292 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-18342-0/R · 18343

定 价: 45.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ @ pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

出版说明

国家医师资格考试目前包括三个专业(西医类),即临床医师、口腔医师、公共卫生医师,每个专业又包括2个级别,即执业医师和执业助理医师,通常称为“两级三类”考试。从1999年开考以来,试题水平不断提升,考生规模逐年增加。

2012年,国家医学考试中心修订了2009版考试大纲,并于2013年开始实施(以下简称2013版大纲)。2013版大纲在人文素质、基础综合、专业综合等领域做了较大幅度的修订,更加符合执业医师考核需求。

具体修改内容请参考相应专业国家医学考试中心唯一推荐图书的“出版说明”和“应试须知”。

为帮助考生复习备考,提高我国执业医师的专业水平和医学教育水平,人民卫生出版社和国家医学考试中心密切合作,共同开发了医师资格考试复习系列用书。这些图书分为两类:

第一类:国家医学考试中心唯一推荐用书,由人民卫生出版社独家出版。国家医学考试中心唯一推荐用书是根据2013版考试大纲和考试要求重新编写的,目的是更好地提高我国执业医师的水平,促进我国的医学教育水平。

第二类:人民卫生出版社组织编写的图书,作为国家医学考试中心唯一推荐用书的补充。这些图书亦结合2013版大纲做了必要的修订,更加贴近考试要求。

这两类图书具有如下重要特点:

第一,权威。与国家医学考试中心紧密结合,融会大纲要求和考试精神,内容权威,能有效提高执业医师的专业水平和执业素质。

第二,全面。全专业、全品种、全层次。图书涉及医师资格考试的所有专业和层次。品种多样,包括指南类、习题类、模拟类、(习)题(考)点结合类等等,能全面满足读者学习备考的要求。

第三,高效。图书内容结合考试要求,强调“突出重点,覆盖一般”。能有效提高读者的学习效率。

2014版图书品种如下(*品种为国家医学考试中心唯一推荐用书):

临床医学专业——执业医师

- * 1. 国家医师资格考试 医学综合应试指南——临床执业医师(含考试大纲)
- * 2. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——临床执业医师(含考试大纲)
- * 3. 国家医师资格考试 模拟试题解析——临床执业医师
- * 4. 国家医师资格考试 医学人文概要(供各专业用)
- 5. 国家医师资格考试 模拟试卷——临床执业医师
- 6. 国家医师资格考试 核心能力提升与训练——临床执业医师
- 7. 国家医师资格考试 考点图表解与命题示例——临床执业医师

8. 国家医师资格考试 实践技能考试实战 5 项——临床执业医师

临床医学专业——执业助理医师

- * 1. 国家医师资格考试 医学综合应试指南——临床执业助理医师(含考试大纲)
- * 2. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——临床执业助理医师(含考试大纲)
- * 3. 国家医师资格考试 模拟试题解析——临床执业助理医师
- 4. 国家医师资格考试 模拟试卷——临床执业助理医师
- 5. 国家医师资格考试 核心能力提升与训练——临床执业助理医师
- 6. 国家医师资格考试 考点图表解与命题示例——临床执业助理医师
- 7. 国家医师资格考试 实践技能考试实战 5 项——临床执业助理医师

口腔医学专业——执业医师

- * 1. 国家医师资格考试 医学综合应试指南——口腔执业医师(含考试大纲)
- * 2. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——口腔执业医师(含考试大纲)
- * 3. 国家医师资格考试 模拟试题解析——口腔执业医师
- 4. 国家医师资格考试 模拟试卷——口腔执业医师
- 5. 国家医师资格考试 实践技能考试理论必备与操作指南——口腔执业医师

口腔医学专业——执业助理医师

- * 1. 国家医师资格考试 医学综合应试指南——口腔执业助理医师(含考试大纲)
- * 2. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——口腔执业助理医师(含考试大纲)
- * 3. 国家医师资格考试 模拟试题解析——口腔执业助理医师
- 4. 国家医师资格考试 模拟试卷——口腔执业助理医师
- 5. 国家医师资格考试 实践技能考试理论必备与操作指南——口腔执业助理医师

公共卫生专业——执业医师

- * 1. 国家医师资格考试 医学综合应试指南——公共卫生执业医师(含考试大纲)
- * 2. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——公共卫生执业医师(含考试大纲)
- * 3. 国家医师资格考试 模拟试题解析——公共卫生执业医师
- 4. 国家医师资格考试 模拟试卷——公共卫生执业医师
- 5. 国家医师资格考试 实践技能考试理论必备与操作指南——公共卫生执业医师(含助理)

公共卫生专业——执业助理医师

- * 1. 国家医师资格考试 医学综合应试指南——公共卫生执业助理医师(含考试大纲)
- * 2. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——公共卫生执业助理医师(含考试大纲)
- * 3. 国家医师资格考试 模拟试题解析——公共卫生执业助理医师
- 4. 国家医师资格考试 模拟试卷——公共卫生执业助理医师

国家临床执业(助理)医师资格考试

试题类型和应试方法

国家临床执业(助理)医师资格考试的全部试题均采用以选择题为代表的客观型试题。选择题的类型众多,但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成:①题干,是试题的主体,可由一段短语、问句或不完全的陈述句构成,也可由一段病历、病史、图表、照片或其他临床资料来表示。②选项,也称备选答案,由4~5个用字母标明、可供选择的词组或短句组成。执业(助理)医师资格考试采用A型题(one best answer,最佳选择题)和B型题(matching question,配伍题),A型题分为A1、A2、A3、A4型题,B型题分为B1、B2型题(医师资格考试暂不采用B2型题)。

为了帮助考生更好地了解考试题型,顺利通过考试,我们将各题型的特点及应试方法分别介绍如下:

(一) A1型题:单句型最佳选择题

1. 答题说明

以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题及特点、答题方法

(1) 标准型

例1 慢性支气管炎最主要的病因是

- A. 过敏因素
- B. 环境污染
- C. 气候因素
- D. 长期吸烟
- E. 真菌感染

正确答案:D

特点及答题方法:每道题由一个题干和五个备选答案组成,其中只有一个最佳答案为正确答案,其余均为干扰答案。干扰答案或完全不正确或部分正确,或相互排斥。回答问题时,应找出最佳的或最适当的答案,排除似乎有道理而实际不恰当的答案。

(2) 否定型

例2 下列哪项不引起支气管平滑肌痉挛

- A. 组胺
- B. 前列腺素E
- C. 神经肽
- D. P物质

E. 前列腺素 F

正确答案:B

特点及答题方法:如果试题涉及多个相关问题或正确答案,可采用否定型题。题目的题干中有一个特别标注的否定词(不、不是、不能、除、除外、错误、无关等),5个备选答案中有一个是错误的。因为这种题型可能造成考生从肯定到否定的思维突变,影响答题,出现不该出现的错误,因此,这类题通常都会在否定词下用黑点或下划线标注。考生在答题时要从备选答案中选出最不适用的、或用得最少的、或某一方面是例外的一个答案。

另外还有“以上都不是”型题,因为具有某种暗示作用,在考试中已逐步被淘汰。

例 3 拟肾上腺素类药物治疗哮喘的主要机制是

- A. 稳定肥大细胞膜
- B. 抗过敏
- C. 抗组胺
- D. 抑制磷酸二酯酶
- E. 以上都不是

正确答案:E

(二) A2 型题:病历摘要型最佳选择题

1. 答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题

例 4 男,20岁,咳嗽、咳脓痰10年,间歇咯血,体检左下肺背部闻及湿啰音,杵状指(+),诊断应首先考虑

- A. 肺结核
- B. 支气管扩张症
- C. 慢性支气管炎
- D. 慢性肺脓肿
- E. 先天性肺囊肿

正确答案:B

3. 答题方法 每一道考题是由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成。回答此类试题,要全面分析题干中所给出的各种条件,分清主次,选择正确答案。

(三) A3 型题:病历组型最佳选择题

1. 答题说明

以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 例题

例 5 女,25岁,咳嗽、咳痰10年,痰量40ml/d。胸片两下肺纹理紊乱,呈卷发状改变。

1. 诊断首先考虑
- A. 慢性支气管炎
 - B. 支气管扩张症

- C. 慢性肺脓肿
- D. 先天性肺囊肿
- E. 卡塔格内(Kartagener)综合征

正确答案:B

2. 下列哪项是错误的

- A. 长期应用抗生素
- B. 体位引流
- C. 体育锻炼
- D. 免疫治疗
- E. 生理盐水雾化吸入

正确答案:A

3. 特点及答题方法 每一道题先开始叙述一个以病人为中心的临床场景,然后提出2~3个问题,每个问题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。每一个问题均与开始叙述的临床场景有关,但测试点不同。而且问题之间是相互独立的,每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。回答这类问题,要注意每一个测试要点的区别,找出临床场景中能回答这个问题的相关部分。

(四) A4型题:病历串型最佳选择题

1. 答题说明

以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 例题

例 6 男性,63岁,确诊为慢性阻塞性肺病近10年,因呼吸困难一直需要家人护理和照顾起居。晨起大便时突然气急显著加重,伴胸痛,送来急诊。

1. 采集病史时应特别注意询问

- A. 胸痛部位、性质和伴随症状
- B. 冠心病、心绞痛病史
- C. 吸烟史
- D. 近期胸部X线检查情况
- E. 近期服药史,如支气管扩张剂、抗生素

正确答案:A

2. 体检重点应是

- A. 肺下界位置及肺下界移动度
- B. 肺部啰音
- C. 病理性支气管呼吸音
- D. 胸部叩诊音及呼吸音的双侧比较
- E. 颈动脉充盈

正确答案:D

3. 确诊最有价值的辅助检查是

- A. B超
- B. 心电图
- C. X线透视或摄片
- D. MRI

E. 核素肺扫描

正确答案:C

4. 若经检查确诊为肺气肿并发左侧自发性气胸,其治疗拟选择胸腔插管水封瓶引流,主要目的是

- A. 尽早使肺复张,维护已经受损的肺功能,防止呼吸衰竭
- B. 尽早使肺复张,缩短住院时间
- C. 尽早使肺复张,防止形成慢性气胸
- D. 尽早使肺复张,防止循环系统受扰和引发并发症
- E. 尽早使肺复张,防止胸腔继发感染

正确答案:A

5. 如果床旁胸部 X 线摄片未显示明确气胸带,下列间接征象中哪项最有助于气胸诊断

- A. 心脏移位
- B. 左心缘透亮度增高,左膈压低
- C. 肺大疱
- D. 两肺透亮度增高
- E. 肋间隙增宽

正确答案:B

3. 特点及答题方法 每一道题先开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床场景,然后提出 4~9 个问题,问题之间是相互独立的,每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息。每一个问题均与开始的临床场景有关,也与新增加的信息有关。回答这类问题,要以试题提供的信息为基础,提供信息的顺序对回答问题十分重要。

A3、A4 型题主要考察临床学科的知识与技能,但是在此类试题的某一个问题中可以考查基础学科或其他非临床学科的知识和技能。

(五) B1 型题:配伍题

1. 答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次,多次或不被选择。

2. 例题

例 7 (78~79 题共用备选答案)

- A. 无痛血尿
- B. 腮腺
- C. 血红蛋白尿
- D. 尿道出血
- E. 乳糜尿

78. 肾结核者出现

79. 膀胱癌者出现

正确答案:78. B 79. A

3. 特点及答题方法 每组题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个题干组成,答案在前,题干在后。答题时要求为每一个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不用。

目 录

模拟试卷一	1
第一单元	1
第二单元	15
参考答案	30
 模拟试卷二	31
第一单元	31
第二单元	45
参考答案	60
 模拟试卷三	62
第一单元	62
第二单元	76
参考答案	91
 模拟试卷四	92
第一单元	92
第二单元	106
参考答案	121
 模拟试卷五	122
第一单元	122
第二单元	136
参考答案	151
 模拟试卷六	153
第一单元	153
第二单元	167
参考答案	182

模拟试卷一

第一单元

A1 型题

答 题 说 明

每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 再生是指
 - A. 纤维细胞数目的增多
 - B. 纤维细胞增生的过程
 - C. 肉芽组织的形成
 - D. 组织缺损由邻近健康细胞增生而修复的过程
 - E. 由分化成熟的细胞转变为另一种分化成熟的细胞
2. 干酪样坏死是一种特殊的
 - A. 液化性坏死
 - B. 湿性坏疽
 - C. 干性坏疽
 - D. 气性坏疽
 - E. 凝固性坏死
3. 癌前病变是指
 - A. 早期浸润癌
 - B. 良性肿瘤的恶变
 - C. 类似肿瘤的瘤样病变
 - D. 有可能癌变的良性病变
 - E. 有可能转变为鳞癌的良性病变
4. 肺动脉栓塞的栓子一般来自
 - A. 左心房附壁血栓脱落
 - B. 二尖瓣疣状血栓脱落
5. 淤血常见的原因中没有
 - A. 静脉受压
 - B. 静脉血栓形成
 - C. 静脉栓塞
 - D. 器质性二尖瓣瓣膜病
 - E. 动脉栓塞
6. 下列对炎症渗出性病变的叙述，错误的是
 - A. 微循环首先发生血流动力学改变
 - B. 血流变慢和血管通透性增加是渗出的必备条件
 - C. 液体和细胞从毛细血管和细静脉渗出
 - D. 所有渗出的白细胞都具有吞噬作用
 - E. 渗出的液体和白细胞被称为渗出物
7. 急性炎症局部组织变红的主要原因是
 - A. 炎症灶内炎细胞浸润
 - B. 肉芽组织增生
 - C. 血管扩张，血流加快
 - D. 炎症灶内血栓形成
 - E. 组织间隙水肿
8. 下列哪项不是恶性肿瘤

- A. 精原细胞瘤
B. 成熟畸胎瘤
C. 黑色素瘤
D. 神经母细胞瘤
E. 髓母细胞瘤
9. 高血压心脏的病变特征是
A. 右心室肥大
B. 右心房扩张
C. 左心室向心性肥大
D. 室壁瘤形成
E. 乳头肌扁平
10. 《执业医师法》规定, 医师在执业活动中应履行的义务之一是
A. 在注册的执业范围内, 选择合理的医疗、预防、保健方案
B. 从事医学研究、学术交流, 参加专业学术团体
C. 参加专业培训, 接受继续医学教育
D. 努力钻研业务, 更新知识, 提高专业水平
E. 获得工资报酬和津贴, 享受国家规定的福利待遇
11. 医疗机构必须配备药学技术人员, 配备的这类人员应是依法经过
A. 资格认定
B. 学历认定
C. 资历认定
D. 资质认定
E. 执业认定
12. 《中华人民共和国侵权责任法》施行时间是
A. 2009年12月1日
B. 2009年12月26日
C. 2010年1月1日
D. 2010年7月1日
E. 2010年9月1日
13. 慢性支气管炎最主要的病因是
A. 免疫功能降低
- B. 大气污染
C. 气候因素
D. 真菌感染
E. 长期吸烟
14. 诊断慢支急性发作伴细菌感染的主要依据是
A. 咳白色泡沫黏痰
B. 咳嗽增多
C. 痰量较多呈脓性
D. 肺底部有细湿啰音
E. 吸气延长伴哮鸣音
15. 我国引起肺心病最常见的病因是
A. 肺间质纤维化
B. 重症肺结核
C. 慢性阻塞性肺疾病
D. 支气管扩张
E. 原发性肺动脉高压
16. 导致哮喘反复发作最重要的原因是
A. 气道慢性炎症
B. 气道黏膜水肿
C. 支气管平滑肌功能失调
D. 气道内黏液栓
E. 气道高反应
17. 医院内获得性肺炎, 最常见的致病菌是
A. 病毒
B. 革兰阳性球菌
C. 厌氧菌
D. 革兰阴性杆菌
E. 真菌
18. 有关支气管扩张的治疗措施不正确的是
A. 恰当体位引流
B. 轮换使用抗生素
C. 禁用支气管扩张剂
D. 积极治疗基础疾病
E. 大咯血可考虑外科手术
19. 抗结核药联合短程化疗最有价值的是
A. 减少药物副作用
B. 减少并发症

- C. 减少或避免后遗症
D. 减少或避免耐药性发生
E. 症状缓解快
20. II型呼吸衰竭氧疗时适宜的吸氧浓度为
A. 25%~34%
B. 35%~40%
C. 41%~45%
D. 46%~50%
E. 51%~60%
21. 关于咳嗽的描述下列哪项正确
A. 只有在呼吸道感染时才能引起咳嗽
B. 干咳仅见于肺癌早期
C. 支气管扩张咳嗽往往于清晨或夜间变动体位时加重，并伴咳痰
D. 中枢神经因素引起的咳嗽，是桥脑发出冲动所致
E. 感染时引起的咳嗽较重，非感染因素引起的咳嗽较轻
22. 与呼吸困难无明显关系的疾病包括
A. 肺炎
B. 急性胃炎
C. 大量腹腔积液
D. 急性一氧化碳中毒
E. 脑出血
23. 血压 170/100mmHg 伴心肌梗死患者应诊断为高血压
A. 2 级(低危)
B. 2 级(中危)
C. 2 级(高危)
D. 2 级(极高危)
E. 3 级(极高危)
24. 直接引起心脏容量负荷加重的疾病为
A. 主动脉瓣狭窄
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 肺动脉瓣狭窄
D. 高血压
E. 肺动脉高压
25. 以下是冠心病的危险因素，除了
A. 年龄、性别、吸烟
B. 血红蛋白异常
C. 血脂、血压异常
D. 胰岛素抵抗与肥胖
E. 高同型半胱氨酸血症
26. 可引起低血钾的药物是
A. 螺内酯
B. 依那普利
C. 氨苯蝶啶
D. 阿米洛利
E. 呋塞米
27. 动脉粥样硬化病变最常累及哪一支冠状动脉
A. 左冠状动脉主干
B. 左冠状动脉回旋支
C. 左冠状动脉前降支
D. 右冠状动脉后降支
E. 右冠状动脉窦房结支
28. 急性心肌梗死最常见的心律失常是
A. 心房颤动
B. 房室传导阻滞
C. 室性期前收缩
D. 窦房传导阻滞
E. 加速性室性自主心律
29. 下列哪种情况常有震颤
A. 主动脉瓣关闭不全
B. 肺动脉瓣关闭不全
C. 动脉导管未闭
D. 二尖瓣关闭不全
E. 三尖瓣关闭不全
30. 二尖瓣狭窄最严重的并发症是
A. 心房颤动
B. 右心衰竭
C. 血栓栓塞
D. 急性肺水肿
E. 感染性心内膜炎
31. 下列心脏瓣膜病中，最易引起心绞痛的是

- A. 二尖瓣狭窄
B. 二尖瓣关闭不全
C. 主动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全
E. 肺动脉瓣狭窄
32. 亚急性感染性心内膜炎的发病机制中不包括哪一项
A. 血流动力学改变
B. 暂时性菌血症
C. 血液的高凝状态
D. 细菌感染无菌性赘生物
E. 非细菌性血栓性心内膜炎
33. 扩张型心肌病的临床表现哪一项错误
A. 起病隐匿而缓慢
B. 可以发生严重心律失常
C. 以充血性心力衰竭为表现
D. 发病年龄大多数为老年人
E. 心脏普遍增大,以左心室为著
34. 心脏压塞体征中不包括
A. 发绀
B. 心包摩擦音
C. 颈静脉怒张
D. 脉速,脉压小
E. 肝大,下肢水肿
35. 以下哪类心律失常,其心律规则,心室率正常
A. 室上性心动过速
B. 心房扑动伴 4:1 房室传导
C. 窦性心动过速
D. 心房颤动
E. 短阵室性心动过速
36. 有关心包摩擦音正确的是
A. 性质粗糙,低音调
B. 与呼吸、心搏一致
C. 性质柔和,低音调
D. 胸骨左缘 3、4 肋间最响
E. 屏气时摩擦音可消失
37. 关于上消化道出血哪项描述不正确
A. 上消化道大量出血后多数可出现低热
B. 胃内积血 250~300ml 可引起呕血
C. 每日出血 50~100ml 可出现黑粪
D. 周围血可见晚幼红细胞与嗜多色性红细胞
E. 急性大出血时血象检查为早期诊断和病情观察的依据
38. 慢性活动性胃炎的治疗应特别注意采用
A. 强力抑酸药
B. 胃黏膜保护药
C. 抗幽门螺杆菌治疗
D. 促胃肠动力药
E. 抗抑郁药物
39. 有关消化性溃疡的流行病学以下哪项是正确的
A. 我国球部溃疡和胃溃疡发病率相同
B. 女性与男性之比为 3:1~4:1
C. 60 岁以上老人一般不发生
D. 十二指肠球部溃疡近年来发病率下降
E. 胃溃疡多位于胃小弯,尤其多见于胃窦部
40. 肠结核的好发部位为
A. 回盲部
B. 空肠
C. 回肠
D. 升结肠
E. 十二指肠
41. 下述哪一项对结核性腹膜炎最具诊断价值
A. 腹水检查
B. 腹壁柔韧感
C. 腹腔镜检查
D. 腹部 X 线平片检查
E. 结核菌素皮肤试验
42. 下列 X 线钡剂灌肠检查所见不符合溃疡性结肠炎的是

- A. 病变轻微者可以正常
B. 可呈现跳跃征
C. 结肠袋消失
D. 可见圆形或是卵圆形充盈缺损
E. 肠壁呈现毛刺状或是锯齿状
43. 急性腹痛发病一周后,对胰腺炎较具诊断价值的检查为
A. 白细胞计数及分类
B. 血清淀粉酶
C. 空腹血糖测定
D. 血清脂肪酶
E. X线腹部平片
44. 以下为肝性脑病的诱发因素,哪项除外
A. 大量排钾利尿
B. 多次灌肠或导泻
C. 上消化道出血
D. 反复放腹水
E. 高蛋白饮食
45. 下列哪项是确诊肝硬化最可靠的证据
A. 食管钡餐检查发现静脉曲张
B. 腹壁有水母头状静脉怒张
C. 肝穿刺活检示假小叶形成
D. 血浆白蛋白/球蛋白比例倒置
E. 血清单胺氧化酶活性增高
46. 根据病因及发病机制贫血可分为
A. 红细胞生成减少、造血功能不良两类
B. 红细胞生成减少、造血功能不良及红细胞破坏过多三类
C. 红细胞生成减少、红细胞破坏过多及失血三类
D. 红细胞生成减少、溶血、失血、再障及缺铁五类
E. 红细胞生成减少、红细胞过度破坏、失血及造血功能不良四类
47. 红细胞增多常见于
A. 糖尿病
B. 严重慢性心肺疾病
C. 严重的组织损伤
- D. 支气管哮喘
E. 急性中毒
48. 急粒与急淋的鉴别要点是
A. 前者多有贫血、发热、出血
B. 前者白细胞计数往往更高
C. 前者较易发生中枢神经系统白血病
D. 前者骨髓增生多极度活跃
E. 前者原始细胞 POX 染色阳性
49. 对白血病化疗的表述不正确的是
A. 目的是达到完全缓解并延长生存期
B. 目前多采用联合化疗
C. 急淋患者的诱导缓解治疗,常用 VP 方案
D. 急非淋白血病的常用标准诱导缓解方案是 DA 方案
E. VP 方案中 P 指的是柔红霉素
50. 各种蛋白质平均含氮量约为
A. 0.6%
B. 6%
C. 16%
D. 26%
E. 36%
51. DNA 的一级结构是指
A. 多聚 A 结构
B. 核苷酸排列顺序
C. 双螺旋结构
D. 三叶草结构
E. 核小体结构
52. 下列有关酶的论述中错误的是
A. 酶有高度的催化效率
B. 酶有高度的专一性
C. 酶能催化化学上不可能进行的反应
D. 酶促反应具有可调节性
E. 酶由活细胞产生,但在试管中仍有催化效能
53. 维生素 D₃ 的活性形式是
A. 25-(OH)D₃
B. 1,25-(OH)₂D₃

- C. $24,25-(OH)_2D_3$
 D. $1-(OH)D_3$
 E. $24-(OH)D_3$
54. 含金属钴的维生素是
 A. B_1
 B. B_2
 C. B_6
 D. B_{12}
 E. 叶酸
55. 糖酵解途径的关键酶是
 A. 丙酮酸羧化酶
 B. 6-磷酸果糖激酶-1
 C. 果糖二磷酸酶
 D. 磷酸己糖异构酶
 E. 6-磷酸果糖激酶-2
56. 在糖酵解和糖异生中均有作用的酶是
 A. 己糖激酶
 B. 磷酸丙糖异构酶
 C. 丙酮酸激酶
 D. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
 E. 丙酮酸羧化酶
57. 呼吸链中的递氢体是
 A. 铁硫蛋白
 B. 细胞色素 c
 C. 细胞色素 b
 D. 细胞色素 aa₃
 E. 辅酶 Q
58. 属于必需脂肪酸的是
 A. 软脂酸
 B. 硬脂酸
 C. 油酸
 D. 亚油酸
 E. 月桂酸
59. 关于载脂蛋白生理功能的叙述, 错误的是
 A. 稳定脂蛋白结构
 B. 转运游离脂肪酸
 C. 识别脂蛋白受体
- D. 调节脂蛋白代谢有关酶的活性
 E. 促进脂质在脂蛋白间交换
60. 医学伦理学是
 A. 研究人与人之间关系的科学
 B. 研究人与社会之间关系的科学
 C. 研究医务人员的医德意识和医德活动的科学
 D. 研究科学道德或科学哲学的学科
 E. 研究医疗人际关系的学科
61. 医疗伤害带有一定的
 A. 可控性
 B. 必然性
 C. 可预见性
 D. 责任性
 E. 可知性
62. 临床诊疗的医学道德原则**不应包括**
 A. 整体性原则
 B. 最优化原则
 C. 消灭差错事故原则
 D. 知情同意原则
 E. 协同一致原则
63. 医德修养的根本途径和方法是坚持
 A. 学习医德理论知识
 B. 学习医德榜样人物
 C. 医疗卫生保健实践
 D. 经常性批评与自我批评
 E. 有的放矢
64. 医疗机构临床用血应当遵照的原则是
 A. 合理、安全
 B. 合理、科学
 C. 安全、规范
 D. 科学、安全
 E. 科学、规范
65. Na^+ 跨膜转运的方式有
 A. 被动转运
 B. 经通道易化扩散
 C. 被动转运和主动转运
 D. 主动转运

- E. 单纯扩散和主动转运
66. 骨骼肌兴奋-收缩耦联中主要参与的离子是
 A. Ca^{2+}
 B. Na^+
 C. K^+
 D. Cl^-
 E. Mg^{2+}
67. 衡量组织兴奋性高低的指标是
 A. 肌肉收缩的强度
 B. 腺细胞分泌的多少
 C. 刺激频率的高低
 D. 刺激强度的大小
 E. 动作电位的幅度
68. 细胞膜的 K^+ 平衡电位是指
 A. 膜两侧 K^+ 浓度差为零
 B. 膜两侧 K^+ 电化学驱动力为零
 C. 膜两侧电位差为零
 D. 膜处于超极化状态
 E. 膜外 K^+ 浓度大于膜内
69. 调节胰岛素分泌的最重要的因素是
 A. 血糖水平
 B. 血中氨基酸的水平
 C. 血钙水平
 D. 血脂水平
 E. 血钾水平
70. 具有特异性免疫功能的血细胞是
 A. 中性粒细胞
 B. 嗜酸性粒细胞
 C. 红细胞
 D. 淋巴细胞
 E. 单核细胞
71. 在心动周期中占时间最长的时期是
 A. 心室收缩期
 B. 心室射血期
 C. 心室舒张期
 D. 心室充盈期
 E. 心房舒张期
72. 血压突然升高时可迅速恢复正常, 这属于
 A. 正反馈调节
 B. 负反馈调节
 C. 局部调节
 D. 体液调节
 E. 自身调节
73. 肾上腺素与其受体结合的特点是
 A. 与 α, β 受体结合力都很强
 B. 与 α 受体结合力强, β 受体弱
 C. 与 β 受体结合力强, α 受体弱
 D. 只与 α 受体结合
 E. 只与 β 受体结合
74. 心交感神经兴奋时可致心肌细胞
 A. Ca^{2+} 通道开放概率增加
 B. 自律细胞 4 期的内向电流减弱
 C. 工作细胞复极期 K^+ 外流减慢
 D. 肌钙蛋白与 Ca^{2+} 亲和力增强
 E. 抑制心肌细胞膜腺苷酸环化酶
75. 肺泡通气量指
 A. 每次吸入或呼出的气体量
 B. 用力吸入的气体量
 C. 每分钟吸入肺的气体量
 D. 每分钟吸入肺泡的气体量
 E. 无效腔中的气体量
76. 肺泡表面活性物质的生理作用是
 A. 使肺泡趋向缩小
 B. 增加毛细血管滤过
 C. 降低肺的顺应性
 D. 降低气道阻力
 E. 降低肺的表面张力
77. 下列不是神经衰弱表现的是
 A. 脑力活动易疲劳
 B. 易激惹、暴怒、烦躁等
 C. 睡眠障碍
 D. 常用头痛
 E. 毫无根据的惶惶不可终日之感
78. 咖啡的适应证为