

中国科学院华南植物园
西南交通大学生命与工程学院

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主编 叶华谷 曾飞燕 叶育石 郑 琮

(四)



化学工业出版社

中国科学院
西南交通研究所



中
國
藥
用
植
物
(四)

叶育石 郑 瑞
主编 古华谷 曾飞燕
CHINESE MEDICINAL PLANTS



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式，按种类名称字母顺序介绍了我国野生及栽培的药用植物共198种（包括亚种、变种和变型），包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。为了安全起见，在有些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，提醒读者慎用。书后附有中文索引和拉丁名索引。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域的人员参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

中国药用植物（四）/叶华谷，曾飞燕，叶育石，郑珺主编。--北京：化学工业出版社，2014.7

ISBN 978-7-122-20867-5

I . ①中 … II . ①叶 … ②曾 … ③叶 … ④郑 … III . ①药用植物 - 介绍 - 中国
IV . ①R282.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 119413 号

责任编辑：李丽

文字编辑：王新辉

责任校对：王素芹

装帧设计：百彤文化传播

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张 13 字数 220 千字 2014 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519680）售后服务：010-64519661

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：79.00 元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编 叶华谷 曾飞燕 叶育石 郑 琨

副 主 编 袁 艺 付 琳 邹 滨

编写人员 熊秉红 于 慧 王发国 邓乔华 刘 冰 刘 念
吴林芳 李书渊 林汝顺 李如良 李泽贤 李素英
张 征 张慧晔 杜怡枫 陈海山 陈玉笋 陈巧明
陈有卿 林锦锋 林惠蓉 杨科明 侯惠婵 秦新生
贾宜军 黄均成 黄珊珊 符同浩 曹洪麟 曹照忠
曾庆钱 曾宪禹 翟俊文 莫结丽 童 毅 叶华谷
曾飞燕 叶育石 郑 琨 袁 艺 付 琳 邹 滨
华翠辉

摄 影 王 斌 邓乔华 叶华谷 叶育石 李泽贤 刘 冰
邹 滨 袁 艺 曾飞燕

本书承

“中国战略生物资源科技支撑体系运行专项(CZBZX-1)、
财政部战略生物资源科技支撑运行专项(KSCX2-YW-Z-1004)、植物园迁地保护植物编目及信息标准化
(2009FY120200)”项目资助出版。





前言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类以字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物198种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《广东中药志》《华南药用植物》《湖南药物志》和《广西药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

黑荆	<i>Acacia mearnsi</i>	2
野菰	<i>Aeginetia indica</i>	4
穿鞘花	<i>Amischotolype hispida</i>	6
假槟榔	<i>Archontophoenix alexandrae</i>	8
槟榔	<i>Areca catechu</i>	10
杏	<i>Armeniaca vulgaris</i>	12
三褶脉紫菀	<i>Aster ageratoides</i>	14
白舌紫菀	<i>Aster baccharoides</i>	16
琴叶紫菀	<i>Aster panduratus</i>	18
钻形紫菀	<i>Aster subulatus</i>	20
白术	<i>Attractylodes macrocephala</i>	22
粉单竹	<i>Bambusa chungii</i>	24
坭箭竹	<i>Bambusa dissimulator</i>	26
撑篙竹	<i>Bambusa pervariabilis</i>	28
粉叶羊蹄甲	<i>Bauhinia glauca</i>	30
羊蹄甲	<i>Bauhinia purpurea</i>	32
洋紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	34
白花洋紫荆	<i>Bauhinia variegata</i> var. <i>candida</i>	36
多花勾儿茶	<i>Berchemia floribunda</i>	38
铁包金	<i>Berchemia lineata</i>	40
光枝勾儿茶	<i>Berchemia polyphylla</i> var. <i>leioclada</i>	42
华南桦	<i>Betula austrosinensis</i>	44
伯乐树	<i>Bretschneidera sinensis</i>	46
黑面神	<i>Breynia fruticosa</i>	48
土蜜树	<i>Bridelia tomentosa</i>	50
狭叶醉鱼草	<i>Buddleja asiatica</i>	52
醉鱼草	<i>Buddleja lindleyana</i>	54

密蒙花	<i>Buddleja officinalis</i>	56
指天椒	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>conoides</i>	58
簇生椒	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>fasciculatum</i>	60
小米椒	<i>Capsicum frutescens</i>	62
嘉赐树	<i>Casearia glomerata</i>	64
锥栗	<i>Castanea henryi</i>	66
锥	<i>Castanopsis chinensis</i>	68
甜槠	<i>Castanopsis eyrei</i>	70
红锥	<i>Castanopsis hystrix</i>	72
大芽南蛇藤	<i>Celastrus gemmatus</i>	74
青江藤	<i>Celastrus hindsii</i>	76
粉背南蛇藤	<i>Celastrus hypoleucus</i>	78
圆叶南蛇藤	<i>Celastrus kusanoi</i>	80
积雪草	<i>Centella asiatica</i>	82
樱桃	<i>Cerasus pseudocerasus</i>	84
夜香树	<i>Cestrum nocturnum</i>	86
皱皮木瓜	<i>Chaenomeles speciosa</i>	88
竹节草	<i>Chrysopogon aciculatus</i>	90
香桂	<i>Cinnamomum subavenium</i>	92
川桂	<i>Cinnamomum wilsonii</i>	94
翼茎白粉藤	<i>Cissus pteroclada</i>	96
白桐树	<i>Claoxylon indicum</i>	98
蝴蝶果	<i>Cleidiocarpon cavaleriei</i>	100
棒柄花	<i>Cleidion brevipetiolatum</i>	102
蛇床子	<i>Cnidium monnierii</i>	104
饭包草	<i>Commelina bengalensis</i>	106
鸭跖草	<i>Commelina communis</i>	108
节节草	<i>Commelina diffusa</i>	110
大苞鸭跖草	<i>Commelina paludosa</i>	112
芫荽	<i>Coriandrum sativum</i>	114
野山楂	<i>Crataegus cuneata</i>	116
线叶猪屎豆	<i>Crotalaria linifolia</i>	118

猪屎豆	<i>Crotalaria pallida</i>	120
野百合	<i>Crotalaria sessiliflora</i>	122
光萼野百合	<i>Crotalaria zanzibarica</i>	124
鸭儿芹	<i>Cryptotaenia japonica</i>	126
香瓜	<i>Cucumis melo</i>	128
华南毛蕨	<i>Cyclosorus parasiticus</i>	130
建兰	<i>Cymbidium ensifolium</i>	132
多花兰	<i>Cymbidium floribundum</i>	134
春兰	<i>Cymbidium goeringii</i>	136
兔耳兰	<i>Cymbidium lancifolium</i>	138
墨兰	<i>Cymbidium sinense</i>	140
刺瓜	<i>Cynanchum corymbosum</i>	142
山白前	<i>Cynanchum fordii</i>	144
徐长卿	<i>Cynanchum paniculatum</i>	146
柳叶白前	<i>Cynanchum stauntonii</i>	148
白花曼陀罗	<i>Datura metel</i>	150
双盖蕨	<i>Diplazium donianum</i>	152
血竭	<i>Dracaena cambodiana</i>	154
锦地罗	<i>Drosera burmanni</i>	156
光萼茅膏菜	<i>Drosera peltata</i> var. <i>glabrata</i>	158
桫椤鳞毛蕨	<i>Dryopteris cycadina</i>	160
蛇莓	<i>Duchesnea indica</i>	162
卫矛	<i>Euonymus alatus</i>	164
紫刺卫矛	<i>Euonymus angustatus</i>	166
扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i>	168
冬青卫矛	<i>Euonymus japonicus</i>	170
疏花卫矛	<i>Euonymus laxiflorus</i>	172
薜荔	<i>Ficus pumila</i>	174
菩提树	<i>Ficus religiosa</i>	176
珍珠莲	<i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>henryi</i>	178
纽榕	<i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>impressa</i>	180
多花瓜馥木	<i>Fissistigma polyanthum</i>	182

紫芝	<i>Ganoderma sinense</i>	184
向日葵	<i>Helianthus annuus</i>	186
菊芋	<i>Helianthus tuberosus</i>	188
泥胡菜	<i>Hemistepta lyrata</i>	190
蛇莲	<i>Hemsleya sphaerocarpa</i>	192
天胡荽	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i>	194
破铜钱	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> var. <i>batrachium</i>	196
油渣果	<i>Hodgsonia macrocarpa</i>	198
野灯心草	<i>Juncus setchuensis</i>	200
复羽叶栾树	<i>Koelreuteria bipinnata</i>	202
葫芦	<i>Lagenaria siceraria</i>	204
浮萍	<i>Lemna minor</i>	206
湖瓜草	<i>Lipocarpha microcephala</i>	208
荔枝	<i>Litchi chinensis</i>	210
光萼华南忍冬	<i>Lonicera confusa</i> var. <i>glabrocalyx</i>	212
短柄忍冬	<i>Lonicera pampaninii</i>	214
皱叶忍冬	<i>Lonicera rhytidophylla</i>	216
钗子股	<i>Luisia morsei</i>	218
多花野牡丹	<i>Melastoma affine</i>	220
地菍	<i>Melastoma dodecandrum</i>	222
细叶野牡丹	<i>Melastoma intermedium</i>	224
展毛野牡丹	<i>Melastoma normale</i>	226
攀援星蕨	<i>Microsorium buergerianum</i>	228
羽裂星蕨	<i>Microsorium dilatatum</i>	230
江南星蕨	<i>Microsorium fortunei</i>	232
青杨梅	<i>Myrica adenophora</i>	234
杨梅	<i>Myrica rubra</i>	236
锈叶新木姜	<i>Neolitsea cambodiana</i>	238
鴨公树	<i>Neolitsea chuii</i>	240
簇叶新木姜	<i>Neolitsea confertifolia</i>	242
金星蕨	<i>Parathelypteris glanduligera</i>	244
异叶爬山虎	<i>Parthenocissus dalzielii</i>	246

绿叶爬山虎	<i>Parthenocissus laetevirens</i>	248
大盖球子草	<i>Peliosanthes macrostegia</i>	250
有柄马尾杉	<i>Phlegmariurus petiolatus</i>	252
过江藤	<i>Phyla nodiflora</i>	254
大薸	<i>Pistia stratiotes</i>	256
镰叶瘤足蕨	<i>Plagiogyria distinctissima</i>	258
华中瘤足蕨	<i>Plagiogyria eupblebia</i>	260
短叶罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	262
长梗黄精	<i>Polygonatum filipes</i>	264
玉竹	<i>Polygonatum odoratum</i>	266
毛蓼	<i>Polygonum barbatum</i>	268
头花蓼	<i>Polygonum capitatum</i>	270
火炭母	<i>Polygonum chinense</i>	272
黑鱗耳蕨	<i>Polystichum makinoi</i>	274
三叉耳蕨	<i>Polystichum tripteris</i>	276
百足藤	<i>Pothos repens</i>	278
豆腐柴	<i>Premna microphylla</i>	280
狐臭柴	<i>Premna puberula</i>	282
全缘凤尾蕨	<i>Pteris insignis</i>	284
凤尾蕨	<i>Pteris multifida</i>	286
野葛	<i>Pueraria lobata</i>	288
葛麻姆	<i>Pueraria lobata</i> var. <i>montana</i>	290
粉葛	<i>Pueraria lobata</i> var. <i>thomsonii</i>	292
三裂叶野葛	<i>Pueraria phaseoloides</i>	294
吉祥草	<i>Reineckia carnea</i>	296
岩芋	<i>Remusatia vivipara</i>	298
狮子尾	<i>Rhaphidophora hongkongensis</i>	300
刺子莞	<i>Rhynchospora rubra</i>	302
簇花清风藤	<i>Sabia fasciculata</i>	304
清风藤	<i>Sabia japonica</i>	306
囊颖草	<i>Sacciolepis indica</i>	308
虎尾兰	<i>Sansevieria trifasciata</i>	310

金边虎尾兰	<i>Sansevieria trifasciata</i> var. <i>laurentii</i>	312
过山风	<i>Schisandra viridis</i>	314
萤蔺	<i>Scirpus juncoides</i>	316
水毛草	<i>Scirpus mucronatus</i>	318
藨草	<i>Scirpus triqueter</i>	320
大狗尾草	<i>Setaria faberii</i>	322
莠狗尾草	<i>Setaria geniculata</i>	324
金色狗尾草	<i>Setaria glauca</i>	326
棕叶狗尾草	<i>Setaria palmifolia</i>	328
紫萍	<i>Spirodela polyrrhiza</i>	330
鼠尾粟	<i>Sporobolus fertilis</i>	332
假马鞭	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	334
金线吊乌龟	<i>Stephania cepharantha</i>	336
血散薯	<i>Stephania dielsiana</i>	338
粪箕笃	<i>Stephania longa</i>	340
粉防己	<i>Stephania tetrandra</i>	342
牛眼马钱	<i>Strychnos angustiflora</i>	344
三脉马钱	<i>Strychnos cathayensis</i>	346
土人参	<i>Talinum paniculatum</i>	348
白花苦灯笼	<i>Tarenna mollissima</i>	350
柚木	<i>Tectona grandis</i>	352
苞子草	<i>Themeda caudata</i>	354
黄背草	<i>Themeda japonica</i>	356
菅	<i>Themeda villosa</i>	358
可可	<i>Theobroma cacao</i>	360
侧柏	<i>Thuja orientalis</i>	362
油点草	<i>Tricyrtis macropoda</i>	364
小麦	<i>Triticum aestivum</i>	366
开口箭	<i>Tupistra chinensis</i>	368
犁头尖	<i>Typhonium blumei</i>	370
钩藤	<i>Uncaria rhynchophylla</i>	372
假钩藤	<i>Uncaria rhynchophylloides</i>	374

挖耳草	<i>Utricularia bifida</i>	376
阿拉伯婆婆纳	<i>Veronica persica</i>	378
婆婆纳	<i>Veronica polita</i>	380
水苦荬	<i>Veronica undulata</i>	382
四方麻	<i>Veronicastrum caulopterum</i>	384
腹水草	<i>Veronicastrum stenostachyum</i> subsp. <i>plukanetii</i>	386
水锦树	<i>Wendlandia uvariifolia</i>	388
蓝树	<i>Wrightia laevis</i>	390
倒吊笔	<i>Wrightia pubescens</i>	392
柞木	<i>Xylosma racemosum</i>	394
大丝兰	<i>Yucca gloriosa</i>	396
参考文献	398
拉丁名索引	399
中文名索引	401



黑 荆

Acacia mearnsi De Wilde

【基 原】 来源于含羞草科金合欢属黑荆 *Acacia mearnsi* De Wilde 的树胶入药。

【形态特征】 乔木，高9~15m；小枝有棱，被灰白色短茸毛。二回羽状复叶，嫩叶被金黄色短茸毛，成长叶被灰色短柔毛；羽片8~20对，长2~7cm，每对羽片着生处附近及叶轴的其他部位都具有腺体；小叶30~40对，排列紧密，线形，长2~3mm，宽0.8~1mm，羽片边缘、下面，有时两面均被短柔毛。头状花序圆球形，直径6~7mm，在叶腋排成总状花序或在枝顶排成圆锥花序；总花梗长7~10mm；花序轴被黄色、稠密的短茸毛。花淡黄或白色。荚果长圆形，扁压，长5~10cm，宽4~5mm，于种子间略收窄，被短柔毛，老时黑色；种子卵圆形，黑色，有光泽。花期6月；果期8月。

【生 境】 栽培。

【分 布】 香港、广东、浙江、台湾、福建、广西、云南、四川。原产热带美洲，现广布于热带地区。

【采集加工】 夏秋采收，树胶晒干。

【性味功能】 树胶代替阿拉伯胶使用。阿拉伯胶是药品和食品工业广泛使用的树胶。



野 蕺

Aeginetia indica Linn

【别名】蛇箭草、烧不死

【基 原】来源于列当科野菰属野菰 *Aeginetia indica* Linn [*A. japonica* Sieb. et Zucc.] 的全草入药。

【形态特征】一年生寄生草本，高 15 ~ 40 (~ 50) cm。根稍肉质，具树状细小分枝。茎黄褐色或紫红色。叶肉红色，卵状披针形或披针形，长 5 ~ 10 mm，宽 3 ~ 4 mm，两面光滑无毛。花生茎端，稍俯垂；花梗粗壮，常直立，长 10 ~ 30 (40) cm，直径约 3 mm，无毛，常具紫红色的条纹；花萼一侧裂开至近基部，长 2.5 ~ 4.5 (~ 6.5) cm，紫红色、黄色或黄白色，具紫红色条纹，顶端急尖或渐尖，两面无毛；花冠带黏液，常与花萼同色，或有时下部白色，上部带紫色，凋谢后变绿黑色，干时变黑色，长 4 ~ 6 cm，不明显的二唇形，筒部宽，稍弯曲，在花丝着生处变窄，顶端 5 浅裂，上唇裂片和下唇的侧裂片较短，近圆形，全缘，下唇中间裂片稍大；雄蕊 4 枚，内藏，花丝着生于距筒基部 1.4 ~ 1.5 cm 处，长 7 ~ 9 mm，紫色，无毛，花药黄色，有黏液，成对黏合，仅 1 室发育，下方一对雄蕊的药隔基部延长成距；子房 1 室，侧膜胎座 4 个，横切面有极多分枝，花柱无毛，长 1 ~ 1.5 cm，柱头膨大，肉质，淡黄色，盾状。蒴果圆锥状或长卵球形，长 2 ~ 3 cm，2 瓣开裂。花期 4 ~ 8 月；果期 8 ~ 10 月。

【生 境】寄生于禾本科植物的根上，多生长于土层深厚、枯叶多的湿润地。

【分 布】香港、广东、澳门、海南、台湾、福建、江西、浙江、江苏、安徽、湖南、广西、贵州、云南、四川。印度、斯里兰卡、缅甸、越南、菲律宾、马来西亚及日本也有分布。

【采集加工】夏秋采收，将全草晒干。

【性味功能】味苦，性凉，有小毒。解毒消肿，清热凉血。

【主治用法】治扁桃体炎，咽喉炎，尿路感染，骨髓炎。外用治毒蛇咬伤，疔疮。用量 3 ~ 9 g，水煎服。