



全国护士执业资格考试 考前冲刺训练

主编 陈锦秀

紧扣大纲
切合实用
立足考试
轻松应对

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

全国护士执业资格考试 考前冲刺训练

主 编 陈锦秀

中国中医药出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

全国护士执业资格考试考前冲刺训练/陈锦秀主编. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-5132-2116-0

I. ①全… II. ①陈… III. ①护士-资格考试-习题集 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 252087 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京地泰德印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 27.25 字数 609 千字
2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5132-2116-0

*

定价 55.00 元
网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换
版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

目 录

第一章 基础护理和技能	1
第二章 法律法规与护理管理	70
第三章 护理伦理与人际沟通	84
第四章 循环系统疾病	97
第五章 消化系统疾病	123
第六章 呼吸系统疾病	145
第七章 传染性疾病	163
第八章 皮肤和皮下组织疾病	176
第九章 妊娠、分娩和产褥期疾病	178
第十章 起源于围生期的疾病和状态、新生儿与新生儿疾病	200
第十一章 泌尿生殖系统疾病	209
第十二章 精神障碍	228
第十三章 损伤、中毒	233
第十四章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病	241
第十五章 肿瘤	250
第十六章 血液、造血器官及免疫疾病	266
第十七章 内分泌、营养及代谢疾病	272
第十八章 神经系统疾病	282
第十九章 影响健康状态和保健机构接触因素、生命发展保健	294
第二十章 中医药知识	307
全国护士执业资格考试模拟试卷（一）	311
专业实务	311
实践能力	321
全国护士执业资格考试模拟试卷（二）	339

专业实务	339
实践能力	349
全国护士执业资格考试模拟试卷（三）	368
专业实务	368
实践能力	378
全国护士执业资格考试模拟试卷（四）	397
专业实务	397
实践能力	407

第一章 基础护理和技能

A1 型题

1. 凡事过犹不及，因此在社交场合运用礼仪时应该遵守礼仪的
A. 宽容原则 B. 敬人原则
C. 适度原则 D. 自律原则
E. 真诚原则
2. 俗话说“十里不同风，百里不同俗”，指的是礼仪的
A. 遵守原则 B. 从俗原则
C. 平等原则 D. 宽容原则
E. 自律原则
3. 古人云“己所不欲，勿施于人”，指的是礼仪的
A. 尊重原则 B. 从俗原则
C. 真诚原则 D. 宽容原则
E. 适度原则
4. 礼仪是人际交往中得到共同认可的
A. 思想
B. 语言
C. 爱好
D. 行为规范和准则
E. 仪式
5. 护理礼仪的特点是
A. 专业性 B. 强制性
C. 服从性 D. 灵活性
E. 操作性
6. 护士应该充分尊重患者的宗教信仰，这是护理礼仪的
A. 专业性 B. 规范性
C. 综合性 D. 操作性
E. 适应性
7. 护士工作期间，如果是短头发应该
A. 不要长过衣领 B. 盘起
C. 遮住耳朵 D. 遮住眼睛
E. 统一发型
8. 护士服的穿着要求中，不正确的是
A. 护士服的样式以整洁美观为原则
B. 里面不应穿过于臃肿的衣服
C. 里面衣服的袖子可以长过护士服
D. 里面衣服的领子不可以高过护士服
E. 注意服装整体的协调合体
9. 在手术室工作时护士佩戴圆帽，不正确的做法是
A. 头发全部在帽子里面
B. 不露发际
C. 不戴头饰
D. 遮住眉毛
E. 帽子干净
10. 在公众场合，礼仪上要求人际交往的距离一般保持在
A. 0.5m 之内
B. 0.5 ~ 1.5m 之间
C. 1.5 ~ 3m 之间
D. 3m 以上
E. 越接近越好
11. 护理程序是科学地认识、分析和解决问题的
A. 工作前提 B. 工作方针
C. 工作方法 D. 工作条件
E. 工作基础
12. 以下关于“护理程序”的概念，描述错误的是
A. 是指导护士工作及解决问题的科学方法
B. 其目标是增进或恢复服务对象的

- 健康
- C. 以系统论为理论框架
- D. 由评估、计划、实施、评价四个步骤组成
- E. 具有计划、决策和反馈的功能
13. 形成护理程序结构的最基本理论框架是
- A. 方法论 B. 系统论
- C. 信息论 D. 解决问题论
- E. 基本需要论
14. 首先提出护理程序的是
- A. 奥兰多 B. 李式鸾
- C. 海尔 D. 尤拉
- E. 袁剑云
15. 护理程序各步骤的排列顺序是
- A. 评估、诊断、计划、实施、评价
- B. 评估、计划、诊断、实施、评价
- C. 诊断、评估、计划、实施、评价
- D. 评价、实施、诊断、计划、评估
- E. 诊断、计划、评估、实施、评价
16. 评估时资料的主要来源是
- A. 亲属
- B. 其他医护人员
- C. 个人的医疗文件
- D. 患者
- E. 参考文献
17. 以下关于收集健康资料的目的, 描述错误的是
- A. 为了解患者隐私, 确立护理诊断提供依据
- B. 为寻找病因、制定护理措施提供依据
- C. 为了解病情变化, 制定护理方案提供依据
- D. 为了解患者心理特征, 选择护理实施方法提供依据
- E. 为了解治疗反应, 评估护理行为提供依据
18. 不属于患者资料收集内容的是
- A. 患者的年龄、民族、职业
- B. 患者对疾病的认识与反应
- C. 患者的手术史、过敏史
- D. 家庭成员婚恋史
- E. 患者的生活方式
19. 属于客观资料的是
- A. 头痛 B. 咽喉部充血
- C. 入睡困难 D. 恶心
- E. 乏力
20. 护理体检的方法不包括
- A. 视诊 B. 触诊
- C. 叩诊 D. 听诊
- E. 化验
21. 气体交换受损: 与肺水肿有关, 这一护理诊断中的相关因素属于
- A. 治疗方面
- B. 病理生理方面
- C. 年龄方面
- D. 情景方面
- E. 心理素质方面
22. “有……危险”的护理诊断常用的陈述方式是
- A. PES 公式 B. PE 公式
- C. ES 公式 D. PS 公式
- E. P 公式
23. 下列护理目标中, 陈述不妥的是
- A. 患者能够说出日常饮食中含盐较多的食物名称
- B. 患者语言表示愿意接受透析治疗
- C. 患者能正确演示术侧上肢功能训练方法
- D. 产妇能熟练摆出正确的哺乳姿势及挤奶的手法
- E. 让患者了解子宫切除不影响性生活能力, 消除焦虑情绪
24. 以下护理诊断中, 陈述错误的是
- A. 便秘: 与生活方式改变有关
- B. 皮肤完整性受损: 与长期卧床有关
- C. 眼球突出: 与甲亢有关

- D. 焦虑：与疾病诊断不明有关
E. 清理呼吸道无效：与咳嗽无力有关
25. 影响护理目标部分实现或未实现的因素不包括
A. 原始资料的全面和可靠程度
B. 护理诊断的正确性
C. 护理目标的现实性
D. 护理措施的可行性
E. 评价方法的合理性
26. 以下护理目标中，描述正确的是
A. 教会患者有效的咳嗽方法
B. 每 2 小时帮助患者更换卧位
C. 在护士帮助下每日下床行走 30 分钟
D. 遵医嘱给药
E. 每日带患者外出活动半小时
27. 按医嘱给药属于
A. 非护理措施
B. 独立性护理措施
C. 辅助性护理措施
D. 依赖性护理措施
E. 协作性护理措施
28. 不属于护理诊断的是
A. 体温过高 B. 营养失调
C. 体液不足 D. 急性胃肠炎
E. 活动无耐力
29. 护理诊断中 PSE 公式的 S 代表
A. 体征 B. 健康问题
C. 患者的现状 D. 病情记录
E. 相关因素
30. 护理程序中，指导护理活动的思想核心是
A. 以完成的护理工作内容为中心
B. 以医院管理的重点任务为中心
C. 以维护医护人员的利益为中心
D. 以执行医嘱为中心
E. 以护理服务对象为中心
31. 护理程序的基础是
A. 护理评估 B. 护理诊断
C. 护理计划 D. 护理措施
E. 护理评价
32. PIO 护理记录格式的含义依次是
A. 护理措施、健康问题、结果评价
B. 健康问题、护理措施、结果评价
C. 健康问题、结果评价、护理措施
D. 护理措施、结果评价、健康问题
E. 结果评价、健康问题、护理措施
33. 不属于护理诊断书写要求的是
A. 诊断明确，书写规范
B. 列出的护理诊断应贯彻整体护理的观点
C. 护理诊断必须具有客观依据
D. 护理诊断应能指出护理方向
E. 一项护理诊断应针对患者的多个健康问题
34. 属于独立性护理措施的是
A. 低盐饮食
B. 输血
C. 地西泮 5mg, po
D. 更换卧位 q2h
E. 内科会诊
35. 护士在制订计划中列出“3 日内患者失眠症状减轻”，这是
A. 护理诊断 B. 护理目标
C. 护理措施 D. 护理实施
E. 护理评价
36. 护理诊断 PSE 公式中的 P 代表
A. 症状与体征
B. 患者的健康问题
C. 患者的既往病史
D. 患者的现病史
E. 健康问题的相关因素
37. 护理评估开始的时间是
A. 做完治疗后开始评估
B. 第一次抽血后开始评估
C. 为患者做完入院介绍后开始评估
D. 与患者第一次见面时开始评估
E. 参加医师查房后开始评估
38. 关于客观资料的记录，描述正确的是

- A. 每天排尿 5~6 次, 量中等
B. 每天饮白开水 4~5 次, 每次约 200mL
C. 咳嗽轻微, 有大量痰液
D. 每餐主食 2 碗, 一日三餐
E. 发热 2 天, 午后明显
39. 用马斯洛需要层次论进行分类, 属于生理需要的健康问题是
A. 焦虑
B. 父母角色不称职
C. 语言沟通障碍
D. 清理呼吸道无效
E. 知识缺乏
40. 属于合作性问题的健康问题是
A. 尿潴留
B. 高血压
C. 清理呼吸道无效
D. 自理能力缺陷
E. 焦虑
41. 三级医院所指的是
A. 医学院的附属医院
B. 农村乡、镇卫生院
C. 省、直辖市的区级医院
D. 厂矿、企事业单位的职工医院
E. 诊治专科疾病所设置的医院
42. 以下医院种类按收治范围分的是
A. 综合医院
B. 军队医院
C. 个体所有制医院
D. 企业医院
E. 三级医院
43. 医院门诊的护理工作不包括
A. 预检分诊
B. 安排候诊
C. 安排就诊
D. 急救物品的管理
E. 开展健康教育
44. 急诊观察室的留观时间为
A. 1~3 天
B. 3~7 天
C. 7~10 天
D. 10~14 天
E. 治愈后出院
45. WHO 规定白天病区噪音强度应维持在
A. 25~30dB
B. 35~40dB
C. 40~45dB
D. 45~50dB
E. 50~55dB
46. 手术室、婴儿室、产房最适宜的温度是
A. 16℃~18℃
B. 18℃~20℃
C. 20℃~22℃
D. 22℃~24℃
E. 24℃~26℃
47. 下列疾病对病室相对湿度要求较高的是
A. 心脏病
B. 急性喉炎
C. 慢性胃炎
D. 心肌梗死
E. 肾病综合征
48. 医院病床间的距离不得少于
A. 0.6m
B. 0.8m
C. 1.0m
D. 1.2m
E. 1.4m
49. 病室定时开窗通风的目的不包括
A. 降低室内微生物的密度
B. 提高氧含量
C. 调节温度、湿度
D. 促进舒适
E. 保持病室整洁
50. 铺麻醉床的目的不包括
A. 保证患者安全、舒适
B. 预防并发症
C. 便于接受、护理麻醉术后患者
D. 准备迎接新患者
E. 保护床上用物不被血渍或呕吐物污染
51. 煮沸消毒时, 海拔每增高 300m, 消毒时间需延长
A. 1 分钟
B. 2 分钟
C. 3 分钟
D. 4 分钟
E. 5 分钟
52. 无菌持物钳不可以夹取的物品是
A. 无菌纱布
B. 治疗碗
C. 无菌棉球
D. 手术刀片
E. 油纱布

53. 能杀灭芽孢的化学消毒剂是
A. 碘伏 B. 碘酊
C. 乙醇 D. 甲醛
E. 氯己定
54. 使用化学消毒剂的方法错误的是
A. 待消毒的物品应先洗净擦干
B. 消毒液应定期检测浓度
C. 易挥发的消毒剂应加盖
D. 玻璃器械应用纱布包裹后放入消毒液内
E. 消毒后物品使用前需用无菌生理盐水冲洗
55. 打开后未被污染, 有效期 $< 24\text{h}$ 的无菌物品是
A. 无菌溶液 B. 无菌包
C. 无菌储槽 D. 无菌罐
E. 无菌手套
56. 下列属于污染区的是
A. 病区内走廊 B. 病区外走廊
C. 值班室 D. 更衣室
E. 医护办公室
57. 医院感染的对象主要是
A. 门诊患者 B. 急诊患者
C. 住院患者 D. 探视人员
E. 陪护人员
58. 热力消毒灭菌法中效果最好的是
A. 燃烧法
B. 干烤法
C. 低温蒸汽消毒法
D. 压力蒸汽灭菌法
E. 流通蒸汽消毒法
59. 下列消毒剂中属于气体灭菌剂的是
A. 甲醛 B. 环氧乙烷
C. 过氧乙酸 D. 过氧化氢
E. 戊二醛
60. 下列关于煮沸消毒法的描述, 错误的是
A. 煮沸途中加入物品, 应从加入物品后开始计时
B. 待消毒物品应刷洗干净
C. 橡胶类物品宜用纱布包好, 水沸后放入
D. 煮沸 15 分钟可杀灭大部分细菌芽孢
E. 大小、形状相同的容器不能重叠
61. 为确保高压蒸汽灭菌法效果, 下列注意事项错误的是
A. 器械、物品灭菌前需洗净、晾干或擦干
B. 预真空压力蒸汽灭菌的物品体积不得超过 $30\text{cm} \times 30\text{cm} \times 25\text{cm}$
C. 布类物品需放在金属、搪瓷类物品上
D. 有孔容器消毒前需将容器孔打开
E. 灭菌物品需待干燥后取出使用
62. 压力蒸汽灭菌效果监测方法最可靠的是
A. 留点温度计监测法
B. 化学指示卡监测法
C. 化学指示胶带监测法
D. 生物指示剂监测法
E. 微生物学监测法
63. 下列关于紫外线消毒法注意事项的描述错误的是
A. 灯管应每两周用无水乙醇擦拭一次
B. 紫外线照射时人应离开房间
C. 消毒物品应摊开或挂起, 并定时翻动
D. 调节紫外线消毒的适宜温度是 $18^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $40\% \sim 60\%$
E. 消毒时间应从灯亮 5 ~ 7 分钟后算起
64. 不属于高度危险性的医用物品是
A. 肠镜 B. 注射器
C. 手术刀片 D. 组织剪
E. 血液及血液制品
65. 化学消毒剂的使用方法不包括
A. 浸泡法 B. 擦拭法
C. 喷雾法 D. 熏蒸法

- E. 煮沸法
66. 使用戊二醛浸泡消毒精密仪器, 下列做法错误的是
- A. 灭菌浓度为 2%
- B. 灭菌时间为 20 ~ 45 分钟
- C. 消毒手术刀片需加入 0.5% 亚硝酸钠防锈
- D. 盛装消毒剂的容器应加盖
- E. 灭菌物品使用前需用蒸馏水冲洗
67. 使用无菌持物钳的方法错误的是
- A. 浸泡保存的无菌持物钳每周清洁、消毒两次
- B. 始终保持钳端向下, 不可跨越无菌区
- C. 取放持物钳时不可触及液面以上部分或罐口边缘
- D. 到远处取物应速去速回
- E. 不可用于夹取油纱布或换药
68. 使用无菌手套的方法正确的是
- A. 戴手套前需洗手、剪指甲
- B. 无菌手套污染后用无菌生理盐水冲洗后可继续使用
- C. 未戴手套的手可触及另一手套的外面
- D. 已戴手套的手可触及另一手套的内面
- E. 戴好手套后两手应置于胸部以上水平
69. 铺好的无菌盘有效期为
- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 6 小时
- D. 8 小时
- E. 4 小时
70. 适用于清洗外科伤口的是
- A. 40% 甲醛
- B. 75% 乙醇
- C. 0.2% 过氧乙酸
- D. 2.5% 碘酊
- E. 3% 过氧化氢
71. 长 24cm 的持物镊浸泡消毒时, 容器内的消毒液液面高度为
- A. 10cm
- B. 12cm
- C. 14cm
- D. 16cm
- E. 18cm
72. 关于无菌物品的保管原则, 错误的是
- A. 无菌物品和非无菌物品应严格区分
- B. 无菌物品不可直接暴露在空气中, 应放在无菌容器中
- C. 需注明物品名称及灭菌日期
- D. 若戴无菌手套可直接取用无菌物品
- E. 无菌物品疑有污染应重新灭菌
73. 关于使用无菌容器的方法, 错误的是
- A. 取物时, 打开容器盖内面向下置于稳妥处
- B. 用无菌持物钳从无菌容器内夹取无菌物品
- C. 取出的无菌物品若未使用不可放回容器内
- D. 取物后将盖反转向下盖严
- E. 手指不能触及盖的边缘及内面
74. 取用无菌溶液应首先核对
- A. 溶液有无混浊、变色
- B. 名称、浓度
- C. 有效期
- D. 瓶体、瓶底有无裂缝
- E. 瓶盖有无松动
75. 关于取用无菌溶液的操作方法, 正确的是
- A. 检查溶液质量时应背光检查
- B. 手不可触及瓶塞盖住瓶口的部分
- C. 可用无菌敷料堵塞瓶口蘸取溶液
- D. 未使用完的无菌溶液可倒回瓶内
- E. 剩余未污染的溶液有效期为 4 小时
76. 关于铺无菌盘的操作方法, 错误的是
- A. 应使用灭菌指示胶带已变色的无菌包
- B. 打开的无菌治疗巾包如未用完, 应按要求包好, 有效期为 4 小时
- C. 用无菌持物钳夹取无菌物品
- D. 无菌治疗巾边缘应对齐
- E. 无菌治疗盘应保持干燥

77. 传染病区的设置要求不包括
- A. 应与普通病区分开
 - B. 远离食堂、水源和其他公共场所
 - C. 相邻病区的楼房相隔大约为 20m, 侧面防护距离为 10m
 - D. 病区应设置多个出口, 工作人员和患者分开进出
 - E. 病区内应配置必要的卫生、消毒设施
78. 下列关于隔离原则的描述, 正确的是
- A. 帽子、口罩及隔离衣穿戴齐全的工作人员可在任何场所活动
 - B. 患者用过的物品应分为已被污染和未被污染两类
 - C. 护理人员穿好隔离衣后必须尽快备齐用物
 - D. 已经落在地上的物品均视为污染物品
 - E. 病室空气应每日消毒 2 次
79. 脱隔离衣的正确顺序是
- A. 解袖口—洗手—解领口—解腰带—脱衣
 - B. 解袖口—洗手—解腰带—解领口—脱衣
 - C. 解袖口—解腰带—解领口—洗手—脱衣
 - D. 解腰带—解袖口—洗手—解领口—脱衣
 - E. 解领口—洗手—解腰带—解袖口—脱衣
80. 下列关于传染病患者出院后床单位的处理, 错误的是
- A. 拆下被服送洗衣房清洗后再消毒
 - B. 棉胎、枕芯、床垫用紫外线照射消毒
 - C. 床及桌椅用消毒液擦拭
 - D. 便盆浸于消毒液中消毒
 - E. 房间用消毒液熏蒸
81. 在住院处办完住院手续, 可酌情免浴的患者是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 慢性胃炎
 - C. 高血压
 - D. 糖尿病
 - E. 休克性肺炎
82. 分级护理的依据是
- A. 自理能力
 - B. 病种
 - C. 年龄
 - D. 患者需要
 - E. 性别
83. 住院病历排在第一页的是
- A. 住院病历首页
 - B. 体温单
 - C. 医嘱单
 - D. 护理记录单
 - E. 病程记录
84. 关于书写入院时间, 正确的是
- A. 用蓝黑水笔在体温单 40℃ ~ 42℃ 纵向填写
 - B. 用蓝黑水笔在体温单 40℃ ~ 42℃ 横向填写
 - C. 用红色水笔在体温单 40℃ ~ 42℃ 纵向填写
 - D. 用红色水笔在体温单 40℃ ~ 42℃ 横向填写
 - E. 用红色水笔在体温单 39℃ ~ 40℃ 纵向填写
85. 用轮椅运送患者, 下列操作方法错误的是
- A. 轮椅后背与床尾平齐
 - B. 轮椅面向床头, 固定车闸
 - C. 推轮椅时, 嘱患者尽量向后靠
 - D. 待患者坐稳后翻起脚踏板
 - E. 下坡时需减慢速度
86. 维持舒适卧位的基本要求不包括
- A. 关节应处于功能位
 - B. 定期变换体位, 至少每小时一次
 - C. 改变卧位时, 应做全范围的关节运动
 - D. 体重应平均分布到身体各部位
 - E. 适当遮挡患者, 保护隐私
87. 采取中凹卧位时, 下列操作正确的是
- A. 头胸部抬高 10° ~ 20°, 下肢抬高

- 20° ~ 30°
- B. 头胸部抬高 20° ~ 30°, 下肢抬高 20° ~ 30°
- C. 头胸部抬高 30° ~ 40°, 下肢抬高 40° ~ 50°
- D. 头胸部抬高 40° ~ 50°, 下肢抬高 20° ~ 30°
- E. 头胸部抬高 50° ~ 60°, 下肢抬高 20° ~ 30°
88. 下列不需要使用保护具的是
- A. 谵妄患者 B. 躁动患者
- C. 体温过低患者 D. 高热患者
- E. 昏迷患者
89. 用于限制患者坐起的约束方法是
- A. 约束手腕 B. 约束踝部
- C. 固定肩部 D. 固定肘部
- E. 固定双膝
90. 二人协助患者移向床头, 下列操作方法是正确的是
- A. 一人托住颈部和肩部, 一人托住腰部和臀部
- B. 一人托住颈部和背部, 一人托住臀部和腘窝
- C. 一人托住颈肩部和腰部, 一人托住背部和臀部
- D. 一人托住颈肩部和腰部, 一人托住臀部和腘窝
- E. 一人托住颈部和腰部, 一人托住臀部和小腿
91. 口腔护理的目的不包括
- A. 去除口臭
- B. 观察舌苔和口腔黏膜变化
- C. 观察口腔特殊气味
- D. 使患者舒适, 预防口腔感染
- E. 清除口腔内一切细菌
92. 下列患者不需行特殊口腔护理的是
- A. 高热
- B. 昏迷
- C. 下肢外伤
- D. 生活不能自理
- E. 禁食
93. 口腔 pH 为中性时, 最适宜的漱口液是
- A. 生理盐水
- B. 1% ~ 3% 过氧化氢溶液
- C. 1% ~ 4% 碳酸氢钠溶液
- D. 2% ~ 3% 硼酸溶液
- E. 0.1% 醋酸溶液
94. 不属于床上擦浴目的是
- A. 使患者舒适
- B. 促进血液循环
- C. 增进皮肤排泄功能
- D. 观察病情
- E. 使皮肤美观
95. 下列患者应进行床上擦浴的是
- A. 心梗急性期
- B. 左腿骨折石膏固定
- C. 大出血
- D. 休克
- E. 腹部手术后当天
96. 以下不属于晨间护理内容的是
- A. 体格检查 B. 口腔护理
- C. 观察病情 D. 心理护理
- E. 卫生宣教
97. 晨间护理的目的不包括
- A. 使患者舒适
- B. 预防压疮及肺炎
- C. 保持病室整洁、美观
- D. 增进护患交流
- E. 消除患者疲劳
98. 晚间护理的内容不包括
- A. 了解患者睡眠情况
- B. 协助患者排便, 收集标本
- C. 协助患者擦洗背部
- D. 协助女患者做好会阴部护理
- E. 整理床单位, 保持床单位平整
99. 发生压疮的最主要原因是
- A. 局部组织受压过久
- B. 病原微生物侵入皮肤

- C. 机体营养不良
D. 用夹板时衬垫不平
E. 皮肤受潮湿、摩擦刺激
100. 体位与压疮好发部位的关系, 不正确的是
A. 仰卧—骶尾部
B. 侧卧—髂部
C. 俯卧—内踝
D. 坐位—坐骨结节
E. 侧卧—肩峰部
101. 下列不宜使用盆浴的患者是
A. 发热
B. 妊娠4个月
C. 心梗急性期
D. 肺结核
E. 腿部外伤患者
102. 为压疮好发的患者进行全背按摩的主要目的是
A. 保持皮肤清洁、干燥
B. 防止局部组织长期受压
C. 增进局部血液循环
D. 降低皮肤温度
E. 润滑皮肤, 增进皮肤营养
103. 在环境温度高于皮肤温度时, 主要的散热方式是
A. 辐射
B. 对流
C. 蒸发
D. 传导
E. 寒战
104. 弛张热常见于
A. 流行性感冒
B. 伤寒
C. 疟疾
D. 肿瘤
E. 败血症
105. 伤寒患者常见的热型是
A. 稽留热
B. 弛张热
C. 间歇热
D. 波浪热
E. 不规则热
106. 对体温过低老年患者的护理措施, 错误的是
A. 提高室温
B. 足部放热水袋
C. 饮热饮料
D. 加盖被
E. 增加活动量
107. 浸泡体温计的消毒溶液应
A. 每日更换
B. 每周更换
C. 隔日更换
D. 隔周更换
E. 每周更换二次
108. 创伤性休克患者的脉搏特征是
A. 单位时间内脉率少于心率
B. 细弱无力
C. 强大有力
D. 动脉管壁变硬, 失去弹性
E. 每隔一个正常搏动后, 出现一次早搏
109. 关于电动吸引器吸痰的操作方法, 错误的是
A. 成人吸痰的负压为40.0~53.3kPa
B. 插管时, 护士应反折吸痰管末端
C. 吸痰时只要向上提拉, 吸净痰液即可
D. 导管退出后, 应用生理盐水抽吸冲洗
E. 吸痰前, 先用生理盐水试吸
110. 测量脉搏的首选部位是
A. 颞动脉
B. 颈动脉
C. 肱动脉
D. 桡动脉
E. 腓动脉
111. 下列不属于吸气性呼吸困难临床表现的是
A. 三凹征
B. 吸气时间缩短
C. 指甲发绀
D. 鼻翼扇动
E. 胸闷、烦躁
112. 属于节律异常的呼吸是
A. 呼吸过速
B. 深度呼吸
C. 鼾声呼吸
D. 蝉鸣样呼吸
E. 潮式呼吸
113. 关于体温的生理性变化, 描述正确的是

- A. 老年人基础代谢率高, 故体温偏高
B. 儿童基础代谢率低, 故体温较低
C. 女性在妊娠早期受孕激素影响, 体温偏低
D. 女性在排卵期受孕激素影响, 体温偏低
E. 运动、进食可使体温略有增高
114. 若使吸氧浓度达 33%, 氧流量至少应调节为
A. 2L/min B. 3L/min
C. 4L/min D. 5L/min
E. 6L/min
115. 混合性呼吸困难多见于
A. 喉头异物 B. 哮喘
C. 喉头水肿 D. 肺部感染
E. 呼吸中枢衰竭
116. 急性肺水肿患者加压给氧时, 常在湿化瓶中加入 20% ~ 30% 乙醇溶液, 是因为乙醇可
A. 减低肺泡的表面张力, 增加通气量
B. 减低肺泡内泡沫的表面张力, 增加通气量
C. 增加肺泡的表面张力, 增加通气量
D. 可使肺泡内压力减少, 增加通气量
E. 可改善肺内血液循环, 改善气体交换不足状态
117. 属于节律异常的脉搏是
A. 洪脉 B. 丝脉
C. 绌脉 D. 速脉
E. 缓脉
118. 流质饮食不宜长期使用的原因是
A. 影响消化吸收
B. 影响营养供给
C. 影响食欲
D. 影响休息
E. 进食次数过多
119. 医院饮食可分为三大类, 即
A. 基本饮食、治疗饮食、试验饮食
B. 基本饮食、普通饮食、试验饮食
C. 治疗饮食、普通饮食、试验饮食
D. 普通饮食、流质饮食、软质饮食
E. 普通饮食、流质饮食、半流质饮食
120. 在对患者的饮食护理, 下列哪项不妥
A. 尊重患者对饮食的选择
B. 禁食患者应交班
C. 双目失明者可给予喂食
D. 鼓励卧床患者自行进食
E. 进食前暂停一切治疗及护理工作
121. 下列患者应给予鼻饲饮食的是
A. 婴幼儿 B. 口腔溃疡
C. 经常呕吐 D. 腹泻
E. 拒绝进食者
122. 下列协助患者进食的措施, 不正确的是
A. 创造良好清洁、整齐、安静的环境
B. 鼓励并协助患者自行进餐
C. 根据患者饮食习惯分发饭菜
D. 尊重患者对饮食的选择
E. 及时解答患者在饮食方面的问题
123. 测量鼻饲管插入长度的方法为
A. 耳垂到鼻尖的长度
B. 鼻尖到胸骨的长度
C. 鼻尖到剑突的长度
D. 前额发际到剑突的长度
E. 口唇到剑突的长度
124. 下列患者适用普通饮食的是
A. 消化功能正常的患者
B. 手术后恢复期的患者
C. 急性消化道疾病患者
D. 发热、体弱的老年患者
E. 吞咽困难的患者
125. 鼻饲饮食后再注入少量温开水的目的是
A. 防止患者呕吐
B. 使患者温暖舒适
C. 避免食物存积于管道
D. 便于测量, 记录准确

- E. 防止液体反流
126. 下列属于试验饮食的是
- A. 流质饮食
B. 低蛋白饮食
C. 无盐饮食
D. 胆囊造影饮食
E. 要素饮食
127. 热疗法的局部生理效应为
- A. 血管收缩
B. 血流加快
C. 神经传导速度减慢
D. 代谢减慢
E. 需氧量减少
128. 可以热敷的患者是
- A. 胃出血
B. 脑出血
C. 术后尿潴留
D. 踝关节扭伤早期
E. 牙痛
129. 冷疗的目的不包括
- A. 促进炎症消散 B. 减轻出血
C. 减轻疼痛 D. 降低体温
E. 减轻局部出血
130. 关于冷疗法影响因素的描述, 错误的是
- A. 湿冷比干冷效果好
B. 冷疗的效果与用冷面积成正比
C. 冷疗的效果与用冷时间成正比
D. 冷环境用冷, 效果会增强
E. 婴儿对冷反应较为强烈
131. 腹部禁忌用冷是为了防止发生
- A. 心律失常 B. 心率减慢
C. 冻伤 D. 腹泻
E. 体温骤降
132. 正常成人 24 小时排尿量平均为
- A. 800mL B. 1500mL
C. 2500mL D. 2800mL
E. 3500mL
133. 正常尿液的 pH 值平均为
- A. 2 B. 4
C. 6 D. 8
E. 10
134. 正常尿液比重为
- A. 1.001 ~ 1.005
B. 1.005 ~ 1.010
C. 1.015 ~ 1.025
D. 1.025 ~ 1.030
E. 1.030 ~ 1.035
135. 多尿指 24h 尿量超过
- A. 2000mL B. 2300mL
C. 2500mL D. 2800mL
E. 3000mL
136. 为女患者行导尿术时, 下列符合无菌操作原则的是
- A. 会阴部消毒均自上而下, 由内向外
B. 先打开导尿包, 再戴无菌手套
C. 导尿管误入阴道, 应拔出重插
D. 手套污染后, 用碘伏消毒后再用
E. 留取前段尿液 15mL 做细菌培养
137. 排便时有鲜血滴出, 常见于
- A. 上消化道出血
B. 阿米巴痢疾
C. 痔疮出血
D. 肠套叠
E. 直肠狭窄
138. 下列关于排尿影响因素的描述, 不正确的是
- A. 麻醉剂可干扰排尿反射, 导致尿潴留
B. 气温高可导致尿量增多
C. 情绪紧张可引起尿频、尿急
D. 前列腺增生可引起排尿困难
E. 钠盐含量多的食物可导致尿量减少
139. 不宜做大量不保留灌肠的患者是
- A. 分娩 B. 中暑
C. 急腹症 D. 肝性脑病
E. 充血性心力衰竭
140. 大量不保留灌肠过程中, 患者腹胀并

- 有便意,正确的护理措施是
- A. 移动肛管或挤捏肛管
 - B. 嘱患者张口深呼吸
 - C. 协助患者平卧
 - D. 提高灌肠筒的高度
 - E. 停止灌肠
141. 行导尿术时,润滑导尿管用
- A. 无菌生理盐水
 - B. 碘伏
 - C. 无菌凡士林
 - D. 无菌液状石蜡
 - E. 无菌蒸馏水
142. 肝性脑病患者用肥皂水灌肠,可导致
- A. 腹水加重
 - B. 腹泻加重
 - C. 肠麻痹
 - D. 血氨的产生和吸收
 - E. 酸碱平衡失调
143. 外用药的瓶签颜色是
- A. 红色
 - B. 蓝色
 - C. 黑色
 - D. 绿色
 - E. 黄色
144. 关于药物保管原则的描述,下列错误的是
- A. 按有效期先后顺序排放
 - B. 药柜应放在干燥、阳光直射的地方
 - C. 药瓶应有明显的瓶签
 - D. 剧毒药、麻醉药应加锁保管
 - E. 药品应定期检查
145. 容易氧化和遇光变质的药物应放在
- A. 有色瓶内
 - B. 干燥阴凉处
 - C. 深色密封瓶内
 - D. 冰箱内
 - E. 避光纸盒内
146. 应放置在冰箱内保存的药物是
- A. 氨茶碱
 - B. 白蛋白
 - C. 糖衣片
 - D. 盐酸肾上腺素
 - E. 维生素 C
147. “临睡前”的外文缩写是
- A. st
 - B. qd
 - C. qh
 - D. qn
 - E. hs
148. 不属于“三查七对”内容的是
- A. 床号、姓名
 - B. 药名、浓度、剂量
 - C. 时间、方法
 - D. 操作前、中、后查
 - E. 用药后反应
149. 指导患者服药的方法,错误的是
- A. 服铁剂,忌饮茶
 - B. 服酸类药物,可用饮水管吸入,服后漱口
 - C. 发汗药服后多喝水
 - D. 助消化药饭前服
 - E. 对胃有刺激的药物饭后服
150. 下列药物使用前需测心率的是
- A. 洋地黄
 - B. 泼尼松
 - C. 地西洋
 - D. 普萘洛尔
 - E. 氯丙嗪
151. 发药时,如果患者提出疑问应
- A. 考虑不用
 - B. 报告护士长
 - C. 弃去药物,重新配药
 - D. 重新核对,确认无误解释后再给药
 - E. 报告医生
152. 使用超声波雾化器过程中,水槽内蒸馏水的温度不得超过
- A. 20℃
 - B. 30℃
 - C. 40℃
 - D. 50℃
 - E. 60℃
153. “静脉注射法”的外文缩写是
- A. iv gtt
 - B. H
 - C. ID
 - D. IM
 - E. IV
154. 同时注射数种药物时,应特别注意药物的
- A. 有效期
 - B. 刺激性