

全国护士执业资格考试系列丛书 **经典系列**

经典畅销 10 年
助百万考生通关

2015

全国护士执业资格考试

历年考题汇编及精解

杨芳宇 主编

赠

条码见封底

- ✓ 2014 年考试试题选编
- ✓ 2015 年考试全真模拟卷 2 套
- ✓ 200 元网上学习费用



北京大学医学出版社

全国护士执业资格考试系列丛书

全国护士执业资格考试 历年考题汇编及精解

主 编 杨芳宇

编 者 (按姓名汉语拼音排序)

顾 颖 李 杨 刘志燕

杨芳宇 杨淑萍

北京大学医学出版社

QUANGUO HUSHI ZHIYE ZIGE KAOSHI LINIAN KAOTI HUIBIAN JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

全国护士执业资格考试历年考题汇编及精解/杨芳宇主编.

—北京:北京大学医学出版社,2014.10

(全国护士执业资格考试系列丛书)

ISBN 978-7-5659-0937-5

I. ①全… II. ①杨… III. ①护士-资格考试-题解

IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 215144 号

全国护士执业资格考试历年考题汇编及精解

主 编: 杨芳宇

出版发行: 北京大学医学出版社

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

电 话: 发行部 010-82802230; 图书邮购 010-82802495

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

经 销: 新华书店

责任编辑: 药蓉 李娜 王智敏 责任校对: 金彤文 责任印制: 罗德刚

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 20 字数: 509 千字

版 次: 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5659-0937-5

定 价: 45.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版说明

从 2011 年起全国卫生专业技术资格考试专业目录取消护理学（初级士，原专业代码 003），报考该专业的考生必须参加全国护士执业资格考试。

全国护士执业资格考试的考试内容、考试形式较以往发生了巨大变化：

1. 考试内容不再以学科为主线编写，而是以系统、疾病为中心，综合各学科内容来编写。
2. 增强了对社会医学、人文知识等（例如法律法规与护理管理、护理伦理、人际沟通知识、生命发展保健等）的考核。
3. 考试分专业实务和实践能力两个科目，每个科目题量为 120~160 道（2011 年护士执业资格考试每个科目约为 135 题），分 A、B 卷考核，用纸笔作答方式进行，考试时间 1 天。
4. 考试试题全部采用选择题，试题题型主要采用包含临床背景的题型（A₂、A₃、A₄ 型题），辅以少量考查概念的 A₁ 型题。
5. 采用计算机阅卷评分，一次考试通过两个科目为考试成绩合格（2011 年护士执业资格考试成绩合格线：专业实务 77 分，实践能力 76 分）。

根据新版考试大纲，北京大学医学出版社全新推出《全国护士执业资格考试系列丛书》。

[经典系列]

◎《全国护士执业资格考试应试指导》紧扣最新大纲，以大纲细目为框架，全面覆盖大纲内容。

◎《全国护士执业资格考试习题集》由习题组成，习题质量高，题量丰富，涵盖大纲全部考点。

◎《全国护士执业资格考试全真模拟及精解》全真模拟考试环境，使考生熟悉答题思路。答案后附有解析，帮助考生了解考题的难易度和考点分布。

◎《全国护士执业资格考试历年考题汇编及精解》汇总历年考试真题，专家解析。根据真题会重复出现的规律反复练习，可帮助考生了解命题规律，提高应试技巧。

[双核系列]

◎《全国护士执业资格考试核心考点》根据应试指导提炼核心考点，并附有“名师点拨”和“考点串联”板块，总结了作者多年的教学和考前培训经验。

◎《全国护士执业资格考试核心 2000 题》按照考试形式分卷编写，精选两千多道试题，试题后直接附答案及解析，便于考生有针对性地复习。

答题说明

A1 型题：每道考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A2 型题：每道考题是以一个小案例出现的，其下有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A3 型题：提供一个案例，下设若干道考题。在每道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

A4 型题：提供一个案例，下设若干道考题。每道考题会逐步增加新的信息，根据题干及新增信息，在考题下的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

目 录

第一章 基础护理知识和技能·····	1
第二章 循环系统疾病患者的护理·····	76
第三章 消化系统疾病患者的护理·····	107
第四章 呼吸系统疾病患者的护理·····	140
第五章 传染病患者的护理·····	155
第六章 皮肤及皮下组织疾病患者的护理·····	163
第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病患者的护理·····	165
第八章 新生儿和新生儿疾病的护理·····	191
第九章 泌尿生殖系统疾病患者的护理·····	202
第十章 精神障碍患者的护理·····	216
第十一章 损伤、中毒患者的护理·····	221
第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病患者的护理·····	234
第十三章 肿瘤患者的护理·····	239
第十四章 血液、造血器官及免疫疾病患者的护理·····	251
第十五章 内分泌、营养及代谢疾病患者的护理·····	257
第十六章 神经系统疾病患者的护理·····	269
第十七章 生命发展保健·····	280
第十八章 中医基础知识·····	290
第十九章 法规与护理管理·····	292
第二十章 护理伦理·····	299
第二十一章 人际沟通·····	303

第一章 基础护理知识和技能

A1/A2 型题

1. 为达到置换空气的目的,一般每次通风时间为

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 30 分钟
- D. 60 分钟
- E. 90 分钟

【答案】C

【解析】30 分钟即可达到空气置换的目的。

2. 某患者大面积 3 度烧伤,对其病室空气消毒的最佳方法是

- A. 紫外线照射
- B. 过氧乙酸
- C. 臭氧
- D. 苍术熏蒸法
- E. 机械除菌

【答案】E

【解析】一般烧伤病房用臭氧消毒,但是该患者大面积 3 度烧伤,机体抵抗力低下,易感染,所以患者一般是安置在层流室的。层流室中采用机械除菌的方法消毒。

3. 下列处理出院患者医疗护理文件的方法错误的是

- A. 在体温单上标明出院时间
- B. 整理出院病历
- C. 诊断卡和治疗卡放入病历内
- D. 填写出院患者登记表
- E. 撤去“患者一览表”上的诊断卡和床头卡

【答案】C

【解析】诊断卡、床尾卡、服药卡、治疗卡、饮食卡等都应注销,而不应放入病历中。

4. 地西洋 5mg, po. sos 属于

- A. 长期医嘱
- B. 临时医嘱
- C. 临时备用医嘱
- D. 长期备用医嘱
- E. 即刻执行医嘱

【答案】C

【解析】临时备用医嘱在 12 小时内有效,可用 sos 表示。

5. 成人腋窝温度的正常范围是

- A. 36.3~37.2℃
- B. 36.0~37.0℃
- C. 36.5~37.7℃
- D. 36.5~37.5℃
- E. 36.3~37.0℃

【答案】B

【解析】成人口腔温度的正常范围为 36.3~37.2℃;肛温的正常范围为 36.5~37.7℃;腋窝温度的正常范围为 36.0~37.0℃。

6. 宜餐前服用的药物是

- A. 铁剂
- B. 氨茶碱
- C. 维生素 E
- D. 维生素 C
- E. 二甲双胍

【答案】B

【解析】氨茶碱在空腹时(餐前半小时至 1 小时,或餐后 2 小时)口服,吸收较快,如在用餐时或餐后服用,可减少对胃肠道的刺激,但吸收较慢。而维生素类药物分为脂溶性维生素(如维生素 E)及水溶性维生素(如维生素 C)。维生素 E 适宜于饭后服用,如空腹时服用,会被迅速吸收入血,在未被人体组织利用前就从尿中排出;若饭后服用维生素,因为肠道内充满食糜,则有利于维生素与之结合,并能获得充分吸收,从而更

好地发挥其治疗效果。维生素 C 虽然是水溶性,但也适宜于饭后服。因维生素 C 口服后主要由小肠吸收,若在饭前服用,因胃肠道没有食物,空腹服时药物被迅速吸收入血,使维生素在血液中的浓度增高,尚未被人体利用之前即经过肾通过尿道排出体外,使药效明显降低。

7. 患者,45岁,因高热就诊,医嘱开具下列检验单。护士采血时优先采取的标本是

A. 凝血
B. 血脂
C. 肝功能
D. 肾功能
E. 血培养

【答案】E

【解析】血液标本采集时一般注入容器的顺序为:血培养—抗凝管—干燥管。因此,本题优先采取的是血培养标本。

8. 有关卧床患者的头发护理,下列错误的是

A. 将大橡胶单围成马蹄形卷置于患者颈下
B. 用棉球塞好双耳,用纱布盖好双眼
C. 确保水温在 43~45℃
D. 及时擦干头发,避免患者感冒
E. 对打结头发用甘油湿润后疏松

【答案】E

【解析】头发打结时应用 30%乙醇湿润打结处,再慢慢梳理开。

9. 热疗的目的不包括

A. 扩张局部血管
B. 减轻深部组织缺血
C. 促进炎症吸收和消散
D. 改善血液循环
E. 增强白细胞吞噬功能

【答案】B

【解析】热疗的目的包括:①促进浅表炎症的消散和局限。②减轻深部组织充血。

③降低痛觉神经的兴奋性,减轻炎性水肿,以解除神经末梢的压力;使肌肉、韧带组织松弛,从而缓解疼痛。④促进血液循环,使患者感到温暖舒适。

10. 化疗注射部位出现条索状红线,此时护士应采取的措施是

A. 局部封闭
B. 继续使用
C. 局部热敷
D. 局部冷敷
E. 按摩局部

【答案】C

【解析】条索状红线为静脉炎表现,应停用该静脉,并热敷,忌挤压按摩。

11. 以下不能放置冰袋的部位是

A. 颈动脉
B. 腹股沟
C. 腋下
D. 前额
E. 腹部

【答案】E

【解析】放在腹部易引起腹泻。

12. 为体位引流患者叩背顺序正确的是

A. 自上而下,由外向内
B. 自下而上,由外向内
C. 自上而下,由内向外
D. 自下而上,由内向外
E. 视患者病变部位而定

【答案】B

【解析】叩背时应根据呼吸道的解剖结构及部位,自下而上、由外向内迅速而有节律地叩击,振动气道,每分钟 120~180 次。

13. 接种活疫苗时消毒皮肤应用

A. 安尔碘
B. 碘酒
C. 碘附
D. 90%乙醇
E. 75%乙醇

【答案】E

【解析】接种活疫苗时应用 75% 乙醇消毒，以免破坏疫苗。

14. 体温单最底栏书写的内容是

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 住院天数
- E. 胃液引流量

【答案】E

【解析】体温单包括眉栏，体温、脉搏、呼吸曲线，以及底栏。其中 A、B、C 项属于体温、脉搏、呼吸曲线，D 项住院天数属于眉栏，只有胃液引流量属于底栏。底栏的内容包括血压、体重、尿量、大便次数、出入量和其他。

15. 在传染病区里属于污染区的是

- A. 病房
- B. 走廊
- C. 治疗室
- D. 值班室
- E. 护士站

【答案】A

【解析】传染病区划分为 3 个区域：清洁区、半污染区和污染区。清洁区包括治疗室、配餐室、更衣室、值班室等，半污染区包括医护办公室、病区走廊、检验室等，污染区包括病房、患者洗手间等。

16. 护理活动中无菌物品的灭菌合格率为

- A. 90%
- B. 100%
- C. 95%
- D. 80%
- E. 85%

【答案】B

【解析】根据消毒隔离质量标准规定，无菌物品灭菌合格率应达到 100%。

17. 破伤风抗毒素皮试液的标准是每 1ml 皮试液内含破伤风抗毒素

- A. 50U

B. 100U

C. 150U

D. 1500U

E. 2000U

【答案】C

【解析】破伤风抗毒素皮试液的配制：用 1ml 注射器吸取破伤风抗毒素药液 (1500U/ml) 0.1ml，加生理盐水稀释至 1ml。因此 1ml 内含破伤风抗毒素 150U。

18. 乙型肝炎患者入院时的衣服应如何处理

- A. 直接保存
- B. 消毒后保存
- C. 交给家属带回
- D. 消毒后交给患者
- E. 直接焚毁

【答案】B

【解析】乙型肝炎是传染性疾病，其衣物应消毒后交家属带回；或消毒后暂存，待患者出院时交患者带回。含氯消毒剂可杀灭乙肝病毒。

19. 在传染病隔离区工作的护士，下列做法正确的是

- A. 掀页撕取避污纸
- B. 将口罩挂在胸前
- C. 为患者翻身后用手整理口罩
- D. 穿着隔离衣进入治疗室
- E. 护理结核病患者后立即更换口罩

【答案】E

【解析】取避污纸时应从页面抓取，不可掀页撕取，以保持避污纸清洁，防止交叉感染，A 项错误；在使用口罩时，不可悬挂于胸前，不可用污染的手触摸口罩，B、C 项错误；一次性口罩使用不超过 4 小时，潮湿或可疑污染时需立即更换，E 项正确；传染病区治疗室是清洁区，为防止病原微生物播散，避免交叉感染，护士应脱掉隔离衣后进入，故 D 项错误。

20. 支气管扩张症的患者反复咯血，最可能出现的心理反应是

- A. 抑郁
- B. 悲伤
- C. 愤怒
- D. 恐惧
- E. 震惊

【答案】D

【解析】支气管扩张症伴反复咯血的患者会产生很大的心理压力，表现出恐惧、紧张甚至绝望的复杂心理变化。因此最可能出现的心理反应是恐惧。

21. 需要避光的药物是

- A. 垂体后叶素
- B. 尼可刹米
- C. 硝普钠
- D. 脂肪乳
- E. 复方氨基酸

【答案】C

【解析】硝普钠液体性质不稳定，遇光时易分解，应避光保存。

22. 手术室温度应该为

- A. 16~18℃
- B. 18~22℃
- C. 22~24℃
- D. 24~26℃
- E. 26~28℃

【答案】C

【解析】一般情况下病室温度保持在18~22℃比较适宜，新生儿室、重症监护室和手术室温度保持在22~24℃为佳。

23. 纤维支气管镜最适宜的化学消毒方法是

- A. 84 消毒液浸泡
- B. 3%过氧化氢浸泡
- C. 2%戊二醛浸泡
- D. 0.1%苯扎溴铵浸泡
- E. 0.2%过氧乙酸熏蒸

【答案】C

【解析】2%戊二醛适用于不耐热的医疗器械和精密仪器的消毒与灭菌，常用浸泡法；苯扎溴铵适用于皮肤、黏膜、环境的消

毒；过氧乙酸适用于耐腐蚀物品、皮肤和环境的消毒灭菌。

24. 下列属于客观资料的是

- A. 头痛 2 天
- B. 感觉疼痛
- C. 体温 39.1℃
- D. 不易入睡
- E. 常有咳嗽

【答案】C

【解析】主观资料是患者主诉，包括患者对疾病的感受，对所经历的、看到的、听到的以及想到的内容的描述。客观资料是指护士通过望、触、叩、听、嗅等方法或借助医疗仪器检查获得的患者的症状和体征。

25. 护士为破伤风患者处理伤口，换下的敷料该怎样处理

- A. 统一填埋
- B. 高压灭菌
- C. 集中焚烧
- D. 日光暴晒
- E. 浸泡消毒

【答案】C

【解析】破伤风传染性强，需要采取接触隔离，被患者污染的敷料应当装袋标记后送焚烧处理。

26. 婴儿输液最常用的静脉是

- A. 肘正中静脉
- B. 颞浅静脉
- C. 贵要静脉
- D. 大隐静脉
- E. 手背浅静脉

【答案】B

【解析】小儿头皮静脉极为丰富，表浅易见，易于固定，故患儿静脉注射多选择头皮静脉，包括颞浅静脉、额静脉、耳后静脉、枕静脉。

27. 美曲磷酯（敌百虫）中毒患者进行洗胃时，禁用以下哪种洗胃液

- A. 温开水

- B. 生理盐水
- C. 蛋清水
- D. 高锰酸钾液
- E. 碳酸氢钠溶液

【答案】E

【解析】美曲磷酯（敌百虫）在碱性环境下会生成毒性更强的敌敌畏，碳酸氢钠溶液为碱性液。

28. 乡卫生院工作的护士准备用纯乳酸为换药室进行空气消毒，换药室长、宽、高分别为4m、5m、3m，需用多少毫升纯乳酸

- A. 3.6ml
- B. 5.8ml
- C. 7.2ml
- D. 12.8ml
- E. 17.4ml

【答案】C

【解析】纯乳酸每立方米的用量是0.12ml，该换药室体积为 $4 \times 5 \times 3 = 60\text{m}^3$ ，用量即为 $0.12 \times 60 = 7.2\text{ml}$ 。

29. 某使用静脉留置针的患者，输液完毕已使用肝素液封管，但第2日仍然发生血液反流堵塞导管，导致堵管的原因不太可能是

- A. 封管的肝素液量不够
- B. 推注封管液速度太快
- C. 患者穿刺侧肢体活动过度
- D. 患者静脉压过高
- E. 封管的肝素液浓度过大

【答案】E

【解析】肝素浓度过大会造成穿刺点出血，不会导致导管堵塞；肝素浓度过小、推注速度快、静脉压高、穿刺手臂长时间下垂或肢体活动过度均会导致导管堵塞。

30. 护士为一级护理的患者行晨、晚间护理的适宜时间分别是

- A. 诊疗开始前，晚饭后
- B. 诊疗开始后，晚饭前

- C. 诊疗开始后，晚饭后
- D. 诊疗开始前，下午4时后
- E. 诊疗间隙中进行，临睡前

【答案】A

【解析】患者晨间醒来后，应进行晨间护理，一般在早上诊疗工作开始之前完成；晚间护理可为提供良好的睡眠条件，确保病室内安静、清洁，使患者舒适入睡，一般在晚饭后进行。

31. 关于输血的叙述错误的是

- A. 输血前经两人核对
- B. 输血前先输入少量生理盐水
- C. 输血后输入少量生理盐水
- D. 在输血卡上记录输血时间、滴速、患者情况等
- E. 输血完毕后及时将输血器、血袋消毒，分类弃置

【答案】E

【解析】输血完毕后的血袋和输血器无须消毒，应送回输血科保留24小时，以备患者在输血后发生输血反应时检查分析原因。

32. 护理工作中，护士观察患者病情最佳的方式是

- A. 多倾听交班护士的汇报
- B. 经常与家属交谈，了解患者需要
- C. 经常与患者交谈，增加日常接触
- D. 加强医护间沟通
- E. 经常查看护理记录

【答案】C

【解析】与患者直接交流沟通是掌握病情资料的最直接和最佳的方式。

33. 不属于医院基本饮食的是

- A. 普通饮食
- B. 软质饮食
- C. 半流质饮食
- D. 流质饮食
- E. 治疗饮食

【答案】E

【解析】医院饮食包括基本饮食、治疗

饮食和试验饮食。其中基本饮食又分 4 种：普通饮食、软质饮食、半流质饮食、流质饮食。

34. 临终患者通常最早出现的心理反应期是
- 协议期
 - 愤怒期
 - 否认期
 - 接受期
 - 忧郁期

【答案】C

【解析】临终患者通常按顺序经历 5 个心理反应阶段，即否认期、愤怒期、协议期、忧郁期、接受期。

35. 压疮发生的原因不包括
- 局部组织长期受压
 - 使用石膏绷带衬垫不当
 - 全身营养缺乏
 - 局部皮肤经常受排泄物刺激
 - 肌肉软弱萎缩

【答案】E

【解析】压疮发生的原因与诱因包括：物理力的联合作用：造成压疮的 3 个主要物理力是垂直压力、摩擦力和剪切力；理化因素刺激；全身营养不良或水肿；受限制的患者。

36. 给婴儿口服脊髓灰质炎减毒活疫苗时，正确的做法是
- 用温热水送服
 - 用热开水送服
 - 冷开水送服或含服
 - 热开水溶解后服用
 - 服后半小时可饮用热牛奶

【答案】C

【解析】脊髓灰质炎减毒活疫苗系活疫苗，送服时应用冷水，避免将疫苗烫死。

37. 亚急性心内膜炎血培养标本采血量应为
- 1~3ml
 - 4~6ml
 - 7~9ml

D. 10~15ml

E. 16~18ml

【答案】D

【解析】采血量增多的目的是为了提细菌培养阳性率。

38. 采集 24 小时尿标本时，正确的采集时间是

A. 早 7:00 至次晨 7:00

B. 早 9:00 至次晨 9:00

C. 早 11:00 至次日 9:00

D. 晚 7:00 至次日晚 7:00

E. 晚 11:00 至次日晚 11:00

【答案】A

【解析】采集 24 小时尿标本时，请患者于早 7:00 排空膀胱后，开始留取尿液，一直到次日晨 7:00 最后一次尿液，应保证 24 小时时间准确，以便得到正确的检验结果。

39. 患者行局部麻醉下肛周脓肿手术，进入手术室时，患者通常出现的心理反应是

A. 兴奋

B. 恐惧

C. 烦躁

D. 忧郁

E. 愤怒

【答案】B

【解析】患者进入手术室时，最常出现的心理反应是对麻醉和手术的恐惧。

40. 目前医学界主张判断死亡的诊断标准是

A. 瞳孔散大固定

B. 各种反射消失

C. 呼吸停止

D. 心跳停止

E. 脑死亡

【答案】E

【解析】不可逆的脑死亡是生命活动结束的象征，是目前医学界主张判断死亡的诊断标准。

41. 在护理实践中，护士有权拒绝执行医嘱

的情形是

- A. 护理程序太繁琐
- B. 医嘱中需要监测的生理指标太多
- C. 需要额外的劳动和付出
- D. 医嘱有错误
- E. 费用太昂贵

【答案】D

【解析】医嘱有错误时，为保证患者安全，护士有权拒绝执行。

42. 护士在工作中患血源性传染病最常见的原因是

- A. 针刺伤
- B. 侵袭性操作
- C. 接触被污染体液
- D. 为污染伤口换药
- E. 接触被污染的衣物

【答案】A

【解析】锐器损伤是一种皮肤深部的足以使受害者出血的意外伤害。锐器伤除了引起疼痛不适和皮肤感染，经此传播的病原体多达20多种，以乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）、人类免疫缺陷病毒（HIV）的危害最大。医务人员在临床工作中感染血源性疾病者约80%为锐器刺伤所致，远远大于经皮肤、黏膜等途径的传染。

43. 对于需要静脉输液的成年人，使用头皮针进行静脉穿刺时优先选择的血管是

- A. 贵要静脉
- B. 头静脉
- C. 桡静脉
- D. 手背静脉网
- E. 肘正中静脉

【答案】D

【解析】输液时选择血管的原则：一般选择粗、直、弹性好并避开关节的静脉，为保护静脉，一般从远心端开始，所以优先选择手背静脉网。

44. 尿常规检查时，留取尿标本的时间正确的是

- A. 饭前半小时
- B. 全天尿液
- C. 早晨第一次尿
- D. 随时收集尿液
- E. 饭后半小时

【答案】C

【解析】因为夜间饮水较少，肾排到尿液中的多种成分都储存在膀胱内并进行浓缩，可以提高阳性检出率。

45. 抢救时间的记录不包括

- A. 患者到达的时间
- B. 医生到达的时间
- C. 抢救措施落实的时间
- D. 病情变化的时间
- E. 家属到达的时间

【答案】E

【解析】家属到达的时间是不包括在抢救时间记录中的。

46. 正确测量胃管插入长度的方法是

- A. 从鼻尖至剑突
- B. 从眉心至剑突
- C. 从眉心至胸骨柄
- D. 从前额发际至胸骨剑突
- E. 从前额发际至胸骨柄

【答案】D

【解析】插胃管长度的测量一直用传统的方法，即患者前额发际到胸骨剑突的长度或鼻尖经耳垂到胸骨剑突的长度（45~55cm）。

47. 在下列患者中，护士在书写交班报告时首先应写

- A. 4床，患者甲，上午10时转呼吸科
- B. 18床，患者乙，上午9时入院
- C. 21床，患者丙，上午8时手术
- D. 25床，患者丁，下午行胸腔穿刺术
- E. 41床，患者戊，医嘱特级护理

【答案】A

【解析】交班报告的书写顺序：①先写离开病区的病员数（出院、转出、死亡），并注明离开的时间，转往何科，或呼吸、心

跳停止时间。②进入病区的病员数(新入院、转入),注明由何科或何院转来。③病区内本班次重点护理的病员,即新入、手术、分娩、危重及有异常情况的病员。

48. 为昏迷患者进行口腔护理时,不需要准备的用物是

- A. 手电筒
- B. 血管钳
- C. 开口器
- D. 棉球
- E. 吸水管

【答案】E

【解析】因为昏迷患者没办法用吸水管。

49. 获得性免疫缺陷综合征(AIDS)患者需要吸痰时,做法错误的是

- A. 吸痰前洗手,戴好口罩、护目镜
- B. 吸痰前穿好隔离衣
- C. 不与其他患者共用中心吸引系统
- D. 吸痰后吸痰管误落地上,立即进行地面的清洁处理
- E. 用过的吸痰管及纱布装入高危品袋中焚烧

【答案】B

【解析】单纯地为AIDS患者吸痰,没有必要穿隔离衣。AIDS的传播途径只有3种:性传播、垂直传播和血液传播。

50. 为卧床患者洗头发时,下列操作不正确的是

- A. 病室温度控制在24℃左右
- B. 水温为40~45℃
- C. 用指甲揉搓患者的头发和头皮
- D. 观察患者面色及有无不适
- E. 洗发时用棉球塞患者双耳,纱布盖双眼

【答案】C

【解析】应用指腹揉搓患者的头发和头皮,而不是指甲,指甲会抓伤患者。

51. 在收集患者资料的过程中,下列说法错误的是

- A. 所有资料均来自护士与患者的正式与非正式交谈
- B. 正式交谈前应做好充分的准备,有目的地引导患者交谈
- C. 正式交谈的内容应属于专业范畴
- D. 非正式交谈常在为患者提供护理服务的过程中进行
- E. 非正式交谈有助于护士了解患者的真实感受

【答案】A

【解析】患者资料除了来自护士与患者的正式与非正式交谈,也可来自患者家属及其他与之关系密切的人员。

52. 休克患者的体位应为

- A. 中凹卧位
- B. 头低足高位
- C. 侧卧位
- D. 半坐卧位
- E. 头高足低位

【答案】A

【解析】休克患者采取中凹卧位的目的是:抬高头胸部,有利于保持气道通畅,增加肺活量,改善缺氧症状;抬高下肢,可促进静脉血回流、增加心排血量,从而缓解休克症状。

53. 采集粪便标本检查阿米巴原虫前,将便盆加热的目的是

- A. 减少污染
- B. 保持原虫活力
- C. 降低假阳性率
- D. 降低假阴性率
- E. 使患者舒适

【答案】B

【解析】因阿米巴原虫在低温环境中可失去活力,从而难以查找。

54. 做膀胱镜检查时患者的卧位应是

- A. 膝胸卧位
- B. 头低脚高位
- C. 去枕仰卧位

D. 俯卧位

E. 截石位

【答案】E

【解析】略。

55. 鼓励长期卧床的心力衰竭患者在床上活动下肢,其目的主要是

A. 预防压疮

B. 防止肌肉萎缩

C. 及早恢复体力

D. 预防下肢静脉血栓

E. 减少回心血量

【答案】D

【解析】患者心力衰竭时,周围血液循环受影响,加之长期卧床,容易引起下肢静脉血栓,故鼓励患者在床上活动下肢。

56. 能够对纱布有吸附性而致药效降低的消毒剂为

A. 乙醇

B. 苯扎溴铵

C. 消毒灵

D. 戊二醛

E. 碘附

【答案】B

【解析】苯扎溴铵有吸附作用,会降低药效,所以溶液内不能放入纱布、棉球等。

57. 测量脉搏时首选哪个动脉血管

A. 肱动脉

B. 桡动脉

C. 股动脉

D. 颈内动脉

E. 足背动脉

【答案】B

【解析】因为桡动脉表浅,靠近骨骼,易于触及到,而且操作方便。

58. 患者临床资料的主要来源是

A. 患者家属

B. 护士

C. 医生

D. 患者本人

E. 保健人员

【答案】D

【解析】患者是临床资料的主要来源,从患者本人直接获得的资料的价值,有时是其他途径所无法获得的。

59. 臀大肌注射法的部位为

A. 髂后上棘和尾骨连线的外上 1/3 处

B. 髂前上棘和尾骨连线的外上 1/3 处

C. 髂前上棘和尾骨连线的外上 1/4 处

D. 髂前上棘和尾骨连线的外下 1/3 处

E. 髂前上棘和尾骨连线的外上 1/5 处

【答案】B

【解析】髂前上棘和尾骨连线的外上 1/3 处注射,避开了大的血管和神经。

60. 下列外文缩写表示“每晚 1 次”的是

A. qd

B. qid

C. qn

D. tid

E. qod

【答案】C

【解析】qn: 每晚 1 次; qd: 每日 1 次; qid: 每日 4 次; tid: 每日 3 次; qod: 隔日 1 次; 用红笔表示。

61. 出院患者病案归档时排在最前面的是

A. 出院记录

B. 死亡记录

C. 入院记录

D. 病程记录

E. 住院病案首页

【答案】E

【解析】出院病案排列顺序是: 病案首页、出院记录或死亡记录、入院记录、病史及体格检查、病程记录、护理病案、各种检验及检查报告、医嘱记录、体温单。

62. 压疮淤血红润期的局部表现是

A. 受压部位呈紫红色

B. 局部皮肤出现红、肿、热、麻木或触痛

- C. 浅层组织感染
- D. 溃疡形成
- E. 皮下硬结产生

【答案】B

【解析】压疮分4期：第一期（淤血红润期），为压疮初期，局部软组织受压后，出现红、肿、热、麻木或触痛。此期为可逆性改变，只要及时去除诱因，就可恢复。第二期（炎性浸润期），红肿部位如继续受压，局部的血液循环得不到及时改善，局部红肿向外浸润、变硬，受压皮肤的表面呈紫红色，有小水疱形成，极易破溃。第三期（浅度溃疡期），水疱继续扩大，表皮破溃，露出创面，有黄色渗出液，感染后创面有脓性分泌物覆盖，致使浅层组织坏死，疼痛加剧。第四期（坏死溃疡期），坏死组织侵入真皮下层和肌肉层，感染严重者，可向深部和周围组织扩展，脓性分泌物增多，有臭味，坏死组织呈黑色。如不及时控制感染，可引起脓毒败血症，危及生命。

63. 针对甲状腺功能亢进症的患者，下列哪项饮食不妥
- A. 高碘饮食
 - B. 高热量饮食
 - C. 高蛋白质饮食
 - D. 低纤维素饮食
 - E. 高维生素饮食

【答案】A

【解析】甲状腺功能亢进症患者需要注意不吃或少吃含碘丰富的食物（海产品、火锅等）。

64. 对于忧郁期的临终患者，相应的护理措施为
- A. 给予同情、照顾，注意安全
 - B. 尊重患者，不强迫与其沟通
 - C. 鼓励患者建立战胜疾病的信心
 - D. 尽量满足其要求
 - E. 态度真诚，不揭穿患者的防卫机制

【答案】A

【解析】处于忧郁期的临终患者往往会产生很强烈的失落感，表现为情绪低落、消沉、悲伤、沉默、哭泣等，甚至有轻生的念头。护理人员应经常陪伴患者，更多地给予同情、照顾，注意其安全。

65. 尸僵多出现在死亡后

- A. 1~3 小时
- B. 2~4 小时
- C. 4~6 小时
- D. 6~8 小时
- E. 6~10 小时

【答案】A

【解析】尸僵一般在死后1~3小时开始出现，4~6小时扩展到全身，12~16小时发展至高峰，24小时后尸僵开始减弱，肌肉逐渐变软，称为尸僵缓解。此题为记忆性题。

66. 破伤风抗毒素（TAT）的作用是

- A. 中和游离的毒素
- B. 消除毒素来源
- C. 控制惊厥
- D. 防治并发症
- E. 镇静催眠

【答案】A

【解析】破伤风抗毒素具有中和破伤风毒素的作用，用于治疗 and 预防破伤风。

67. 患者行粪便隐血试验前，医生应告知患者下列哪种食物不要吃

- A. 大米稀饭
- B. 面包
- C. 油条
- D. 瘦肉
- E. 豆角

【答案】D

【解析】大便隐血试验前3天内不要食用动物血、肉、肝、铁剂（硫酸亚铁、枸橼酸亚铁、富马酸亚铁）、富含叶绿素的食物（菠菜、青菜），避免出现假阳性反应；亦不可大量服用维生素C或其他有还原作用

的物质,避免出现假阴性反应。

68. 肺炎患者应该给予的饮食不包括

- A. 高脂肪饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 高热量饮食
- D. 高维生素饮食
- E. 易消化的流质或半流质

【答案】A

【解析】肺炎患者应该忌食油腻荤腥之类的食物,每天多喝白开水,多吃清淡、易消化的食物,多吃水果。

69. 急性病期患者对疾病缺乏思想准备时,易产生的情绪是

- A. 恐惧
- B. 焦虑
- C. 沮丧
- D. 消极
- E. 悲观

【答案】B

【解析】急性病期患者对疾病缺乏思想准备,担心预后,易产生焦虑情绪。

70. 接种卡介苗者结核菌素反应硬结的特点是

- A. 直径 10~15cm
- B. 颜色呈深红色
- C. 质地较硬
- D. 边缘不清楚
- E. 反应持续 7~10 天

【答案】D

【解析】接种卡介苗者结核菌素反应硬结的特点是:直径多为 5~9mm,颜色呈浅红色,质地较软,边缘不清,反应持续 2~3 天,反应逐年减弱,一般于 3~5 年消失。

71. 开放性损伤早期处理最重要的是

- A. 补液
- B. 止痛
- C. 清创
- D. 换药
- E. 应用抗生素

【答案】C

【解析】清创术是处理开放性伤口最重要、最基本、最有效的手段。由于开放性伤口易引起感染,因此早期清创很重要,只有尽早清创,使污染伤口变为清洁伤口,才有利于伤口愈合。

72. 严重代谢性酸中毒时常静脉滴注下列哪种溶液

- A. 复方氯化钠
- B. 右旋糖酐
- C. 葡萄糖
- D. 碳酸氢钠
- E. 果糖

【答案】D

【解析】代谢性酸中毒轻症可不必使用碱性药物,或给予碳酸氢钠 1~2g 口服,每日 3 次;重症时,从静脉输入碳酸氢钠。

73. 面容枯槁、面色苍白或铅灰、表情淡漠、眼窝凹陷,此面容称为

- A. 慢性病容
- B. 危重病容
- C. 贫血病容
- D. 二尖瓣病容
- E. 急性病容

【答案】B

【解析】危重病容表现为面容枯槁、面色苍白或铅灰、表情淡漠、双目失神、眼眶凹陷、鼻尖高耸、四肢厥冷等,多见于大出血、严重休克、脱水等急危重症。

74. 关于异常脉搏的临床意义,不正确的是

- A. 速脉见于周围循环衰竭
- B. 交替脉见于室性期前收缩二联律
- C. 短绌脉为心房颤动的特征
- D. 奇脉是缩窄性心包炎的体征之一
- E. 水冲脉见于主动脉瓣关闭不全

【答案】B

【解析】交替脉是指脉律正常而脉搏强弱交替出现的一种病理现象,以坐位时明显。其与心室的收缩力强弱交替有关,往往