

2015 国家医师资格考试

临床执业医师 考试全真模拟及精解

北京大学医学部专家组 编

好礼随书赠

2014 年试题精编
55 元网上学习费用

- ▶ 紧扣新版考试大纲
- ▶ 实战演练 考前必备
- ▶ 专家命题 精解考点



北京大学医学出版社

国家医师资格考试用书

国家医师资格考试

临床执业医师考试 全真模拟及精解

北京大学医学部专家组 编

北京大学医学出版社

GUOJIA YISHI ZIGE KAOSHI——LINCHUANG ZHIYE YISHI KAOSHI QUANZHEN
MONI JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

国家医师资格考试临床执业医师考试全真模拟及
精解/北京大学医学部专家组主编. —5 版. —北京:
北京大学医学出版社, 2013. 1 (2014. 11 重印)
ISBN 978 - 7 - 5659 - 0529 - 2

I. ①国… II. ①北… III. ①临床医学—医师—资格
考试—题解 IV. ①R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 020643 号

国家医师资格考试——临床执业医师考试全真模拟及精解

编 写: 北京大学医学部专家组

出版发行: 北京大学医学出版社

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

电 话: 发行部 010 - 82802230; 图书邮购 010 - 82802495; 医考出版培训 010 - 82802564

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 高 瑾 王智敏 宋建君 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 25.5 字数: 640 千字

版 次: 2013 年 2 月第 5 版 2014 年 11 月第 3 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5659 - 0529 - 2

定 价: 56.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

出版这套丛书的动机源自执业医师资格考试后的座谈会，与会的不少考生反映医学课程门类多，内容广泛，虽然经过较长时间的复习，临考前仍感到“心中无底，思路不清”；还有些考生因对题意理解有偏差而未能答对，尤其是工作了多年的考生，对现行的试题题型不熟悉。基于此，为了帮助考生复习，增强应考信心；为了帮助考生熟悉试题题型，避免无谓的失误；为了帮助考生熟悉考试过程和自我测试，加强临考前的“冲刺”练习；我们组织编写了这套全真模拟及精解丛书。这套书出版以来，深受广大考生的欢迎。

这套新版全真模拟丛书，针对新的考试大纲、题型比例作了全面修订，使本书与当前的考试大纲、考试内容、考试形式相一致，真正达到全真模拟的效果。

本书的主要内容有：①国家执业医师资格考试试题题型介绍与答题技巧；②三套国家执业医师（助理医师）资格考试全真模拟试卷，针对试题所侧重的知识点、各学科试题在试卷中的比重、各类题型的比例以及考试的时间要求等方面进行了全真模拟；③试题答案及解析。

同时，本版针对 2013 年临床执业医师资格考试大纲对以往试题进行了修改与增删。祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编 者

2014 年试题精编

第一部分 专业综合

呼吸系统

1. 判断肺结核传染性最主要的依据是 (痰涂片可见抗酸杆菌)
2. 吸入性肺脓肿最常见的病原体是 (厌氧菌)
3. 异常性支气管呼吸音常见于 (肺实变)
4. 最常见于Ⅱ型呼吸衰竭的疾病是 (膈肌瘫痪)
5. 对未接种卡介苗者结核菌素试验阳性的解释,最准确的是 (曾感染结核分枝杆菌)
6. 鉴别中心型肺癌和周围型肺癌,最有价值的检查是 (胸部 CT)
7. 局限性胸痛、按压后疼痛加重,提示病变主要累及的部位是 (壁层胸膜)
8. 男,21岁。发作性喘息4年,再发3天急诊入院。查体:端坐呼吸,口唇发绀,双肺广泛哮鸣音,心率120次/分。该患者最可能的诊断是 (支气管哮喘)
9. 男,21岁。畏寒,高热,咳嗽伴左胸痛5天。查体:BP 80/50mmHg,心率120次/分。胸部X线片见左肺下叶大片状致密影。实验室检查:血WBC $12.2 \times 10^9/L$, N 0.87。该患者最可能感染的病原体是 (肺炎链球菌)
10. 男,34岁。四肢广泛挤压伤后3h急诊入院。查体:BP 85/65mmHg,呼吸急促,口唇发绀,双肺可闻及湿啰音,心率140次/分。血气分析(未吸氧): PaO_2 50mmHg, $PaCO_2$ 30mmHg。除扩容治疗外,此时首选的治疗措施为 (持续高浓度吸氧)
11. 男,56岁。反复咳嗽30年伴间断咯血。发作时使用“头孢菌素”及止血治疗可缓解。查体:左下肺可闻及湿性啰音。胸部X线片示左下肺纹理增粗、紊乱。为明确咯血的病因,宜首先采取的检查是 (胸部高分辨CT)
12. 男,66岁。活动后突发左侧胸痛伴呼吸困难1天。既往慢性阻塞性疾病史10余年。查体:R 26次/分, BP 95/60mmHg,口唇发绀,左肺呼吸音明显减弱,心率102次/分,律齐。该患者最可能的诊断是 (自发性气胸)
13. 女,22岁。双眼睑下垂1年余,诊断为重症肌无力。胸部CT发现前上纵隔占位,大小约 $2cm \times 2cm \times 1cm$,最可能的诊断是 (胸腺瘤)
14. 女,70岁。反复咳嗽、咳痰伴气促15年。查体:双肺呼吸音减弱。辅助检查结果中对明确诊断最有价值的是 (肺功能示 FEV_1/FVC 明显降低)

心血管系统

15. 引起病毒性心肌炎最常见的病毒是 (柯萨奇B组病毒)
16. 最有助于感染性心内膜炎诊断的实验室检查是 (血培养)
17. 若对急性心肌梗死患者行其他疾病的择期手术,最早应在心肌梗死后 (6个月)
18. 成人心肺复苏抢救时胸外按压与人工呼吸通气的比例为 (30:2)
19. 二尖瓣狭窄患者出现急性左心衰竭时,一般不宜采用的治疗措施是 (静脉注射毛花苷C)
20. 发作时心电图ST段抬高的心绞痛是 (变异型心绞痛)
21. 急性心肌梗死后1天,心尖区出现收缩中晚期喀喇音和吹风样收缩期杂音,最可能出现的并发症是 (乳头肌功能失调)
22. 男,25岁。无诱因突发心悸1h来诊。查体:BP 130/80mmHg,心率240次/分,律齐。压迫颈动脉窦后心率突然降至70次/分,心律整齐。该患者最可能的诊断是 (阵发性室上性心动过速)
23. 男,33岁。活动时气短、心前区疼痛1年。查体:BP 146/80mmHg,双肺呼吸音清,心率78次/分,律齐,胸骨左缘第3、4肋间可闻及3/6级收缩期喷射性杂音。超声心动图示舒张期室间隔与左室后壁厚度之比 >1.5 。该患者最可能的诊断是 (肥厚型心肌病)
24. 男,40岁。发作性心悸、头晕、大汗4个月,每次发作持续约20min。发作时血压180/120mmHg,平素

血压不高。对诊断最有帮助的是（在血压升高时检查尿中的儿茶酚胺水平）

25. 男, 54 岁。发作性胸痛 3 天。于劳累时发作, 休息 5min 可缓解, 每天发作 3~4 次。最近 2h 内上述症状发作 2 次, 每次持续 20min。该患者最恰当的处理措施是（立即收住院监测心电图和血肌钙蛋白）
26. 男, 56 岁。间断活动时憋喘 1 年余, 近期加重。重体力活动即感喘憋, 有夜间憋醒。既往高血压病史 8 年余, 糖尿病史 4 年余。查体: BP 150/100mmHg, 双肺呼吸音清, 心率 76 次/分, 心律整齐。患者经药物治疗症状好转, 为改善预后需要长期使用的药物是（血管紧张素转换酶抑制剂）
27. 男, 66 岁。急性前壁心肌梗死 2 天, 轻微活动即喘憋。查体: BP 100/60mmHg, 双肺底可闻及少量细小湿啰音, 心率 102 次/分。该患者心功能分级为（Killip 分级 II 级）
28. 女, 40 岁。咳嗽 2 周, 心前区锐痛 2 天。深呼吸时加重, 放射到颈部。查体: 胸部无压痛, 心界不大, 胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及抓刮样粗糙音, 屏气后仍存在。该患者最可能的诊断是（急性心包炎）
29. 女, 50 岁。活动后胸闷 1 年, 夜间阵发性呼吸困难 4 天。查体: BP 130/80mmHg, P₂亢进, 心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音, 余瓣膜区未闻及杂音。该患者最易出现的心律失常是（心房颤动）
30. 女, 69 岁。突发胸骨后压榨样疼痛 6h, 持续不缓解。查体: BP 160/70mmHg, 心率 97 次/分。心电图示 V₁~V₆导联 ST 段水平型压低 0.3~0.5mV。实验室检查血清肌钙蛋白 I 增高。该患者不宜采取的治疗是（静脉滴注尿激酶）

消化系统

31. 上消化道大出血最常见的病因是（消化性溃疡）
32. 适用 Dukes 分期的疾病是（直肠癌）
33. 细菌性肝脓肿最主要的原因是（胆管结石并感染）
34. 根除幽门螺杆菌的方案中首选的是（质子泵抑制剂+克拉霉素+铋剂+阿莫西林, 治疗 10 天）
35. 先天性腹股沟斜疝发生的最主要原因是（腹膜鞘突不闭锁）
36. 原发性肝癌中最常见的首发临床表现是（肝区疼痛）
37. 胆总管结石梗阻后最典型的临床表现是（Charcot 三联征）
38. 反映肝硬化肝功能减退的血清指标是（白蛋白）
39. 腹膜返折以上直肠癌早期淋巴转移的主要途径是（向直肠上动脉旁淋巴结转移）
40. 肝硬化最常见的并发症是（上消化道大出血）
41. 肛诊检查触及黏膜外条索状肿物, 质地稍硬、固定, 最可能的是（直肠息肉）
42. 继发性肝癌一般不会发生变化的指标是（甲胎蛋白）
43. 男, 18 岁。练双杠时撞击上腹部, 突发腹痛 4h。疼痛加重, 伴背部疼痛、恶心、呕吐, 呕吐物中有胃液和胆汁。既往有胆囊炎病史。腹部 X 线平片检查: 横结肠肝曲胀气, 腹膜后有气体征象。粪隐血 (-)。最可能的诊断是（十二指肠破裂）
44. 男, 25 岁。反复腹痛、腹泻、便血 10 个月。近日加重伴发热, 体温 39℃, 1 天前因腹痛肌肉注射阿托品治疗 6h 后腹胀明显。查体: BP 70/50mmHg, 心率 120 次/分。最可能出现的情况是（中毒性巨结肠）
45. 男, 28 岁。间断腹痛、发热 3 年。结肠镜检查: 回肠末段见 4cm×1cm 纵行溃疡, 周围黏膜铺路石样改变。活检标本可能出现的主要病理改变是（非干酪样肉芽肿）
46. 男, 33 岁。急性坏疽性阑尾炎手术后 4 天, 出现尿频、尿急、大便次数增多、里急后重、发热。其最可能的并发症是（盆腔脓肿）
47. 男, 35 岁。左下腹外伤后 24h。入院时有弥漫性腹膜炎, 行剖腹探查术。术中见腹腔内有黄色脓液及粪便, 降结肠下段有 0.5cm 穿孔, 有粪便溢出。最合适的术式是（穿孔处修补, 横结肠造口）
48. 男, 40 岁。肝区疼痛 3 个月, 无发热。右肋下触及肝, 质硬, 表面有直径 5cm 结节, 无触痛。既往慢性乙型病毒性肝炎病史 10 年。为确认诊断最有意义的检查是（穿刺活检）
49. 男, 45 岁。进食高脂餐并饮酒后上腹持续疼痛 8h, 呕吐 2 次后疼痛无缓解。查体: T 37.8℃, 上腹偏左压痛、反跳痛阳性。如需使用抗生素治疗, 抗生素选择的最佳配伍是甲硝唑和（亚胺培南）
50. 男, 47 岁。反酸、胃灼热 2 个月。间断胸痛、咳嗽, 无吞咽困难。首先考虑的诊断是（胃食管反流病）
51. 男, 52 岁。皮肤、巩膜黄染 2 个月。大便颜色变浅, 无腹痛及发热。查体: 皮肤、巩膜黄染, 右上腹触及囊性

包块，无压痛。腹部B超示：胆总管扩张，胆囊大，胰腺显示不清。该患者最可能的诊断是（壶腹周围癌）

52. 男，58岁。进行性吞咽困难两月余。上消化道X线钡餐造影见食管下段黏膜紊乱，部分管壁僵硬。为明确诊断，首选的检查是（食管镜）
53. 男，70岁。饮酒1h后呕咖啡样物100ml，后排黑便100g。既往体健。查体：P 110次/分，BP 90/50mmHg。对诊断及治疗最有意义的检查是（胃镜）
54. 女，35岁。腹胀、便秘、乏力6个月。1周来症状加重伴呕吐。查体：T 37.6℃，右腹可触及5cm×3cm大小包块，质中等，边界不清，轻触痛。胸片示右侧胸膜肥厚，右上肺钙化灶。首先考虑的临床诊断是（肠结核）
55. 女，45岁。1天前进高脂餐后出现右上腹剧烈绞痛，阵发性加剧，并向右肩背部放射，伴恶心、呕吐、发热，T 38℃。该患者最可能的诊断是（急性胆囊炎）
56. 女，53岁。腹痛、腹胀、低热4周，表情淡漠、嗜睡1天。腹部B超示：肝实质弥漫性病变、脾大及腹水。对该患者诊断最有意义的阳性体征是（扑翼样震颤阳性）

泌尿系统

57. 成人巨大睾丸鞘膜积液，最佳治疗措施是（睾丸鞘膜翻转）
58. 成人少尿的定义是指（尿量少于400ml/24h或17ml/h）
59. 慢性肾病4期是指[GFR 15~29ml/(min·1.73m²)]
60. 诊断肾细胞癌最可靠的影像学方法是（CT增强扫描）
61. 直径2.8cm的肾盂单发结石，首选的治疗方法是（经皮肾镜碎石）
62. 男，52岁。反复无痛肉眼血尿1个月。偶伴尿频、尿急。首先应考虑的疾病是（膀胱肿瘤）
63. 男，70岁。进行性排尿困难7年。夜尿3~4次，尿流变细、费力。经非那雄胺治疗症状改善不明显。B超检查示前列腺54mm×45mm×38mm，残余尿100ml，双肾无积水。最大尿流率8ml/s。心、肺、肝、肾功能正常。下一步首选的治疗方案是（经尿道前列腺切除术）
64. 男孩，3岁。右侧阴囊内肿块，光滑、有波动感，右侧睾丸未触及，卧位时肿块不消失。首先考虑的诊断是（睾丸鞘膜积液）
65. 女，32岁。慢性膀胱刺激症状逐渐加重3个月。KUB+IVU见右肾有钙化影，肾影增大，无功能。对确诊最有价值的尿液检查是（尿结核分枝杆菌培养）

女性生殖系统

66. 判断乳腺包块周围血供情况首选的检查方法是（乳腺B超）
67. 前置胎盘的常见致病因素不包括（初孕妇）
68. 我国现阶段采用的围生期是指（从妊娠满28周至产后1周）
69. 子宫内膜异位症根治手术适用于（45岁以上重度患者）
70. 初产妇，26岁。妊娠40周，临产11h，宫口开大4cm，前羊膜囊饱满，S=0，胎心率140次/分。目前该患者恰当的处理措施是（行人工破膜）
71. 初产妇，28岁。孕足月临产后静脉滴注缩宫素，自然破膜1min后出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、发绀等症状，数分钟后死亡。该患者最可能的诊断是（羊水栓塞）
72. 初孕妇，32岁。妊娠20周，合并子宫肌壁间肌瘤，剧烈腹痛1天，无阴道流血。查体：T 38.2℃。血常规：WBC 10×10⁹/L，N 0.75。最可能的诊断是（子宫肌瘤红色样变）
73. 复发性外阴阴道假丝酵母菌病（RVVC）的维持治疗应（持续6个月）
74. 黄体萎缩不全患者月经5~6天刮宫的病理表现是（增殖期与分泌期并存）
75. 临产后第一产程活跃期的最大加速期是指（宫口扩张4~9cm）
76. 卵巢肿瘤患者盆腔X线平片显示牙齿及骨骼提示（畸胎瘤）
77. 女，20岁。突发下腹部疼痛伴恶心、呕吐8h。直肠-腹部诊：子宫前倾，正常大小，右侧附件区可触及一8cm×7cm×5cm囊实性包块，边界清楚，触痛明显。最可能的诊断是（卵巢肿瘤蒂扭转）
78. 女，24岁。停经6周诊断为早孕，行人工流产术。吸宫后探宫腔发现探不到宫底，出血不多。自述心悸、轻度腹痛及恶心。该患者最可能的诊断是（子宫穿孔）
79. 女，25岁。产后10天，下腹痛伴发热3天。查体：T 39℃，P 98次/分，R 26次/分。脓血性恶露，有恶

臭。血常规：WBC $13 \times 10^9/L$ ，N 0.88。最可能的判断结果是（产褥感染）

80. 女，27岁，已婚。停经9周，阵发性下腹痛3天，阴道少量流血2天。为判断是否能继续妊娠，首选的辅助检查是（B超检查）
81. 女，28岁。婚后4年未孕。月经初潮12岁，5年前起月经稀发、经量减少，近2年闭经，体重增加8kg。查体：BP 120/80mmHg，BMI 26。双乳有触发泌乳。最可能的诊断是（垂体泌乳素瘤）
82. 女，48岁。放置宫内节育器（IUD）10年，不规则阴道流血3个月。妇科检查：宫颈光滑。宫颈细胞学检查无异常。首选处理方法（取出IUD并行诊断性刮宫术）
83. 女，60岁，G4P4。近两年来阴道脱出一肿物，逐渐增大。妇科检查：宫颈光滑，屏气用力后宫颈和部分宫体脱出阴道口外，子宫萎缩，双侧附件正常。对该患者子宫脱垂程度判断正确的是（Ⅱ度重度）
84. 女，70岁。外阴、阴道灼热感4天。妇科检查：阴道黏膜有散在出血点，阴道内少许分泌物，呈淡黄色。该患者首先考虑的诊断为（萎缩性阴道炎）

血液系统

85. 使慢性粒细胞白血病达到血液学缓解首选的治疗是（应用羟基脲）
86. 铁剂治疗缺铁性贫血有效的最早期指标是（网织红细胞升高）
87. 治疗急性髓细胞白血病普遍采用的标准化疗方案是〔柔红霉素+阿糖胞苷（DA）〕
88. 男，40岁。因急性粒细胞白血病入院。查体：四肢皮肤多处出血点和瘀斑。化验：Plt $8 \times 10^9/L$ 。给予单采血小板输注。输注4h后，患者出现胸闷、呼吸困难。急查胸部X线片可见弥漫性阴影。患者最可能发生的输血不良反应是（输血相关急性肺损伤）
89. 急性早幼粒细胞白血病（ M_3 ）首选的治疗是（应用全反式维A酸）
90. 女，18岁。发热、鼻出血3天。查体：全身浅表淋巴结肿大，最大者2.5cm×2cm大小，胸骨压痛（+），肝脾肋下均可触及边缘。骨髓细胞学检查：骨髓原始细胞占0.65，过氧化物酶（-），非特异酯酶染色（-）。最可能的诊断是（急性淋巴细胞白血病）
91. 女，20岁。头晕、乏力1年。实验室检查：Hb 70g/L，RBC $3.0 \times 10^{12}/L$ ，WBC $4.1 \times 10^9/L$ ，Plt $200 \times 10^9/L$ ，血清蛋白4μg/L。最可能的诊断是（缺铁性贫血）
92. 女，40岁。皮肤出血点及瘀斑、牙龈出血1周。查体：肝脾不大。血常规：Hb 110g/L，WBC $4.0 \times 10^9/L$ ，Plt $10 \times 10^9/L$ 。骨髓细胞学检查：巨核细胞95个，产板型巨核细胞1个。最可能的诊断是（特发性血小板减少性紫癜）
93. 女，43岁。乙型肝炎肝硬化10年，近1周来高热伴乏力，出现鼻出血和皮肤多处瘀斑。为确定患者是否并发弥漫性血管内凝血（DIC），最有价值的实验室检查指标是（血浆FⅧ：C下降）

内分泌系统

94. 垂体后叶储存的激素是（抗利尿激素）
95. 为抑制甲状腺功能亢进症患者甲状腺素的释放，外科手术前最常选择的药物是（碘剂）
96. 男，30岁。颈部包块6个月。查体：甲状腺右叶可触及直径2cm质硬结节。B超检查示：甲状腺右叶下极实性结节，2cm×1.5cm，边界不规则，内可见细小钙化。行穿刺活检，最可能的病理类型是（乳头状癌）
97. 女，35岁。近2个月来食欲增加，出汗增加，怕热，体重下降并易激惹，活动增加，独处时偶尔听到有人议论她，或觉得一些行人对她吐痰等。实验室检查：血 T_3 、 T_4 增加，空腹血糖5.5mmol/L。该患者最可能的诊断是（甲状腺功能亢进症所致精神障碍）
98. 女，59岁。乏力伴心悸、多汗、手颤、易饿3个月，脾气暴躁。每天大便4~5次，不成形。体重下降6.0kg。查体：甲状腺Ⅱ度肿大、质软，心率110次/分，心律整齐，心音有力。目前确定诊断的主要检查项目是（甲状腺功能测定）
99. 有关低血糖症的论述中，正确的是（低血糖症可伴有精神症状）
100. 女，55岁。因甲状腺功能亢进症行甲状腺次全切除术，术后1h，突感呼吸困难。查体：面色青紫，颈部肿胀。引起呼吸困难最可能的原因是（切口内出血）

精神、神经病学

101. 心肌梗死后附壁血栓引起的脑血管疾病最常见的是（脑栓塞）

102. 遗忘综合征的三大特征是（近记忆障碍、虚构、定向障碍）
103. 蛛网膜下腔麻醉术后 12h 内应采取的体位是（平卧位）
104. 高血压脑出血的好发部位是（基底节）
105. 患者意识障碍，可唤醒，但不能准确辨别人物和地点。该种意识状态属于（意识模糊）
106. 开放性颅脑损伤特有的临床表现是（脑脊液漏）
107. 老年人最常见的硬脊膜外肿瘤是（转移瘤）
108. 目前颅内动脉瘤主要的确诊检查是（脑血管造影）
109. 男，18 岁。急起四肢无力 3 天，大小便正常。病前 1 周有“上感”史。查体：双眼闭合无力，双侧咽反射迟钝，四肢肌力 1~2 级，肌张力低，腱反射消失，无明显感觉障碍。最可能的诊断是（吉兰-巴雷综合征）
110. 男，55 岁。大量饮酒十余年，停止喝酒后 2 天出现走路不稳、四肢震颤，看到床上有鱼、虾在跳，分不清方向，判断不了时间。头颅 CT 无异常。该患者最可能的诊断是（酒精性痴呆）
111. 女，20 岁。吵架后突然倒在沙发上，全身抽搐。查体：面色苍白，呼吸急促，眼睑紧闭，眼球乱动，瞳孔对称，对光反射存在，双侧巴宾斯基（Babinski）征未引出。常规脑电图未见异常。最可能的诊断是（假性癫痫发作）
112. 女，20 岁。近 3 个月来觉得同学们在背后议论和讥笑她，老师上课也对她指桑骂槐，在公共汽车上常常觉得有人跟踪监视她，不到预定车站就下车。该患者最可能的诊断是（精神分裂症）
113. 女，45 岁。当听到家中房子因洪水倒塌的消息后，突然哭闹叫喊，手舞足蹈，拿砖头打砸旁边的房子，表情恐惧而紧张，1 天后恢复平静。该患者最可能的诊断是（急性应激障碍）
114. 女，62 岁。突然头痛、恶心伴呕吐，左侧肢体运动障碍 3h。头颅 CT 示右侧额叶高密度灶。最可能的诊断是（脑出血）
115. 女，65 岁。头部外伤后昏迷 2h。查体：中度昏迷，右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增高，病理征（+）。头颅 CT 示右额颞部高密度新月形影。最可能的诊断是（急性硬脑膜下血肿）

运动系统、风湿性疾病

116. 符合骨折功能复位标准的是（儿童下肢骨干骨折缩短 2cm 以内）
117. 脊柱结核主要的 X 线表现是（椎体骨质破坏和椎间隙狭窄）
118. 开放性骨折处理正确的是（游离污染的小骨片应该去除）
119. 周围血管疾病用测定双侧肢体皮肤温差的方法判断动脉血流减少情况，温度相差至少应大于（2.0℃）
120. 男，24 岁。手背部刀伤，创口出血不止。现场急救处理最简便而有效的止血方法是（局部加压包扎）
121. 男，28 岁。2h 前摔倒后左肩受伤。X 线检查示左孟肱关节失去正常对应关系，未见骨折征象。予手法复位，复位成功的标志是（Dugas 征阴性）
122. 男孩，4 岁。左膝关节上方肿痛 3 个月，夜间加重。查体：左膝关节上方肿胀，压痛（+），皮温高，静脉怒张，触及一肿物，硬而固定。X 线检查示干骺端有溶骨破坏及日光放射状骨膜反应。最可能的诊断是（骨肉瘤）
123. 女，66 岁。2h 前跌倒时手掌着地受伤。查体：右腕明显肿胀，压痛（+），侧面观呈“银叉样”畸形。最可能的诊断是（Colles 骨折）
124. 女，66 岁。人工膝关节置换术后膝关节周围加压包扎。1 天后发现右足不能背屈，跖屈正常，足背动脉搏动正常。最可能的原因是（腓总神经损伤）
125. 属于骨折晚期并发症的是（骨化性肌炎）
126. 男，22 岁。下腰痛两年余，加重 6 周。疼痛以夜间明显，有痛醒现象。查体：双侧“4”字试验阳性，腰部活动受限。实验室检查：血沉 48mm/h，HLA-B27 阳性。最可能的诊断是（强直性脊柱炎）
127. 男，40 岁。体重 60kg。右上肢肩关节以下、右下肢膝关节以下烧伤深度为浅二度至深二度，右足部烧伤深度为三度。该患者第一个 24h 的补液量应为（3700ml）
128. 治疗急性风湿热时，早期使用糖皮质激素的指征是（心脏炎）
129. 类风湿关节炎不常累及的关节是（远端指间关节）
130. 与狼疮肾炎损害关系最密切的自身抗体是（抗 dsDNA 抗体）

儿科

131. 确认新生儿败血症最有意义的检查是（血培养）
132. 维生素 D 缺乏性佝偻病后遗症期的临床表现是（骨骼畸形）
133. 小儿蛋白质 - 能量营养不良最早期的临床表现是（体重不增）
134. 新生儿期计划免疫应接种的疫苗是（卡介苗与乙肝疫苗）
135. 儿童死亡率最高的时期是（围生期）
136. 男，14 岁。发热、干咳伴全身肌瘫 2 天。胸部 X 线片示间质性肺炎，同班级中数人有类似症状。治疗首选的是（阿奇霉素）
137. 男孩，2 岁。活动后气急、口唇发紫 1 年余。查体：胸骨左缘第 3 肋间闻及 3/6 级喷射性收缩期杂音。胸部 X 线片示心影稍增大，心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷，肺门血管影缩小，肺透亮度增加。最可能的诊断是（法洛四联症）
138. 男婴，12 天。拒奶、体温不升 10h 急诊入院。查体：重病容，面色苍白，前囟平，颈软，心音低钝，双肺未闻及啰音，腹胀，肝右肋下 3.5cm，脐有少许分泌物。实验室检查：血 WBC $5.0 \times 10^9/L$ ，N 0.70，L 0.30。最可能的诊断是（新生儿败血症）
139. 男婴，3 天。黄疸程度加重 2 天，足月儿，母乳喂养。母亲血型为 O 型、Rh 阳性，父亲血型为 AB 型、Rh 阳性。实验室检查：TBil $289 \mu\text{mol}/L$ 。为确诊最有效的检查是（血型）
140. 女孩，4 岁。反复呕吐 3 天，突发抽搐 1 次。食欲差，精神萎靡，肾病综合征病史半年余，长期低盐饮食。其最可能合并（低钠血症）
141. 女孩，会用勺子吃饭，能双脚跳，会翻书，会说 2~3 个字的短句。最可能的年龄是（2 岁）
142. 女婴，1 天。足月产，出生 1 分钟 Apgar 评分 3 分。查体：P 90 次/分，R 30 次/分，嗜睡，面色微绀，前囟饱满，心音低钝，四肢肌张力减低，拥抱反射消失。最可能的诊断是（新生儿缺氧缺血性脑病）
143. 女婴，2 个月。拒食、吐奶、嗜睡 3 天。查体：面色青灰，前囟紧张，脐部少许脓性分泌物。为明确诊断，最关键的检查是（脑脊液检查）
144. 女婴，6 个月。咳嗽伴喘憋 2 天。查体：T 38°C ，P 120 次/分，R 80 次/分，烦躁不安，双肺明显哮鸣音，喘息缓解时可闻及少许中、小湿啰音，肝肋下 2.0cm。最可能的诊断是（呼吸道合胞病毒肺炎）
145. 男婴，营养状况良好，头围 46cm，前囟 0.5cm，身长 75cm。最可能的月龄是（12 个月）

传染病、性传播疾病及其他

146. 典型麻疹的出疹时间与发热的关系是（发热 3~4 天出疹，出疹时热更高）
147. 男孩，14 岁。中午参加聚餐，晚上开始发热、腹泻，初为水样便，后为黏液脓血便，呕吐 3 次。粪镜检：WBC 30~40/HP，RBC 4~8/HP，吞噬细胞 1~2/HP。最可能的诊断是（急性细菌性痢疾）
148. 手足皮肤肿大、片状头皮且无色素沉着的疾病是（猩红热）
149. 流行性乙型脑炎的防御措施是（灭蚊）
150. 男，35 岁。头痛伴视物模糊 3 个月，偶伴抽搐。曾在大便中发现带状节片。最可能的诊断是（脑囊尾蚴病）
151. 男，40 岁。恶心、呕吐、尿色变深 2 天。既往无肝炎病史。查体：巩膜黄染，肝肋下 2cm。实验室检查：ALT $800 \text{U}/L$ ，Tbil $60 \mu\text{mol}/L$ ，抗 HAV IgM (-)，HBsAg (+)，抗 HBs (-)，抗 HBc IgM (+)。该患者最可能的诊断是（急性乙型肝炎）
152. 男，44 岁。乏力、低热、腹泻伴体重下降 3 个月。近 1 年有吸毒史。查体：颌下及腋下淋巴结肿大。对明确诊断最有价值的检查是（血清抗-HIV 抗体）
153. 女，23 岁。外阴瘙痒、白带增多 5 天。有不洁性交史。妇科检查：外阴皮肤黏膜充血，小阴唇内侧见多个小菜花状赘生物，宫颈光滑，子宫正常大，附件无异常。最可能的诊断是（尖锐湿疣）
154. 烧伤患者发生的溃疡是（Curling 溃疡）
155. 可判断有机磷杀虫药中毒的严重程度并对指导治疗最有意义的是（血胆碱酯酶活力）
156. 女，60 岁。被家人发现其昏迷在浴室内，浴室使用的是燃气热水器。急诊入院。查体：皮肤潮红，瞳孔大小正常，口唇樱桃红色。最可能的诊断是（一氧化碳中毒）
157. 男，14 岁。午餐进食海鱼后，即出现头痛、头晕、胸闷，心跳、呼吸加快，伴有眼结膜充血，颜面部及

- 全身潮红，体温正常，无呕吐、腹泻等症状。患者最可能是（组胺中毒）
158. 男，21岁。足底被生锈钉刺伤后8天，四肢抽搐2天。发作时头颈部后仰、强直，牙关紧闭，口唇青紫，大汗淋漓。该患者最严重的并发症是（窒息）

第二部分 基础综合

生理学、病理学

159. 贫血性梗死灶呈锥体形改变的器官是（肾）
160. 肉眼形态表现为颗粒性固缩肾的疾病（慢性硬化性肾小球肾炎）
161. 肾小球滤过膜中，阻挡大分子物质滤过的主要屏障是（肾小球毛细血管内皮下基膜）
162. 在我国最多见的淋巴瘤类型是（弥漫性大B细胞淋巴瘤）
163. 主要由自身反应性T细胞介导的自身免疫病是（桥本甲状腺炎）
164. 决定红细胞血型的物质是（红细胞膜特异凝集原）
165. 能正反馈激活自身分泌的胃液成分是（胃蛋白酶）
166. 维持组织液生成量与回流量平衡的机制是（多余的生成部分经毛细淋巴管回流）
167. 细胞静息电位为 -90mV ，当其受到刺激变为 -100mV 时的膜电位变化称为（超极化）
168. 血液中 H^+ 浓度变化调节呼吸运动的主要刺激部位是（颈动脉体和主动脉体）
169. 月经来潮的原因是（血中雌激素水平降低，孕激素水平降低）
170. 直接参与胆固醇生物合成的物质是（NADPH）
171. 休克指数的计算方法是（脉率与收缩压之比）
172. 正常成人热量的基本需要量是 $[25\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})]$
173. 含有2个胚层以上成分的肿瘤是（成熟性畸胎瘤）
174. 梅毒树胶样肿区别于结核肉芽肿的主要表现是（见多量浆细胞）
175. 男，21岁。3日前受凉后症状已好转。1h前参加篮球比赛后出现气促。查体：双肺散在哮鸣音，心率84次/分。该患者发病最可能的机制是（气道高反应性）
176. 女，33岁。B超检查在左乳房外上象限发现 $0.3\text{cm}\times 0.2\text{cm}$ 大小结节，局部切除送病理检查。结节内查见癌细胞，累及上皮全层，但未侵破基底膜。正确的病理诊断是（原位癌）

生物化学、药理学、免疫学、微生物学

177. 成熟红细胞中，能产生调节血红蛋白运氧功能物质的代谢途径是（2,3-二磷酸甘油酸旁路）
178. 大多数脱氢酶的辅酶是（ NAD^+ ）
179. 各型高脂蛋白血症中不增高的脂蛋白是（高密度脂蛋白）
180. 与体内尿酸累积相关的酶是（黄嘌呤氧化酶）
181. 长期饥饿时糖异生的生理意义之一是（有利于补充血糖）
182. 正常情况下适度升高胆汁酸浓度的结果是（胆固醇 7α -羟化酶合成抑制）
183. 携带缺陷基因BRCA-1者易患的疾病是（乳腺癌）
184. 能够诱导UDP-葡萄糖醛酸基转移酶合成从而减轻黄疸的药物是（苯巴比妥）
185. 能诱发“流感综合征”的药物是（利福平）
186. 女，67岁。因右侧胸腔积液给予规律三联试验性抗结核治疗2个月，近2天出现视力异常。导致上述表现最可能的原因是（乙胺丁醇不良反应）
187. 治疗顽固性呃逆的药物是（氯丙嗪）
188. 参与黏膜免疫的免疫球蛋白是（IgA）
189. 获得性免疫缺陷综合征患者主要受损的靶细胞是（ CD4^+ T细胞）
190. 免疫系统清除病毒感染细胞的主要机制是（诱导特异性CTL产生）
191. 属于II型超敏反应导致的疾病是（新生儿溶血病）
192. 肺炎链球菌的主要致病物质是（荚膜）
193. 男，25岁。左手手指指甲旁红肿、疼痛1天。3天前该处曾被木刺刺伤。实验室检查：血WBC $15.0\times 10^9/\text{L}$ ，

N 0.79。引起该患者感染的常见细菌是（金黄色葡萄球菌）

第三部分 人文综合

医学心理学、医学伦理学、卫生法规

194. 男，46岁。投资顾问。因社交焦虑接受心理治疗，在心理治疗师的帮助下焦虑明显改善。患者心存感激，欲将其掌握的投资信息告知心理治疗师以作报答，但被婉言谢绝。在此治疗关系中，该心理治疗师遵循的原则是（单向性）
195. 潜意识又称无意识，在人的心理活动中一般处于（压抑状态）
196. 医疗机构从业人员理想的人格形象是（大医精诚）
197. 有些人在工作中认真负责，有些人敷衍了事，有些人得过且过。这些表现在人的性格特征中属于（态度特征）
198. 有些人在面对应激事件时易采用“钻牛角尖”的方式应对，这种应对方式属于（情绪反应）
199. 对甲类传染病患者实施强制隔离措施时，应当遵循的公共卫生伦理原则是（全社会参与原则）
200. 对临床诊疗道德中最优化原则理解全面的是（选择以最小代价获得最大效果的治疗方案）
201. 某单位女职工，在一家医院接受过心理评估与心理治疗。其所在单位领导获悉后想了解该患者的心理问题现状，遂向医院索要心理评估的结果，但被患者的心理医生拒绝。该心理医生所遵循的原则是（保密原则）
202. 《医疗机构管理条例》规定的医疗机构执业规则是（按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动）
203. 《疫苗流通和预防接种管理条例》规定的预防接种异常反应情形是（合格疫苗在规范接种过程中相关各方均无过错但造成受种者机体组织器官损害）
204. 某女怀孕后，非常想知道胎儿的性别，遂请好友某妇产科医师为其做胎儿性别鉴定。该医师碍于情面实施胎儿性别鉴定。根据《母婴保健法》的规定，当地卫生计生行政部门应对该医师作出的处理是（给予行政处分）
205. 男，50岁。为长期使用麻醉药品的门诊癌症患者。医院为了解治疗效果和用药安全状况，要求其定期进行复诊。根据相关规定，患者复诊间隔的最长期限是（3个月）
206. 实现“人人享有卫生保健”目标的关键是（开展初级卫生保健）
207. 医疗保险设置开始支付医疗费用的最低标准，低于该标准的医疗费用由患者自付，该标准被称为（起付线）
208. 医疗机构应当对无正当理由开具抗菌药物超常处方达到一定次数的医师提出警告。应当予以警告的最低次数是（3次）
209. 医师判断患者为非正常死亡但未按照规定报告，应给予的行政处罚是（暂停执业活动）
210. 在卫生服务需求中，造成没有需要的需求的原因是（对医院规模和设施的盲目追求）

第四部分 预防医学

211. Meta分析中异质性检验的目的是检验各个独立研究结果的（同质性）
212. 开展膳食与糖尿病关系的病例对照研究，若选用确诊一年以上的糖尿病患者作为病例组，则最常见的偏倚是（现患病例-新发病例偏倚）
213. 利用健康高危人群的就医机会进行的针对性检查称为（机会性筛查）
214. 某地区在1个月内对居民进行了是否有糖尿病的普查，可计算当地居民糖尿病的（患病率）
215. 属于环境中的二次污染物是（光化学烟雾）
216. 随机抽样调查甲、乙两地正常成年男子身高，得甲地身高的均值为175cm，乙地为179cm，经 t 检验得 $P < \alpha$ ，差别有统计学意义。其结论为（可认为两地正常成年男子平均身高不同）
217. 为了解某地区铅污染的情况，抽样收集了130人的尿铅值，经分析发现数据为偏态分布。若要对数据进行描述，应选择集中趋势和离散程度的指标为（中位数和四分位间距）
218. 已知甲地老年人比例大于乙地，经普查甲地冠心病死亡率为5‰，乙地冠心病死亡率为4‰，若希望比较甲、乙两地冠心病死亡率的高低，则（计算标化率后再比较）
219. 在直线回归分析中，如果算得回归系数 $b > 0$ ，则（还需进行假设检验确定 β 是否等于零）
220. 中国营养学会提出的平衡膳食宝塔提供了（食物分类的概念）

目 录

考试题型介绍与答题技巧	(1)
国家医师资格考试全真模拟试卷 (一)	(5)
第一单元	(7)
第二单元	(22)
第三单元	(39)
第四单元	(55)
试卷 (一) 答案及试题分析	(81)
第一单元	(81)
第二单元	(94)
第三单元	(106)
第四单元	(119)
国家医师资格考试全真模拟试卷 (二)	(135)
第一单元	(137)
第二单元	(153)
第三单元	(170)
第四单元	(187)
试卷 (二) 答案及试题分析	(213)
第一单元	(213)
第二单元	(226)
第三单元	(239)
第四单元	(252)
国家医师资格考试全真模拟试卷 (三)	(265)
第一单元	(267)
第二单元	(283)
第三单元	(300)
第四单元	(317)
试卷 (三) 答案及试题分析	(343)
第一单元	(343)
第二单元	(356)
第三单元	(369)
第四单元	(382)

考试题型介绍与答题技巧

国家执业医师资格考试采用的题型有 A 型选择题和 B 型选择题。A 型选择题中，A1、A2、A3/A4 型选择题均出现了；B 型选择题中只出现了 B1 型选择题。现分别介绍于下（所列例题均选自历届临床执业医师资格考试试卷）：

一、A1 型选择题

A 型选择题属于最佳选择题类型。A1 型选择题为单个最佳选择题，每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成（见例题 1）。要求考生找出 1 个符合题干要求的最佳或恰当的答案，此为正确答案，其余 4 个则为干扰答案。5 个备选答案之间往往具有比较意义，干扰答案可以是完全不符合题干要求，也可以是部分符合题干要求，因此答题时应审慎选择，以排除似乎有理而实际是不合适的答案。A1 型选择题中还有一种否定型形式，试题有多个正确答案或涉及不止 1 个相关问题时常采用否定型形式（见例题 2）。题干中有 1 个特别标注的（用黑体标注）否定词（**不、不是、不能、除外、错误、无关等**），要求应试者在 5 个备选答案中选出符合题干要求的答案，而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的，或者是最不合适的，或者是例外的，或者是用得最少的。

例题 1 胸膜腔内压等于

- A. 大气压—非弹性阻力
- B. 大气压+跨肺压
- C. 大气压+跨胸壁压
- D. 大气压—肺弹性回缩力
- E. 大气压+肺弹性回缩力

正确答案：D

例题 2 单纯性二尖瓣狭窄的病变不伴有

- A. 左心房肥厚
- B. 左心房扩张
- C. 右心室肥厚
- D. 左心室肥厚
- E. 心脏呈梨形

正确答案：D

二、A2 型选择题

A2 型选择题是病历摘要型最佳选择题，多用于考查临床学科的知识与技能（见例题 3），但基础医学与其他学科也常采用（见例题 4）。试题由一个叙述性的简要病历（或其他主体）作为题干和 5 个备选答案组成。也有否定型和“以上都不是”型。

例题 3 男性，66 岁，昏迷 1 天入院，既往无糖尿病史，BP 21.3/11.3kPa (160/85mmHg)，血糖 38.9mmol/L (700mg/dl)，血钠 150mmol/L，血 pH 7.35，血酮体弱阳性，可能诊断是

- A. 糖尿病酮症酸中毒昏迷

- B. 饥饿性酮症酸中毒
- C. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷
- D. 乳酸性酸中毒
- E. 脑血管意外

正确答案：C

例题 4 细菌经紫外线照射会发生 DNA 损伤, 为修复这种损伤, 细菌合成 DNA 修复酶的基因表达增强, 这种现象称为

- A. DNA 损伤
- B. DNA 修复

- C. DNA 表达
- D. 诱导
- E. 阻遏

正确答案: D

三、A3/A4 型选择题

A3 型选择题为病历组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床案例, 然后在案例下提出若干道考题, 每道考题均与案例有关, 但测试点不同, 各考题之间相互独立 (见例题 5)。每道考题备有 5 个备选答案, 要求选择 1 个最佳的答案, 其余的答案可以是错误的, 也可以是部分正确的, 但只能有 1 个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3 型选择题和后面讲述的 A4 型选择题多用来考查临床学科的知识技能, 但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识技能。

A4 型选择题为病历串型最佳选择题。试题的结构类似 A3 型选择题, 也是先叙述 1 个临床案例, 然后提出若干个相关的问题, 与 A3 型选择题不同的是当病情逐渐展开时, 可逐步增加新的信息 (见例题 6)。每个问题均与开始叙述的临床案例有关, 又与随后增加的信息有关, 所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4 型选择题中的每个问题也有 5 个备选答案, 要求找出 1 个最佳的答案, 其余的备选答案可以是部分正确, 也可以是错误的。A4 型选择题也有否定型形式, 否定词常用黑体标出以提醒考生。

例题 5 (1~3 题共用题干)

男, 51 岁, 胸骨后剧烈疼痛 4 小时, 伴大汗淋漓, 血压 10.7/8.0kPa (80/60mmHg), 心率 134 次/分, 面色苍白, 四肢冰冷, 心电图示急性广泛前壁心肌梗死。

1. 该患者血压低的原因是

- A. 血容量不足
- B. 合并右室梗死
- C. 舒张期充盈不足
- D. 心源性休克
- E. 疼痛性休克

2. 对指导治疗最有帮助的辅助检查是

- A. 心电图和血压监测
- B. 心肌酶谱监测
- C. 漂浮导管血流动力学监测
- D. 超声心动图
- E. 胸部 X 线片

3. 对该患者最理想有效的治疗措施是

- A. 毛花苷 C 强心
- B. 多巴胺升压
- C. 尿激酶溶栓
- D. 主动脉内球囊反搏泵
- E. 直接 PTCA 术

正确答案: 1 题 D; 2 题 A; 3 题 E

例题 6 (1~5 题共用题干)

某矿工, 男性, 40 岁, 因塌方事故被泥土、矿石压埋致伤。当时不能站立, 腰部疼痛、无力, 双下肢不能自主活动, 双腹股沟以下感觉消失, 急送医院。

1. 正确的搬运方法是

- A. 搂抱
- B. 一人背
- C. 一人抬头, 一人抬足
- D. 三人用手平直托起, 保持躯干平直
- E. 两人抬上肢, 两人抬下肢

2. 到医院检查,发现病人腰背有后突畸形,应首先考虑的诊断是
- A. 胸腰段棘突骨折
 - B. 胸腰段横突骨折
 - C. 胸腰段椎体骨折
 - D. 肋骨骨折
 - E. 局部血肿
3. 此时首选的检查方法是
- A. CT 检查
 - B. MRI 检查
 - C. X 线检查
 - D. 肌电图检查
 - E. 核素检查
4. 假设患者经 1 周卧床观察后双下肢瘫痪

明显恢复,应考虑

- A. 脊髓震荡
- B. 脊髓受压
- C. 脊髓横断
- D. 马尾神经损伤
- E. 神经根损伤

5. 假设 X 线显示椎体单纯压缩性骨折,压缩不到 1/3,其首选治疗方法是
- A. 仰卧于木板床上
 - B. 两桌法过牵复位
 - C. 手术脊椎融合
 - D. 手术内固定
 - E. 石膏背心外固定

正确答案: 1 题 D; 2 题 C; 3 题 C; 4 题 A; 5 题 A

四、B1 型选择题

B 型选择题为配伍题。B1 型选择题是标准配伍题,试题的形式为开始是 5 个备选答案,其后提出至少 2 道试题,要求考生为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案(见例题 7),每个备选答案可以被选用一次、多次或不被选用。

例题 7 (1~3 题共用备选答案)

- A. 霍乱
- B. 黄热病
- C. 艾滋病
- D. 流行性感冒
- E. 渗出性皮肤病

- 1. 《传染病防治法》规定的甲类传染病有
 - 2. 《传染病防治法》规定的乙类传染病有
 - 3. 《传染病防治法》规定的丙类传染病有
- 正确答案: 1 题 A; 2 题 C; 3 题 D

