

醫學新名詞解

上海醫學書局出版



醫學新名詞解釋

無錫萬鈞叔豪編纂

一畫

一時狂 病起於卒然。經過一

二時或一二日即復常態者。

一時熱 一日或至三日之熱

性病也。羅急性傳染病者多見之。

一般感覺 能報內界痛苦、飢

渴、愉快、疲勞、於腦之感覺也。

一刀尖 即二、〇。約合中秤

五分二厘。

一茶匙 即四、〇。約合中秤

一錢零四厘。

一食匙 即一五、〇。約合中

秤三錢九分。

一盞 即一〇〇、〇。約合中

秤二兩六錢。

一茶碗 即一〇〇、〇。約合

中秤二兩六錢。(按液體不能秤。須用〇〇杯。該杯以玻璃製成。

外面刻有一、〇、二、〇、四、

〇、五、〇、一、〇、〇、五、〇、〇、

一〇〇、〇等之標線。今以〇〇

杯量水一〇〇、〇。秤之亦得

二兩六錢左右。故曰約合中秤

二兩六錢也。然油類與酒精。輕

重有異。不能準此數矣。)

一筒 凡以藥水注入皮下。或

靜脈。或筋肉。則用注射器。器中

滿以藥水者。爲一筒。或用半筒。

或用幾分之幾。

二畫

十二指腸 在小腸之上部。上

與胃連。下與空腸接。形似馬蹄

鐵狀。有十二指指相並之長。故名

十二指腸。

十二指腸蟲病 由攝取不潔之

水及野菜而起。其病狀爲貧血

漸次增進。全身倦怠。頭痛。運動

時心悸亢進。呼吸促迫。時時眩

量耳鳴。顏面蒼白。皮膚浮腫。心臟有貧血性雜音。頸靜脈爲獨樂音。食思減退。口渴增進。檢查糞便有圓形無色之十二指腸蟲卵。

人中 上唇中央之凹痕也。

人爲的加齡 不知衛生。恣其口腹勞其筋骨。妄用其腦力。致年未老而已現衰老之象也。

人血系狀蟲 蟲之一種也。由蚊之媒介。棲息於吾人之血液。致生尿血、乳血等症。

力低專司 以石蕊之汁製成。以其汁染紙。能用爲化學試驗紙。如遇酸性則變爲赤色。遇鹼則復原。

力神 提舉物件或壓迫物體

時。能區別其輕重大小者是也。

二尖瓣 又名僧帽瓣。在左心

室與左心耳之間。其作用與三

尖瓣同。

二畫

下等披爾知 生物界中最細

微之下等植物也。見細菌。

下獸 木屐也。

三尖瓣 在右心耳與右心室

之間。所以防止血液之逆流者

也。

三叉神經 分布於前額上下

顎。司知覺運動者也。

小刀尖 卽一、〇約合中秤

二分六釐。

小下肢 單體畸形中四肢發

育不完全之一。卽下肢之短小

也。

小兒散 又名苦士大黃散。以

炭酸麻痺涅叟謨十分。大黃末

三分。茴香油糖七分製成。治小

兒之消化障礙。下痢便秘等。

小結節 皮膚上之小隆起也。

見丘疹條。

小水泡 表皮膨起。如粟粒乃

至小豆大。其中滿藏水狀或乳

狀之液。

上皮組織 單層或複層之組

織。蔽覆肉體之全面。及內腔氣

管等處者是。

土瀝青 其形如蠟。有蠟狀之

光澤。色分褐黑二種。體不透明。燃之則發黑煙。放臭氣。混以石灰。可供建築。如糞之爲膏。塗於木材。則水不能浸入。

大耳神經 爲頸神經叢分出之知覺神經也。分布於外耳、耳殼、外聽道、耳下腺等處。

大結節（瘤塊） 爲大如榛實之腫瘤。大都爲半球狀。間有扁平、或球形、或生莖者。

大水泡（水泡） 與小水泡相同。惟大小稍差耳。如天泡瘡與火傷所生之水泡皆是。

大動脈瘤 卽血瘤也。其病狀爲胸骨部發濁音。心臟部之隆起及搏動。心收縮期的雜音。鄰

接器官之壓迫症狀。左右同名之兩脈搏不同。

大動脈瓣閉鎖不全 其病狀

爲左心室肥大。舒張期的大動脈雜音。機骨動脈。既速且硬。心濁音界左方增大。毛細管搏動。股動脈重復音。股動脈壓迫現象。在一二之器官。可以見其搏動。

子宮癰腫 卽子宮癰。原因爲

房事過多。遺傳。病毒轉移等。在年四十歲以上之婦人。罹本症爲最易。本症多發於子宮頸。往往有肉汁狀帶下。出血（初期之出血。係原於外來之刺激。例如交接）放惡臭。發疼痛。便秘。

或下痢。嘔吐。身體衰憊。具瘰癧性惡液質。淋巴腺腫脹。患部起腫瘍。全經過自一年至一年半。身體衰弱。卒發尿毒症。腹膜炎而至於死亡。

子午線 地球上通過某地點及南北極之經線。卽爲某地之子午線。自天球言之。卽通過天頂及南北極之大圈也。皆人所想像而成。以爲測量及繪圖之符號。

口蓋 爲口腔上部之壁。（在舌之上面）分前後二部。其前部有骨。甚堅硬。名曰硬口蓋。其後部有肉而無骨。柔軟而能移動。名曰軟口蓋。

口蓋扁桃

位於口蓋弓與咽

頭口蓋弓之間。從扁桃竇之底

面所發出。即淋巴小節之集合

物也。(扁桃腺)其形如卵而稍

扁平。其大小人人各異。

四書

天然的加齡

慎起居。節飲食。

事事循乎衛生。隨年齡之增長

而人亦漸次衰老也。

天然免疫性

以有疫性之微

生蟲注射於多種之動物體內。

而試驗之。如某種動物因注射

而起劇甚之病徵。又一種動物

全為不感受性。此不感受性之

動物。即有天然免疫性者。

天行病

流行病之勢力極為

猖獗。甚至有害及全世界者是也。

天竺鼠

亦譯海豚子。或曰豚

鼠。為細菌的試驗時。使用最多

之動物也。性馴良而不嚙人。故

用之甚便。

水銀

即汞也。為金屬原質之

一質有毒。古時道家用以製煉

丹藥。近日醫者。用為殺菌消毒

之劑。

水素

輕也。又作輕氣。化學原

質之一。為無色無味之氣體。在

萬物中為最輕。與氧氣化合而

成水。故名。

水療法

以清水或含有藥液

之水。依種種之方法。(即濕布

綱帶。濕布纏絡法。濕布摩擦法。冷水灌注法。浴湯等)用於身

體之表面。由是而有散炎症。緩

疼痛。下降過高之體溫。興奮神

經系統。增進新陳代謝之作用

者是也。

水蛭

用以吸出局部血液之

物也。一名馬蟻。形似蚯蚓而小。

用法。以強壯之水蛭。(強壯者

觸手即收縮)貼於欲吸出血

液之部分。(貼此之先。宜用肥

皂水洗清該部)如水蛭不附

着於該部者。可滴乳汁或砂糖

水以誘之。水蛭既吸吮十分之

血液。則自然脫落。其咬傷部。貼

以清潔之布片。血即自止。凡皮

膚見有靜脈或動脈搏動之處。均宜避之。

水腎 腎臟變爲充滿尿液之囊狀物也。

水脈腺 卽淋巴腺。

反理的食慾 喜食土塊、木炭、松香、不可食之物也。

反胃 朝食暮吐。或不久卽吐也。

反躬弓 脊髓本縱裂。故可分爲兩半。左半側與右半側。各能發反射運動。若此側枝之知覺能反射於他側枝。及與此運動之細胞者。曰反射弓。

反射作用 爲知覺神經。以其所受之刺激。傳達於反射中樞。

而運動神經興奮。因起意識的運動是也。(如刺戟物感觸鼻內而發噴嚏。固形物入氣管而發咳嗽。食物入口而分泌唾液等。是其作用皆延髓主之。)

不隨意便 卽大便失禁。不仁 卽知覺減少也。又卽知覺脫失也。

不滅性 物體爲火燒燼。或爲水消化。其外觀似已消滅。然此不過吾人之目力不及耳。物體固僅變其形性而依然存留也。如斯之性。曰不滅性。

不隨意筋 一名平滑筋。從紡錘狀之細胞而成。其中央有核。(隨意筋則無之。而呈淡黃色。)

以其運動不聽命於志意。故名如胃腸內面之筋肉。籍以構成臟器者。皆是也。

不働性萎縮 凡働作之臟器組織。常因働作性充血而得多量之働作血。營養甚爲得宜。若常在休息狀態。或不營官能的臟器組織。動脈血之輸入較諸働作性之部。甚爲稀少。卽成不働作性貧血。而終陷於萎縮。如於上肢或下肢。施義布斯綳帶。月餘不働作。或終日在室內不爲運動。常致筋肉萎縮。此其例也。

不全麻痺性步行 不能運其固有之運動也。見麻痺性步行。

條下。

不定型熱

疫熱時或反定型

熱或早昇晚降

心臟內膜炎

即心肉皮炎也

其病狀爲心悸亢進。心窩苦悶。

呼吸促迫。體溫昇騰。脈搏頻數。

不正。心尖有收縮期的雜音。右

室之擴張。第二肺動脈音旺盛。

若輕症則無以上各症狀。

心囊炎

即心包絡生炎也。其

病狀爲胸部之疼痛。胸內苦悶。

呼吸促迫。顏面蒼白。頸部靜脈

怒張。心囊有摩擦音。心部濁音

增大。往往有不定型之體溫昇

騰。本病之病勢多重篤。惟癱瘓

質斯性稍佳良。

心氣病

一種神經病也。見依

卜昆垓里。

匆

日本衡名。讀若蒙眉。(モ

シメ) 斤之一百六十分之一。

合中國秤一錢。

五運六氣

陰陽術數之說。漢

醫學家皆主之。五運即五行之

歲首。六氣陰陽風雨晦冥也。

五臟

漢醫以心、肝、脾、肺、腎爲

五臟。其他謂之腑。

六氣

見五運條

六腑

腑本作府。即胃、膽、三焦、

膀胱、大小腸也。見金匱論。

中樞

延髓之中。神經節細胞

羣集於數部。每羣營一定之作

用。故名此各羣曰中樞。如大腦

爲心意作用之中樞。小腦爲調

整運動之中樞。延髓爲生活的

作用之中樞。脊髓爲反射的作

用之中樞。交感神經爲內臟諸

作用之中樞等是也。

中和

化學作用。謂具有偏性

之兩物相遇。而偏性化爲中性

也。試以苛性曹達之溶液中。加

以稀薄鹽酸。以赤色之試驗紙

試之。則變爲青色。後乃至青色

者變爲赤色。最後則兩種試驗

紙俱不變色。

丹毒

俗名大頭瘟。因體內侵

入丹毒球菌而發。其病狀先惡

寒。次發高熱。頭痛嘔吐。二三日

後。皮膚現赤色之光澤。遂生灼

熱而疼痛之廣斑紋。皮膚軟弱之部。腫脹甚高。大抵經一週間而熱度下降。以皮膚之落屑爲終結。本症於幼兒最爲危險。比斯的里球（ヒステリー球）

由食道之痙攣而生。惟比斯的里患者有之。故名。

比較的脈搏遲緩 譬如有熱病患者兩人。同一熱度。則脈搏亦應同一數度。乃一則數速。一則雖數而較爲遲緩。此較爲遲緩之脈搏。即曰比較的脈搏遲緩。

化骨 骨於少年時爲軟者。至年老時則漸變爲硬。例如肋軟骨至老年時。即變爲硬骨。凡骨

由軟至硬。或由硬至軟。統謂之化骨。

化膿 血液侵入一種之細菌。致白血球死滅。而化爲液體之膿也。

化骨性筋炎 見乘馬骨條。

化學的刺戟 例如貼芥子泥

塗水銀軟膏之部發疹。酸類及鹼性液。腐蝕皮膚。光線。惹起炎症等是。

孔馬菌（コンマ菌） 一作措

麻菌。爲屈曲之桿狀菌。形如英文中之。故名。其數個連結者。則如。狀。或如螺旋狀。

毛細管 極菲薄之細管也。由血管之末漸次分歧而成。爲吸

收血液徧布於各組織之用。

毛樣筋 調節眼之伸縮之筋。

手裂足裂 爲單體畸形中四肢發育不完全之一。即內外側之手指或足趾中部缺如也。

分利 熱之將下降也。溫調節機漸復常態。或急速放溫。故流汗淋漓。而熱度驟低。漸復平溫也。

分解 由一種之物質。分析爲數種相異之物質。

分葉肝 因病的變化。而肝臟變其形狀也。即於肝之左葉或右葉或兩葉。呈數多之外觀。

介達症狀 自罹病之臟器間接發現者也。如腎臟病之全身

水腫等是。

介立 爲立於中間之人也。如家中服役之僕婢、及外來問候之親友等是。

引赤 以刺戟藥外敷。引血液至皮膚外層。而使皮膚變爲赤色。即引病外出之意也。

引赤紙 日本以黃蠟四十八分、鯨蠟十八分、阿列布油二十四分、羯答利斯末六分、徧陳六分、水六十分混和之。煮沸之。復濾過之。使成爲能熔融之凝塊。然後塗於紙面。以爲刺戟皮膚之用。此紙有誘導作用。可使局部充血。

巴意哀兒氏板 (バイエル氏板)

此板一名巴意哀兒氏腺椎體。極微眇。存於空腸內黏膜之基部。

太陽叢 即神經叢。

木乃伊 (モイラ) 置屍體於乾燥之處。使迅速蒸散體液。並用防腐藥品覺屍。使屍體不腐敗而得永存。太古埃及人多行之。

木脾 豚脂脾之硬如木板者。

五畫

生的適當 一米突之一百分之一。合營造尺三分二厘三毫餘。

生理的食鹽水 能與血中之鹽類相接近者。

生的格郎姆 一瓦之一百分之一。約中秤二毫六絲餘。

生理的作用 無病身體之作也。

古布列門篤 血清之亞力規聖也。有溶菌力。

古布里苦氏斑 (コブリク氏斑) 爲帶青藍色而發有光輝之小水泡或小屑片也。

古雷矢台林 (コスレテリン) 爲膽液主成分之一。存於膽汁中。一名膽硬汁。

古雷矢台林結晶 (コレステリン結晶) 爲薄菱形狀之結晶。若加以稀硫酸。則其邊緣帶有黃赤色。與沃度丁幾相接。

觸則變爲紫藍色。

加答兒(カタル)

加答兒流

出之義也。凡自鼻腔、口腔等流出黏液之症。皆附此名。

加里羅(カロリー)

測物體

熱量之單位也。如水一瓦升高溫度一度所需之熱。謂之一小加里羅。一千瓦之水。升高溫度一度。是爲一大加里羅。皆爲量熱之標準也。

加烏派氏腺(カウパー氏腺)

男子分泌生殖管之腺也。位於該管球體之後。其排泄管至於海綿體之起始部。

加答兒性肺炎

舊譯作肺小

葉炎。其病狀爲咳嗽。咯痰。呼吸

促迫。全身蒼白。體溫三十九度

以上。數日持續。熱型呈不正之弛張。疾病增進時。胸部發濁音。打診上證明有響性小水泡音。及氣管枝呼吸音。

加答兒性黃疸

卽黃疸。因食

物不攝生而起。其病狀爲皮膚、黏膜及尿。均帶黃色。眼結膜、口唇、口腔發黃色。尿爲黃褐色。比重較大。以嚼囉仿謔混於尿內而振盪之。其管底現黃色之沈澱物。大便爲灰白色。脈徐。皮膚癢。肝臟腫大。體溫在初期稍昇騰。

加排伊篤(カーバイト)

日

語之炭化石灰也。其製法。以石

灰與炭素熱於電氣爐中。使相

化合。如石塊狀。若觸於水則發熱分解。發生アセチレン瓦斯。而變爲消石灰。

加舍陰(カセイン)

爲含有

窒素之化合物。若僅熱之不能凝固。必加以酸類。始有凝固之性。壓搾而製之曰乾酪。

加里愛斯(カリエス)

骨組

織壞死。而微細之顆粒狀物。生缺損者是也。是因骨組織內及其骨膜新牛肉芽組織。被吸收而起。亦譯爲骨瘍。

加德忒爾(カテーテル)

舊

譯作通尿管。又作探尿管。有硬性、軟性、半硬性之三種。大抵男

子用硬性。女子用軟性。可由尿道插入膀胱內。至膀胱後。其外端即流出尿液。

布洛篤布拉司買（プロトブラスマ）

爲細胞之內容。黏稠透明之液物也。

布篤嗎茵（ブトマイン） 即

屍體毒素也。多因於人體及動物屍體之腐敗。故有此名。

布篤列知精（ブトレスチン）

腐敗產物之一種。自オルニチン之腐敗而生。於尿中可得見之。

布仙（プロセント） 即%

%即百分之記號。如二%硼酸水。即硼酸二、〇水一〇〇、〇

也。除均依此推類。

布拉斯麻（ブラスマ） 細胞

之原形質也。

布拉斯麻利誰（ブラスマリゼ）

細胞成形成質之溶解現象也。

當細胞之自行死滅時。先陷於

變形態（老廢形變形態）次則

細胞成形成質。發生顆粒。分裂爲

數個。遂變壞而死滅者是也。

布拉斯麻甫利誰（ブラスマフリゼ）

細胞成形成質之滲

出現象也。細胞於營養障礙及

其他生活上不適當時。則自被

膜發生裂口。由此流出成形成質

之全部或一部。不有被膜殘留

之現象也。

皮爾梅兒氏音響變換（ピールメル氏音響變換）

在氣胸之空響性或鑢性打響之患者。因體位之變換。而聲音有高低也。如在起坐位。比仰臥位之打響。較爲低調。

皮膚甲錯 皮膚因枯燥。而垢

裂欲落也。

皮阿篤氏呼吸現象（ビオート氏呼吸現象）

呼吸常有停止。其停止自數秒鐘乃至半分鐘。或其以上。

皮角症 皮膚之角質。漸次增

殖隆起。於皮膚上生成一角。闊

或同時發生數角。而與皮膚之

表面爲鉛直線。

皮筋 在皮膚之直下。爲移動

皮膚之筋也。

皮利爾並(ビリルビン) 一

作膽汁紅色素。於尿中呈淡赤

色。又呈藍綠色。

皮利威爾菁(ビリウエルヂー

ン) 卽膽綠也。呈綠色。膽汁之

所以爲綠色者。由此質所成也。

草食動物之膽中。含是物最多。

白帶 婦人於陰道流出白色

之粘液也。其紅者。謂之赤帶。帶

下過多。身體衰弱隨之。

白金 卽鉑也。其質最堅。雖經

紅熾。亦無腐蝕減滅之患。

白堊 白色之土也。其用至廣。

爲製造石灰及盜器之原料。俗

謂之白墻。

白濁 卽淋病也。因交媾不潔

而起。膀胱發炎。小便困難。尿中

含膿白汁及血液。

白血病 舊作黃癰。卽白血輪

過多症也。其病狀爲血液。中白

血球增多。皮膚蒼白。全身倦怠。

心悸亢進。頭痛。耳鳴。眩暈。食慾

不進。皮膚浮腫。心臟及頸靜脈

有雜音。常併發鼻。齒齦出血。吐

血等。本病之脾臟常腫大。

丘疹 卽小結節。爲皮膚上之

小隆起。其大自粟粒以至豌豆

不等。其形狀或爲半球。或爲圓

錐。或爲扁平。其色有赤亦有蒼

白者。

瓦 凡權藥物之重輕。則用藥

秤。其秤恒用法國之グラム。日

人譯作瓦。我國舊譯作格郎姆。

每瓦合中秤二分六厘六毫。在

書中恒以常用之數字與小點

記之。如一瓦作一、〇十瓦作

一〇、〇(亦曰迭、客格郎姆。

(デカグラム)簡作貳)一百

瓦作一〇〇、〇(亦曰黑達

格郎姆。(ヘクトグラム)簡作

貳)一千瓦作一〇〇〇、〇(

亦曰啓羅格郎姆。(キログラ

ム)簡作貳。又作基)一瓦十分

之一作〇、一(亦曰底西格郎

姆。(デシグラム)簡作貳)一

瓦百分之一作〇、〇一(亦曰

生的格郎姆。(セチグラム)簡

作鹽。一瓦千分之一作〇、〇

〇。(亦曰密里格郎姆。(ミ

リグラム)簡作廷。)

瓦斯(カース) 爲一種流動

之氣質也。煤氣亦名爲瓦斯。

包蟲 此爲狗兒縲蟲之幼蟲。

專寄生於人體及羊、牛、豚等動

物之臟器中。尤以肝肺二臟爲

最多。

平攝篤(ピセント) 外科上

之器械也。卽鑷子。

石灰沈著 血中之石灰質。沈

於血管中也。

石蕊 多產於山地。色灰白。製

汁染紙。謂之試驗紙。參觀力低

幕斯條。

石灰變性 石灰鹽類之沈着

於組織中者。

石鹼 俗稱洋鹼。係油類與鹼

類煎熬而成。

正常體溫 溫度往來於三六

、二五度與三七、四度之間

者。

代償 謂身體之某部。或受損

傷。遂失其作用。而移行於他部

以代之也。例如月經閉塞不通。

而發衄血以代之。左腎壞。則右

腎代之操作等是。

弗 卽弗素。化學原質之一也。

爲淡綠黃色之氣體。天然產生

者。多含於螢石中。卽弗化鈣也。

甲狀腺 甲狀腺之構造。結締

織中有腺胞。胞壁覆上皮細胞

之一層。細胞之形。在小兒時代

呈方形。其後則呈扁平。細胞腔

內有含液。此液富於蛋白質。能

以腺胞所產之物。自淋巴管導

諸血中。

矢苟兒倍偏(ヒキルベグ)

壞血病也。又卽牙疳。

矢批黎爾麻(スピリルム)

卽硬性螺旋菌也。形短質硬。不

變爲屈曲之狀態。以菌端之數

鞭毛而運動。

矢批羅夫哀台(スピロフエ

テ) 卽軟性螺旋菌也。

菌質柔軟。而體形能任意變更。

爲鞭打狀之運動。無鞭毛。

半月瓣 在心室與動脈之間。

自三片半月形之瓣膜構成。用

以防血液之逆流於心室。

半茶匙 卽二瓦也。合中秤五

分二釐。

半食匙 卽七、五也。合中秤

一錢九分五釐。

卡布雷(カブレ) 皮膚受刺

戟而生如粟粒之瘡也。

司堆儂氏管(ステノン氏管)

唾腺自耳下腺泌出之路也。又

名耳下腺管。

司布(スーブ) 本品有取自

肉中者。有由骨中煮出者。取自

肉中者。以新鮮牛肉之下腿肉

二斤。洗滌之。加清水一升七合。

食鹽八、〇。煮之。煮時除去浮

遊之物。於文火上煮五時。冷後

濾過之。應用時。則暖而飲之。(

其他數種之煮法從略) 因其

含有之鹽類。足以增進病夫之

食慾。故爲最佳最要之食品也。

六畫

百日咳 卽疫咳也。古名頓咳。

由傳染而來。其病狀在加答兒

期。特發乾咳。氣管枝加答兒。在

癰聲期。鷄鳴樣深呼吸。短咳嗽

頻發。遂呈吹笛樣吸息及乾咳

頻發。呼吸困難。來望息狀。約十

秒至三十秒。晝夜之發作。自三

回至百回。在分利期。咳嗽減退。

僅發單純氣管枝加答兒性咳。

延及數週之久。

百布聖(ヘブシン) 一名卑

白新。卽胃液素也。爲胃液腺所

分泌之無色透明之消化液。能

消化食物。遇蛋白質則變爲百

布頓。

百布頓(ペプトン) 由胃

液遇食物之蛋白質而變成。爲

一種之養料。(按胃液卽胃腺

分泌之液也。透明如水。略帶臭

氣。含有酸性。一名胃酸。能消化

食物)。

百斯篤 卽鼠疫也。舊作黑眼

瘟。因百斯篤菌侵入體內而起。

其病狀先戰慄。次發高熱。頭痛。

眩暈煩渴、全身倦怠、脈搏頻數、舌上厚苔、脾臟腫大、經二三日而水脈腺腫脹發炎、患者陷於昏憒、發譫語、熱益昇騰、身體衰脫、發心臟麻痺而斃。

色素變性

色素之沈着於組

織中者是也。

色盲

視覺中之色彩感覺消

失、除白黑而外、赤黃青綠等色

皆不能辨。

吉列幾斯蚊（キエツエキス

蚊）

爲一種傳染瘧疾之

毒蚊、較阿諾弗來斯蚊爲小、其

止於壁也、身體與壁面作平行、

其子又多發生於穢溷不潔之

溝渠、非若阿諾弗斯蚊之發生

於不甚溷濁之池沼也。

同化

採取外界之物質、入於

體內、變化之、俾與自身所有之

體質相同、其變化之作用、曰同

化作用。

血友病

其病狀爲由輕微之

外傷、卽出血不止、而其病原在

血液稀薄、難於凝固、因屢次出

血、有移於貧血症者、又本病患

者、有羅僂麻質斯神經痛之傾

向。

血清

以病毒種於動物、且屢

次種之、至減輕其毒勢、然後種

於人體之疫漿也、其效能令人

體內化生抗毒質、（抗毒質卽

安金德基新其法先培養病菌、

取其病毒、注射動物體中、則該

動物發熱、注射處腫脹、其體中

自產生抗毒質、此抗毒質能

制疫源微生物所產之毒質、令

不肆虐、血清之種類甚多、治破

傷風者、曰破傷風血清、治實扶

的里者、曰實扶的里血清。

血清療法

取能免疫之動物

血清、注射於人之血管、以治疫

病之法也。

血塞

血液凝固於生活體之

血管內而閉塞之也、其凝固之

血液塊、曰血栓。

血餅

血液凝結王塊也、其附

於創傷之皮面者、曰血痂。

血液性炎症

炎症以血液爲

媒介而作用於組織。致發生炎症也。

血角法 俗名打火罐。見吸角。

尖足 即馬足也。又作馬蹄足。

肉 動物體中柔韌之質。所以

包骨骼者。由蛋白質之纖維束而構成。其含有彈力者曰筋。故

世統稱曰筋肉。

肉百布頓(肉へブトン) 爲

滋養品。其製法。以新鮮之肉片。

細切之。加鹽酸養浸。融解其纖

維。濾汁置陶器中。重湯蒸養。加

重碳酸曹達。復濾去沈澱。即成

糖漿狀之濃液。

印度幾私兒(イントキシール)

此乃腸中蛋白質之腐敗產物

也。

印奇乾尿(インヂカン尿)

於腸狹窄、便秘等腐敗機轉亢

進之際。或腸部以外之部分蛋

白腐敗之時。(腐敗性肋膜炎、

腹膜炎等) 印度幾私兒、斯加

篤幾私篤兒排泄於尿之量。即

有增加者是也。

印奇乾(インヂカン) 爲腸

管蛋白腐敗增加之證。其檢出

法。以壓夫氏法爲最確。法以試

驗之尿五立方仙迷。置於試驗

管。加同量之鹽酸。其次滴下稀

薄之格魯兒石灰液。再加嚼囉

仿謨二三滴。振盪之。此時嚼囉

仿謨。則呈印奇斛(純藍、藍色)

藍色。是即示尿中印奇乾之增

量也。若正常之尿。則印奇乾量

甚少。而嚼囉仿謨。必不能着色。

又即以藍草精製之染料也。或

稱靑藍。

印華爾屈篤 即腹內壅積也。

地方病 傳染病蔓延之唯限

於一處者是。

地水說 謂傳染病之細菌。乘

地水之下。行。進入濕潤鬆粗之

地層內。而後發育繁殖。再出於

空氣中。以傳染於人身也。

自覺症 病人自己所感覺之

症狀也。

自汗 病者無因而自出汗也。

自然生 如山中所生之罌藟

等。不加栽植。而能繁殖者是。

自家中毒 因身體內部之毒

作用。致發起全身中毒之謂也。

自然口孔 凡口腔、鼻腔等均

是。

自閉瓣

即小腸之黏膜也。爲

環狀之皺襞。具有無數之絨毛。

共働機

身體各部之運動。非

由一種之筋肉收縮而能。必由

許多之筋肉。綜合收縮乃現。此

筋肉綜合作用。謂之共働機。共

働機苟變調。則運動不能自由

矣。

共同運動

營一有意之運動。

而伴起一無意之運動也。例如

舉重物之時。吾人之顏面筋。亦

共同作用也。

共同感覺

疼痛、戰慄、及癢痒

等之感覺。逸出於刺激之區域

外者。是也。如齒痛劇烈之時。其

痛幾及顏面之前部。滴一點冷

水於頭上。全身亦覺有戰慄之

感等。

列布篤里克斯 (レプトリツク

ス) 即桿菌分裂後。互相

連接而爲長線狀者。

列企輕 (レチチレ)

爲有嬌

質之白色物質也。神經組織。卵

黃。精液等多有之。藥物亦有列

企輕。取卵黃製之。

列知哀布篤兒

見側鎖。

列氏表

見寒暑表。

米哀林 (ミエリン)

爲神經

之有光輝白色之外觀。(因含

有髓鞘) 屈曲光線極強之球

狀物也。其狀如脂肪之滴者。謂

之米哀林球。

米突 (メートル)

法國度名

也。一作邁當。又作密達。簡稱曰

咪。一米突爲子午線四千萬分

之一。合營造尺三尺二寸三分

四釐餘。(米突之十倍曰迭客

邁當 (デカメートル) 簡作料。

合營造尺三十二尺三寸四分。

其百倍曰黑達邁當。(ヘクト

メートル) 簡作箱。合營造尺

三百二十三尺四寸。其千倍曰

啓羅邁當。(キロメートル) 簡