



標準藥性大字典

國醫 潘杏初編

第一類 植物門

●人參

【別名】 人蔘，黃參，血參，人御

，鬼蓋，神草，土精，地精，海腴，皺面黃丹。

【產地】 我國吉林遼甯產者最良；北美洲與高麗，亦均有出產。

【分科】 爲五加科當歸屬植物，多年生草之根。

【形態】 形肥厚，似萊蕪；有類人形者，亦有類雞腿形者，色白而微褐，與萊蕪之色相似。

【品類】 採集後，任其乾燥者爲水參，日光乾燥者爲白參，蒸後以日光乾燥者爲紅參，其枝根及細生主根爲參鬚。

【成分】 主要成分，大體爲揮發油與沙波甯(卽石臍素)及含水炭素類。

【性味】 呈弱微之酸性反應，味甘苦，微有香氣。

【功效】 其主要效能，爲強壯劑。凡肺癆，神經衰弱，陰萎，遺精，貧血與腎臟病，子宮病，及一切體力消耗所起之病症，皆可用。於神經衰弱之頭痛眩暈，尤有特效。但亦有謂久服人參，則呈頭痛頭重，及腦充血之症狀者。

【作用】 能助胃部之消化力，一部分與胃酸化合，而含水炭素與類似葡萄糖之糖液質。至小腸，始被吸收而入血液中，能促進血液之進行；助長白血球之暢旺，使精神振作，體力強壯。

【處方】 新中藥著：同白朮，茯神，寸冬，甘草，治神經衰弱之消化不良症。

佐歸身，五味，甘草，治心臟衰弱，新本草教本：以人參末與王瓜末，等量混和，製爲參華粉；用以療治久咳發熱。每食前三十分鐘時，服一。五，至二。○格蘭姆。用砂糖水過下，一日三次。

用人參末，黃連末，吳茱萸末，等分混和，製爲人參丸。凡患疝氣者，每食後一時間，服二十粒至三十粒，開水過下。

用人參粗末一分，以上等燒酒十分浸泡。凡腎虛及其他虛弱症，每食前服一湯匙，至二湯匙。

【用法】 切片煎服，或剉末吞服。

【用量】 每次一格蘭姆，至四格蘭姆。

【禁忌】 白血病，及陰虛火動，痘疹初發，均忌服。

【反藥】 乾漆，藜蘆。

【附錄】參條；乃人參之橫生蘆頭上者，其力甚薄，止可用以調理常病，生津止渴，其性橫行，凡指臂無力者，服之甚效。

參蘆；乃人參之蘆頭，性苦溫，能涌吐虛勞痰飲，可代瓜蒂爲探吐良藥，加竹瀝吐頑痰。

參鬚；乃橫生蘆頭而更細者，其性與參條同，而力尤薄。

參葉；乃人參之葉，大苦大寒，損氣敗血，其性與人參相反。

太子參；雖甚細如參條，但短緊結實而有蘆紋，功似人參。

珠兒參；參之產於閩中者，味苦微甘，補肺降火，肺熱者宜用之。

土人參；味甘淡香，性微寒，補氣生津，治欬嗽，喘逆，痰壅，火升，久痿，淋瀝，難產，經閉。

。瀉痢由於肺熱，反胃噎膈由於燥濕，凡有升無降之症，用之甚效。

【附註】本草從新云：人參，黨參，土人參，西洋參，薺危，沙參，桔梗，其形相似，不可不辨。沙參；體虛無心而味淡。薺危；體虛無心而味甘。桔梗；體堅有心而味苦。黨參；體實有心而味甘。

淡。人參；體質有心而味甘微帶苦，自有餘味。西洋參雖似遼東人參，但氣味不香耳。

【編者說明】嘗思天地精華之氣，聚而種於人，散而佈於物，物之種類甚繁，惟足以培元氣，開心益智，聰耳明目者，莫如大山人參。人參之見重於世者，以遜濟爲尤甚。貴人政客，莫不用爲貴重之禮品焉！高麗久被竊據；近來東北又亡，產地皆爲日人所佔。高麗吉林諸參，咸爲日韓人廣種販運；而其功用與本草所載之野山真人參，又有別矣！邇來藥肆合丸，關於方中用人參者，大率以黨參代之，功效微薄。若病家苟不懂而誤服參，可以藥蕪子煎汁飲之能解。

### ●丁香

【別名】 丁子香， 雞舌香， 如字香， 索瞿香， 百里香， 瘦香嬌。

【產地】 產安南，及我國西藏兩廣。

【分科】 屬桃金娘科植物，爲常綠喬木之花蕾。

【形態】 萼長三分，闊一分，萼瓣缺裂四

個，截片爲三角形質，柔軟似草，有穠褐色脂樣之光澤，實之尖端分二房，中包藏多數之卵子。

【品類】 丁香，又名公丁香。雞舌香，又名母丁香，性質相似。

【成分】 主要成分，爲丁香油；餘爲單甾酸，樹脂，樹膠等。

【性味】 味辛，性溫。

【功效】 爲健胃驅風劑，用於吐瀉及寒冷之腹痛。治胃空痛，初期霍亂，疝氣痛。

【作用】 能使胃黏膜充血，令人覺餓；并能促進胃液之加增，使胃之蠕動迅速。更能刺激腸壁神經，使腸之蠕動加增，及被吸收而入血管內，能收血中之氯，增白血球之數，使大腦及主要神經，皆受激動而興奮；心臟之跳動亦同時抗進。與霍亂菌相遇，能停止

其運用；而使之呈麻醉狀態，或竟由麻醉而死。

【處方】 新中藥著：佐白蔻，藿香，陳皮

，厚朴，砂仁，治初期霍亂。合當歸，附子，川棟子，茴香，治疝痛。同半夏，陳皮，白朮，紅豆蔻，治胃空痛。

【用法】 煎服，或研末服。

【用量】 每服〇·三，至一·〇格蘭姆。

【禁忌】 扁桃腺炎，胃出血，腦充血，均忌服。又凡病非屬虛寒而一切有火熱者忌服；呃逆由於熱者大忌之。

【反藥】 鬱金。

【附註】 呃逆之治有三；寒呃用丁香，柿蒂湯。熱呃用五汁湯。（即梨汁，地栗汁，鮮薑根汁，麥門冬汁，鮮藕汁，或蘆汁。若是單用一二汁，如梨汁，地栗汁，蘆汁，亦可。）至於普通偶然的呃逆，只須清痰理氣，切不可誤認，而妄用丁香也。

【附錄】 雞舌香；主風水毒腫，霍亂心痛。治心腹冷氣不和，吹鼻殺腦疔。

【編者說明】 呃逆有寒熱之別，丁香為治寒呃要藥；陰盛格陽之症，及小兒慢驚腹痛呃忒者，用加味理中湯，以丁香為主腦。至於胃氣上逆，肺失下降，不可妄用丁香也。

### ● 刀豆

【別名】 葛豆，刀鍬豆，皂角豆，挾劍豆。

【產地】 處處有之，多栽種於田園。

【分科】 屬豆科植物，為刀豆之種子。

【形態】 為稍扁帶橢圓形扁平之種子，長八九分，如拇指大；成熟者作淡紅色，有光澤。又有一種白刀豆，形狀相同。

【性味】 味甘，性平，無毒。

【功效】 用為祛痰滋養劑。主溫中下氣，

補元陽，利腸胃，治病後呃逆，止嘔益腎。

【單方】 嘔不止，用刀豆粉，白湯服下。

又為蚊所螫，揉刀豆葉貼之。

【處方】 新本草綱目：白刀豆，米粉，（各十錢）反鼻，（二錢）共成細末，名

白龍散，治狂痢。每服一錢，日二夜

一，白湯送下；能含而不能咽者，冷

水亦得。初發四五十日間狂躁者益佳

，服後喜睡者是其驗。

白刀豆，糖霜，（名等分）二味合調，

用生薑湯飲下，每服二錢，每日二次

，治急喘。

【用法】 研粉湯服。

【用量】 一錢至三錢。

【附錄】 刀豆能治腰痛，久痢，婦女經閉，血痞，腹

脅脹痛。（焙末好酒服，加麝香更妙。）瘵喉癰，

（燒灰吹之。）楊梅瘡，（煎濃汁頻服。）

刀豆根；治頭末酒服。（用五錢酒煎服。）鼻淵，（焙

【編者說明】李時珍本草從新云：刀豆本草失載，惟

近時小書載其溫而補元陽也。苟有病後呃逆不止

，聲聞鄰舍，或令取刀豆子，燒存性，白湯調服

，二錢即止。此即取其下氣降元，而呃逆自止也

三七

【別名】 山漆，金不換。

【產地】 我國湖廣一帶多產之，山野自生

，庭園亦可栽植。

【分科】 屬於菊科植物，為三七之根。

【形態】 莖高二三尺，根作團塊。

【性味】 味甘，微苦；性溫，無毒。

【效功】 散瘀血，定痛要藥。功能散一切

惡血，保一切新血，治血瘀成腫成痛

。外敷能消腫止血。

【其他】 能治金刀箭傷，跌撲杖瘡。血出

不止者，嚼爛塗敷，或爲末摻之，血

卽止。並治吐血，衄血，下血，血痢

，血崩，經水不止，產後惡血不下，

血暈，血痛，赤目，癰腫，虛咬蛇傷

諸症。又無名瘡癩，揉葉敷之，甚效

。

【用法】 外治，嚼爛或剉末塗敷。內治，

切片煎服。

【用量】 普通一錢半至三錢，大劑一兩左

右。

【禁忌】 無

〔編者說明〕三七爲散瘀定痛之要藥，又能生新，止

吐下血。昔犯人受杖前服一二錢，血不沖心；杖

後敷之，消腫定痛易愈；大抵陽明厥陰血分藥也

，故治血症甚效。

### 三稜

【別名】 荊三稜， 半天丹乙， 削尖都

尉。

【產地】 生陵澤濕地，我國湖南湖北，俱

有出產。

【分科】 屬莎草科植物，入藥用根。

【形態】 爲黃白色之根，狀似小芋，頭端

較小，三四塊連合爲一，具黝黃色之

鬚根，質堅實，且沈重，市人多去其

外皮售之。

【品類】 有黑三稜，形如烏梅，而不生細

根，體輕大小不定，其色黑，去皮卽

白。

又有石三稜，形如斂股，黃白色，葉

綠如蒲，苗高及尺。亦有三稜，四月

開花，白色似蓼蒨花。

【性味】 味苦，性平，無毒。

【功效】 用爲鎮痙劑，功同香附子，乃散

血，行氣，消積要藥。主治積聚，血

結，腹痛，氣脹，飲食不消，經脈不

調。入肝經血分，破血中之氣，通肝經聚血。兼入脾經，散一切血瘀，氣結，食停，瘡硬，老塊堅積；消腫，止痛，通經，墮胎。從血藥中則治血，從氣藥中則治氣。

## 【處方】

新本草綱目：三稜，甘草，益智

，縮砂，莪朮，青皮，各等分爲末，名爲三稜散。每服一錢，能治氣積腹痛。莪朮，益智，三稜，青皮，（各二兩）白茯苓，（四兩）甘草（一兩）棗（一枚）鹽（少許）水煎服，治食積氣塊，攻刺胸脅，不思飲食，脹滿嘔酸。又去白茯苓，加木香，神麴，名爲木香三稜湯；水煎服，治霍亂腹痛。

杏仁，蘿蔔子，（微炒）乾漆（各二兩）礪砂，（一兩）神麴，麥蘖（各三兩）三稜，八兩，（用生細剉，搗爲末，以酒三斤熬成膏）名爲三稜膏。再將三

稜膏搜圓如梧子大，名爲三稜煎圓。每十五丸，米飲下，治中脘氣痞，心腹堅脹，喘滿短氣。

三稜，蘿蔔子，蓬莪朮，青皮，烏藥，檳榔，枳實，（各一錢）名爲稜朮湯。水煎服，治食積。

三稜，莪朮，（各五兩）白朮（三兩）木香（半兩）枳實（一兩）名爲賺氣散。以生薑水煎服，用砂糖壓下，治心胸痞悶，腹脅虛脹，兩肋刺痛。

【用法】 春秋初冬，採掘其根，煨軟，去鬚根，剉炙用。或去鬚根，以醋煮熟，剉炙用。

【用量】 五分至錢半。

【禁忌】 藥力至強，不可久服，氣弱胃弱者忌服。又能墮胎，瀉真氣。

【編者說明】此肝經血分之藥也。攻堅消積，而力頗峻，治積塊瘡硬者，乃堅者削之也。又能治異症

，渾身燥炮，如棠梨狀，每箇出水，有石一片，如指甲大，而其炮復生，抽盡飢骨肉，即不可治。用荊三稜，蓬莪朮各五錢，爲末，分三服，酒調連進愈。(是危氏得效方)；(參看蓬莪朮姜黃各條)。

●土人參

【產地】山西長子縣，雲南姚安縣，安徽舒城縣，均有出產。

【分科】屬五加科植物，爲土參之根。

【形態】外面黃褐色，內部白色，狀如木質。

【成分】爲沙波甯質。

【性味】味甘，淡香，性微寒。

【功效】爲人參代用品，亦屬強壯劑。此外有健胃，解熱，祛痰之效，用於風邪。

【用法】用爲煎劑，每食前一時服。如加甘草小量，尤易服食。

【用量】一日量三・〇，至七・〇格蘭姆。

●土茯苓

【別名】奇良，奇糧，岐良，山牛

，冷飯，硬糍，山歸來，冷

飯塊，地茯苓，過山龍，道河

櫟，冷飯團，山地栗，山豬糞

，山奇糧，木豬苓，硬飯，土草薺，仙遺根，刺豬苓，過

岡龍，榮莫，木豬腰子，草禹

餘糧，華禹餘糧。

【產地】產中國之河北山東湖北浙江，諸山谷中皆有之。

【分科】屬百合科植物，爲土茯苓之根。

【形態】蔓生如蕁，莖有細點，其葉不對

，狀頗類大竹葉，而質厚滑，如瑞香葉，長五六寸，其根狀如菝葜，而圓

，其大若雞鴨卵連綴而生，遠者離尺許，近或數寸，其肉軟，可生啖，有赤白二種，入藥以白者為良。

【性味】味甘淡，性平，無毒。

【功效】中醫專用治瘡毒。日本弘治正德時，因楊梅瘡盛行，率用輕粉取效，毒留筋骨，潰爛終身；後用此藥，遂為剋梅毒要劑。

本草綱目：健脾胃，強筋骨，祛風濕，利關節，止泄瀉，治拘攣骨痛，惡瘡癰腫，解汞粉銀硃毒。

【用法】去皮，剉炒用。

【用量】普通三錢，至五錢；大劑數兩。

【禁忌】忌茗醋。

〔編者說明〕土茯苓治楊梅結毒。李時珍曰：楊梅瘡，古方不載，亦鮮有病者。近時起於嶺表，傳及四方；蓋嶺表風土卑炎，瘴風熏蒸，飲啖辛熱，男女淫猥，濕熱之邪，積蓄既深，發為毒瘡，遂

致互相傳染，自南而北，遍及海宇，然皆淫邪之人，病之種類有數種，治之則一也。土茯苓能解輕粉毒，惟多服或致髮禿，亦耗血之明徵也。

### ●土當歸

【產地】山野多年生草。

【性味】味辛，性溫，無毒。

【功用】主除風和血，酒煎服。治手足閃拗，同荆芥，葱白，煎湯淋洗之。

【用量】普通一二錢。

〔編者說明〕如以土當歸之根，搗汁沖服，令人沉醉，亦金瘡之聖藥也。（註）金瘡瘡口，破裂出血，或為刀箭毒所傷，而當發者。

### ●土木香

【別名】日本名：御藥園木香。

【產地】為自生山野，或栽植庭園之宿根

草。

【分科】屬菊部植物，大車之根。

【形態】

莖高五六尺，葉在下部者，作長橢圓形，柄長上部者細小。邊緣俱有精鋸齒，有毛茸，夏季於莖上分數極，頂上開黃色頭狀花，後結淡褐色子實，根之經二三年者，秋季採掘之，供藥用。生鮮時，內部作白色，乾後，則作灰褐色。

【成分】

含有歌列甯苦味質，伊努甯樹脂，揮發油等。

【性味】

氣味芳香而苦，性溫。

【功效】

用作肺病藥，及健胃藥。利小便，治風氣痞滯諸症，及疝痛腰痛。療脾病，依剝昆堉兒，通經閉，殺虫。治未發之咳嗽，痰喘等熾衝之胸疾，能刷淨肺粘痰。

【用法】

煎服，蒸氣，或浸酒服。

【用量】

五分至三錢。

●土荊芥

【別名】

鵝脚草。

【產地】

生於田野，或爲人所栽植。

【分科】

屬蓼科植物。

【形態】

莖高一二尺，葉互生，作披針狀；上部多作卵圓形，末端狹，邊緣有鋸齒，夏月於葉腋簇生綠色小花。

【成分】

含揮發油，樹脂，鹽類等。

【性味】

氣味芳香如樟腦。

【功效】

用作健胃通經藥，及神經強藥。

【單方】

毒虫刺傷，揉生葉貼之。

【用量】

每次一分至二分。

●土常山

【產地】

生於深山崖上。

【分科】

屬虎耳草科植物，爲土常山之葉。

【形態】落葉灌木，高二三尺，春季生新

葉，盛夏茂盛，葉對生，長三四寸，作卵圓形，末端帶紫色，邊緣有鋸齒，夏月每梢生白，碧，紫，紅，諸色花，稍有繖形，外側花大，萼亦大，中心花小。

【成分】為歐篤蘭精。

【功效】日本文化元年，所刊行飲膳摘要

：載有「味甘無毒，多食則寒氣。」

●土紅花 詳紅花科目內。

●大黃

【別名】錦文，黃良，將軍，火參

，膚如。

【產地】產陝西，甘肅，四川等省，多年

生之宿根草。

【分科】屬蓼科植物，為大黃之根。

【形態】根黃色帶有赤色之紋。似球狀之

正圓體，大三四寸，外表色黃，內為白色之堅實，有光澤及褐色之髓線附着。

【成分】大黃根之有效成分：(一)為卡泰

爾輕酸。(二)為一種苦味質。(三)為大黃鞣酸。(四)為克利翔敷盎酸。此外尚有愛莫蓼，泛屋來輕等質；草酸鈣等質。

【性味】味大苦，性大寒，無毒。

【功效】用為緩下劑，利便祕；又為健胃劑，止瀉藥。主治瀉實熱，蕩積滯，血閉熱結，功能下瘀破癥，蕩滌腸胃，推陳致新，調中化食，治大便秘結，女子紅閉。又便益，助消化不良。

【作用】在胃中，略能助胃液之不足，以促進其消化作用。至腸，能激腸之蠕動，使積糞瀉下。然一次瀉下，因草

酸有斂腸之功，故復行便秘。

【處方】 新中藥著：同芒硝，枳實，厚朴

，治便秘。合龍胆，甘草，柏子仁，白芍，治消化不良症。

【用法】 對末吞，或煎水飲；每於食前三

十分鐘服。

【用量】 每次一格蘭姆，至六格蘭姆。

【禁忌】 凡氣分病，及胃寒血虛，妊娠產

後，均忌。

【反藥】 生漆。

〔編者說明〕大黃苦峻下走，爲手足陽明血分之要藥。最重要方劑，有大承氣湯，涼膈散，能除腸中蘊結之邪。陽明津液消亡，宜仿承氣微下之例；承氣者，所以承接未亡之陰氣於一綫也。用以瀉滯腸胃，下燥結而除癆熱。東垣曰：如定禍亂，以致太平，可以有將軍之名。土材曰：古人用大黃，治虛勞吐衄，意甚深微。蓋濁陰不降，則清陽不升；瘀血不去，則新血不生也。

●大蒜

【別名】 蒜頭，葷菜，天師葫。

【產地】 處處有之，隨地可以播種。

【分科】 屬百合科植物，爲大蒜之鱗莖。

【形態】 扁圓或圓形，外蒙白膜數層，內藏腰圓形白色之仁四五瓣。

【成分】 含揮發油。此油之成分，爲硫亞

立耳；此外含蔗糖與澱粉。

【性味】 味辛，性溫，有毒。

【功效】 用作利尿，祛痰，鎮咳，爲殺虫

劑。治霍亂，腹中不安。療癥結，散

癰腫，破冷氣，除風濕，通氣血，健

脾胃，治吐血肺氣，殺虫毒，伏邪氣

。

【作用】 在胃中，僅自行分解，不起何等

作用。至腸，次第被吸入血中，能助

血行增速，并能激發管神經，使分泌

液透出。

液透出。

【單方】 腹腫大，叩之如鼓鳴者，用大蒜

去根皮，裹綿使溫，放入肛門，冷則易之，如此數次。此外大便不通之病，亦可用此法。衄血不止，用大蒜搗爛如泥，作成厚二分許，大一寸四方，貼於腳底。拔除雞眼，用大蒜搗碎貼局部，每日取換，隔日用灰洗。陰門癢，用大蒜煎湯，時時洗之。

【處方】新中藥著：同杏仁，甘草，治肺結核。佐砂仁，木香，白朮，陳皮，豆蔻，桂心，治消化不良。

【用法】用為蔬菜服食，或搗爛煎服，及搗汁塗敷外部。

【用量】一日量一顆至三顆。亦可用粉末，一次五格蘭姆。

【禁忌】偏頭痛，腦膜炎，腦充血，眼結膜，加答兒。

【編者說明】蒜為五葷之一，氣味燥烈，多食則口臭昏目。故養生者，不宜常啖。惟通竅之功特大，

凡極臭極香物，皆能開竅有餘也。

### ●大棗

【產地】產山東山西河北等省，他處亦多之。生棗曬乾，即名大棗。

【分科】屬鼠李科植物，為棗樹之果實。

【性味】味甘，性平，溫，無毒。

【功效】為緩和藥，用於胃病，聲啞，咽喉痛。又為祛痰藥，用於有胸痛之咳嗽；亦可外治凍瘡。又為補中益氣，和解百藥要藥；主養脾，平胃，調榮衛，生津液，潤心肺，治虛損。

【用法】用為煎劑，每食前三十分鐘服。

【用量】一日量：五格蘭姆，至十五格蘭姆；中量二三錢。

【禁忌】生棗多食，令人熱渴膨脹，動臟腑，損脾元，助濕熱，忌與葱魚同食；若多食致壅氣助濕。凡中滿者，小兒疳病者，齒痛及患痰熱者均忌。

〔編者說明〕大棗即黑棗，與紅棗用法有別。紅棗調和營衛而健脾土，黑棗溫運中陽，而納元氣。著各方劑有葶藶大棗瀉肺湯（葶藶，大棗）；及大棗湯（大棗十枚，甘草一尺，生姜二兩，附子一枚，黃耆四兩，麻黃五兩）治癰疽核效。

### ●大戟

〔產地〕 為山野或平澤自生之宿根毒草，產浙江等地。

〔分科〕 屬大戟科植物，為大戟之根。

〔形態〕 春生紅芽，莖高尺許，傷其莖有

白汁流出。根外部赤黃，內白色。

〔性味〕 味苦，性寒，有小毒。

〔功效〕 為泄臟腑水濕要藥。主消水腫，

祛痰涎，利大小便，瀉痘毒。

〔用法〕 為煎劑，每食前一時服。

〔用量〕 普通八分至一錢。

〔禁忌〕 有劇毒，不可與孕婦服；否則有

墮胎傷生之虞。

### 〔反藥〕 甘草。

〔編者說明〕大戟甘遂，俱為泄水氣，逐痰涎之要藥。但能耗氣，不宜常服。控涎丹（甘遂，大戟，白芥子等分）。大戟能泄臟腑之水濕，甘遂能行經隧之水濕，白芥子能散皮裏膜外之痰氣。惟善用者能收奇功也。又有十棗湯（芫花，大戟，甘遂，等分，加棗十枚）。又有百祥丸（大戟棗肉）。治嗽而吐青綠水，能瀉其腑，而臟自不實。又治痘瘡紫黑乾陷，不發寒者，急宜下之，不黑者慎不下。

### ●大薊

〔別名〕 地疔，地丁香，地下草，大居寒，牛溺刺。

〔產地〕 生田野間，處處有之。

〔分科〕 屬菊科植物，為大薊之地下莖及

葉。

〔形態〕 花葉多作針刺狀。

〔性味〕 味甘，性溫，無毒。

〔功效〕 主涼血，消腫。治瘡癰，通乳汁

，療腸癰。(腸癰今名盲腸炎之一)

【用法】煎服，搗根絞汁服。

【用量】每次一錢至二三錢。

【禁忌】不利於脾弱泄瀉，及血虛胃弱，

不思飲食之症。

【獨者說明】大薊有大小之別，皆能破血。但大薊兼療癰腫，而小薊專主血，不能消腫。小薊力微，可退熱，不如大薊能健養下氣也。

## ●大青

【產地】各省多有產之，莖葉均可入藥。

【性味】味苦，微鹹，性大寒。

【功效】為解散熱毒要藥。治傷寒時熱狂

，陽毒發斑，清心涼胃。

【用量】每次一錢至三錢。

【禁忌】此乃陰寒之藥；止用以除天行熱

病，不可施於虛寒脾弱。

【編者說明】犀角大青湯：(大青七錢半，犀角二錢半，梔子十枚，豉二撮。)分二服，每服二盞半

；煎八分，溫服。(南陽活人書)：小兒卒然肚皮青黑，乃血氣失養，風寒乘之，危惡之候也。大青為末，吹納口中，以酒送下，奇效。(保幼大

全方)

## ●大蓼

【別名】仙人杖。

【產地】自生山野濕地之多年蔓狀灌木。

【分科】屬毛茛科植物，為大蓼之葉花。

【形態】長達丈餘，葉對生，作羽狀複葉

；由卵圓形或心臟形之小葉，三葉至

七葉而成。表面深綠色，裏面淡綠色

，花為白色四瓣，作聚繖花序排列，

後結瘦果。

【成分】含有阿涅蒙油。

【功效】梅毒潰瘍，腐骨疽，用此藥泡製

內服，甚效。能消化潰瘍中之水棉狀

肉，及穢敗胼胝狀肉。或癌狀潰瘍，

及兼有腐骨疽症，搗葉貼之，有排膿

刷淨之效。

【用法】 花及葉泡劑服，或外敷。

### ●大麻

【別名】 大麻，黃麻，麻。

【產地】 我國處處均有。

【分科】 爲桑科之大麻屬，嫩葉及花子，

均入藥。

【形態】 掌狀複葉，邊有鋸齒，花無瓣，

雌雄異樣，色綠褐，子如蓮實，表面

有黑斑。

【成分】 至要素，爲大麻油。

【作用】 在胃中不起何等變化，入腸後即

激腸之粘膜，使分泌增多，蠕動加速

；同時又能限制腸內固水分，不使

收吸。

【功效】 治產後大便祕結。

【處方】 新中藥著：合大黃，芍藥，厚朴

，紫蘇子，台黨，歸尾，生地，枳殼，檳榔，甘草，治產後大便秘結。

【用法】 搗爛煎服。

【用量】 每次〇·八格蘭姆，至四格蘭姆

。

【反藥】 牡蠣，白薇，茯苓。

### ●大楓子

【別名】 大風子。

【產地】 廣東南海，及暹羅，交趾，印度

諸島。

【分科】 屬椅科植物，爲大楓樹之種子。

【形態】 形如橙果之球圓形果，外殼硬固

，作木質狀，蒙有鬚毛果皮。

【成分】 中含有脂肪，蛋白。

【性味】 味辛，性熱，有毒。

【功效】 爲治麻瘋之良劑。治諸疥癬，有

殺虫，劫毒之效。