

精致中草药工具丛书

主审：马 骥 主编：陈兴兴 刘传明

常用

# 中草药

## 识别应用图谱

(手绘本)



广东省出版集团



广东科技出版社（全国优秀出版社）

# 常用中草药识别应用图谱

(手绘本)

主 审：马 骥

主 编：陈兴兴 刘传明

副主编：袁立霞 张宏伟

编 者：张 勤 张晓强 徐 起

熊文超 林漪清



- 药材来源符合《中华人民共和国药典》2010版；
- 注明历史出处，引证拉丁学名；
- 文字简洁，注明原植物与药材识别特征；
- 彩绘图精美，完整描绘植物的形态；
- 原创的药材和饮片图，高清精细；
- 单验方药味少，用法简单，疗效确切

## 图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药识别应用图谱: 手绘本/ 陈兴兴、刘传明主编.  
—广州: 广东科技出版社, 2014. 3

(精致中草药工具丛书)

ISBN 978-7-5359-5243-1

I. ①常… II. ①陈…②刘… III. ①中草药—图谱  
IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第284554号

Changyong Zhongcaoyao Shibie Yingyong Tupu

---

策 划: 李 鹏 谢慧文 冯常虎 杜怡枫

责任编辑: 谢慧文 杜怡枫

封面设计: 柳国雄

责任校对: 蒋鸣亚

责任印制: 任建强

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号 邮政编码: 510075)

<http://www.gdstp.com.cn>

E-mail: [gdkjyxb@gdstp.com.cn](mailto:gdkjyxb@gdstp.com.cn) (营销中心)

E-mail: [gdkjzbb@gdstp.com.cn](mailto:gdkjzbb@gdstp.com.cn) (总编办)

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

印 刷: 广东信源彩色印务有限公司

(广州市番禺区南村镇南村村东兴工业园

邮政编码: 511442)


规 格: 889mm×1194mm 1/64 印张6.375 字数150千

版 次: 2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

定 价: 32.00元

---

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。



## 本书使用说明

1. 本书所有中草药来源符合《中华人民共和国药典》2010版，并引证其拉丁学名。考虑到临床实际应用情况，个别药味未作区分，如：“川黄柏”、“关黄柏”均在“黄柏”项下，“北五味子”、“南五味子”均在“五味子”项下。
2. 最早记载的历史文献均有注明，如：“连翘Lianqiao——《神农本草经》”，有争议或脉络不清者，暂不列。
3. 通常一味药的文字和图各占一页。同一植物基源的不同药用部位尽可能放在一起描述，以其中一味药为主，其他加“附”字标注，例如：“金沙藤”与“海金沙”，“桑叶”、“桑白皮”与桑枝等。
4. 原植物描述力求文字简洁，重点突出。描述顺序依据植物分类学常规排序。

5. 【用法用量】及【药材识别特征】等项有画龙点睛之处。如：“旋覆花外感暴咳宜生用，内伤久咳宜炙用”；“商陆切面有多个凹凸不平的同心性环纹，俗称‘罗盘纹’；天麻块茎顶端有红棕色干枯芽苞，习称‘鹦哥嘴’”等。
6. 根据读者基本需求，并限于篇幅，本书中凡多基源中药，仅描述其中一个主要基源的识别特征；凡具多方面功效的中药，仅说明其主要功效；采收加工项下不专述炮制方法。
7. 每药项下的【验方精选】，尽可能选择药味较少，用法简单，疗效较好的1~3个。“水煎服”通常是指：每日1剂，煎2次，合并药液，分2次服。有毒的药通常不设【验方精选】，个别药物因原植物或药材识别特征内容较多也略去此项。

## 关于中药彩图的说明

2007年在建设岭南药博物馆的过程中，我们发现原标本室的仓柜角落里散落部分老式教学挂图，因多年未用，其中有些已经残缺不全，但仔细观察仍可见当年绘图者精心制作的功力和科学彩图的独到之处。经询问老同事得知这些彩图曾在20世纪八九十年代的中药教学中发挥过重要作用，绘图者的姓名已难准确查询。于是我们小心翼翼通过翻拍，修复，尽力保持原图风貌，制成电子版用于教学，制成图版作为岭南药博物馆的展品之一。今天借出版之际将这些中药彩图呈现给读者分享。同时，也在此真诚地纪念那些曾经为中草药教学和科研辛勤劳动的前辈同仁。

编者

2013年1月11日

# 目 录

01

## 根及根茎类

狗脊·····	2	地榆·····	38
大黄·····	4	苦参·····	40
虎杖·····	6	葛根·····	42
何首乌·····	8	甘草·····	44
牛膝·····	10	黄芪·····	46
川牛膝·····	12	远志·····	48
商陆·····	14	人参·····	50
银柴胡·····	16	三七·····	52
太子参·····	18	白芷·····	54
威灵仙·····	20	当归·····	56
附子·····	22	独活·····	58
白头翁·····	24	羌活·····	60
白芍·····	26	前胡·····	62
赤芍·····	28	川芎·····	64
黄连·····	30	藁本·····	66
升麻·····	32	防风·····	68
乌药·····	34	柴胡·····	70
延胡索·····	36	北沙参·····	72
		龙胆草·····	74
		秦艽·····	76



通草·····	172
钩藤·····	174

03

皮类

牡丹皮·····	178
厚朴·····	180
肉桂·····	182
杜仲·····	184
合欢皮·····	186
黄柏·····	188
白鲜皮·····	190
秦皮·····	192
香加皮·····	194
地骨皮·····	196

04

叶类

侧柏叶·····	200
大青叶·····	202
桑叶·····	204
枇杷叶·····	206
番泻叶·····	208

艾叶·····	210
---------	-----

05

花类

辛夷·····	214
丁香·····	216
夏枯草·····	218
金银花·····	220
旋覆花·····	222
款冬花·····	224
菊花·····	226
野菊花·····	228
红花·····	230
西红花·····	232
蒲黄·····	234

06

果实及种子类

白果·····	238
胡椒·····	240
火麻仁·····	242
王不留行·····	244
莲子·····	246

芡实·····	248	大枣·····	298
五味子·····	250	胖大海·····	300
八角茴香·····	252	使君子·····	302
肉豆蔻·····	254	诃子·····	304
莱菔子·····	256	小茴香·····	306
覆盆子·····	258	蛇床子·····	308
木瓜·····	260	山茱萸·····	310
山楂·····	262	连翘·····	312
苦杏仁·····	264	女贞子·····	314
郁李仁·····	266	牵牛子·····	316
乌梅·····	268	蔓荆子·····	318
金樱子·····	270	枸杞子·····	320
沙苑子·····	272	栀子·····	322
决明子·····	274	瓜蒌·····	324
补骨脂·····	276	牛蒡子·····	326
槐角·····	278	苍耳子·····	328
赤小豆·····	280	薏苡仁·····	330
白扁豆·····	282	槟榔·····	332
陈皮·····	284	砂仁·····	334
枳壳·····	286	豆蔻·····	336
吴茱萸·····	288	草豆蔻·····	338
花椒·····	290	草果·····	340
川楝子·····	292		
龙眼肉·····	294		
酸枣仁·····	296		

金沙藤·····	344
石韦·····	346
麻黄·····	348
鱼腥草·····	350
细辛·····	352
仙鹤草·····	354
紫花地丁·····	356
广藿香·····	358
荆芥·····	360
益母草·····	362
薄荷·····	364
紫苏梗·····	366
肉苁蓉·····	368
车前草·····	370
豨莶草·····	372
茵陈·····	374
青蒿·····	376
佩兰·····	378
蒲公英·····	380
淡竹叶·····	382
灯心草·····	384
石斛·····	386

参考文献·····	388
-----------	-----

索引·····	389
---------	-----

## 根及根茎类

根（Radix）及根茎（Rhizoma）是植物的两种不同器官，具有不同的外形和内部构造。由于很多中药同时具有根和根茎两部分，两者又互有联系，因此为了便于比较，通常将根及根茎类中药并为一类叙述。

根类中药包括药用为根或以根为主带有部分根茎的药材。就根部而言，没有节、节间和叶，一般无芽。

根茎类是一类变态茎，为地下茎的总称，包括根状茎、块茎、球茎及鳞茎等，药材中以根状茎多见。根茎类中药系指地下茎或带有少许根部的地下茎药材，鳞茎则带有肉质鳞叶。

## 狗脊 Gouji

《神农本草经》

蚌壳蕨科植物金毛狗脊 *Cibotium barometz* (L.) J. Sm. 的干燥根茎。

◎**原植物识别特征** 多年生大型蕨类植物，高2~3m。A根茎粗大，顶端连同叶柄基部密生金黄色长柔毛。叶丛生，叶柄粗壮，长约120 cm；叶片革质，阔卵状三角形，长达2m，三回羽裂；羽片互生，末回裂片镰状披针形，长1~1.4cm，宽约3mm，边缘有浅锯齿。孢子囊群生于裂片侧脉顶端，每裂片有1~5对；囊群盖2瓣，成熟时张开如蚌壳。

◎**药材识别特征** 呈不规则块状，长8~30 cm，直径2~10 cm，外被金黄色长柔毛，顶端有棕红色叶柄残基，下部丛生多数棕黑色细根。质坚硬，难折断。气无，味微涩。

生狗脊片呈不规则长条形或圆形，厚1.5~5mm，边缘不整齐，B断面淡棕色，近外皮2~5mm处有一棕黄色凸起的木质部环纹。质坚韧，可折断。熟狗脊片黑棕色，木质部环纹明显。


◎**性味功效** 苦、甘，温。归肝、肾经。祛风湿，补肝肾，强腰膝。

◎**用法用量** 煎服，10~15g。

### 验方精选

①烫伤、创伤或手术创口不愈所致的体部溃疡：用狗脊绒毛外敷，每日2~3次。②腰肌劳损，经常疼痛：狗脊、桑寄生各15g，杜仲、川续断各10g，怀牛膝25g，水煎服。

狗脊



主产于福建、广东、四川等地。秋末冬初采挖根茎，除去地上部分及柔毛，趁鲜切片晒干，称“生狗脊片”；沸水煮或蒸后晒至六七成干，再切片晒干称“熟狗脊片”。

# 大黄 Dahuang

《神农本草经》

蓼科植物掌叶大黄 *Rheum Palmatum* L.、唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf. 或药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的干燥根及根茎。

◎**原植物识别特征** 掌叶大黄：多年生草本，根及根茎肥厚。茎直立，中空。A基生叶具长柄，叶片掌状半裂，裂片3~7，每一裂片再羽裂或具粗齿；茎生叶较小，互生，具短柄；托叶鞘膜质。圆锥花序顶生；花小，紫红色或带红紫色；花被片6，2轮，长约1.5mm；雄蕊9；子房上位。B瘦果有3棱，沿棱生翅，长9~10mm，棕色。花期6~7月，果期7~8月。

◎**药材识别特征** 类圆柱形、圆锥形、卵圆形或块片状，长3~17cm，直径3~10cm。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色，可见类白色网状纹理，或有部分棕褐色栓皮残留。质坚实，断面淡红棕色或黄棕色，颗粒性。C横切面根茎髓部宽广，有星点环列或散在；根形成层环明显，木部发达，具放射状纹理，无星点。气清香，味苦微涩，嚼之黏牙，有砂粒感，唾液染成黄色。

◎**性味功效** 苦，寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经。

◎**用法用量** 煎服，5~15g；若作泻下攻积用，入汤剂应后下，或用开水泡服。外用适量。

## 验方精选


①鼻出血：大黄6g，黄芩、栀子、竹叶各9g，白茅根30g，水煎服。②胃肠积滞，大便不通：大黄9g，芒硝、甘草各6g，水煎服。

大

黄

大黃

主产于青海、甘肃。除去细根，刮去外皮，切瓣或段，绳穿成串干燥或直接干燥。9~10月茎叶枯黄时，或4~5月发芽前采挖，除去细根，刮去外皮，切瓣或段，悬挂屋檐下阴干、晒干或用暗火烟熏干。



## 虎杖 Huzhang

《名医别录》

蓼科植物虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根。

◎**原植物识别特征** 多年生草本，高1~2m。根茎粗大，木质化，黄色。茎直立中空，散生紫红色斑点，节明显，上有膜质托叶鞘。A单叶互生，卵状椭圆形至宽卵形，长6~12cm，宽5~9cm。花单性异株，B圆锥花序；花小，花被5，白色或淡绿色，外轮3片果期增大，背部生翅；雄蕊8，子房上位。瘦果卵状三棱形，长3~4mm，黑褐色。花期6~8月，果期9~10月。

◎**药材识别特征** 呈圆柱形小段或块片，表面棕褐色或棕红色，有纵皱纹及须根痕。根茎有节，节间长2~3cm。质坚韧，不易折断。C断面棕黄色，纤维性，皮部较薄，木部占大部分，射线呈放射状；根茎中央有髓或呈空洞状。气微，味微苦、涩。

◎**性味功效** 微苦，微寒。归肝、胆、肺经。利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛。

◎**用法用量** 煎服，9~15g。外用适量。

### 验方精选

①慢性支气管炎：虎杖30g，鱼腥草30g，功劳叶30g，水煎浓缩制成糖浆200ml，每次20ml，每日服两次。②阴道炎：虎杖60g，加水500ml，煎至300ml。待温冲洗阴道，后用苦参栓或野菊花栓。每日1次，7日为1疗程。