

精致中草药工具丛书

◎主审：马 骥 主编：刘传明 张宏伟

常用

中草药

识别应用图谱——按药用部位分类

详细的识别特征，真实的药物形态



广东省出版集团



广东科技出版社（全国优秀出版社）

常用中草药识别应用图谱

——按药用部位分类

主 审：马 骥

主 编：刘传明 张宏伟

副主编：陈兴兴 袁立霞

编 委：张 勤 张晓强 徐 起 熊文超 林漪清

摄 影：陈兴兴 马 骥 张宏伟 刘传明



图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药识别应用图谱: 按药用部位分类 / 刘传明, 张宏伟主编. —广州: 广东科技出版社, 2014. 3

(精致中草药工具丛书)

ISBN 978-7-5359-5831-0

I. ①常… II. ①刘…②张… III. ①中草药—图谱
IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第218174号

CHANGYONG ZHONGCAOYAO SHIBIE YINGYONG TUPU—AN YAOYONGBUWEI FENLEI

策 划: 李 鹏 冯常虎

责任编辑: 黎青青 李 莎 杜怡枫

封面设计: 柳国雄

责任校对: 梁小帆

责任印制: 吴华莲

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号 邮政编码: 510075)

http: //www. gdstp. com. cn

E-mail: gdkjyxb@gdstp.com.cn (营销中心)

E-mail: gdkjzbb@gdstp.com.cn (总编办)

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 东莞市翔盈印务有限公司

(广东省东莞市东城区莞龙路柏洲边路段 邮政编码: 523113)

规 格: 889mm×1 194mm 1/64 印张7.5 字数180千

版 次: 2014年3月第1版

2014年3月第1次印刷

定 价: 33元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

金银花 Jinyinhua

《本草纲目》

注明历史出处

忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花。主产于山东、河南。夏初花开放前采收，置通风处干燥。

◎**原植物识别特征** 半常绿木质藤本。老枝棕褐色，幼枝绿色，密被短柔毛。叶对生；卵形或长圆状卵形^a，长3~8cm，宽1.5~4cm，全缘。花成对腋生，萼筒短小，5裂；花冠长3~4cm，初开时白色，后逐渐变黄，唇形^b，上唇4浅裂，下唇不裂；雄蕊5；雌蕊1，子房下位。浆果球形，熟时黑色。花期5~7月，果期7~10月。

◎**药材识别特征** 花蕾小棒状，上粗下细，略弯曲，长2~3cm，直径约3mm。表面黄绿色或黄白色，密被茸毛^c。萼筒与下位子房结合，萼齿5裂，外面及先端有毛。开放者花冠筒状，先端二唇形，上唇4裂，下唇不裂。雄蕊5，生于筒壁上。

◎**性味归经** 甘，寒。归肺、心、胃经。

◎**功效** 清热解毒，疏散风热。

◎**用法用量** 煎服，6~15g。生品宜用于疏散风热、清泄里热；炒炭宜用于热毒血痢；露剂多用于暑热烦渴。

◎**附** 忍冬藤是忍冬的干燥藤茎。秋冬二季采割，晒干。味甘，性寒。归肺、胃经。清热解毒，疏风通络。

验方精选

- ①急、慢性咽喉炎：金银花、野菊花各15g，水煎服。
②麦粒肿：板蓝根20g，金银花、紫花地丁、大青叶、蒲公英各15g，水煎服。

1. 来源：拉丁学名等符合《中华人民共和国药典》（2010版一部）

2. 文字描述简洁，原植物与药材识别重点突出


3. 验方精选，用法简单，疗效确切

4. 重要鉴别特点在文中用彩色字、波浪线标出，且在图中标有对应字母，指示明确

5. 原植物或饮片图，图片清晰，细节特征突出

金银花





使用说明

1. 所有中草药来源符合《中华人民共和国药典》2010版，并引证其拉丁学名。考虑到临床应用情况，个别药物未作区分，如：“川黄柏”“关黄柏”均在“黄柏”项下；“北五味子”“南五味子”均在“五味子”项下。
2. 最早记载历史文献均注明，如：“连翘Lianqiao——《神农本草经》”；有争议或脉络不清者，暂不列。
3. 通常一味药的文字和图各占一页。同一植物基源的不同药用部位尽可能放在一起描述，以其中一味药为主，其他加“附”字标注，例如：“金沙藤”与“海金沙”；“桑叶”“桑白皮”与“桑枝”等。
4. 原植物描述力求文字简洁，重点突出。描述顺序依据植物分类学常规排序。
5. 【用法用量】及【药材识别特征】等项中信息丰富，如：“旋覆花外感暴咳宜生用，内伤久咳宜炙用”；商陆切面有多个凹凸不平的同心性环纹，俗称“罗盘纹”；天麻块茎顶端有红棕色干枯芽苞，习称“鹦哥嘴”等。
6. 根据读者基本需求，并限于篇幅，本书中凡多基源中药，仅描述其中一个主要基源的识别特征；凡具多方面功效的中药，仅说明其主要功效；采收加工项下不专述炮制方法。
7. 每药项下的【验方精选】尽可能选择药味较少，用法简单，疗效较好的1~3个。“水煎服”通常是指：每日1剂，煎2次，合并药液，分2次服。有毒的药通常不设【验方精选】，个别药物因原植物或药材识别特征内容较多也略去此项。

目 录

01

根及根茎类

狗脊	2	地榆	38
大黄	4	苦参	40
虎杖	6	葛根	42
何首乌	8	甘草	44
牛膝	10	黄芪	46
川牛膝	12	人参	48
商陆	14	三七	50
太子参	16	白芷	52
银柴胡	18	当归	54
附子	19	羌活	56
威灵仙	20	前胡	58
白头翁	22	川芎	60
白芍	24	藁本	62
赤芍	26	防风	63
黄连	28	柴胡	64
升麻	30	独活	66
乌药	32	北沙参	67
远志	33	龙胆	68
板蓝根	34	秦艽	70
延胡索	36	白薇	72
		丹参	74
		黄芩	76

玄参	78
生地黄	80
熟地黄	81
巴戟天	82
茜草	84
紫草	86
续断	87
桔梗	88
党参	90
南沙参	92
白术	94
苍术	96
木香	98
紫菀	99
三棱	100
香附	101
泽泻	102
白茅根	104
芦根	106
天南星	108
半夏	110
白附子	112
石菖蒲	113
川贝母	114
浙贝母	116
黄精	118

玉竹	120
天冬	122
麦冬	124
百合	126
知母	128
山药	130
射干	132
炮姜	134
莪术	136
郁金	138
姜黄	140
高良姜	142
天麻	144
白及	146

02

茎木类

桑寄生	148
桂枝	150
大血藤	152
鸡血藤	154
苏木	156
降香	158
沉香	160
通草	162
钩藤	164

03

皮类

桑白皮	166
牡丹皮	168
厚朴	170
肉桂	172
杜仲	174
合欢皮	175
黄柏	176
白鲜皮	178
秦皮	180
香加皮	182
地骨皮	184
苦楝皮	186

04

叶类

侧柏叶	188
枇杷叶	190
番泻叶	192
功劳叶	193
艾叶	194

05

花类

辛夷	196
----------	-----

玫瑰花	197
槐花	198
丁香	200
夏枯草	202
金银花	204
旋覆花	206
款冬花	208
红花	209
菊花	210
野菊花	212
西红花	214
蒲黄	215
玉米须	216

06

果实及种子类

白果	218
胡椒	220
火麻仁	222
地肤子	224
王不留行	225
莲子	226
芡实	228
五味子	230
八角茴香	232
肉豆蔻	234
白芥子	236
莱菔子	238

覆盆子	240
木瓜	242
山楂	244
苦杏仁	246
桃仁	248
郁李仁	250
金樱子	252
乌梅	254
沙苑子	255
决明子	256
补骨脂	258
赤小豆	259
白扁豆	260
陈皮	262
枳壳	264
佛手	266
吴茱萸	268
花椒	270
龙眼肉	272
荔枝核	274
川楝子	276
酸枣仁	277
大枣	278
胖大海	280
石榴皮	282
使君子	284
诃子	286
小茴香	288

蛇床子	290
山茱萸	292
连翘	294
女贞子	296
牵牛子	298
车前子	300
蔓荆子	302
枸杞子	304
木蝴蝶	306
梔子	308
瓜蒌	310
牛蒡子	312
苍耳子	314
薏苡仁	316
槟榔	318
砂仁	320
白豆蔻	322
草豆蔻	324
草果	326

07

全草类

石韦	328
麻黄	330
鱼腥草	332
细辛	334
马齿苋	335
瞿麦	336

仙鹤草	338
紫花地丁	340
广藿香	342
益母草	344
薄荷	346
紫苏叶	348
溪黄草	350
肉苁蓉	352
锁阳	354
穿心莲	356
白花蛇舌草	358
豨莶草	360
青蒿	362
佩兰	364
大蓟	366
蒲公英	368
鹅不食草	370
墨旱莲	371
茵陈	372
灯心草	373
淡竹叶	374
石斛	376
荆芥	378

08

菌、藻、地衣类

海藻	380
昆布	381

冬虫夏草	382
茯苓	384
猪苓	386
雷丸	387
灵芝	388

09

树脂类

苏合香	390
乳香	392
没药	393
血竭	394

10

其他类

海金沙	396
青黛	398
儿茶	399
冰片	400
五倍子	402
琥珀	403
芦荟	404
神曲	406
麦芽	407
淡豆豉	408

11

动物类

地龙	410
石决明	411
珍珠	412
牡蛎	413
海螵蛸	414
全蝎	415
蜈蚣	416
土鳖虫	417
桑螵蛸	418
蝉蜕	419
僵蚕	420
海马	421
海龙	422
龟甲	423
鳖甲	424
蛤蚧	425
金钱白花蛇	426
蕲蛇	427
乌梢蛇	428
阿胶	429
穿山甲	430
五灵脂	431

鹿茸 432

鸡内金 434

12

矿物类

朱砂	436
雄黄	437
自然铜	438
磁石	439
赭石	440
海浮石	441
炉甘石	442
青礞石	443
滑石	444
石膏	445
芒硝	446
白矾	447
赤石脂	448
硼砂	449
硫黄	450
龙骨	451

索引 452

常见植物形态术语图解
..... 457

根及根茎类

狗脊 Gouji

《神农本草经》

蚌壳蕨科植物金毛狗脊 *Cibotium barometz* (L.) J. Sm. 的干燥根茎。主产于福建、广东、四川等省区。秋末冬初采挖根茎，除去地上部分及柔毛，趁鲜切片晒干，称“生狗脊片”；沸水煮或蒸后晒至六七成干，再切片晒干称“熟狗脊片”。

◎**原植物识别特征** 多年生大型蕨类植物，高2~3m。根茎粗大，顶端连同叶柄基部密生金黄色长柔毛。叶丛生，叶柄粗壮，长约120cm；叶片革质，阔卵状三角形，长达2m，三回羽裂；羽片互生，末回裂片镰状披针形，长1~1.4cm，宽约3mm，边缘有浅锯齿。孢子囊群生于裂片侧脉顶端，每裂片有1~5对；囊群盖2瓣，成熟时张开如蚌壳^a。

◎**药材识别特征** 不规则块状，长8~30cm，直径2~10cm，外被金黄色长柔毛，顶端有棕红色叶柄残基，下部丛生多数棕黑色细根。质坚硬，难折断。气无，味微涩。

生狗脊片呈不规则长条形或圆形，厚1.5~5mm，边缘不整齐，断面淡棕色，近外皮2~5mm处有一棕黄色突起的木质部环纹^b。质坚脆，可折断。熟狗脊片黑棕色，木质部环纹明显。


◎**性味归经** 苦、甘，温。归肝、肾经。

◎**功效** 祛风湿，补肝肾，强腰膝。

◎**用法用量** 煎服，10~15g。

验方精选

①烫伤、创伤或手术创口不愈所致的体部溃疡：用狗脊茸毛外敷，每日2~3次。②腰肌劳损疼痛：狗脊、桑寄生各15g，杜仲、川续断各10g，怀牛膝25g，水煎服。



大黄 Dahuang

《神农本草经》

蓼科植物掌叶大黄 *Rheum palmatum* L.、唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf. 或药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的干燥根及根茎。主产于青海、甘肃。除去细根，刮去外皮，切瓣或段，绳穿成串干燥或直接干燥。9—10月茎叶枯黄时，或4—5月发芽前采挖，除去细根，刮去外皮，切瓣或段，悬挂于屋檐下阴干、晒干或用暗火烟熏干。

◎**原植物识别特征** 掌叶大黄：多年生草本，根及根茎肥厚。茎直立，中空。基生叶具长柄，叶片掌状半裂，裂片3~5（7），每一裂片再羽裂或具粗齿；茎生叶较小，互生，具短柄；托叶鞘膜质。圆锥花序顶生；花小，紫红色或带红紫色；花被片6，2轮，长约1.5mm；雄蕊9；子房上位。瘦果有3棱，沿棱生翅，长9~10mm，棕色。花期6—7月，果期7—8月。

◎**药材识别特征** 类圆柱形、圆锥形、卵圆形或块片状，长3~17cm，直径3~10cm。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色，可见类白色网状纹理，或有部分棕褐色栓皮残留。质坚实，断面淡红棕色或黄棕色，颗粒性。横切面根茎髓部宽广，有星点环列或散在^a；根形成层环明显，木部发达，具放射状纹理，无星点^b。气清香，味苦微涩，嚼之黏牙，有砂粒感，唾液染成黄色。

◎**性味归经** 苦，寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。

◎**功效** 泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经。

◎**用法用量** 煎服，5~15g；若作泻下攻积用，入汤剂应后下，或用开水泡服。外用适量。



唐古特大黄

虎杖 Huzhang

《名医别录》

蓼科植物虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根。主产于江苏、浙江、安徽、广东、广西、四川、云南等省区。春秋二季采挖，除去须根，洗净后切段或片，晒干。

◎**原植物识别特征** 多年生草本，高1~2m。根茎粗大，木质化，黄色。茎直立中空，散生紫红色斑点，节明显，上有膜质托叶鞘。单叶互生，卵状椭圆形至宽卵形^a，长6~12cm，宽5~9cm。花单性异株，圆锥花序；花小，花被5，白色或淡绿色，外轮3片果期增大，背部生翅；雄蕊8，子房上位。瘦果卵状三棱形，长3~4mm，黑褐色。花期6—8月，果期9—10月。

◎**药材识别特征** 圆柱形小段或块片，表面棕褐色或棕红色，有纵皱纹及须根痕。根茎有节，节间长2~3cm。质坚韧，不易折断。断面棕黄色，纤维性，皮部较薄，木部占大部分，射线呈放射状^b；根茎中央有髓或呈空洞状。气微，味微苦、涩。

◎**性味归经** 微苦，微寒。归肝、胆、肺经。

◎**功效** 利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛。

◎**用法用量** 煎服，9~15g。外用适量。

验方精选

①慢性支气管炎：虎杖30g，鱼腥草30g，功劳叶30g，水煎浓缩制成糖浆200mL，每次20mL，每日2次。②阴道炎：虎杖60g，加水500mL，煎至300mL。待温冲洗阴道，后纳入苦参栓或野菊花栓。每日1次，7日为1个疗程。