



主治医师晋升宝典

妇产科主治医师 资格考试**通关必做**

精选真题 · 把脉命题方向
精编题库 · 囊括全部考点
精心解析 · 引导答题技巧

主编 许兰芬

中国医药科技出版社

主治医师晋升宝典



妇产科主治医师资格考试通关必做

主编 许兰芬

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为《主治医师晋升宝典》之一,是由有丰富教学和考前辅导经验的专家教授在深入分析了妇产科主治医师资格考试的考纲考点、细致研究了历年真题的命题规律基础上精心编写而成。书中根据大纲所要求的考点,精选试题 5000 余道,题量丰富,题型全面,题目仿真性强,并对难题和易错题做了详细解析,有助于考生快速掌握重要考点内容,在短期内高效复习、一举过关,是参加全国卫生专业技术资格考试妇产科中级考试读者的首选参考书。

图书在版编目(CIP)数据

妇产科主治医师资格考试通关必做/许兰芬主编. —北京:中国医药科技出版社, 2014. 9

(主治医师晋升宝典)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6991 - 4

I. ①妇… II. ①许… III. ①妇产科学 - 医师 - 资格考试 - 自学参考资料
IV. ①R71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 199109 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 889 × 1194mm ¹/₁₆

印张 25 ³/₄

字数 814 千字

版次 2014 年 9 月第 1 版

印次 2014 年 9 月第 1 次印刷

印刷 三河市汇鑫印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6991 - 4

定价 49.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

本书编委会

主 编 许兰芬

副主编 白秀萍

编 委	黄 丽	陈 俊	付 涛	侯 荣
	计 莉	蒋太春	李国静	梁 琼
	廖发金	刘 波	刘 颖	孔志坚
	刘作华	龙永强	鲁 冰	罗小娟
	马建国	聂 勇	彭景云	任 蓉
	王 莉	张 敬	张静静	赵慧慧
	付丽珠	刘葆陞	周 翠	刘 凯
	许兰芬	白秀萍		

编写说明

主治医师是临床医师的中级职称，是通过参加全国卫生专业技术资格（中级）考试才能取得的任职资格。该考试于每年5月下旬举行。其考试科目包括：基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力，共四个科目。各科目以100为满分计算，每科目成绩达到60分为合格。考试成绩实行2年为周期的滚动管理，即所有4个科目在2年内全部合格者可申请该级别的专业技术资格，成为主治医师。

为了帮助忙碌的临床医生顺利通过卫生专业技术资格（中级）考试，我们组织了有丰富教学和考前辅导经验的专家教授，在深入分析了各科主治医师资格考试的考纲考点、细致研究了历年真题命题规律的基础上，历时1年编写了这套《主治医师晋升宝典》丛书。

本丛书包括“考点速记”和“通关必做”2个系列，具体分册有：

1. 内科主治医师资格考试考点速记
2. 外科主治医师资格考试考点速记
3. 妇科主治医师资格考试考点速记
4. 儿科主治医师资格考试考点速记
5. 全科主治医师资格考试考点速记
6. 内科主治医师资格考试通关必做
7. 外科主治医师资格考试通关必做
8. 妇科主治医师资格考试通关必做
9. 儿科主治医师资格考试通关必做
10. 全科主治医师资格考试通关必做

“**考点速记**”系列，每个分册的章节结构由两部分组成：

过关必读——核心考点纵览：按照章节，依据考纲要求，采用“图表为主，文字表述为辅”的形式，梳理归纳知识要点；其间穿插【要点提示】，直击考试重点、难点及易混淆知识点，帮助读者在短期内快速掌握中级职称考试的重要考点内容。

过关必记——高频考点速记：分析整理历年考题，把常考点进行了提炼、摘要，便于读者发现命题规律和记忆高频考点。

“**通关必做**”系列，每个分册根据大纲所要求的考点，按学科分章节编排题目，题量丰富，题型全面，题目仿真性强。真题做导航，把脉复习方向；题库为后盾，囊括全部考点；解析是精髓，引导答题技巧。有助于读者熟悉考试题型，提前感受考试的氛围，方便自测，提高解题和应试能力。

如将两系列图书配套使用，定会使您的复习备考取得事半功倍的效果，在短期内高效复习、一举过关。

为不断提高图书品质，更好地为大家服务，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将在今后的工作中不断修订完善。反馈信息请发送至邮箱：kszx405@163.com。在此谨致谢意！

相信本丛书定会为您的职称考试提供强大助力，伴您职场一帆风顺！

编者
2014年8月

目 录

第一章 女性生殖系统解剖	1	第十六章 女性生殖系统炎症	232
第二章 女性生殖系统生理	17	第十七章 女性生殖道肿瘤	253
第三章 妊娠生理	33	第十八章 妊娠滋养细胞疾病	300
第四章 妊娠诊断	46	第十九章 生殖内分泌疾病	312
第五章 孕期监护及保健	53	第二十章 子宫内膜异位症和子宫腺肌病	332
第六章 正常分娩	63	第二十一章 女性生殖器官发育异常	341
第七章 正常产褥	80	第二十二章 女性生殖器官损伤性疾病	344
第八章 病理妊娠	85	第二十三章 性及女性性功能障碍	353
第九章 妊娠合并症	134	第二十四章 不孕症	354
第十章 妊娠合并性传播疾病	164	第二十五章 计划生育	364
第十一章 异常分娩	172	第二十六章 妇女保健	379
第十二章 分娩期并发症	200	第二十七章 医疗机构从业人员行为规范与医学 伦理学	382
第十三章 异常产褥	215	第二十八章 专业实践能力（案例分析题）	388
第十四章 妇科病史及检查	220		
第十五章 外阴上皮内非瘤样病变	227		

第一章 女性生殖系统解剖

【A1/A2 型题】

- 左侧卵巢静脉一般汇入
 - 髂总静脉
 - 髂内静脉
 - 髂外静脉
 - 肾静脉
 - 腹主静脉
- 关于子宫的描述, 正确的是
 - 成年女子的子宫长约 7~8cm, 宽约 4~5cm, 厚约 4~5cm
 - 宫体与宫颈之间最狭窄的部分为子宫峡部
 - 幼年时宫体和宫颈的比例是 2:1
 - 子宫峡部上端是组织学内口
 - 子宫峡部下端为解剖学内口
- 下列对于外阴的解剖, 哪项不恰当
 - 大阴唇外侧面与皮肤相同, 内侧面皮肤湿润似黏膜
 - 阴阜即为耻骨联合前面隆起的脂肪垫
 - 大阴唇有很厚的皮下脂肪层, 局部外伤时不易发生血肿
 - 阴蒂与男性阴茎海绵体相似, 富含神经, 有勃起性
 - 阴道前庭为两侧小阴唇之间的菱形区
- 下列对于女性生殖器官的血管供应哪项不恰当
 - 子宫动脉于阴道上宫颈部分为上下两支
 - 子宫动脉为髂内动脉前干的分支
 - 卵巢动脉来自髂总动脉 (左侧可来自肾动脉)
 - 阴道下段主要由阴部内动脉和痔动脉供应
 - 盆腔静脉丛互相吻合, 感染易于蔓延
- 对于女性骨盆的描述, 下列哪项正确
 - 骨盆是由髌骨、骶骨和尾骨组成
 - 女性骨盆入口呈长椭圆形, 约占妇女的半数
 - 扁平骨盆入口前后径短, 约占妇女的 1/4
 - 真骨盆位于骨盆分界线之上
 - 妊娠期骨盆的韧带受激素影响而较坚韧
- 对于女性生殖系统血管, 哪项不正确
 - 卵巢动脉来自腹主动脉分支
 - 子宫动脉为髂内动脉前干分支
 - 阴道动脉由子宫动脉供应
 - 左卵巢动脉可来自左肾动脉
 - 阴部内动脉为髂内动脉前干的终支
- 对于内生殖器与邻近器官, 以下哪项错误
 - 尿道长 4cm, 位于阴道前面
 - 膀胱充盈可影响子宫及阴道
 - 输卵管在宫颈旁 2cm 处与子宫动脉交叉
 - 子宫直肠陷凹是腹膜腔最低点
 - 患阑尾炎时不可能累及子宫附件
- 下面哪项不是正常性别分化的内容
 - 性腺分化
 - 性别决定
 - Y 染色体存在
 - 内生殖器发育
 - 外生殖器发育
- 对于女性外生殖器淋巴引流哪项是正确的
 - 阴道下段淋巴汇入腹股沟深淋巴结
 - 阴蒂周围淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
 - 阴道上段和宫颈淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
 - 子宫体两侧沿圆韧带汇入腹股沟深淋巴结
 - 子宫体、子宫底、输卵管和卵巢淋巴均汇入腰淋巴结
- 下面哪条血管不属于阴部内动脉的分支
 - 阴唇动脉
 - 痔中动脉
 - 痔下动脉
 - 阴蒂动脉
 - 会阴动脉
- 对于坐骨棘间径哪项是正确的
 - 9.8cm
 - 9.6cm
 - 10cm
 - ≤10cm
 - ≥10cm
- 对于先天性无阴道, 下列哪项正确
 - 多合并卵巢缺失
 - 为双侧中肾管发育异常造成
 - 诊断后应及时手术
 - 子宫发育多为正常
 - 可合并泌尿系统畸形, 应行相应的检查
- 女性内生殖器的始基是
 - 副中肾
 - 尿生殖嵴
 - Wolffian 管
 - 副肾管
 - 尿生殖窦



14. 对于阴道的解剖哪项错误
- 阴道前穹窿两侧与输尿管密切临近
 - 阴道黏膜富有静脉丛和分泌黏液的腺体
 - 阴道后穹窿顶端为腹腔的最低部分
 - 绝经后阴道内 pH 上升
 - 阴道上皮受激素影响, 有周期性变化
15. 对于生殖血管, 哪项错误
- 卵巢动脉经骨盆漏斗韧带向内横行, 再经输卵管系膜进入卵巢门
 - 子宫动脉为髂内动脉前干的分支
 - 阴道动脉为髂内动脉前干的终支, 分布于阴道上下段
 - 阴部内动脉为髂内动脉前干的终支, 分布于会阴及肛门
 - 会阴、阴唇及阴蒂动脉均为阴部内动脉的分支
16. 对于子宫哪项错误
- 子宫肌壁外层纵向、内层环形, 中层各方交织
 - 非孕时, 子宫肌壁厚约 0.8cm
 - 为空腔器官, 腔内覆有黏膜
 - 子宫内膜表面 1/3 受卵巢激素的影响发生周期性变化
 - 子宫浆膜层即为与肌层紧贴的腹膜
17. 对于女性生殖器淋巴, 哪项错误
- 子宫体及底部淋巴输入腰淋巴结
 - 髂淋巴结又分为髂总、髂前、髂后 3 部分
 - 内生殖器淋巴分为两组, 髂淋巴结和腰淋巴结
 - 腹股沟浅淋巴结主要收受外生殖器部位的淋巴结
 - 腹股沟深淋巴结主要收受腹股沟浅淋巴结
18. 对于会阴, 以下哪项是错误的
- 会阴两侧为耻骨降支、坐骨支、坐骨结节和骶结节韧带
 - 会阴前为耻骨联合下缘, 后为尾骨尖
 - 会阴外层为皮肤及皮下脂肪
 - 内层为会阴中心腱
 - 狭义的会阴是指阴道口至肛门之间的软组织, 又称会阴体
19. 对于骨盆的分界, 以下说法哪种正确
- 假骨盆的径线长短与真骨盆的大小无关
 - 假骨盆的前壁是耻骨联合上缘、两侧是髂骨、其后是第 5 腰椎
 - 真假骨盆的分界线为耻骨联合上缘、髂耻线及骶岬下缘的连线
 - 真骨盆的入口与出口之间为骨盆腔
 - 骨盆腔的后壁是骶骨、侧壁是坐骨、前壁是耻骨联合
20. 骨盆的形态、大小和发育与哪项因素无关
- 营养
 - 遗传
 - 种族
 - 外伤
 - 性激素
21. 支持盆底最主要的组织是
- 泌尿生殖膈
 - 肛提肌及其筋膜
 - 会阴中心腱
 - 会阴深横肌
 - 会阴体
22. 对于阴蒂哪项正确
- 位于两侧大阴唇前端的汇合处
 - 位于阴阜下方
 - 无勃起性
 - 分头体两部分
 - 阴蒂头富于神经末梢, 极为敏感
23. 对于骶骨弯曲的长度哪项是正确的
- 10.6cm
 - 10.4cm
 - 10.8cm
 - 11.4cm
 - 11.8cm
24. 女性, 孕 5 个月发现残角子宫妊娠活胎, 有生育要求, 以下处理哪项最恰当
- 立即手术, 剖宫取胎, 同时行残角子宫切除术
 - 立即手术, 剖宫取胎
 - 期待足月后剖腹产
 - 立即手术, 剖宫取胎, 同时行残角子宫切除术 + 患侧输卵管切除术
 - 立即手术, 剖宫取胎, 同时行残角子宫切除术 + 患侧输卵管切除术 + 对侧输卵管绝育术
25. 对于女性外生殖器解剖哪项正确
- 阴蒂相当于男子的球海绵体
 - 大阴唇外侧面与皮肤相同, 内侧面似黏膜, 富有皮脂腺和汗腺
 - 阴阜为耻骨前面的脂肪垫, 长有阴毛, 呈尖端向上的三角形
 - 前庭大腺开口于小阴唇与处女膜间的沟内
 - 尿道旁腺位于尿道口两侧, 常为细菌潜伏所在
26. 对于女性输尿管下列哪项是正确的
- 长 25cm, 内径最细为 3~4mm, 最粗为 7~8mm
 - 长 20cm, 内径最细为 3~4mm, 最粗为 7~8mm
 - 长 30cm, 内径最细为 3~1mm, 最粗为 7~8mm
 - 长 35cm, 内径最细为 3~4mm, 最粗为 7~8mm
 - 长 40cm, 内径最细为 3~4mm, 最粗为 7~8mm
27. 生殖器官与邻近器官的关系, 哪项错误
- 输尿管于宫颈内口水平外侧 2cm 向前进入膀胱
 - 阴道前穹窿穿刺易引起膀胱损伤

- C. 膀胱充盈影响盆腔检查
D. 阑尾炎症可波及右附件
E. 尿道长6cm, 临近阴道与肛门, 易感染
28. 对于子宫峡部哪项错误
A. 其上端是解剖学内口, 下端是组织学内口
B. 是宫体与宫颈之间最狭窄的部分
C. 黏膜与宫颈黏膜相同
D. 在晚期妊娠时形成子宫下段, 可达7~10cm长
E. 其内膜可随月经周期而有周期性变化
29. 对于女性尿道的长度哪项是正确的
A. 3~4cm B. 2~3cm
C. 4~5cm D. 5~6cm
E. 6~7cm
30. 生产时会阴侧切切断的肌肉哪项除外
A. 部分会阴深横肌 B. 坐骨海绵体肌
C. 会阴浅横肌 D. 球海绵体肌
E. 部分肛提肌
31. 对于骨盆底的叙述, 下列哪项正确
A. 肛门外括约肌属盆膈范畴
B. 中层为泌尿生殖膈
C. 外层为盆膈
D. 球海绵体肌有松弛阴道作用
E. 肛提肌是组成骨盆底的小肌肉
32. 对于性别决定, 下列描述哪项不正确
A. 原始性腺具有分化为卵巢或睾丸的双向潜能
B. 合子染色体为46, XX, 原始性腺发育为卵巢, 合子染色体为46, XY, 原始性腺发育为睾丸
C. 性别是由合子所含的染色体决定的
D. Y染色体的长臂上存在睾丸决定基因, 是性别决定的重要基因
E. 无睾丸决定基因存在, 原始性腺自然发育为卵巢
33. 成年女子子宫颈管的长度应为
A. 2.0~2.5cm B. 1.0~2.0cm
C. 2.5~3.0cm D. 2.5~3.5cm
E. 3.0~3.5cm
34. 对于成人妇女子宫的叙述, 下列哪项正确
A. 子宫腔容量约10ml B. 重约100g
C. 长度约为7~8cm D. 宫体: 宫颈=1:2
E. 子宫上部较子宫下部稍突
35. 对于输卵管哪项正确
A. 与圆韧带临近
B. 是精子游走的通道
C. 包括间质部、峡部、壶腹部和伞端
D. 黏膜层有三种细胞
E. 黏膜无周期性变化
36. 对于先天无阴道无子宫, 下列处理哪项不正确
A. 必要时检查染色体核型
B. 应检查骨骼、心血管系统有无异常
C. 常规行泌尿系统检查
D. 诊断后应立即手术
E. 手术后应使用模具扩充阴道, 防止缩窄
37. 下列哪项不是女性中肾管的遗迹
A. 泡状附件 B. 阴道 Gartner 囊肿
C. 卵巢冠囊肿 D. 卵巢单纯囊肿
E. 卵巢旁体
38. 盆底外层包括, 哪项除外
A. 坐骨海绵体肌 B. 球海绵体肌
C. 会阴深横肌 D. 会阴浅横肌
E. 肛门外括约肌
39. 对于耻骨联合的全长哪项是正确的
A. 4.4cm B. 4.2cm
C. 4.0cm D. 4.6cm
E. 3.5cm
40. 对于幼稚子宫, 下列描述不正确的是
A. 月经极少 B. 子宫小于正常
C. 原发不孕 D. 可给予人工周期治疗
E. 多合并无阴道
41. 对于子宫峡部哪项是错误的
A. 峡部上端是解剖学内口
B. 峡部下端是组织学内口
C. 峡部下端是解剖学内口
D. 子宫体和子宫颈之间最狭窄部
E. 子宫峡部于妊娠晚期伸展为子宫下段
42. 对于子宫内膜哪项是正确的
A. 表面1/3为功能层, 下2/3为基底层
B. 子宫内膜基底层有周期性变化
C. 月经期子宫内膜全层脱落
D. 表面2/3为功能层, 下1/3为基底层
E. 表面1/2为功能层, 下1/2为基底层
43. 对于骨盆出口平面, 哪项不对
A. 骶尾关节至耻骨联合下缘之间的距离约为11.5cm
B. 呈菱形
C. 出口横径是坐骨结节间的距离, 平均约为9cm
D. 前矢状径约为6cm
E. 出口横径与后矢状径之和>15cm时, 中等大小的胎儿可经阴道分娩
44. 对于前庭大腺下列哪项是错误的



- A. 腺管长约 1~2cm, 开口于小阴唇与处女膜之间的沟内
B. 左右各一, 如黄豆大小
C. 位于大阴唇的后方, 被球海绵体肌覆盖
D. 正常情况下可以触及此腺体
E. 性兴奋时可以分泌黏液起润滑作用
45. 对于卵巢的解剖哪项错误
A. 卵巢表面由单层立方上皮覆盖
B. 卵巢表面无腹膜
C. 卵巢髓质内含有数以万计的始基卵泡
D. 卵巢髓质内含有少量平滑肌纤维
E. 阔韧带外 1/3 部向外侧达骨盆壁称卵巢悬韧带
46. 对于前庭大腺哪项正确
A. 一般检查时可触及到 B. 又称那氏腺
C. 开口于阴道口两侧 D. 与性生活无关
E. 感染后腺管口阻塞, 可形成脓肿或囊肿
47. 子宫全切术时不需要切除哪个韧带
A. 主韧带 B. 子宫骶骨韧带
C. 子宫圆韧带 D. 骨盆漏斗韧带
E. 卵巢固有韧带
48. 子宫骶骨韧带的前端是在
A. 宫颈上侧方 B. 宫颈后面侧方
C. 子宫后面侧方 D. 宫颈后面上侧方
E. 子宫颈两侧
49. 对于大骨盆的界限哪项是错误的
A. 前壁为下腹壁 B. 大骨盆即为假骨盆
C. 两侧为髂骨翼 D. 后壁为第 5 腰椎
E. 假骨盆与产道有直接联系
50. 对于女性骨盆哪项是错误的
A. 髂骨翼宽而浅
B. 骨盆入口为椭圆
C. 骨盆入口口横径大于入口前后径
D. 耻骨弓较宽
E. 双侧坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$
51. 对于骨盆的组成, 哪项是正确的
A. 骶骨由 5~6 块骶椎组成
B. 骨盆由骶骨、尾骨和左右髋骨组成
C. 骨盆由骶骨、耻骨和左右髋骨组成
D. 髋骨由髂骨和坐骨组成
E. 骨盆由骶骨、尾骨和坐骨组成
52. 最少见的女性骨盆是
A. 扁平型骨盆 B. 男型骨盆
C. 女型骨盆 D. 类人猿型骨盆
E. 混合型骨盆
53. 对于阴道的叙述, 下列哪项正确
A. 平时阴道前后壁互相贴近
B. 阴道下端比上端宽
C. 上端包绕子宫颈, 下端开口于前庭的前部
D. 黏膜覆以单层柱状上皮
E. 阴道有腺体
54. 宫颈癌淋巴结转移的二级组不包括哪组淋巴结
A. 髂总淋巴结 B. 腹主动脉旁淋巴结
C. 腹股沟深淋巴结 D. 腹股沟浅淋巴结
E. 闭孔淋巴结
55. 对于女性生殖器淋巴的叙述, 下列哪项正确
A. 阴道下 1/3 段淋巴注入闭孔淋巴结
B. 外阴淋巴大部分注入腹股沟深淋巴结
C. 腹股沟深、浅淋巴结均汇入髂淋巴组
D. 宫颈两侧淋巴沿圆韧带进入腹股沟淋巴结
E. 内生殖器淋巴分为髂淋巴组、腰淋巴组和闭孔淋巴组
56. 对于子宫峡部的叙述, 下列哪项正确
A. 上端为组织学内口 B. 为子宫颈的一部分
C. 非孕时长度为 1cm D. 妊娠期变软不明显
E. 临产后形成子宫下段, 与脐平
57. 宫颈癌淋巴结转移的一级组不包括哪组淋巴结
A. 髂内淋巴结 B. 闭孔淋巴结
C. 髂外淋巴结 D. 宫旁淋巴结
E. 髂总淋巴结
58. 对于骨盆底部的解剖错误的是哪项
A. 两侧为耻骨降支、坐骨升支和坐骨结节
B. 后方为骶尾关节
C. 前方为耻骨联合下缘
D. 前部为尿生殖三角
E. 后部为肛门三角
59. 女性内、外生殖器的血液供应来源于
A. 卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉和髂外动脉
B. 卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉和阴部内动脉
C. 卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉和外阴动脉
D. 卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉和腹壁下动脉
E. 卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉和主动脉
60. 未生育过的成年妇女, 其子宫大小、子宫腔容积分别为
A. $8\text{cm} \times 6\text{cm} \times 4\text{cm}$, 10ml
B. $7\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$, 10ml
C. $7\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$, 5ml
D. $10\text{cm} \times 8\text{cm} \times 6\text{cm}$, 5ml
E. $5\text{cm} \times 3\text{cm} \times 2\text{cm}$, 3ml

61. 维持子宫于正常位置, 主要依靠
A. 盆底组织支托
B. 子宫韧带
C. 子宫韧带及盆底组织支托
D. 腹肌收缩力和膈肌收缩力
E. 膀胱、直肠支托
62. 阴道形态学特征正确的是
A. 阴道下端比阴道上端宽
B. 平时阴道前后壁互相贴近
C. 阴道下端开口于阴道前庭前部
D. 黏膜覆以单层柱状上皮
E. 阴道有腺体
63. 成年妇女子宫形态学特征正确的是
A. 重约 100g
B. 宫腔容量 20ml
C. 长度 7~8cm
D. 宫体: 宫颈 = 1:2
E. 子宫上部较子宫下部稍窄
64. 女性内生殖器淋巴回流错误的是
A. 输卵管淋巴汇入腰淋巴结
B. 阴道下段淋巴汇入腹股沟淋巴结
C. 阴道上段淋巴大部汇入闭孔淋巴结及髂内淋巴结
D. 宫颈淋巴汇入腹股沟深淋巴结
E. 宫体两侧淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
65. 子宫峡部的下界为
A. 组织学内口
B. 组织学外口
C. 解剖学内口
D. 解剖学外口
E. 以上都不是
66. 女性外生殖器形态学特征错误的是
A. 阴阜即耻骨联合前方的皮肤隆起
B. 大阴唇为一对纵长隆起的皮肤皱襞
C. 两大阴唇之间的菱形区为阴道前庭
D. 阴蒂位于两侧小阴唇顶端的联合处
E. 前庭大腺位于大阴唇后部
67. 维持子宫在正常位置, 主要依靠
A. 卵巢固有韧带
B. 盆底组织支托
C. 子宫韧带及盆底肌及筋膜
D. 腹肌收缩力和膈肌收缩力
E. 膀胱、直肠支托
68. 卵巢形态学特征正确的是
A. 成年妇女卵巢重约 10g
B. 卵巢表面无腹膜
C. 卵巢白膜是一层平滑肌组织
D. 髓质内含数以万计的始基卵泡
E. 皮质内不含卵泡
69. 对于输卵管正确的是
A. 位于阔韧带上缘内
B. 全长 15~18cm
C. 输卵管分为 3 部分
D. 峡部在壶腹部的外侧
E. 峡部管腔最窄
70. 女性骨盆临床最多见的是
A. 女型骨盆
B. 男型骨盆
C. 扁平型骨盆
D. 类人猿型骨盆
E. 混合型骨盆
71. 下面哪项不是女性生殖器官的邻近器官
A. 尿道
B. 膀胱
C. 输尿管
D. 直肠
E. 肾脏
72. 对于阴道的描述哪项错误
A. 阴道由黏膜、肌层和纤维层构成
B. 上端包绕宫颈、下端开口于阴道前庭后部
C. 环绕宫颈周围的部分称阴道穹窿
D. 阴道上端比下端宽、前壁比后壁长
E. 阴道黏膜由复层鳞状上皮细胞覆盖无腺体
73. 关于卵巢, 下列哪项是正确的
A. 是一对扁椭圆形的性腺, 产卵子和性激素
B. 卵巢表面由腹膜覆盖
C. 卵巢白膜是一层平滑肌组织
D. 髓质内含数以万计的始基卵泡
E. 皮质内无卵泡
74. 有关骨盆最小平面的描述, 哪项是错误的
A. 骨盆最小平面是中骨盆平面
B. 骨盆最小平面是呈后径长的椭圆形
C. 骨盆最小平面前方是耻骨联合下缘
D. 骨盆最小平面两侧为坐骨棘
E. 骨盆最小平面后方为尾骨
75. 关于生殖器解剖, 下列哪项是错误的
A. 阴道黏膜由复层鳞状上皮所覆盖, 无腺体
B. 子宫颈阴道部亦为鳞状上皮所覆盖
C. 宫颈管黏膜为高柱状上皮所覆盖, 有腺体
D. 宫颈口鳞状上皮与柱状上皮交界处为宫颈癌多发部位
E. 子宫峡部黏膜与宫颈黏膜相同
76. 子宫最狭窄的部分是
A. 组织学内口
B. 子宫峡部
C. 解剖学内口
D. 子宫颈管
E. 子宫体外口
77. 由子宫颈到骨盆侧壁的韧带是
A. 子宫骶骨韧带
B. 卵巢固有韧带
C. 骨盆漏斗韧带
D. 圆韧带



- E. 主韧带
78. 维持子宫正常位置是
- A. 盆底肌肉及筋膜的支托作用
B. 膀胱和直肠的支托
C. 子宫四对韧带的作用
D. 子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托
E. 腹腔压力作用
79. 左侧卵巢动脉不同于右侧卵巢动脉, 还可以来自
- A. 肾动脉
B. 髂内动脉
C. 腹主动脉
D. 髂外动脉
E. 以上都不是
80. 骨盆底的组成, 下列哪项不正确
- A. 骨盆底外层包括肛门外括约肌
B. 盆隔由肛提肌及其筋膜组成, 是支托盆内脏器的最主要成分
C. 尿生殖膈由两层筋膜及一对会阴深横肌组成
D. 骨盆底分内、中、外三层, 中层又称尿生殖膈
E. 会阴体不属盆底组成部分
81. 输卵管的组织解剖及生理作用是
- A. 长 6~8cm
B. 峡部为输卵管腔最狭窄部
C. 内膜为复层柱状上皮
D. 伞部有“拾卵”作用
E. 输卵管黏膜不受性激素影响
82. 关于子宫的解剖, 下述哪项正确
- A. 成年人子宫体与子宫颈的比例为 1:2
B. 成年的子宫长 7~8cm, 宽 4~5cm, 厚 2~3cm
C. 子宫峡部的黏膜无周期性变化
D. 子宫颈主要由平滑肌构成
E. 成年妇女子宫颈管长 4~5cm
83. 子宫动脉来自
- A. 髂外动脉
B. 腹主动脉
C. 腹下动脉
D. 腹上动脉
E. 肾动脉
84. 女, 35 岁。G1P0, 孕 39⁺₆ 周, 上午 6 时起宫缩 32~37 秒/4~5 分钟, 强度 (++)~(+++), 胎心率 140 次/分, LOA, 上午 8 时入院, 入院时肛查: 宫口开 1cm, 先露 S-1, 于下午 8 时, 宫缩 20~25 秒/7~8 分, 强度 (++)~(+++), 宫口开大 8cm, 胎心率 155 次/分, 阴道检查: 坐骨切迹, 切迹 < 2 指, 骶凹平坦, 坐骨结节间径 7.5cm。可能的诊断是
- A. 出口狭窄
B. 骨盆入口狭窄
C. 骨盆入口和出口狭窄
D. 高龄初产
E. 中骨盆和出口狭窄
85. 维持子宫前倾位置的主要韧带是
- A. 阔韧带
B. 卵巢固有韧带
C. 子宫圆韧带
D. 主韧带
E. 子宫骶骨韧带
86. 髂内动脉前干分支不直接供血的是
- A. 子宫
B. 卵巢
C. 阴道
D. 膀胱
E. 输尿管
87. 骨盆对角径的正常值是
- A. 12cm
B. 10cm
C. 11cm
D. 9cm
E. 13cm
88. 后矢状径是
- A. 10cm
B. 9cm
C. 11cm
D. 12cm
E. 13cm
89. 女, 35 岁。因月经过多且经期延长, 贫血, 血红蛋白仅 56g/L, 而决定行全子宫切除术。术前主刀医师在考虑手术各步注意事项时, 下列哪项可不必顾虑
- A. 切断圆韧带时, 避免损伤输尿管
B. 推离直肠子宫腹膜反折时, 避免损伤直肠
C. 切断子宫骶骨韧带时, 避免损伤输尿管
D. 推离膀胱腹膜反折时, 避免损伤膀胱
E. 切除子宫动脉时, 注意勿损伤输尿管
90. 子宫峡部是
- A. 子宫颈与子宫体之间最狭窄部分
B. 子宫颈阴道上部
C. 子宫颈管最狭窄部分
D. 子宫颈阴道部
E. 子宫体最狭窄部分
91. 坐骨棘间径平均是
- A. 9cm
B. 11cm
C. 10cm
D. 12cm
E. 13cm
92. 做全子宫及单侧附件切除术时, 切断下列哪项最不易损伤输尿管
- A. 骨盆漏斗韧带
B. 子宫骶骨韧带
C. 卵巢固有韧带
D. 子宫动脉
E. 主韧带
93. 关于输卵管各部, 正确的是
- A. 间质部外侧的为壶腹部
B. 通入子宫壁内的为间质部
C. 峡部比间质部的管腔窄
D. 漏斗部 (伞部) 为输卵管宽大部分

- E. 以上都不是
94. 右卵巢动脉是从哪条动脉分支来的
A. 腹主动脉 B. 髂外动脉
C. 肾动脉 D. 髂内动脉
E. 髂总动脉
95. 骨盆出口横径指哪项
A. 坐骨结节中段外侧缘之间的距离
B. 坐骨结节后端外侧缘之间的距离
C. 坐骨结节前端内侧缘之间的距离
D. 坐骨结节后端内侧缘之间的距离
E. 坐骨结节前端外侧缘之间的距离
96. 下列哪项为骨盆测量的正常值
A. 耻骨弓角度 90° B. 坐骨棘间径 9cm
C. 坐骨切迹 <2 指 D. 对角径 10 ~ 11cm
E. 骨盆倾斜度 80°
97. 作子宫切除时, 下列注意事项哪项是错误的
A. 切除阔韧带时, 避免损伤膀胱
B. 推离直肠子宫腹膜反折时, 避免损伤直肠
C. 切除子宫骶骨韧带时, 避免损伤输尿管
D. 推离膀胱腹膜反折时, 避免损伤膀胱
E. 切断子宫动脉时, 注意勿损伤输尿管
98. 关于子宫颈的解剖学, 下列哪项不正确
A. 子宫颈分为阴道上部和阴道部
B. 宫颈峡部下端是组织学内口
C. 宫颈黏膜上皮有分泌腺液功能
D. 宫颈管黏膜上皮在组织学内口处由柱状上皮变为鳞状上皮
E. 青春期宫颈宫体之比为 1:2
99. 关于子宫, 正确的是
A. 成年的子宫长 7 ~ 8cm, 宽 4 ~ 5cm, 厚 4 ~ 5cm
B. 子宫体与子宫颈的比例, 成年人为 1:2
C. 子宫峡部的上端是组织学内口
D. 子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分为子宫峡部
E. 已产妇的子宫颈外口是圆形
100. 对于成人子宫, 下列哪项不正确
A. 重约 50g
B. 宫腔容量约 5ml
C. 子宫呈前后略扁的倒置梨形
D. 长度 6 ~ 7cm
E. 子宫下段较上部稍窄
101. 骶骨包括
A. 4 ~ 5 块骶椎 B. 3 ~ 4 块骶椎
C. 5 ~ 6 块骶椎 D. 6 ~ 7 块骶椎
E. 3 ~ 5 块骶椎
102. 髌骨是由
A. 坐骨与耻骨融合而成
B. 髌骨与耻骨融合而成
C. 髌骨与坐骨融合而成
D. 髌骨、坐骨与耻骨融合而成
E. 髌骨与骶骨融合而成
103. 子宫动脉下支供应
A. 阴道 B. 宫颈与阴道上段
C. 宫颈与阴道 D. 宫体、宫颈与阴道上段
E. 子宫峡部、宫颈与阴道
104. 子宫动脉上支又分为
A. 宫体支、宫颈支与阴道支
B. 宫底支、宫体支与宫颈支
C. 宫底支、卵巢支与输卵管支
D. 卵巢支与输卵管支
E. 宫体支、卵巢支与输卵管支
105. 子宫动脉可分为
A. 宫底支、宫体支与宫颈支
B. 宫体支与输卵管支
C. 宫底支、卵巢支与输卵管支
D. 子宫支、卵巢支与输卵管支
E. 宫体支与宫颈 - 阴道支
106. 对于宫颈, 下列哪项错误
A. 宫颈阴道部为复层鳞状上皮覆盖
B. 宫颈管黏膜上皮细胞呈单层高柱状
C. 主要由结缔组织构成
D. 宫颈黏膜不受性激素影响
E. 宫颈管内黏液栓呈碱性
107. 舟状窝位于
A. 阴蒂与尿道口之间
B. 尿道口与阴道口之间
C. 阴道口与阴唇系带之间
D. 大阴唇后方与阴道口之间
E. 小阴唇与处女膜之间
108. 对于骨盆底的分区, 下列哪项不正确
A. 尿道通过尿生殖区 B. 分为尿生殖区与肛区
C. 肛区有肛管通过 D. 阴道通过尿生殖区
E. 以上均不正确
109. 骨盆底组织有
A. 2 层 B. 1 层
C. 3 层 D. 4 层
E. 5 层
110. 女性盆腔的最低部位是



- A. 阴道后穹窿 B. 直肠子宫陷凹
C. 膀胱子宫陷凹 D. 阴道前穹隆
E. 阴道侧穹隆
111. 正常成年妇女的子宫厚度为
A. 3~4cm B. 2~3cm
C. 1~2cm D. 4~5cm
E. 5~6cm
112. 骨盆的关节包括
A. 耻骨联合与骶髂关节
B. 耻骨联合与骶尾关节
C. 耻骨联合、骶髂关节与骶尾关节
D. 骶髂关节与骶尾关节
E. 骶尾关节
113. 对于耻骨联合, 下列哪项不正确
A. 由纤维软骨组成 B. 由结缔组织组成
C. 位于两耻骨之间 D. 位于骨盆前方
E. 是骨盆的关节之一
114. 骶结节韧带位于
A. 骶骨与尾骨之间 B. 骶骨与闭孔之间
C. 骶骨与坐骨棘之间 D. 骶骨与坐骨结节之间
E. 骶骨与耻骨联合
115. 对于骶棘韧带, 下列哪项正确
A. 位于骶尾关节与坐骨棘之间
B. 位于骶髂关节与坐骨棘之间
C. 位于骶骨与坐骨棘之间
D. 其宽度即为坐骨切迹宽度
E. 以上均不正确
116. 判断中骨盆是否狭窄的重要指标是
A. 髂嵴间径 B. 髂棘间径
C. 坐骨切迹宽度 D. 骶耻外径
E. 坐骨结节横径
117. 下面哪项不是女型骨盆的特点
A. 耻骨弓较宽
B. 髂骨翼宽而浅
C. 骨盆入口呈横椭圆形
D. 两侧坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$
E. 为女性正常骨盆
118. 下面哪项是扁平型骨盆的特征
A. 耻骨弓较窄 B. 入口呈横椭圆形
C. 骶骨弯曲正常 D. 我国妇女中少见
E. 入口前后径短而横径长
119. 对于大阴唇, 下列哪项正确
A. 其内侧为黏膜
B. 其后端为子宫圆韧带的终点
C. 起自阴蒂, 止于会阴
D. 其皮下脂肪层富含血管、淋巴管和神经
E. 以上均正确
120. 会阴组织由外向内依次为
A. 皮肤、皮下脂肪、肛门外括约肌
B. 皮肤、皮下脂肪
C. 皮肤、筋膜
D. 皮肤、皮下脂肪、会阴中心腱
E. 皮肤、皮下脂肪、肛提肌
121. 对于阴蒂, 下列哪项不正确
A. 具有勃起性
B. 位于两侧大阴唇顶端的联合处
C. 位于两侧小阴唇顶端的联合处
D. 分为阴蒂头、阴蒂体和两个阴蒂脚
E. 敏感性极高
122. 子宫动脉上支为
A. 子宫支 B. 宫体支
C. 宫底支 D. 卵巢支
E. 输卵管支
123. 阴蒂动脉分布于
A. 阴蒂与小阴唇 B. 阴蒂与前庭球
C. 阴蒂与阴阜 D. 阴蒂
E. 阴蒂与大阴唇、小阴唇
124. 对于女型骨盆, 下列哪项正确
A. 骨盆入口呈长椭圆形, 坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$
B. 骨盆入口呈扁椭圆形, 坐骨棘间径 $\geq 10\text{cm}$
C. 骨盆入口呈横椭圆形, 坐骨棘间径 $\geq 10\text{cm}$
D. 骨盆入口呈横椭圆形, 坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$
E. 骨盆入口呈圆形, 坐骨棘间径 $\leq 10\text{cm}$
125. 对于女性骨盆, 下列哪项不正确
A. 真骨盆又称骨产道
B. 真骨盆位于骨盆分界线之下
C. 假骨盆又称大骨盆
D. 坐骨棘位于骨盆中部, 仅可经阴道触及
E. 骶岬是骨盆内测量对角径的重要据点
126. 阴道前庭包括
A. 阴蒂、前庭球及前庭大腺
B. 前庭球、前庭大腺、尿道口、阴道口及处女膜
C. 前庭球、前庭大腺及尿道口
D. 阴蒂、前庭球、前庭大腺及尿道口
E. 前庭大腺、尿道口及阴道口
127. 对于阴道, 下列哪项正确
A. 阴道壁由黏膜和肌壁构成
B. 阴道穹隆按其位置分为前、后两部分

- C. 阴道下端比上端宽
D. 阴道壁富含静脉丛
E. 阴道前壁长于后壁
128. 下面哪项不是组成骨盆的骨骼
A. 耻骨 B. 髌骨
C. 骶骨 D. 腰椎
E. 尾骨
129. 盆膈是指盆底的
A. 中层 B. 外层
C. 内层 D. 外层与中层
E. 中层与内层
130. 对于骨盆底, 下列哪项正确
A. 骨盆底与分娩无直接关系
B. 骨盆底由多层肌肉组成
C. 骨盆底由筋膜组成
D. 骨盆底的结构和功能与盆腔脏器的位置和功能密切相关
E. 以上均不正确
131. 对于女性内生殖器的神经支配, 下列哪项不正确
A. 卵巢神经丛与骶前神经丛均支配内生殖器
B. 交感神经纤维由腹主动脉前神经丛分出
C. 由交感神经与副交感神经支配
D. 卵巢神经丛分布于卵巢、输卵管和子宫
E. 子宫平滑肌的收缩不受神经支配
132. 对于女性内生殖器的血管, 下列哪项不正确
A. 左卵巢动脉可来自左肾动脉
B. 右卵巢动脉可来自右肾动脉
C. 子宫动脉为髂内动脉前干的分支
D. 阴部内动脉为髂内动脉前干的终支
E. 会阴动脉为阴部内动脉的分支
133. 支配女性外生殖器的神经主要为
A. 会阴神经 B. 阴部神经
C. 外阴神经 D. 阴蒂背神经
E. 痔下神经
134. 下面哪条动脉属于阴部内动脉的分支
A. 痔中动脉 B. 痔下动脉
C. 痔上动脉 D. 阴道动脉
E. 阴阜动脉
135. 对于阴道的血供, 下列哪项不正确
A. 阴道上段由子宫动脉下支供应
B. 阴道血供来源于多条动脉
C. 阴道中段由阴道动脉供应
D. 阴道下段由阴部内动脉和痔中动脉供应
E. 阴道中段与下段血供相同
136. 外生殖器包括
A. 大阴唇、小阴唇、阴道口和处女膜
B. 大阴唇、小阴唇和阴道前庭
C. 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、尿道口和阴道口
D. 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、前庭大腺、尿道口和阴道口
E. 阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂及阴道前庭
137. 下面哪项不属于盆腔淋巴结
A. 髂总淋巴结 B. 髂外淋巴结
C. 髂内淋巴结 D. 腹股沟深淋巴结
E. 腰淋巴结
138. 对于输卵管浆膜层, 下列哪项正确
A. 覆盖整个输卵管 B. 为阔韧带上层
C. 为输卵管系膜的一部分 D. 含有腺上皮
E. 与输卵管黏膜层紧贴
139. 对于双子宫以下说法正确的是
A. 每个子宫伴有一个宫颈和一对输卵管及卵巢
B. 双子宫是由双侧副中肾管未完全融合所致
C. 双子宫常出现月经过多
D. 妊娠只能发生在一个宫腔内
E. 早期人工流产时可能造成漏吸
140. 对于输卵管系膜, 下列哪项不正确
A. 可发生系膜囊肿 B. 为阔韧带的一部分
C. 位于输卵管以下 D. 子宫动静脉从其中穿过
E. 其中有结缔组织及中肾管遗迹
141. 18岁, 女性, 无月经来潮伴有周期性下腹痛, 检查未见阴道开口, 黏膜表面无蓝染, 未见黏膜膨出。肛查扪及向直肠突出的包块, 直肠腹部诊可在下腹部扪及腹腔内一较小包块, 压痛明显。可能的诊断是
A. 处女膜闭锁 B. 先天性阴道闭锁
C. 先天性宫颈闭锁 D. 先天性无阴道
E. 先天性无子宫
142. 主韧带位于
A. 子宫动脉两侧与骨盆侧壁之间
B. 阴道穹隆两侧与骨盆侧壁之间
C. 子宫峡部两侧与骨盆侧壁之间
D. 宫颈两侧与骨盆侧壁之间
E. 宫体两侧与骨盆侧壁之间
143. 骨盆底的前方为
A. 耻骨联合上缘 B. 耻骨联合
C. 耻骨联合下缘 D. 阴阜
E. 阴道前庭



144. 盆腔淋巴分为
- 髂内、髂外、髂总与骶前淋巴组
 - 髂内、髂外及髂总淋巴组
 - 髂内、髂外与骶前淋巴组
 - 髂淋巴组与骶前淋巴组
 - 髂淋巴组、骶前淋巴组与腰淋巴组
145. 输卵管由内向外依次为
- 间质部、壶腹部、峡部及伞部
 - 峡部、间质部、壶腹部及伞部
 - 间质部、峡部、壶腹部及伞部
 - 峡部、壶腹部、间质部及伞部
 - 壶腹部、间质部、峡部及伞部
146. 对于子宫阔韧带, 下列哪项不正确
- 外 1/3 部移行为骨盆漏斗韧带
 - 内 1/3 包围输卵管
 - 分为前后两叶
 - 富含血管、神经及淋巴管
 - 两侧达盆壁
147. 对于子宫, 下列哪项正确
- 子宫峡部黏膜组织与宫颈黏膜相同
 - 靠近子宫肌层的内膜为功能层
 - 子宫峡部黏膜无周期性变化
 - 基底层无周期性变化
 - 功能层于月经期部分脱落
148. 子宫圆韧带长
- 10 ~ 12cm
 - 8 ~ 10cm
 - 11 ~ 13cm
 - 12 ~ 13cm
 - 12 ~ 14cm
149. 阴部内动脉的分支有
- 3 支
 - 2 支
 - 4 支
 - 5 支
 - 6 支
150. 宫体两侧淋巴结沿圆韧带汇入
- 骶前淋巴结
 - 腹股沟浅淋巴结
 - 腹股沟深淋巴结
 - 闭孔淋巴结
 - 髂内淋巴结
151. 对于阴道上段淋巴引流, 下列哪项不正确
- 小部分汇入髂外淋巴结
 - 大部分汇入闭孔淋巴结与髂内淋巴结
 - 与阴道下段引流基本相同
 - 与宫颈引流基本相同
 - 不注入腹股沟淋巴结
152. 对于外生殖器淋巴, 下列哪项不正确
- 腹股沟浅淋巴结分上、下两组
 - 分为腹股沟浅淋巴结与腹股沟深淋巴结
 - 腹股沟深淋巴结汇入闭孔及髂内等淋巴结
 - 腹股沟深淋巴结收纳阴蒂、股静脉区及腹股沟浅淋巴
 - 腹股沟浅淋巴结输出管大部分注入髂外淋巴结
153. 使子宫底保持前倾位置的韧带是
- 主韧带
 - 圆韧带
 - 阔韧带
 - 宫骶韧带
 - 骨盆漏斗韧带
154. 对于子宫峡部, 下列哪项不正确
- 非孕期长约 1cm
 - 其黏膜不同于子宫内膜
 - 位于宫体与宫颈之间
 - 其上端为解剖学内口
 - 其下端为组织学内口
155. 女性内生殖器包括
- 阴道、宫颈、子宫、输卵管和卵巢
 - 子宫、输卵管和卵巢
 - 阴道、子宫、输卵管和卵巢
 - 阴道、子宫、输卵管、卵巢和盆腔结缔组织
 - 阴道、子宫、输卵管、卵巢及其血管
156. 阴道上段的血供来自
- 卵巢动脉
 - 阴道动脉
 - 肾动脉
 - 阴部内动脉
 - 子宫动脉
157. 对于卵巢, 下列哪项正确
- 卵巢位于输卵管的后上方
 - 成年妇女的卵巢约 3cm × 2cm × 1cm 大小
 - 卵巢白膜为一层纤维组织
 - 髓质内有数以万计的原始卵泡
 - 卵巢以卵巢悬韧带与子宫连接
158. 对于输卵管, 下列哪项正确
- 壶腹部在峡部内侧
 - 为一对细长而弯曲的管, 游离于阔韧带之外
 - 黏膜层为单层高柱状上皮, 均为纤毛细胞
 - 肌层有节奏地收缩能引起输卵管由近端向远端蠕动
 - 肌层由内环形、外纵形的两层平滑肌组成
159. 对于女性生殖器的发生以下哪个说法是正确的
- 由于睾酮的存在使外生殖器向雄性分化
 - 在生殖腺发育为卵巢后, 副中肾管退化
 - 外生殖器向雌性分化是胚胎发育的自然规律
 - 如果只有睾酮存在, 但外阴局部组织中缺乏 5 α -还原酶, 则胚胎发育为女性

- E. 以上说法都不对
160. 子宫动脉在下列何处横跨输尿管至子宫侧缘
- 子宫体下方外侧约 2cm
 - 峡部水平外侧约 2cm
 - 宫颈内口水平外侧约 2cm
 - 宫颈外口水平外侧约 2cm
 - 主韧带上方约 2cm
161. 子宫动脉为
- 髂外动脉后干分支
 - 髂外动脉前干分支
 - 髂总动脉分支
 - 髂内动脉前干分支
 - 髂内动脉后干分支
162. 成年妇女的卵巢大小为
- 3cm × 2cm × 1cm
 - 4cm × 3cm × 2cm
 - 5cm × 4cm × 3cm
 - 4cm × 3cm × 1cm
 - 4cm × 2cm × 1cm
163. 对于生殖腺的发生下列哪些说法是错误的
- 睾丸决定因子位于 Y 染色体短臂决定区
 - 原始生殖腺具有向睾丸或卵巢分化的双向潜能
 - 只有 Y 染色体存在亦不能决定原始生殖腺分化成睾丸还是分化成卵巢
 - 睾丸决定因子对生殖腺分化起决定作用
 - 如无睾丸决定因子存在, 在胚胎第 4 周末时, 即可分化出卵巢
164. 卵巢生发上皮为
- 单层梭形上皮
 - 单层柱状上皮
 - 单层扁平上皮
 - 单层鳞状上皮
 - 单层立方上皮
165. 卵巢门是指
- 卵巢系膜连接于输卵管的部位
 - 卵巢固有韧带连接于卵巢的部位
 - 卵巢系膜连接于阔韧带后叶的部位
 - 卵巢连接于子宫的部位
 - 卵巢系膜连接于阔韧带前叶的部位
166. 女性盆部淋巴主要分为
- 盆腔淋巴组与内生殖器淋巴组
 - 外生殖器淋巴组与内生殖器淋巴组
 - 盆腔淋巴组与外生殖器淋巴组
 - 腹股沟淋巴组与内生殖器淋巴组
 - 髂淋巴组与腹股沟淋巴组
167. 输卵管黏膜层为
- 腺上皮
 - 单层高柱状上皮
 - 单层柱状上皮
 - 浆液性上皮
 - 生发上皮
168. 女性内生殖器的血供与下述哪项无关
- 卵巢动脉
 - 髂外动脉
 - 子宫动脉
 - 阴道动脉
 - 阴部内动脉
169. 关于卵巢, 下列哪项正确
- 位于子宫颈两侧
 - 为腹膜间位器官
 - 后缘有血管、神经出入
 - 是女性生殖腺
 - 由髂外动脉分支营养
170. 临床上, 寻找卵巢血管的标志是
- 卵巢悬韧带—卵巢门
 - 卵巢固有韧带
 - 子宫阔韧带
 - 卵巢系膜
 - 卵巢子宫索
171. 手术时识别输卵管的标志是
- 输卵管伞
 - 输卵管漏斗
 - 输卵管系膜
 - 输卵管间质部
 - 输卵管外侧端
172. 可限制子宫向两侧移动的是
- 子宫圆韧带
 - 子宫主韧带
 - 骶子宫韧带
 - 子宫阔韧带
 - 卵巢子宫索
173. 防止子宫脱垂的主要韧带是
- 子宫圆韧带
 - 子宫主韧带
 - 骶子宫韧带
 - 子宫阔韧带
 - 子宫系膜
174. 骨盆底外层肌肉不包括
- 球海绵体肌
 - 坐骨海绵体肌
 - 会阴浅横肌
 - 尿道括约肌
 - 肛门外括约肌
175. 关于女性内生殖器的血供, 下述哪项错误
- 营养子宫的动脉是腹主动脉的分支
 - 卵巢的血供供应来自子宫动脉和卵巢动脉
 - 输卵管的血液供应来自子宫动脉和卵巢动脉
 - 子宫动脉发出阴道支营养阴道
 - 子宫动脉分支营养子宫、卵巢、输卵管、阴道
176. 参与构成盆膈的肌肉是
- 肛提肌
 - 会阴深横肌
 - 会阴浅横肌
 - 坐骨海绵体肌
 - 球海绵体肌
177. 关于卵巢动脉错误的是
- 自腹主动脉分出, 左侧可来自左肾动脉
 - 右侧卵巢动脉多来自右肾动脉
 - 在腹膜后沿腰大肌前下行至骨盆腔
 - 卵巢动脉经卵巢系膜进入卵巢门
 - 卵巢动脉分出若干支营养输卵管
178. 下面哪一项不是成年人子宫的正常解剖形态