

中医学专业考题题库

系列丛书

总主编 黄政德 何清湖

中医骨伤


必读基础知识

ZHONGYIGUSHANG

BIDU

JICHUZHISHI

主编 熊辉



山西出版传媒集团

山西科学技术出版社

中医骨伤必读

基础知识

主编 熊 辉

副主编 齐新宇 尹 明

编 委 王先立 尹 明 向黎黎 李 前 李腾龙

陆小龙 肖群飞 徐 云 郭玉星 贺渊哲

倪力力 谈立明 曾祥晶 熊 辉

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医骨伤必读基础知识 / 黄政德, 何清湖总主编. — 太原: 山西科学技术出版社, 2014. 3
(中医学专业考试题库系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4746 - 2

I. ①中… II. ①黄…②何… III. ①中医伤科学 - 医学院校 - 习题集 IV. ①R274 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035047 号

中医骨伤必读基础知识

总主编 黄政德 何清湖

出版 山西出版传媒集团 · 山西科学技术出版社

(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发行 山西出版传媒集团 · 山西科学技术出版社

(电话: 0351 - 4922021)

经 销 全国新华书店

印 刷 太原彩亿印业有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 5

字 数 110 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月太原第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4746 - 2

定 价 10.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前　　言

为提高中医学专业学生学习兴趣，帮助学生从大量的理论学中找到学习的主体方向，我们特组织我校相关专家教授们在原有套题库建设基础上编写该套题库，使学生通过真题与仿真题演练，促进学生对教材知识点的温习，更好夯实专业相关基础理论知识，以达到培养高质量临床型中医药人才的目的。

《中医学专业考试题库》紧扣中医学专业课程教学大纲和考试大纲，围绕中医学专业各门课程基础知识要点，以中国中医药出版社出版的面向 21 世纪二版规划教材为蓝本进行编写，全书共分 15 册。包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、针灸学、中医推拿、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科、中医骨伤。题型主要是：A 型题（单选题）、X 型题（多选题）、填空题、改错题（或是非判断题）、名词解释题、问答题、案例分析题等，后均附有参考答案。其中：

1. A 型题是单选题，在备选答案中，只有一个正确答案，错选、多选该题无分。
2. X 型题是多选题，在备选答案中有 2 - 5 个正确答案，错选、少选、多选该题无分。
3. 填空题，在题目中留出空格，需填入相符合的内容。
4. 判断题，给出已知题目，认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。
5. 名词解释题，给出一个名词术语，需对其进行分析说明
6. 问答题，给出题目的规定和要求，要求根据提示项进行简述、概述、说明、简析、评价。
7. 案例分析题，在提供一段中医专业背景资料后提出问题，在问题中要求考生阅读分析，依据一定的理论知识，或做出决策，或作出评价，或提出具体的解决问题的方法或意见。

经过 15 个学科团队百余位教学、临床一线专家的通力合作，耗时年余，几易其稿，终得付梓，对各位老师付出的辛勤劳动表示衷心感谢！

本书编写过程中，虽然专家们反复商量，不断修改，但涉及的题量信息大，难免有错漏之处，恳请读者指正。我们希望，本书公开出版后，能成为中医院校在校生以及各类参与中医考试人员复习、备考用书，也可以作为教师教学参考书。

黄政德 何清湖

《中医学专业考试题库》编委会

总策划 赵志春

总主编 黄政德 何清湖

副总主编 熊 辉 刘平安 文红艳 熊 焰

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁瑞丛	王 超	王先立	王孟清	王建国	王德军
文乐兮	文红艳	尹 明	尹 勇	尹周安	毛娅男
石 佳	石晓理	卢丽丽	皮丕喆	艾碧琛	龙 玲
田浩梅	齐新宇	祁 林	向 芳	向黎黎	危 玲
伍良明	刘 娟	刘 峰	刘 密	刘小卫	刘平安
刘金芝	刘超萍	刘丽芳	刘旺华	刘建新	李 中
李 英	李 灿	李 武	李 前	李 琳	李洪亮
李江山	李铁浪	李彩云	李鑫辉	李腾龙	李雄安
李洪亮	何宜荣	何清湖	沈 菁	余 娜	严 婧
吴红娟	张国山	张炳填	肖科金	肖锦仁	肖碧跃
肖群飞	苏丽清	欧阳建军	邹旭峰	邹芝香	陆小龙
杨 舟	杨 丽	陈 聪	陈楚淘	陈湘鹏	郁保生
易亚乔	罗成宇	罗银河	周 兴	周 姣	周德生
林 洁	郜文辉	赵国荣	胡 燕	胡志希	贺又舜
贺渊哲	郭 雁	郭玉星	郭春秀	徐 云	徐 慧
聂 娅	倪力力	凌 智	谈立明	袁 博	袁振仪
袁雅洁	袁轶峰	黄 婷	黄政德	常小荣	程丽娜
曾序求	曾祥晶	喻 嵘	葛云鹏	葛君芸	彭 亮
谢 勇	谢 静	谢宇霞	谢雪姣	谢明峰	董文波
梁 昊	简维雄	谭 静	熊 辉	熊 焰	臧家栋
黎鹏程	戴 维	瞿延晖			
秘 书	谢 勇	赵彦琴	刘 峰		

目 录

试卷一	1
试卷二	6
试卷三	11
试卷四	16
试卷五	21
试卷六	27
试卷七	32
试卷八	37
试卷九	42
试卷十	47
试卷一参考答案	52
试卷二参考答案	54
试卷三参考答案	56
试卷四参考答案	58
试卷五参考答案	59
试卷六参考答案	61
试卷七参考答案	63
试卷八参考答案	65
试卷九参考答案	67
试卷十参考答案	69



试卷一

时间：120分钟

一、A型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内、错选、多选该题无分。每小题1分，共25分）

1. 首次记载髋关节脱臼分为前后脱臼两类的是（ ）
A. 巢元方《诸病源候论》 B. 蔺道人《仙授理伤续断秘方》
C. 宋慈《洗冤集录》 D. 危亦林《世医得效方》
E. 王肯堂《证治准绳》
2. 踝关节背伸活动正常范围是（ ）
A. 背伸 $0^\circ \sim 10^\circ$ B. 背伸 $10^\circ \sim 20^\circ$ C. 背伸 $20^\circ \sim 30^\circ$
D. 背伸 $40^\circ \sim 50^\circ$ E. 背伸 $60^\circ \sim 70^\circ$
3. 小夹板固定扎带松紧度以可以上下移动多少厘米为合适（ ）
A. 2 B. 1.5 C. 1
D. 0.5 E. 3
4. 易发生骨折不愈合的是（ ）
A. 股骨转子间 B. 股骨颈基底部 C. 腕舟骨结节部
D. 股骨颈头下型 E. 胫骨上 $1/3$
5. 股骨颈的前倾角正常值为（ ）
A. $10^\circ \sim 15^\circ$ B. $11^\circ \sim 14^\circ$ C. $12^\circ \sim 15^\circ$
D. $15^\circ \sim 18^\circ$ E. $18^\circ \sim 20^\circ$
6. 股骨髁间骨折复位应达到良好的对位使关节面光滑平整，是为防止后期发生（ ）
A. 缺血性肌挛缩 B. 骨化性肌炎 C. 足下垂
D. 缺血性骨坏死 E. 创伤性关节炎
7. 肱骨外科颈骨折，断端外侧嵌插而内侧分离，向前、内侧突起成角，其病理分型属于（ ）
A. 嵌插型骨折 B. 裂缝型骨折 C. 内收型骨折
D. 外展型骨折 E. 肱骨外科颈骨折合并肩关节脱位
8. 跟骨结节骨折复位后肢体固定的位置为（ ）
A. 屈膝位 B. 跖屈位 C. 踝背伸位
D. 跖屈、屈膝位 E. 屈膝、踝背伸位
9. 颞颌关节脱位复位后应用四头带固定，其时间一般是（ ）



- A. 1 周 B. 1—2 周 C. 5~6 天
D. 2~3 天 E. 10 天

10. 腕管综合征受到卡压的神经是 ()
A. 桡神经 B. 尺神经 C. 正中神经
D. 臂丛神经 E. 颈神经

11. 首次记载用竹片夹板固定骨折的是 ()
A. 晋·葛洪《肘后救卒方》 B. 南齐·龚庆宣《刘涓子鬼遗方》
C. 隋·巢元方《诸病源候论》 D. 唐·王焘《外台秘要》
E. 唐·蔺道人《仙授理伤续断秘方》

12. 疲劳骨折发生的致伤因素是 ()
A. 直接暴力 B. 间接暴力 C. 肌肉牵拉
D. 骨感染 E. 外力的累积

13. 骨折愈合过程中，原始骨痂形成期约需 ()
A. 2—3 周 B. 3—4 周 C. 4—6 周
D. 4—8 周 E. 8—12 周

14. 下列哪一项不是骨折常伴有的并发症 ()
A. 休克 B. 骨化性肌炎 C. 肌肉萎缩
D. 脂肪栓塞 E. 内脏损伤

15. 桡神经损伤可出现的症状是 ()
A. 爪形手 B. 垂腕 C. 小指感觉障碍
D. 第 4、5 指屈曲不全 E. 拇指不能对掌

16. 胫骨外科颈骨折，断端外侧嵌插而内侧分离，向前、内侧突出成角，其病理分型属于 ()
A. 嵌插型骨折 B. 裂缝型骨折 C. 内收型骨折
D. 外展型骨折 E. 胫骨外科颈骨折合并肩关节脱位

17. 桡骨下端伸直型骨折出现的畸形是 ()
A. 鞍状畸形 B. 餐叉样畸形 C. 骆峰样畸形
D. 锅铲样畸形 E. 方肩畸形

18. 落枕检查时常见的压痛点在 ()
A. 颈脊肌 B. 背阔肌 C. 斜方肌
D. 冈上肌 E. 冈下肌

19. 化脓性关节炎在哪个阶段治愈关节功能可恢复正常 ()
A. 脓性渗出期 B. 血性渗出期 C. 浆液渗出期
D. 黏液性渗出期 E. 浆液纤维蛋白渗出期

20. 骨质疏松症疼痛部位多见于 ()
A. 颈部 B. 胸部 C. 腰骶部



- D. 腰背部 E. 筋部

21. 磁共振 (MRI) 图像上, 表现非常低的信号强度的是 ()
A. 脂肪 B. 髓质骨 C. 皮质骨
D. 肌肉 E. 透明软骨

22. 清热凉血法是损伤初期治疗中的一种方法, 属骨伤内治法中 ()
A. 和法 B. 清法 C. 补法
D. 消法 E. 下法

23. 创伤救护的步骤是 ()
A. 包扎 - 搬运 - 止血 - 固定 B. 止血 - 包扎 - 固定 - 搬运
C. 搬运 - 止血 - 包扎 - 固定 D. 固定 - 搬运 - 包扎 - 止血
E. 止血 - 固定 - 搬运 - 包扎

24. 感觉检查中的浅感觉检查包括的内容是 ()
A. 痛觉、位置觉、温度觉 B. 痛觉、温度觉、触觉
C. 震动觉、痛觉、触觉 D. 痛觉、实体觉、触觉
E. 位置觉、震动觉、实体觉

25. 恶性骨肿瘤最早的临床症状是 ()
A. 肿胀 B. 畸形 C. 功能障碍
D. 异常活动 E. 疼痛

二、X型题（下列各题的备选答案中有2~5个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内、错选、少选、多选该题无分。每题1分，共10分）

1. “锤状指”可见于 ()
A. 伸指肌腱于掌指关节平面断裂 B. 伸指肌腱于近侧指间关节平面断裂
C. 伸指肌腱于远侧指间关节平面断裂 D. 伸指肌腱于腕关节平面断裂
 2. X 线平片观察关节腔包含 ()
A. 关节面软骨 B. 关节间纤维软骨 C. 关节固有间隙
D. 骨皮质 E. 韧带
 3. 以下那些是小夹板的性能 ()
A. 可塑性 B. 弹性 C. 韧性
D. 可透射线 E. 质地轻便
 4. 心搏骤停急救的正确方法为 ()
A. 气管插管 B. 体外心脏按压, 成人 80 ~ 100 次/分, 儿童 100 ~ 120 次/分
C. 电击除颤 D. 人工呼吸
E. 心内注射心三联 (即肾上腺素, 异丙肾上腺素, 去甲肾上腺素) 各 1mg
 5. 挤压综合征全身表现的主要特征为 ()
A. 休克 B. 肢体肿胀 C. 高血钾症
D. 肌红蛋白尿 E. 酸中毒及氮质血症

6. 诊断无明显移位骨折的重要体征是（ ）
 A. 纵轴叩击痛 B. 肿胀和瘀斑 C. 环状压痛
 D. 异常活动 E. 骨擦音和骨擦感
7. 关于手的功能位，正确的说法有（ ）
 A. 腕背伸 30° B. 掌指关节屈曲 45°
 C. 近侧指间关节屈曲 45° D. 远侧指间关节屈曲 25°~30°
 E. 远侧指间关节屈曲 45°
8. 周围神经损伤出现的软瘫的特点是（ ）
 A. 肌肉收缩 B. 腱反射消失 C. 肌张力减低
 D. 肌肉萎缩 E. 腱反射减弱
9. 颞下颌关节脱位的症状、体征有（ ）
 A. 口弹性固定于半张合位 B. 下颌骨下垂 C. 咬肌痉挛
 D. 耳屏前方凹陷 E. 下颌偏向健侧，头偏向患侧
10. 股骨颈骨折的特点有（ ）
 A. 患者平均年龄在 60 岁以上 B. 容易引起一些危及病人生命的并发症
 C. 骨折不愈合率较一般骨折为高 D. 老年患者感染发热，往往出现高热
 E. 易发生股骨头缺血性坏死

三、填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. 中医骨伤科古属折疡、_____范畴，又称“接骨”、“正体”、“正骨”、_____等。
2. 前臂长度测量从_____至_____。
3. 骨伤科常用内治法根据疾病分类不同，可分为骨伤内治法、_____及_____三法。
4. 骨伤科各部位练功法，既有加强局部肢体关节的活动功能，又有促进全身_____，增强_____的功效。
5. 骨质的疏松部和_____之交界处，静止段和_____之交界处是骨折的好发部位。
6. 对股骨粗隆间骨折的治疗关键有二，一为_____，一为_____。
7. 颞下颌关节脱位的手法复位方法分为_____、_____两种，后者多使用于年老齿落者的习惯性脱位。
8. 慢性伤筋还要与_____、_____等相鉴别。
9. 行抽屉试验时，胫骨向前移位大于_____cm，提示_____松弛或断裂。
10. 腰椎间盘突出后，局部可出现_____炎症、_____炎症和创伤性炎症。

四、判断题（下列各题，你认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。 (每小题 1 分，共 10 分)

1. 局部锻炼主要是指导患者进行伤肢被动活动。 ()



2. 畸形、骨擦音和弹性固定是骨折的三大特征。 ()
3. 化脓性关节炎早期 X 线检查可见关节间隙增宽。 ()
4. 跟腱反射减弱或消失者多是腰 4 神经根受压。 ()
5. 对含有丹类药物的膏药，X 线能穿透，所以做 X 线时可以不取下。 ()
6. 桡尺骨干双骨折复位后，前臂原则上放置在旋前位。 ()
7. 骨性关节炎病变日久可引起关节的骨性强直。 ()
8. 髋关节暂时性滑膜炎多发于 10 岁以下。 ()
9. 踝关节内翻扭伤中以背伸内翻扭伤多见。 ()
10. 股骨头无菌性坏死晚期髋关节屈曲、内收、内旋明显受限。 ()

五、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 骨质疏松症
2. 肘后三角
3. 疼痛弧试验
4. 孟氏骨折
5. 创伤性关节炎

六、问答题（共 20 分）

1. 简述腰椎间盘突出症的症状、体征及治疗方法的要点？(6 分)
2. 试述导致肱骨干骨折的病因病机及骨折的移位特点？(7 分)
3. 如何鉴别肩关节脱位和肱骨外科颈骨折？(7 分)

七、案例分析题（共 15 分）

刘某，男，7岁，因左膝部肿痛伴发热4天来院就诊。患者6天前自觉咽部疼痛，4天前出现左膝部肿胀、疼痛、活动受限，伴发热、纳差。查体：T：39.8℃，左膝部肿胀，色红且皮温灼手，膝关节呈屈曲位，不能伸直。舌红苔黄，脉弦数。血常规：白细胞 $19.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 79%。血沉 34mm/小时。X线拍片：左膝关节间隙增宽，关节囊肿胀。关节穿刺：穿刺出黄色浑浊样关节液。

要求：请做出该病的中西医诊断、病因病机分析、治疗方法、方药。

试卷二

时间：120分钟

一、A型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内、错选、多选该题无分。每小题1分，共25分）

1. 新石器时代已产生的外科手术器械为（ ）
A. 曲针 B. 小针刀 C. 镊针
D. 砧镰 E. 青铜刀
2. 肋骨骨折的检查手法应选用（ ）
A. 屈伸法 B. 叩击法 C. 挤压法
D. 触摸法
3. 损伤内因与下列何种因素关系十分密切。（ ）
A. 解剖结构 B. 直接暴力 C. 间接暴力
D. 肌肉过度强烈收缩 E. 外感六淫
4. 患处持续性剧痛，夜间加重，止痛剂不能奏效，并见精神萎靡，食欲不振，消瘦，贫血等，可能是（ ）
A. 退行性骨关节病 B. 良性骨肿瘤 C. 先天性骨关节畸形
D. 骨痨 E. 恶性骨肿瘤
5. 颈椎活动正常范围是（ ）
A. 前屈、后伸各 60° ~ 80° ；左右旋转各 60° ~ 80° ；左右侧屈各 45°
B. 前屈、后伸各 35° ~ 45° ；左右旋转各 60° ~ 80° ；左右侧屈各 45°
C. 前屈、后伸各 35° ~ 45° ；左右旋转各 35° ~ 45° ；左右侧屈各 45°
D. 前屈、后伸各 35° ~ 45° ；左右旋转各 60° ~ 80° ；左右侧屈各 80°
E. 前屈、后伸各 35° ~ 45° ；左右旋转各 60° ~ 80° ；左右侧屈各 80°
6. 搭肩试验用于诊断（ ）
A. 网球肘 B. 肩关节脱位 C. 肱二头肌长腱滑脱
D. 冈上肌腱断裂 E. 肱骨外科颈骨折
7. 不属于骨折外因是（ ）
A. 直接暴力 B. 间接暴力 C. 筋肉牵拉
D. 骨骼病变 E. 疲劳骨折
8. 嵌插骨折最重要的体征是（ ）
A. 局部畸形 B. 骨擦音 C. 严重功能障碍
D. 纵轴叩击痛 E. 异常活动



9. 下列骨折中，不属于完全骨折的是（ ）
 A. 横断骨折 B. 嵌插骨折 C. 青枝骨折
 D. 压缩骨折 E. 斜形骨折
10. 下列哪一项是骨折特有体征？（ ）
 A. 疼痛 B. 肿胀 C. 活动功能障碍
 D. 异常活动 E. 水泡
11. 肘后三角关系正常的损伤为（ ）
 A. 胫骨内踝骨折 B. 胫骨外踝骨折 C. 肘关节后脱位
 D. 尺骨鹰嘴骨折 E. 以上均不是
12. 间接暴力所致的成人锁骨骨折的骨折线形态多为（ ）
 A. 横断形 B. 青枝形 C. 短斜形
 D. 粉碎形 E. 螺旋形
13. 手部外伤后出现“锤状指”提示指骨骨折部位是（ ）
 A. 近节指骨基底部骨折 B. 近节指骨骨折 C. 中节指骨骨折
 D. 末节指骨基底部骨折 E. 近、中、末三节指骨均骨折
14. 成人肱骨干骨折夹板固定时间一般为多少周（ ）
 A. 3~5周 B. 4~6周 C. 6~8周
 D. 8~10周 E. 10~12周
15. 下肢骨折，若缩短（ ）厘米以上，就会出现明显跛行（ ）
 A. 1cm B. 2cm C. 3cm
 D. 4cm E. 5cm
16. 反常呼吸往往发生于（ ）
 A. 一根肋骨骨折 B. 数根肋骨骨折 C. 一根肋骨两处骨折
 D. 多根肋骨双处骨折 E. 后肋骨折
17. 骨髓损伤固定时间为（ ）
 A. 1~2周 B. 2~3周 C. 3~4周
 D. 4~6周 E. 6~8周
18. 关节脱位的病因中以哪项为多见？（ ）
 A. 持续劳损 B. 肌肉强烈收缩 C. 直接暴力
 D. 间接暴力 E. 感染
19. 下列不符合肩关节脱位表现的是（ ）
 A. 肩部疼痛、肿胀 B. “方肩”畸形
 C. 在喙突下、腋窝内或锁骨下可触及肱骨头 D. “靴样”畸形
 E. 搭肩试验阳性
20. 筋伤初期的药物治疗原则是（ ）
 A. 活血和营，舒筋活络 B. 活血化瘀，行气止痛

- C. 温经止痛，滑利关节 D. 温经散寒，祛风止痛
 E. 补益肝肾，宣痹通络
21. 桡骨茎突腱鞘炎是因哪两条肌腱在共同的腱鞘内过多地摩擦所致（ ）
 A. 桡侧伸腕长肌与桡侧伸腕短肌 B. 桡侧伸腕长肌与外展拇长肌
 C. 桡侧伸腕短肌与伸拇短肌 D. 外展拇长肌与伸拇短肌
22. 对椎动脉造成挤压和刺激引起脑供血不足的主要原因是（ ）
 A. 颈椎间盘退化 B. 颈部韧带肥厚钙化 C. 钩椎关节增生
 D. 椎间孔变窄 E. 椎体后缘骨赘形成
23. 脑震荡苏醒后，初期主要症状是头痛、头晕、恶心，时有呕吐，夜寐不宁，治疗应舒肝活血安神，方药选用（ ）
 A. 可保立苏汤 B. 柴胡细辛汤 C. 归脾汤
 D. 杞菊地黄汤 E. 二陈汤
24. 血源性骨髓炎后期的病理变化主要是（ ）
 A. 骨质破坏 B. 骨质坏死 C. 新骨形成
 D. 局部红肿 E. 关节僵硬
25. 具有治损伤与寒湿作用的膏药是（ ）
 A. 金黄膏 B. 红油膏 C. 狗皮膏
 D. 太乙膏 E. 陀僧膏
- 二、X型题**（下列各题的备选答案中有2~5个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、少选、多选该题无分。每题1分，共10分）
1. 《礼记》对损伤的诊断主要采用下列哪些方法？（ ）
 A. 祝 B. 视 C. 审
 D. 察 E. 瞻 F. 抚
2. 腕管综合征局部的主要病理改变有（ ）
 A. 腕横韧带增厚 B. 腕管内容物增多
 C. 正中神经自身的炎症 D. 正中神经与尺、桡骨发生摩擦
 E. 正中神经与肌腱发生摩擦
3. 骨质破坏的X线表现为（ ）
 A. 局限性骨质缺损 B. 骨质密度减低 C. 骨皮质模糊
 D. 骨小梁模糊 E. 骨结构清晰
4. 外固定器的适应证有（ ）
 A. 肢体严重开放性骨折 B. 四肢闭合性骨折 C. 内固定术后骨感染
 D. 肢体延长 E. 骨折不愈合 F. 显微外科手术需要
5. 以下哪些是用于检查下肢的病理反射征？（ ）
 A. 膝反射 B. 巴彬斯基（Babinski）征
 C. 奥本海姆（Oppenheim）征 D. 霍夫曼（Hoffmann）征



- E. 踝阵挛 F. 跟反射

6. 骨折的特殊体征包括 ()
A. 疼痛 B. 肿胀 C. 畸形
D. 骨擦音 E. 异常活动

7. 胫骨干上 1/3 骨折后，导致近断端移位的肌肉有 ()
A. 胸大肌 B. 大圆肌 C. 三角肌
D. 背阔肌 E. 肱二头肌

8. 屈曲型脊柱压缩骨折常用的复位手法有 ()
A. 双踝悬吊法 B. 人背复位法 C. 两桌法
D. 持续牵引法 E. 挤压推拉法

9. 颞下颌关节脱位的病因包括 ()
A. 过度张口 B. 暴力打击 C. 年老体衰
D. 久病体虚 E. 持续劳损

10. 造成习惯性髌骨脱位的因素有 ()
A. 股骨外髁发育不良 B. 股骨内髁发育不良 C. 髌骨比常人大
D. 髌骨比常人小 E. 膝外翻畸形

三、填空题（每题1分，共10分）

- 按致伤因素的性质种类分类，可将损伤分为物理损伤、_____、_____三类。
 - 脱位的特征是_____、弹性固定、_____等。
 - 大腿长度测量从_____至_____。
 - 疲劳性骨折的特点是_____和_____同时进行。
 - 肋骨骨折的胶布固定法，是在_____之末，胸围缩至最小时，将胶布呈叠瓦状粘贴，前后均应超过中线_____cm，固定2~3周。
 - 脱位整复后，应对患肢进行适当的固定。有效固定可以减少出血，有利于软组织的修复，防止_____和的_____发生。
 - 牵拉肘复位后，常用_____悬吊_____天。
 - 人体最强的肌腱是_____，止于_____部。
 - 锐器割裂造成的跟腱断裂多为_____形，手术修复后常将踝关节固定于_____位。
 - 根据骨折的损伤程度，将骨折分为_____骨折和_____骨折。

四、判断题（下列各题，你认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。）

(每小题1分, 共10分)

1. 间接暴力导致的骨折多为横断形骨折或粉碎形骨折，骨折处的软组织损伤较为严重。 ()
 2. 检查膝交叉韧带损伤的重要方法是“4”字试验阳性 ()
 3. 桡、尺骨干双骨折X线照片时应包括腕、肘两个关节 ()



4. 任何牵引方法，既能矫正骨折重叠移位，又能纠正骨折侧方移位 ()
5. 摸皮肤温度时一般用手背测试最为合宜 ()
6. 第一掌骨基底部骨折，折端总是向桡背侧突起成角 ()
7. 锁骨外形呈“S”形，骨折好发于上1/3处 ()
8. 凡构成关节的软骨脱离正常的位置，发生关节功能障碍者称为脱位 ()
9. 临幊上颈椎病常见的类型是脊髓型 ()
10. 粗糙的关节摩擦音可在骨性关节炎时听到 ()

五、名词解释题（每小题2分，共10分）

1. 腕管综合征

2. 解剖复位

3. 骨化性肌炎

4. Tinel征

5. 肩关节周围炎

六、问答题（共20分）

1. 请阐述夹板固定的作用机理及其适应证？(6分)

2. 试述椎动脉型颈椎病的诊查要点？(7分)

3. 肱骨髁上伸直型骨折与肘关节后脱位的鉴别要点？(7分)

七、案例分析题（共15分）

张××，女，68岁，2小时前在家不慎摔倒，以臀部触地，当即出现右髋部疼痛，右髋关节功能丧失，不能站立，平车入院。检查：右下肢呈外旋、外展、短缩畸形，右髋、膝关节轻度屈曲，右髋部无明显肿胀，未见瘀斑，右边腹股沟中点处有压痛，纵轴叩击痛阳性，右下肢血运及感觉未发现明显异常。

要求：(1) 最可能的诊断是什么？若要确诊，还需要进一步完善哪些检查？(4分)

(2) 治疗方案及注意事项。(6分)



试卷三

时间：120分钟

一、A型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题1分，共25分）

1. 新石器时代已出现外伤科名医（ ）
A. 神农 B. 黄帝 C. 伏羲
D. 扁鹊 E. 俞跗
2. 记载用“骨擦音”作为检查骨折方法的医籍是（ ）
A. 《金疮秘传禁方》 B. 《仙授理伤续断秘方》
C. 《世医得效方》 D. 《肘后救卒方》
3. 有一患者自高处坠落，臀部着地，发生胸腰椎压缩性骨折，问病因是何种外因（ ）
A. 直接暴力 B. 间接暴力 C. 肌肉过度强烈收缩
D. 持续劳损 E. 拼力岔气
4. 陈伤表现面色不华或萎黄、头晕、目眩、心悸、手足发麻、心烦失眠、爪甲色淡、唇舌淡白、脉细无力者属于何症。（ ）
A. 血瘀 B. 血虚 C. 血脱
D. 血热 E. 血滞
5. 骨折后出现疼痛的特征是（ ）
A. 胀痛 B. 酸痛 C. 游走性疼痛
D. 放射性疼痛 E. 直接与间接压痛
6. 对骨伤科来说，望诊之首要是（ ）
A. 望肿胀 B. 望畸形 C. 望形态
D. 望神色 E. 望创口
7. 腰椎活动正常范围是（ ）
A. 前屈90°；后伸30°；左右侧屈各20°~30°；左右旋转各30°
B. 前屈30°；后伸30°；左右侧屈各70°~80°；左右旋转各30°
C. 前屈90°；后伸30°；左右侧屈各20°~30°；左右旋转各80°
D. 前屈90°；后伸80°；左右侧屈各20°~30°；左右旋转各30°
E. 前屈30°；后伸30°；左右侧屈各20°~30°；左右旋转各30°
8. 下列骨折中，不属于完全骨折的是（ ）
A. 横断骨折 B. 嵌插骨折 C. 青枝骨折