

第九冊

產科發蒙

產論

產論翼

中國兒科醫鑑

幼科證治大全

痘科辨要



陳存仁編校

皇漢醫學叢書

片倉元周著

產科發蒙

世界書局印行

產科發蒙

提

要

鶴陵深甫先生。既好讀書。又善治術。長文筆。精著述。遐邇咸奉爲師範也。本書爲先生名著之一。博採古今言論。附以己所經驗。發前人之秘。啓後人之蒙。彙集成編。題曰產科發蒙。以補產論之未備也。蓋先生初學於賀川氏。受產論而歸。積二十餘年之精攷深思。得胎產治術之要領祕法。可謂善悟產論奧旨。開發餘蘊者矣。全書一帙。釐爲六卷。首述妊娠之胎辦。與胎前諸病。次詳臨蓐之難易。與產後雜證。末舉治例三十四案。與治形五十八圖。並錄驗方。以資參考。全書正疑補闕。功足羽翼產論。而嘉惠後世。誠胎產之金科玉律。

產科發蒙序

治產外科成矣。其書爲相山鶴陵先生深甫氏所著。蓋博取古今善說。附以己治驗。定爲此編。以補產論不備云。先生初學賀川翁所。受產論而歸。卽誦讀前後二十年。頗極精微。出而爲人解難。乃生子呱呱而泣矣。百無一失。其名藉藉然起焉。今之言產者。皆折衷深甫氏也。予雖未睹產論。而今得視此書。則思過半矣。唐有孫真人。志在濟世。嘗列其方於華表石上。豎之鑑山之下。漆沮合流路隅。使人覽且抄也。今夫深甫氏之仁於民乎。功豈在真人之下哉。荀卿有言曰。青出於藍。青于藍信然矣。是爲序。

享和三年歲次癸亥中秋前五日題于崎陽客館之環翠樓中。吳超程赤城。

產科發蒙序

婦人生產生生不絕者。天地自然之理。而非疾病則其不須藥餌也固矣。然將養失常。胎教乖方。則孕中之諸證。臨產之倒橫。產後之衆疾。變化百端。不可悉極。是以顛科者。救護之術。治法之要。二者相須若車兩輪。豈可不精練研究哉。若治法救護不得其法。則子母之命懸焉。實可畏也。夫陳自明婦人大全良方。咎殷產寶方。陳治道保產萬全書。陳朝階癸囊便方。湯居士保產機要。高賓便產須知。王化貞產鑑。何鍾台達生編等諸書。皆

是專門。而雖非方論不備。至于救護術。則僅僅無幾。後人無所宗法焉。余得賀川氏之書。見其術之精詳。而嘆發前哲所未發。後游其門。愈信其術之有神驗矣。乃服事其教二十餘年。起死回生之效。不可勝紀也。其閱歷之久。周之不敏。亦有稍稍所發明。因蒐集既驗者。以成編。題曰產科發蒙。雖然。不過正其疑似。而詳其未詳也。後之君子。幸以賀川氏書爲綱。以此書爲目。而施諸治法。則益見賀川氏之功之不少矣。

寬政乙卯歲陳月上元鶴陵居士片倉元周撰并書。

產科發蒙目錄

卷一

胎子位置形狀論第一	一
辨駢胎位置第二	六
攀胎一胞辨第三	六
一產二子命呼第四	八
辨孿子兄弟第五	八
產前產後諸症發明二十五則第六醫案	九
一條附	九
惡阻治法第七	一三
清膈飲 集驗橘皮湯 產經竹茹湯	一三
乾薑人參半夏湯 醫方筆記治惡	一三
阻一方 半夏茯苓湯 小品茯苓丸	一三
紅圓子 蘆橘薑橫湯 二香散	一三
加減七氣湯 左金丸 生薑瀉心湯	一三
烏梅圓	一三
妊娠吐血第八	一八
清血湯 三聖散 甘草乾薑湯 養	一八

中飲 川芎三黃湯 加減鷄蘇散
柔脾湯 四生丸 麥門冬飲子 必
勝散

妊娠鼻衄第九

伏龍肝散 遠志散 蓬砂散 胡粉

散 四黃煎 人參飲子 芎歸百草

飲 飲 飲

飲 飲 飲

妊娠胸滿第十

厚朴生薑甘草半夏人參湯 清化湯

小半夏加茯苓湯 茯苓桂枝白朮

甘草湯 旋覆花湯 紫蘇飲 氣鬱

湯 湯 湯

湯 湯 湯

卷二

妊娠欬嗽第十一

潤肺湯 小青龍湯 東隣飲 百合

散 濟生百合散 山查飲 百花散

子癰第二

子癰第二

葛根湯 蘇合香圓 單兵散 鐵砂

三黃湯 妙功救命散 柴胡鐵鏽湯

雙神元 解毒雄黃圓

妊娠過期不產第三.....三〇

虞搏經驗方 武之望經驗方

妊娠頓仆失踞胎動第四.....三〇

大阿膠湯 和榮湯 蟹爪湯

妊娠嘔吐第五.....三一

半附理中湯 二生湯 驢耳飲 消

導湯 旋覆半夏湯 四聖飲

妊娠小便不利第六.....三三

腎氣丸 開閉術 開腠煎 冬葵子

散 澤瀉湯

妊娠脬腫第七.....三四

木通散 防己散 雙全散 全生白

朮散 分心氣飲 澤瀉散

妊娠腹內鍾鳴第八.....三六

半產第九治驗一遺附.....三六

救生湯 益母飲大黃牡丹湯 桂枝

茯苓當歸湯 還元煎

妊娠淋疾第十.....三八

地膚大黃湯 葵子蜀黍湯 芡苢湯

妊娠澹泄第十一治驗一遺附.....三九

真武湯 治中湯 胃苓湯 九物飲

內消散 四神丸 茱萸斷下丸

妊娠痢疾第十二.....四二

五味蕩滯飲 七味蕩滯飲 八味蕩

滯飲 四寶丹 盲腸煎 益榮蕩滯

飲 逆挽湯 葛根湯 桂附理中湯

大斷下圓 如神丸 黃連厚朴湯

藥蒜丸

臟燥第十三.....四六

淡竹茹湯 震靈散

妊娠數墮胎第十四.....四六

補天手飲 黃耆散 白朮圓 山藥

丸 加味四物湯 千金保孕湯 大

黃芪苓丸 應效丹

妊娠心腹腰痛第十五.....四八

胎前後心痛方 茯苓厚朴湯 白朮

湯 當歸芍藥散 茱萸當歸湯 草

豆蔻散 當歸散 杜仲散 秘方鹿

角散 阿膠散

妊娠誤服毒藥傷動胎氣第十六.....五一

奪命圖

卷二

鎮帶辨第一.....五三

新定難產八因辨第二.....五四

產要第三.....五六

臨產第四.....五七

芎歸加桂湯 清心湯 安榮湯 加

味芎歸湯 黑神散 妙功散 雲母

散 四逆加人參 見龍散

產後第五.....六一

愈風散 行瘀煎 理中湯 芎歸理

中湯 雙烏散 桂枝調血飲 熟料

五積散 二味參蘇飲 平胃加桂枝

生薑湯 內補建中湯

產後血暈第六.....六七

聖惠牛膝散 獨行散 參熊丸 扶

陽飲 清魂湯 桃花散

胞衣不下第七.....六九

含陽散 千金牛膝湯 脫花煎 盤

珠煎 健捷散 桂芎當歸散 妙乙

齋試驗方 治胞衣不下單方三首

產後顛狂第八.....七四

鐵砂牡蠣湯 三黃硃砂煎 抱膽丸

加味八珍湯

卷四

產後效嗽第一.....七五

丹參湯 二母散 瓜蒌湯 旋覆花

湯

產後寒戰交牙第二.....七八

附子湯 人參湯 奪命散

產後崩漏第三.....七九

膠艾湯 惜紅煎 獨勦散 瑞蓮散

產後兒枕痛第四.....八〇

永類延胡索散 熊氏延胡索湯 四

物加大黃湯 加味建中湯 加味通

氣湯

產後發熱第五……………八一

七味益母飲 製尿瓦法

產後飽悶第六……………八二

九聖飲 白丸子 指迷七氣湯

產後乳結痛第七……………八三

麥芽煎 玉露散

產後語言錯亂第八……………八四

黑龍丹 失笑散

產後嘔吐第九……………八四

半夏竹茹湯

產後淋疾第十……………八五

開閉煎 滑石散 石葦湯 緩痊煎

五聖飲 潤下飲

產後腫滿第十一……………八七

藁吾飲 紫葳蘇木湯 澤蘭湯 禹

翼湯 禹續湯 茯苓湯 集香湯

分心氣飲 琥珀湯 加味腎氣丸

加味六皮煎

產後玉門不開第十二……………九〇

石灰湯 治玉門不開方 治陰戶突

出方 治子宮墜出戶外經驗方

產後口舌病第十三……………九一

當歸飲 間碧散 加味導痰湯

產後煩渴第十四……………九二

集驗括樓湯 聖惠白散丸

產後自汗盜汗第十五……………九三

經驗黃芪湯 黃耆建中湯 參附耆

蠟湯

產後脇下疼痛第十六……………九四

豁脇湯 枳殼養散 當歸柴胡湯

柴胡疎肝散 補肝散 檳榔湯

產後大便閉結第十七……………九五

調道飲 桃核承氣湯

產後下利第十八……………九六

芍藥香附湯 茯苓建中湯 當歸湯

調中湯 神效參香散

產後遺尿第十九.....九七

鹿麝飲 喬一方 桑螵蛸散

產後腹脹第二十.....九八

抵聖湯 忍冬飲

產後痿躄第二十一.....九九

健脚煎 續斷丸 思仙續斷圓

產後陰門腫痛第二十二.....一〇〇

枳殼散 收傷油 六味熏洗方 失

痛散

產後乳汁少第二十三.....一〇一

通乳煎 木通丸 胡桃散 玄素散

通乳瓢畜飲

產後目疾第二十四.....一〇二

熟地黃湯 四物補肝湯 四製香附

丸 芎藭湯 掃紅煎

產後暮勞第二十五.....一〇四

人參鱉甲散 三合散 加味四物湯

懷熟地湯 新定補元煎 崔氏竹

葉飲 經效黃芪湯 麻黃根散 新

定龍骨散

卷五

治驗三十四道.....一〇九

臨產腰腹疼痛而不娩.....一〇九

產後喘息煩悶身若燔炭二.....一〇〇

臨產七日不達三.....一〇〇

臨盆九日不產四.....一〇〇

臨產子露半身而不出五有發明.....一一一

兒頭顱腫不出六.....一二二

子癰七.....一二四

子癰八.....一二四

產後浮腫九.....一五

產後左腳獨腫十.....一六

半產似溫病十一.....一六

產後口中糜爛十二.....一六

妻娠孕五月患傷寒墮胎十三.....一七

妊已三月用坐藥半產十四有發明.....一八

胎漏至彌月免死胎十五.....一八

懷孕十五個月而產十六	一一九
產後小水不禁十七	一二一
產後精神昏迷小腹有一氣起時升心	一二一
下十八	一二一
臨產子露手膊一醫切去之不出十九	一二二
孕婦五月患痢嘔吐頭痛發熱二十	一二三
妊娠九月產門下血二十一	一二三
臨盆橫生二十二	一二四
坐產二十三	一二四
懷孕小便滴瀝又產後盜汗寸口虛數	一二五
二十四	一二五
產死胎後胞衣不下二十五	一二六
產後浮腫大便泄瀉二十六	一二七
臨產兒頭纔出體不能出二十七	一二七
小產後經血不止二十八	一二八
妊娠周身腫滿二十九	一二八
產後遍身腫滿不能起三十	一二九
隱疾三十一	一三〇
臨產暈厥三十二	一三一

產後錯語飲食却如無事人三十三	一二二
產後腫滿欬嗽三十四	一二二

卷上八

未成形墮胎圖	一三三
六月墮胎圖	一三三
懷孕三月墮胎圖	一三四
囊兒生下膈膜觀全形圖	一三四
正孕圖	一三五
逆孕圖	一三六
兩胎一胞雙首向下圖	一三七
駢胎一胞一順一逆圖	一三八
駢胎各胞雙順圖	一三九
駢胎各胞一順一逆圖	一四〇
逆產兒頭額睡露全體而頭獨不出圖	一四一
子露半身因尿脬填滿下身不能出圖	一四一
產後尿脬填滿胞衣不下圖	一四二
臨產臍帶將絆頸圖	一四三
胞衣表裏圖二道	一四四
子宮前面後面胞衣圖十一道	一四五

人鏡經胎元圖二道	一四八
英機黎國救難產圖二道	一四九
一蘭書載剝胞衣見筋絡圖	一五〇
又臍帶絆頭項圖	一五〇
啞蘭醫牒分的兒易難諸產圖二十七道	一五一
附錄	
產前後經驗方	一六五

赤白帶下	一六六
經閉血瘀	一六九
崩漏	一七〇
乳癰 乳結	一七二
乳巖	一七四
陰瘡 陰腫	一七六
曲頭管圖式	一七八

產科發蒙卷一

相州片倉元周深甫著

紀州谷井敬英世昌
門人土州源周碩博卿
相州伊達周禎子祥

全校

胎子位置形狀論第一

余壯歲西游子玄先生之門。學產科術。蓋其術皆出於親試獨得。而診訣占候。實精詳鍛鍊。是以其施治。皆莫不有神驗也。可謂能究產蓐微奧矣。余乃覃思研精。晝夜不輟。於是不出百日。而得入其室矣。及還東都。再取其所著產論及翼等書。沉潛反覆而讀之。論中有謂。大抵五月之後。腹中胎大如瓜。必背面而倒首。其頂當橫骨上際而居焉。其胞衣則蓋于胎之尻上。而當母鳩尾之下。至臨月按之。可得別其體貌而盡矣。又曰。自其背而探之。其左右足膝皆張而旁出。則應是其面作箕服或結跌也。如其手膊則並展其臂。而常自依脇旁。則未嘗縮手足也。云云。又閱產論翼。載背面倒首。而皮膜裹胎。其胞衣則見附蒂於上。而蓋尻上。其莖則從膜上垂下。過脊背越左肩。向腹部之圖。予嘗依其論與圖。而沉思默想者。不啻累月積年。未能攻究其胞莖之貫皮膜而至臍之處。在何地而爲何狀也。疑之久之。頃歲城南山下門外。笹井某妻。妊娠方期月。忽腹疼腰痛。於是人定速余治診。即便往。發劑飲之。而拊摩其腹。則蹲循之際。兒便產下。而無

啼聲。乳咽抱起看時。亦無手足面目。唯蠢乎微動。乃以爲怪物。將裹草棄之。余細檢之。隔膜纔見兒頭。面手足。謂曰此囊兒也。因就熟視之。胞衣在腹部而其形橢。上至領下。下逮臍下。而胞衣四邊薄皮引出以包裹胎。視之如雲母屏中物。兒在其內。屈臂握手。以魚腹印耳下。其形似邦俗取膏盲穴之狀。又踞兩膝。而膝頭僅過乳上。膝外廉與臍內廉相齧。猶人登圓狀。臍帶則自左手與胸旁之間。蟠屈而出二寸許。斜至肩。余卽執小刀剖領下膜。也。男子則白膜縮蹙歸于胞四邊矣。急含少水。以噴兒面。始揚聲啼叫。衆皆稱天幸哉。余取胞衣置于油單紙上。以攤視之。其形圓匾。徑六寸許。其外面則中央最厚。至邊而漸薄。高低出沒。皺皮錯交。其色紫紅綠黑。混然相雜。而不甚濃。又往往有紫黑濃斑點。反覆視其裏面則有文理筋絡。宛乎似荷葉裏面。其色紫碧黑。比表面則稍淡。筋絡則青與白交加參錯。其胞莖則如無名指大。而若人工撚作者然。又類於繩索。其色不異筋絡。按胞莖始出。其色灰白色。既而過一二時。變爲青白參錯。莖中有三孔相通。余以爲一以輸氣。一以注血。一反氣血者也。是亦若人有咽與喉。而氣穀道各異者歟。未可知也。皮膜之形。如歷製海蛇。其色淡黃也。近入街墻。葺屋匠妻。年二十七。彌月而產囊兒。也。女子亦復如是。其所異者。肚帶紆曲在于右腰間而已。於是乎始悟子宮者。蓋附着于腎腸前面。而爲一界郭。而兒在於其中也。背面倒首而屈手足。其領着缺盆骨上。而面與膝頭相聚。若自窺臍者。其形蟠縮一團。若煮蝦魚然。胞衣則對兒腹。皮膜自生裹胎。其胞蓋當子宮中後面而粘

着。母之血氣，繇是先入胞內，乃散布於文理筋絡。自文理筋絡達于胞帶中之隙孔，而至臍中，以將養於兒者無疑。故知彌月將產，而陣痛頻至，入腰腰體之邊幾摧，而周身灼熱，漿漿汗出者，此胞衣着母體之處，將離脫之勢爾。以此推之，則如龐安常云：兒出胞而誤執母腸胃，故隔腹鍼兒虎口。于法開云：使積日不脫之婦，食羊十餘臍而針是，則須臾羊臍音聊脂裹兒出。盛起東云：將分娩，但子抱母心，因便針之之類。雖後之醫家稱譽其明診，以載于書籍，豈足可信哉？儒門事親云：醫者不察孕，加燔針於臍兩旁，方不數月生一女子，兩目下各有燔針痕。又太平聖惠和劑局方：婦人良方等書，所載催生丹方後云：服一丸，卽時產。隨男左女右，手中握出，是亦虛言空論，殆惑來學，皆刪去而可也。夫子宮者，自是腸胃外，固圖一界郭爾，必非有孔竅而通于腸胃者矣。子在其中也，胞與膜裹之，無一點孔竅。其胞附着子宮而受養，乘其將分娩之勢，而皮膜自破，漿水迸出，然後兒出門矣。奚有執母腸抱母心，羊臍裹兒，手握藥出，兩目下有燔針痕等事邪？不但此也。魏志所載：華佗診甘陵相夫人有娠，使人手摸知所在，在右則女，在左則男。人云在左，於是爲湯下之。果下男形之類。試之今日，無有的確，是皆後人信筆增奇者而已。曷足爲法乎？古人妄誕往往有此類學者，不可不擇也。頃又覽明錢雷人鏡經附錄，載男女胎元圖說云：精勝其血，自左子宮受氣而男形成，精不勝血，自右子宮受氣而女形成。又曰：男負陽而抱陰，故頭東而足西；女負陰而抱陽，故頭西而足東。頭與手足

蟠行一團如卵黃然。其漿水如卵白也。又曰。胞帶起於兩腎中間。着脊而生。有一系係于兒臍。懸兒於胞中。此通母之血氣遺蔭之道路也。云云。而其胎元圖。作低頭踉蹌腰背。屈曲兩足。男首向左。女首向右。仰而橫臥者。此皆本十九難所謂男子生於寅。女子生於申之義。而設圖說者耳。雖似可憑。至其以子宮爲二。男女頭足異乎東西。懸兒於胞中。仰而橫臥。則臆度亦甚。近閱蘭醫牒分的兒產科書。載易產難產圖。總二十有三。而其胞衣有戴於頭頂者。有蓋於尻上者。又有負于背藉于臀。插于兩股間者。且其胎形狀。則有橫生。倒生。肚帶攀其肩也。偏產。見額角也。橫後。頭之後骨偏挂谷道兒即露額也。及領挂橫骨而出雙手。或一足已出。而胞帶將出。或肩臨子戶而出帶。或俟兩腳於面前。臀向人門而露一手。或臀出其半而不能達。或腹向產戶而出胞帶。或與上形同而不露帶。或背脊向子宮口。或肚帶纏頸而四肢將出。或兩足與一手已出子門。或駢屈兩膝而將出。又雙胎。一則仰臥。一則跨其上而露其臍帶。又正產仰出者。伏出者。礙橫骨者。拄肛門者。向腰左右者等之異。其他形狀不能備錄。而胞衣之所在不一者。彼以爲子宮有欹側正直之殊也。然不載胞之對腹者。則彼未睹囊兒乎。其圖說雖似詳。或出臆見者十過其半。嗟乎。萬古以來。不論華夷。凡醫家於懷孕圖說。泛濫懵懂。紛紛不一者。皆由不觀真囊兒。故未有一人能爲的當之說者也。夫蘭人雖言事出其實。豈能如殷紂剖孕婦腹而視之乎哉。故其所圖。不可信據也。夫吾子玄先生於產科一技。終身用意刻苦。是以其術超邁于古今。如