植物學大辭典

一畫

一丈紅 Althaea rosea, Cav. タチアフヒ。ハナアフヒ。

一丈紅卽蜀葵也名見草木記註詳蜀葵。

一本芒 Cladium mariscus, R. Br. ヒトモトススキ。

莎草科。一本芒屬名見日本理科大學植物標品目錄。

一帆青 Aspidistra elatior, Bl. バラン。バラン。

一帆青卽蜘蛛抱蛋也名見質問本草詳蜘蛛抱蛋註。

一年根 Annual root.

亦曰一年生根。卽一年植物之根也。參看一年植物註。

一年植物 Annual plant.

亦曰一年生植物。此植物自種子萌發之時期。至開花結實而枯死。不逾一年者也。一年植物之根。曰一年根。概小而歧出。至生花結實。則根中營養物質。悉被吸收。以致全體枯死。草本植物。殆皆如是。

一位 Taxus cuspidata, S. et Z. イチヰ。

一位卽紫杉也。日本名註詳紫杉。

一束雄蕊 Monodelphous stamen. *Monodelphischer Staubfaden.*

一曰單體雄蕊。詳見該條。

一枝黃花 Solidago Virga-aurea, L. アキノキリンサウ。アワダチサウ。

菊科。一枝黃花屬。生於山野。多年生草本。每春自舊根出苗。高至二三尺。莖細而強。其色紫黑。葉卵形或橢圓形。或披針形而尖。有明

一枝黃花

顯之細脈。秋末莖梢開花。呈黃色。亦有白色者。頭狀花序。外圍之花。舌狀花冠。中部之花。筒狀花冠。其各花序形小。攢簇而生。如穗狀。果實有冠毛。能隨風飛散。在昔時。取其枝之有花者。用以治腎臟病膀胱病等。名見植物名實圖考。謂江西山坡極多。獨莖直上。高尺許。間有歧出者。葉如柳葉而寬。秋開黃花。如單瓣寒菊而小。花枝俱發。茸密無隙。望之如穗。土人以洗腫毒。日本一名「秋麒麟草」。

一枝箭 Lycoris radiata, Herb. マンジュシャゲ。ヒガンバナ。シタマガリ。テンガイバナ。

一枝箭。卽石蒜。名見本草綱目。李時珍曰。箭以莖狀名也。詳見石蒜。

一花鹿蹄草 Pirola uniflora, L. イチゲイチヤクサウ。

鹿蹄草科。鹿蹄草屬。爲鹿蹄草之一種。花單生於花梗之頂上。與鹿蹄草之排列爲總狀者異。故得是名。參看鹿蹄草條。

一品紅 Euphorbia pulcherrima, Willd. シャウジャウボク。

大戟科。大戟屬。木本。培養於溫室中。熱帶產者頗肥大。莖梢之葉。呈鮮紅色。如花瓣樣。葉間攢簇小花。雄花祇有一雄蕊。雌花祇有一雌蕊。數花間。看生蜜槽。淡黃色。作小盃狀。此蜜槽與紅葉。俱所以招致昆蟲。使爲授粉之媒介者也。一品紅爲我國俗稱。日本或名「猩猩木」。

一家植物 Monoecious plant. *Monoïsche Pflanze.*

一花之中。具有雌蕊及雄蕊者。曰兩性花。其僅有雌蕊者。曰雌花。僅有雄蕊者。曰雄花。皆謂之單性花。單性花中。雌花與雄花同在一株者。曰雌雄同株。雌雄同株之花。稱爲一家花。如栗、蓖麻、榛、棚、松、皆一家花植物也。若雌花雄花不在同株者。曰雌雄別株。此種花卽稱爲二家花。

一捻紅 Thea japonica, Nois. ツバキ。ヤブツバキ。

一捻紅 卽山茶名見本草綱目註詳山茶

一華草 Anemone nikoensis, Maxim. イチゲサウ。

一華草卽雙瓶梅也日本名註詳雙瓶梅

一葉 Aspidistra elatior, Bl. イラン。バラン。

一葉卽蜘蛛抱蛋也名見琉球國志略註詳蜘蛛抱蛋

一葉田子 Chionanthus retusa, Lindl. et Paxt. ヒトツバタゴ。

木犀科一葉田子屬名見日本理科大學植物標品目錄。

一葉豆 Hardenbergia monophylla, Benth. ヒトツバマメ。

荳科一葉豆屬名見日本理科大學植物標品目錄。

一葉苔 Riccia natans. イテフモ。

地錢族浮苔科之一種也常漂浮水面亦生於陸地其生於水者葉狀體爲心臟形下面生許多紫色帶狀之鱗片水退則漸變其形狀爲扁平而有裂之體其餘生態詳浮苔科條下

一葉萩 Flueggea Japonica, Muell. Arg. ヒトツバハギ。

大戟科一葉萩屬自生於山野之落葉灌木幹高達四五尺葉卵圓形而尖有細微鋸齒其狀如萩之小葉一枚夏日葉腋多簇生短梗花色淡黃花後結圓形果實每三枚聚爲一團中藏種子六粒雌雄異株

一葉萩屬 Flueggea, Willd.

爲大戟科之一屬其特徵與葉下珠屬相類似花皆單性葉不大而其差異如左

雄花具不完全之雌蘊雄蘊通常有五個蘂爲小木本……一葉萩屬

雄花不具雌蘊雄蘊通常有三個蘂爲草本或爲木本……葉下珠屬

一葉蘭 Orchis cyclochila, Maxim. イチエフラン。

蘭科一葉蘭屬生於高山之多年生草蘂高三四寸自

根際出一廣橢圓形之葉六七月間莖頂開一花淡紫色而帶褐色上方之花瓣表面略帶綠色有紅斑紋

一輪草 Anemone nikoensis, Maxim. イチリンサウ。

一輪草卽雙瓶梅也日本名註詳雙瓶梅

一藥草 Pirola elliptica, Nutt. イチヤクサウ。

一藥草卽鹿蹄草也日本名註詳鹿蹄草

乙斯蘭土苔 Cetraria islandica, Ach. イスランドゴケ。エーランタイ。

地衣類產於高山多年生隱花植物如木狀其植物體灰白色略帶綠色扁平分枝枝之緣邊有許多毛狀突起此植物用爲滋養藥或供食用乙斯蘭土苔乃日本之俗名也一名「依蘭苔」

二畫

丁子 Jambosa caryophyllus, Ndz. チヤウジ。
丁子卽丁香也註詳丁香。

丁子香 Jambosa caryophyllus, Ndz. チヤウジ。
丁子香卽丁香也名見嘉祐本草註詳丁香。

丁子草 Ansonia elliptica, R. et S. チヤウジサウ。
丁子草卽水甘草也日本名註詳水甘草。

丁子菊 Mallotopus japonicus, Fr. et Sav. チヤウジギク。
菊科丁子菊屬名見日本理科大學植物標品目錄。

丁子蔘 Ludwigia prostrata, Roxb. チヤウジタデ。
丁子蔘卽丁香蔘也名見日本理科大學植物標品目錄註詳丁香蔘。

丁字樣葯 Versatile anther.
葯之中央部着生於花絲之頂端者謂之丁字樣葯例如稻麥等是。

丁香 Jambosa Caryophyllus, Ndz. チヤウジ。
桃金孃科產於熱帶地方常綠木本高至二十尺餘葉對生長橢圓形而尖全邊花常數花聚生花瓣淡紅色。

此植物之花芽爲芳香性之調味藥又將花芽蒸餾之製揮發油謂之丁香油用以治齒痛或有用此芳香以附着於他物者名見開寶本草又有『丁子香』『雞舌香』等名陳藏器曰雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者爲雞舌擊破有順理而解爲兩向如雞舌故名乃是母丁香也日本名「丁子」

丁香柿 Diospyros lotus, L. シナノガキ。マメガキ。サハガキ。

丁香柿卽君遷子也名見日用本草註詳君遷子。

丁香茄兒 Calonyction speciosum, Choisy. Var. Muricatum Choisy. (Ipomaea bona box, L.) ハリアサガホ。タウアサガホ。

丁香茄兒卽天茄兒也名見救荒本草註詳天茄兒。

丁香蓼 Ludwigia prostrata, Roxb. チヤウジタデ。タコボウ。

柳葉菜科丁香蓼屬生於田沼等水邊之草本莖高二尺許多分枝互生細長之葉無鋸齒夏秋之際葉腋開一二小花黃色花後結一寸餘之蒴果至秋季莖葉皆變紅色或作「丁子蓼」

丁香蓼屬 Ludwigia, L.

爲柳葉菜科之一屬其特徵與水龍屬相類似皆爲水生草本花整齊而其差異如左。

花瓣四個至六個雄蕊八個至十二個：水龍屬

花瓣三個至六個雄蕊亦三個至六個……丁香蓼屬

丁香蹶躅 Tsusiophyllum Tanakae, Maxim. チヤウジツツジ。ハコネコメツツジ。

石南科米躅躅屬自生於山上之小灌木米躅躅之特別種也枝與葉皆對生小枝有黑褐色之毛葉爲小倒卵形又橢圓形其質厚全邊殆無柄七月葉腋開筒狀花殆無梗花色白花冠之筒部較米躅躅細長其裂片甚小。

丁歷 Draba nemorosa, L. Var. hebecarpa, Ledeb. イヌナヅナ。

丁歷卽葶藶也名見名醫別錄註詳葶藶。

七姊妹 Rosa multiflora, Thunb. Var. platyphylla, Red. ボサツイバラ。

七姊妹卽十姊妹也名見植物名實圖考註詳十姊妹。

七度竈 Pirus aucuparia, Gaertn. Var. japonica, Maxim ナナカマド。

薔薇科梨屬常自生於山地之落葉喬木也高有達於二三丈者葉互生爲奇數羽狀複葉小葉爲長卵形有五六雙其緣邊有細銳之鋸齒五六月間開花攢簇繁多爲聚繖花序花形小白色果實熟而呈紅色此材難燃七度入竈燒之尙不能成炭故得此名。

七星草 Polypodium hastatum, Thunb. ウラボシ。ミツテウラボシ。

七星草卽金星草也名見本草綱目註詳金星草。

七重草 Primula japonica, A. Gr. クリンサウ。

櫻草科櫻草屬生於山中之溼地多年生草本似櫻草而較大高至二三尺葉大長橢圓形長六七寸上面深綠色下面淡綠色根生春月葉間抽莖頂上數花輪生上下凡成數層花有長花梗合瓣花冠五裂筒部長紅色雌雄蘂隱存於筒內其構造亦與櫻草之花相類此植物供觀賞之用花色不一又有鮮紅淡紅斑點白色紫色等但其汁液有刺激性以之塗於皮膚上則生瘡腫云此係日本名又作「九輪草」或謂七重草卽旌節花見羣芳譜但旌節花學名爲 Stachyurus praecox, S. et Z. 與此不同。

七島藺 Cyprus tegetiformis, Roxb. シチタウ非。

七島藺卽莞草也日本名註詳莞草。

七葉樹 Aesculus turbinata, Bl. トチノキ。

七葉樹科(亦作無患子科)七葉樹屬生于山地爲落葉喬木高至四五十尺葉對生掌狀複葉多自七小葉

而成。亦有五小葉者。小葉形大。初夏枝梢成穗開花。有稍不整齊之花瓣四。白黃色。帶有淡紅色。蕚五裂。雄蕊七枚。較花瓣爲長。果實爲裂果。如球狀。含大種子。約寸餘。在秋末成熟時。則裂開而散出。木材細密。黃白色。供器具之料。老幹之材。有皺紋。殊美觀。種子供食用。名見鎭江府志。日本名「橡」

七葉樹科 Hippocastanaceae.

爲雙子葉植物中離瓣植物之一科。多產于亞美二洲之温帶地方。爲木本。有生有用之木材及種子者最著者一屬。卽七葉樹屬也。其特徵與槭樹科相類似。子房有二室或三室。每室內有一個或二個胚珠。而其差異如左。

葉爲單葉。或爲三小葉所成之掌狀複葉。果實爲翅果……槭樹科

葉爲七小葉內外所成之掌狀複葉。果實爲蒴果……七葉樹科

七葉樹屬 Aesculus, L.

爲七葉樹科之一屬。其特徵與七葉樹科同。

七變花 Hydrangea hortensia, DC. Var. Azisai, A. Gr. アヂサヰ。

七變花。卽八仙花也。日本名。註詳八仙花。

九子羊 Apios fortunei, Maxim. ホド。ホドイモ。

九子羊。卽土圞兒也。名見植物名實圖考。注詳土圞兒條。

九年母 Citrus aurantium, L. クネンボ。

九年母。卽香橙也。日本名。註詳香橙。

九臼 Podophyllum versipelle, Hce. キヤウ。

九臼卽鬼臼名見神農本草經詳註鬼臼

九英菘 Brassica campestris, L. カブラ。

九英菘卽蕪菁也名見食療本草註詳蕪菁

九英蔓菁 Brassica rapa L. Var. アフミカブラ。スワリカブラ。

十字花科蔓生屬乃偉大蕪菁之種類其根肥而扁圓徑尺許其味頗佳宜煮食又可醃藏糟藏或晒乾其葉莖風乾後亦可貯藏日本名「近江蕪」或「坐蕪」

九重葛 Bougainvillea spectabilis, B. Glabra. コノヘカヅラ。

紫茉莉科九重葛屬產於熱帶之蔓生類有二三種其花之外部皆有苞葉膨大呈赤紫等色極豔麗其花數亦甚多發生亦甚盛攀於大樹頂上而全蔽之開花於一面爲蔓生花卉中之最美者名見日本三好學所著之熱帶植物奇觀

九眞藤 Polygonum multiflorum, Thunb. ツルドクダミ。

九眞藤卽何首烏也名見本草綱目註詳何首烏

九階草 Veronica virginica, L. クガイサウ。

九階草卽草本威靈仙也日本名註詳草本威靈仙

九葉草 Senecio campestris, DC. クエフサウ。

九葉草卽狗舌草也日本名註詳狗舌草

九輪草 Primula japonica, A. Gr. クリンサウ。

九輪草卽七重草也日本名註詳七重草

九頭獅子草 Dichiptera japonica, Makino. ハグロサウ。

爵牀科九頭獅子草屬(日本稱葉黑草屬)生於林藪樹蔭等處之草本莖高一二尺葉長橢圓形對生全邊深綠色夏日葉腋分枝上端出二個葉狀之苞苞比萼長其間通常出一花花冠細長下部爲筒狀脣形分裂極明瞭末二脣出苞外白質而帶淡紅紫色極易脫落

雄蕊有二個名見植物名實圖考又名『接骨草』又名『土細辛』日本稱「葉黑草」又馬齒莧亦名九頭獅子草與此迥別

九頭獅子草屬 Diclíptera, Juss.

爲爵牀科之一屬其特徵與爵牀屬相類似雄蕊皆有二個花冠分裂爲唇形而其差異如左

苞比萼長被包一花或數花葯胞無小突起……

……九頭獅子草屬

無如前條之苞葯胞有小突起……爵牀屬

二列式 Distichous or Two ranked.

互生葉配列於二條直線上第一葉距第二葉百八十度第三葉更距百八十度恰在第一葉頂上第四葉亦恰在第二葉頂上如此之排置法稱爲二列式例如玉蜀黍是

二名法 *Binare Momenclater.*

植物學名用二名詞上爲屬名下爲種名例如 Pinus Densiflora.(赤松) Pinus Thunbergii.(黑松) Pinus Pentaphylla.(五鬚松) 此 Pinus 爲松屬之名而 Densiflora, Thunbergii, Pentaphylla. 各爲其種名故一見此名則三種皆爲同屬已分明矣此法爲瑞典林娜氏 Linnaeus 所創定謂之二名法亦曰「二命式」

二年根 Biennial root.

亦曰「二年生根」即二年植物之根也可參看二年植物條下

二年植物 Biennial plant.

亦曰「二年生植物」此植物初年種子萌發至翌年始開花結實遂至於枯死者也二年植物之根曰二年根於初年之終根中貯蓄多量之營養物質爲翌春生花實之資料迨此資料悉被吸收則根遂萎縮以至于枯死如萊服胡蘿蔔蕪菁等是也

二色性 *Dichroism.*

植物之葉及他綠色組織之細胞內含有綠色之顆粒

www.ertongbook.com

曰葉綠體葉綠體含有二種色素一葉綠質呈綠色一葉黃質呈黃色今取菜類或稻麥之葉新鮮者入酒精使沸熱則葉綠質溶出呈鮮綠色然於此溶液內注偏蘇恩振盪後而靜止之則上層成深綠色下層成黃色蓋上層爲偏蘇恩能溶出葉綠質而不能溶出葉黃質下層爲酒精則能溶出二種色素謂之二色性

二色桃 Prunus persica, S. et Z. Var. vulgaris, Maxim. モモ。

二色桃名見羣芳譜註詳桃。

二形花 Dimorphous flowers. *Dimorphe blüthen.*

花有長短不同之二種雌雄蘊者謂之二形花例如櫻草、蕎菜等是

二束雄蕊 Diadelphous. *Diadelphisch.*

一曰兩體雄蘊詳見該條

二命式 *Binare nomenclater.*

即二名法也見該條

二長雄蕊 Didynamous stamens. *Stamina didynama.*

即二強雄蘊也詳見該條

二家花植物 Dioecious plant. *Diozische pflanze.*

一花之中具有雌蘊及雄蘊者曰兩性花其僅有雌蘊者曰雌花僅有雄蘊者曰雄花皆謂之單性花單性花中雌花與雄花不同在一株者曰雌雄別株雌雄別株之花稱爲二家花如柳、大麻、公孫樹皆二家花植物也若雌花雄花同在一株者曰雌雄同株此種花即稱爲一家花

二強雄蕊 Didynamous stamens. *Stamina didynama.*

例如野芝麻、以及其他唇形科植物有幾雄蘊其中二蘊長二蘊短者謂之二強雄蘊

二葉葬 Oldenlandia diffusa, Roxb. アタバイグラ。

茜草科。二葉葎屬。生於田園等處之雜草也。莖高四五寸至七八寸。葉狹長。對生。春日開短梗之細花。色白而美。名見日本理科大學植物標品目錄。

二葉萩 Vicia unijuga, Al. Br. フタバハギ。

二葉萩。卽歪頭菜也。詳見歪頭菜。

二葉葵 Asarum caulescens, Miq. フタバアフヒ。

二葉葵。卽雙葉細辛也。註詳雙葉細辛。

二葉蘭 Listera cordata, R. Br. フタバラン。

蘭科。二葉蘭屬。名見日本理科大學植物標品目錄。

二輪草 Anemone flaccida, Fr. Schm. ニリンサウ。

二輪草。卽鵝掌草也。日本名。註詳鵝掌草。

人工美

卽于植物體之天然美。加以修飾。使其一部或全部之形態更發達者。謂之人工美。比天然美尤顯著。但加人工。則植物之形態色彩極奇異。而失自然之趣味。彼敗醬蘭草、桔梗等其栽植於花園內者。雖甚肥大發生。然花輪之重複。葉片之斑紋。及幹之强捩等。呈種種畸態。而其野生固有之趣味。全消滅矣。

人工匐枝 Artificial auslaufer. *Kunstliche Stolon.*

園藝家屈曲草木之枝條。俾入地下而生根出葉。成一新株。至與原株不連續。卽爲別株。以分殖良種。此卽所謂人工匐枝也。

人字草 Saxifraga cortusaefolia, S. et Z. Var. mandida, Maxim. シンジサウ。

虎耳草科。虎耳草屬。自生於山谷之宿根草本。形似大字草。惟葉之缺刻深殆如槭樹。淡綠色。有毛。夏月抽花莖。開白色小花。如人字成穗狀。是乃大字草之一種也。

人柳 Tamarix chinensis, Lour.

人柳。卽檉柳也。名見本草綱目。李時珍曰。三輔故事云。漢苑有柳如人形。號曰人柳。詳見檉柳。

人面子 Spondias dulcis Forst. ニンメンシ。

漆樹科之植物也名見本草綱目李時珍曰草木狀云出南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面可玩祝穆方輿勝覽云出廣中大如梅李春花夏實秋熟蜜煎甘酸可食其核兩邊似人面口目鼻皆具內有仁三粒此仁必經鹽醋浸過方甘美可食又其核生則白熟則色微黑點茶如梅花片光澤可愛此樹最宜沙土數歲卽婆娑偃地

人面竹 Phyllostachys aurea, Riv. ホテイチク。ゴサンチク。

禾本科苦竹屬爲園養苞木又多自生於暖國之山野。幹高丈餘根上一二尺之處每節四面參差或正或斜有凸凹無定形幹可用爲釣竿或製杖鞭傘柄等名見本草彙言日本名「布袋竹」

人面桃 Prunus persica, S. et Z. Var. vulgaris, Maxim. モモ。

人面桃名見羣芳譜註詳桃。

二畫 人

人面蘭 Cleisostoma ionosmum, Lindl. ニウメンラン。

人面蘭卽屈子花也日本名因產於日本沖繩人面山故有是名註詳屈子花。

人參 Panax ginseng, C. A. Mey. ニンジン。カノニグサ。

五加科土當歸屬(亦作人參屬)中國北部、朝鮮、及北美原產多年生草本亦有栽培於園圃間者下種至三年始着花實初年莖高三四寸生一極五葉之掌狀複葉二年二極三年三極每經一年輒增一數至四五年時莖高二尺餘根形略與人體相類頗肥大葉爲掌狀複葉類七葉樹但由五小葉而成邊有小鋸齒秋日開花花小花瓣五類五加花繖形花序至第三年卽抽花軸作花果實初青熟則色赤扁圓狀徑約一分五釐許灰白色卽蕃殖用之種子也此植物之根爲東洋各國著名藥品能回復身體及神經之疲勞且有健胃之効。

泰西醫家之說。則云此根藥用上之價值。全與甘草相同。名見本草經。又有『人蔘』『黃參』『血參』『人銜』『鬼蓋』『神草』『土精』『地精』『海腴』『皺面還丹』等名。植物名實圖考曰。人參昔時以遼東新羅所產。皆不及上黨。今以遼東吉林爲貴。新羅次之。其三姓甯古塔。亦試採。不甚多。以苗移植者爲秧參。種子者爲子參。力皆薄。黨參今係蔓生。頗似沙參苗。而根長至尺餘。俗以代人參。殊欠考覈。

人參木 Vitex negundo, L. ニンジンボク。

人參木。卽牡荊也。註詳牡荊。

人爲分類法 Artificial system. *Kunstliche system.*

總括古今之植物。探究其親緣之遠近。而定其系統。更依系統之關係。而分別科屬者。謂之系統分類法。或稱自然分類法。其僅就植物體一部之形態。如花葉果實等。以爲標準。而類別之。是不過與植物名彙之依字畫分部。以便檢索者相似。與植物之系統無關。是之謂人爲分類法。此法於千五百八十三年。意大利人始創爲之。就果實之性質。分別爲十五綱。爾後代有作者。至十八世紀之初。瑞典林娜氏始集大成。以雌雄蘂之數及位置。分顯花植物爲二十三綱。更總括無花植物爲第二十四綱。世稱「林氏二十四綱」分類頗完全。然林氏創定該式。自言決非植物界自然上之分類。不過從便宜上定之。爲日後自然分類法式之基礎而已。

人爲淘汰 Artificial selection. *Kunstliche Zucht-*

wahl.

植物各有一定之特徵。該特徵遺傳於子孫。永久不變。然往往有新特徵現出。例如培養一種植物於同一地面。其中花葉之形色大小。莖之長短。枝之分歧。果實種子之性質等。不免稍有差異。此皆因該植物體之漸次變化也。若選拔此變化者。植於他處。俾其自花受精而結實。蒔其種子。則幼植物變化之度。必更增進。更幾回選拔。保護其變化者。除去其不變化者。則該新特徵發達而能遺傳於種子。遂成一培養變種。此選拔培養法。名曰人爲淘汰。

人銜 Panax ginseng, C. A. Mey. ニンシン。カノニゲグサ。

人銜。卽人參也。名見本草經。李時珍曰。其成有階級。故名人銜。詳見人參。

人蔘 Panax ginseng, C. A. Mey. ニンシン。カノニゲグサ。

人蔘。卽人參也。名見本草綱目。李時珍曰。蔘卽浸也。年深浸漸長成者。根如人形。故名人蔘。詳見人參。

八丈草 Angelica kiusiana, Maxim. ハチヂヤウサウ。

八丈草。卽鹹草也。日本名。註詳鹹草。

八乂藻 Sargassum palens, Ag. ヤツマタモク。バラモク。

眞藻門。褐藻類。馬尾藻科。馬尾藻屬。產於沿海之種類。長自二尺以達三尺。葉之在下部者小。爲篦形。在上部者細長。爲稍不規則之分枝。葉形扁平。而有中肋狀之縱條。全部甚大。其氣胞大如豌豆。生於全葉之下部。其尖端恆有多少分枝之葉。此藻通全體爲柔軟質。

八升豆 Mucuna capitata, W. et A. ハツシヨウマメ。

八升豆。卽黎豆也。日本名。註詳黎豆。

八手 Fatsia Japonica, Dene. et Planc. ヤツデ。

八手 名見日本理科大學植物標品目錄。卽八角金盤也。註詳八角金盤。

八月春 Begonia evansiana, Andr. シウカイダウ。八月春卽秋海棠也。名見羣芳譜。註詳秋海棠。

八月珠 Fœniculum officinale, All. ウイキヤウ。クレノヲモ。八月珠卽蘹香也。名見本草綱目。註詳蘹香。

八月槿 Stauntonia hexaphylla, Dene. ムベ。トキハアケビ。八月槿卽野木瓜也。名見救荒本草。註詳野木瓜。

八仙花 Hydrangea hortensia, DC. var. Azisai, A. Gr. アヂサヰ。虎耳草科粉團屬(亦作八仙花屬)落葉亞灌木。葉橢圓形對生有鋸齒。夏月開花。聚繖花序。花有二種。一種爲正花。形小。隱於中間。又一種爲假花。在花序之外圍。有闕大之萼。頗美麗。初白次碧。終紅。能次第變色。嘗栽於庭園。爲觀賞之用。其花乾之可入藥。有解熱之効。花鏡云。八仙花卽『繡球』之類。因其一蒂八蔬。簇成一朵。故名。又

『粉團』一名繡毬。俗以爲大者爲粉團。小者爲繡毬。植物名實圖考云『錦團團』花如丁香。數百朵成簇。如繡毬。此數者形態略似。惟莖之高低。葉之大小。花序之疎密。則各不同。植物名實圖考分四種。今從之。又八仙花漳州府志作『瑪哩花』。花歷百詠作『天麻裏』。遵生八箋作『聚八仙』。日本一名「紫陽花」或「七變花」。

八仙花屬 Hydrangea, L.