

無錫顧鳴盛編

中西
合纂

驗方新編

上海文明書局發行

中西合纂 驗方新編

無錫顧鳴盛譯輯

第一章 傳染病

一 猩紅熱

病證

即疹子也。亦名疫毒痧。兩

歲至四歲之小兒。最易患之。以惡寒戰慄而始。繼則體溫忽高至三十九度以上。或四十度五分。脈搏加速。每分時有百二十至以上。肢體疲極。頭痛。喉痛。舌有白苔。一二日後。頸項。胸前。已現極細小之紅疹。漸漸融成一片。終乃遍及全身。惟兩頤及口脣間俱無之。試挑破該疹。則微有膿漿洩出。約三四日。疹子遂褪。紛紛落屑。細若糠粃。亦有大塊剝落者。如蛇蛻也。

舌則一變而爲紅。其色似覆盆子。病中有併發腎炎。心內膜炎。胸膜炎。喉痧。關節炎。中耳炎。水腫諸症者。

衛生

疹褪落屑。熱亦漸退。仍須

謹慎安臥。不可妄動。病房亦須設法通風。使常常換氣。但不宜太冷耳。病勢熾盛之時。口必大渴。可稍稍進酸性飲料。頭部施冰罨法。酸性飲料者何。即帶酸味之外國湯頭也。酸能清涼。故服之可止渴。食物惟牛乳最佳。以既係液體。且多滋養質也。其不喜牛乳者。亦祇可進其他流動物。必四

星期後。方可食飯及魚肉等。又大小便須令時常通暢。

中國經驗方

一大連翹飲 治一切痧疹時行發熱等證

連翹 瞿麥 滑石 車前子

牛蒡子 赤芍 山樞 木通

當歸 防風 黃芩 柴胡

甘草 荊芥 蟬蛻 石膏各

五分

右水二鍾。燈心二十根。煎八分服。

外國經驗方

一 稀鹽酸二瓦 糖漿二十瓦

沸水百五十瓦

右爲酸性飲料、口渴時服匙

許、

二 鹽酸規尼涅一瓦至三瓦 白

糖五瓦

右爲十包、一日二三次、每次

一包、退熱用、

三 撒曹五瓦

右爲十包、每二時服一包、至

熱退止、

一一 麻疹

病證

自春徂秋、此病皆盛、自兩

歲至六歲之小兒、患之最易、該病傳

染之力極大、其來也、體發壯熱、一似

前證、而乾咳頻頻、噴嚏流淚、則爲特異、亦有疹子、頭面發現最早、次頸項、次軀幹、次四肢、至外而皮膚、內而黏膜、以及眼瞼內面之結膜、無不瀰漫、該疹與完好之部顯分界畫、顯黯淡紅、大似芝麻、疹之中央、微隆起若小阜、是時諸部之發炎症狀、亦極熾盛、約一二日後、身熱漸爲分利之勢而減退、第三四日、疹亦陸續消滅、第五六日、紛紛落屑、第七八日、遂恢復如常矣、病中須防結膜炎、角膜炎、鼻炎、咽喉炎、喉頭炎、氣管枝及毛細氣管枝炎、中耳炎、腸炎、腎炎諸症之併發、病後易有痙攣、結核之繼來、

衛生

始終須息心靜臥、待病機

之自轉、切忌輕舉躁動、或雜劑亂投、

自貽伊戚、病房中固不宜太冷、亦不可太煖、溫度以常在攝氏表三十度上下爲佳、通風最屬緊要、室中若氣太乾燥、可燒煖爐、或火盆、上置水一面盆、俾汽水常常蒸散以潤之、又此病之炎症多劇、故病房宜暗忌明、全身均須包裹、俾肢體溫度一致、一切飲食物、宜溫忌冷、家中如有健全之孩童、切記遠避、以免傳染、服藥惟緩和劑、及緩下劑爲宜、止咳化痰藥、必咳甚方可用之、

外國經驗方

一 遠志浸(二瓦半至五瓦)一百

瓦 阿片酒二滴至五滴 糖

漿十五瓦

右一日六次、二日服完、

二 挖氏散 ○ 二瓦 一瓦十分之一 白

糖兩瓦

右研和爲散、勻分五包、一日

三次、每服一包、

三 吐根浸 (○ 三瓦) 一百瓦

阿片膏 ○ 三瓦 安母尼

亞加苗香精二十滴 糖漿二

十瓦

右每時服一食匙、

四 嗎啡 ○ 一瓦 杏仁水十

瓦

右每服五滴、一日約數次、

二 丹毒

病證

舊稱大頭瘟。病以猝然寒

戰而始。俄焉壯熱來攻。體溫升至四

惡心、嘔吐。種種證候。綿綿而來。重篤者且來讖語。皮膚受傷部之周圍。則腫痛灼熱。發斑宛若紅雲。有變成水泡者。斑疹蔓延。極爲迅速。有一日散大至二寸者。輕症。六日至十日可愈。重症。或因合併症而死。

衛生

病人自覺有異。應立即靜臥。中等者。則行冷罨法。劇甚者。須行冰罨法。至溫罨法。必俟病勢減退。方可行之。酸性飲料。爲止渴所必需。或須斟酌病情。投以下劑。傷處塗敷油類。或脂肪。或用一指寬之橡皮膏。周圍黏貼。免侵及完好之部。精神虛脫者。須飲濃珈琲。或進葡萄酒。或服樟腦。麝香等提神藥劑。

中國經驗方

一 金花散 治一切丹毒熱痛癰

赤

鬱金 黃連 黃芩各一兩

糯米三合

右爲末、每用蜜水調如泥、雞

翎掃丹上、乾即易之、

二 車前子 益母草 地膽草

右等分、爛研塗上、乾再塗之、

如無新者、只以乾者爲末、冷

水調敷、

三 搗方 治丹毒始發嫩熱浸淫

長成

升麻 芒硝 黃芩各三兩

黃連 芩薊 大黃各二兩

當歸 甘草炙 羚羊角屑各

一兩

右細劉、以水一斗三升、煮取

五升、絞去滓、鑊中內芒硝、上

火、攪令成沸、盡滓、稍分適冷

熱、貼臍、揭腫上、數過、其熱隨

手消散、

四 拔毒散 治熱毒丹腫游走不

定

生石膏 生寒水石各四兩

黃蘗 甘草各一兩

右爲細末、以新水調搗之、或

紙花子小貼、尤妙、涼水潤

之、

五 郭氏金黃散 治熱毒丹流遊

走不定疼痛不止

寒水石二兩 鬱金一對 藍

實 大黃 黃蘗 黃連 景

天各一兩

右爲細末、用雞子清調敷、水

亦得、

六 消毒犀角飲子 治斑及癰疹

諸證

牛蒡子六錢 荊芥 防風各

三錢 甘草一錢

右劉碎、水煎服、

七 酢和石灰塗之、或同青靛塗、善

治火焰丹毒、

八 赤丹、用黃瓜種中瓢水、去子、以

器貯之、用時、以水塗患處、

九 景天草真珠末各一兩、搗如泥

塗之、乾則易、此方治焰火丹毒、

從兩股兩脅起、其赤如火者、

外國經驗方

一 石炭酸 火酒各一瓦 松節

油兩瓦 甘油五瓦

右調和、每二時一次、塗發炎

部並其近旁、

二 次醋酸鉛液十瓦 汽水二百

瓦

右爲冷器料、

三 依比知呵兒 麵粉各八十瓦

蛋白兩瓦 汽水四十瓦

右爲塗擦料、名溫那氏劑、

四 列曹爾珍十瓦 豬油三十瓦

右製成軟膏、一日塗搽四次、

五 知葛瑞兒(純)五十瓦

右塗搽如前、

六 硫規一瓦 白糖兩瓦

右研和爲散、勻分五包、一日

三次、每服一包、游走性丹毒用之、

七 樟腦〇。二瓦 白糖二瓦

右研和爲散、勻分五包、每三時服一包、精神虛脫者用之、

四 瘧疾

病證

譯稱間歇熱、亦名麻拉利

亞。泰西醫家咸謂瘧之由來、實基於某種蚊之螫刺。故以卑溼地方爲多。先是病人自覺疲乏、頭痛、肢痛。全不思食。或則嘔吐。繼即惡寒、戰慄、齒震、震有聲。脈搏細數。頭面、手足、非常寒冷。口唇、爪甲、同現藍色。脣間有發水泡疹者。如是少則三十分。多則一二時而止。是謂惡寒期。惡寒期過。即發大熱。體溫升至四十、或四十一度半。

皮膚熱甚。色若絳霞。脈搏充實。呼吸疾速。頭痛欲裂。渴索水漿。脾臟腫大。如是少則三時。多則五時而止。是謂灼熱期。既而大汗淋漓。頭痛若失。體亦爽適。一二時中。體溫即復其常度。脈搏亦呈安靜狀態。遂得深入睡鄉。是謂發汗期。統計三期全經歷之時。少則六時。多倍之。過此又不思食。膚色發黃。頸椎、胸椎、隱隱作痛。此則免熱時也。依此反覆發作。距離遠近不一。有日必一作者。有間日一作者。有三日一作者。尋常所患瘧疾。大都係普通一種。症狀最輕。此外尚有四種。一曰假面性。二曰惡性。三曰弛張性。四曰惡液質。證皆較重。或死。或不治。

衛生

人既知瘧之來歷。應講求

公衆衛生。爲個人之預防。或遷居爽塏。或洩去死水。或禁遏蚊種。或懸掛蚊帳。夜勿裸臥戶外。亦不可開窗而眠。如已發瘧。速移居稍暗之室。屏絕諸般嗜慾。多著衣服。促其發汗。或頻拭皮膚。或飲葡萄酒少許。俱佳。頭痛甚者。投以寒冷之飲料。

中國經驗方

一 勝金丸 能截一切瘧

常山四兩酒浸一宿曬乾 蒼

朮泔浸曬乾 檳榔 草果各

二兩

右爲末、將浸常山餘酒、煮糊和九、梧子大、每服五十九、前一日臨臥時、溫酒送下、便臥

至當發日、雞鳴時、服七十九、
忌生冷食物、

二 牛膝煎 截瘡大效

牛膝二錢 當歸 陳皮各三錢

右用好酒一鍾、浸一宿、次早加水一鍾、煎至八分、溫服、

三 刺效餅子 治一切瘡疾

定粉 龍腦 麝香各半兩
硃砂一兩一分 荷葉 藁豆粉 炙甘草各五兩 信炙二兩半

右爲細末、煉蜜丸、每兩作二十九、捏作餅、每服一餅、新汲水磨化、每日發者、未發前服、間日發者、不發夜服、隔數日

發者、一日夜服、連日發者、凌晨服、

四 十將軍飲 治久瘡及瘡母

縮砂 檳榔 常山 草果各二兩 三稜 蓬朮 青皮 陳皮 烏梅 半夏各一兩

右先將常山、草果、酒酢各一椀、浸一宿、後入八味、同浸至晚、炭火煮乾爲末、酒酢各半打糊和丸、梧子大、白湯下三四十丸、日二服、服至八兩、卽除根、亦名老瘡丸、

外國經驗方

一 鹽規 白糖各半瓦

右研和作一包、發熱前六時頓服、以後再秤前藥兩瓦、與

白糖研和、勻分五包、每日仍於發熱前六時服一包、

二 亞砒酸加榴誤液五瓦

右一日四次、俱擇發作停歇時服之、每次服三滴至五滴、久瘡者用之、

五 赤痢

病證 亦曰滯下、是爲一種瘴氣

性病、能傳染、夏末秋初、往往流行、其重要之證候、爲頻頻如廁、一日中少者十次、多則五六十次、排便之時、腹痛如絞、裏急後重、病人輒蹙額、齧牙泄出之物、或如膠、或如膿、或則純血、量祇少許、其臭甚惡、此外則嘔吐、呃逆、食思減退、舌燥而汚、放尿極少、惟不發熱、最輕者、約六日或八日、便可

治愈。重症則須十餘日，至二十餘日。面色慘白。枯瘦脫力。脈搏細數。體溫低降。皮膚寒冷。聲音嘶啞。全身痠痛。倘變成慢性。終必羸瘦而死。故輕症必治。重症則百人中死者可二十人。慢病則百人中死者可八十人。

衛生

第一須安靜身體。就臥最佳。切忌勉強動作。強壯者。絕食二日。

一面服藥。虛弱者亦祇可食牛乳、雞蛋等無刺戟性流動物。且須溫熱者。一切米飯、麵包、肉湯等。概須嚴禁。飲料宜清開水。加入赤葡萄酒少許。煩渴嘔吐者。宜含碎冰塊。或冷開水。裏急後重。及痛甚者。腹部宜行溫罨法。病室須善流通空氣。兼十分消毒。禁他人出入。以防傳染。

中國經驗方

一 元青丸

治下痢勢惡頻併窘

痛或久不愈諸藥不能止須下之

黃連 黃蘗 大黃 甘遂

芫花酢拌炒 大戟各半兩

牽牛末二兩 輕粉二錢 青黛一兩

右爲末、水丸小豆大、初服十

丸、每服加十丸、空腹日午臨

臥三服、快利爲度、後常服十

五至二十九丸、數日後、得食、久

病未痊除者、再加取利、利後、

仍常服、以意消息、病去爲度、

後隨證止之、小兒丸如黍米

或麻子大、

二 聖餅子

治瀉痢赤白臍腹撮

痛久不愈

黃丹二錢 定粉 舶上硫黃

密陀僧各三錢 輕粉少許

右細研爲末、入白麵四錢、滴

水和如指尖大、捻作餅子、陰

乾、食前、溫漿水磨服之、大便秘

黑色爲效、

三 訶黎勒丸

治休息痢晝夜無

度諸藥不效

訶子肉五錢 椿根白皮一兩

母丁香三十粒

右爲細末、酢麵糊丸梧子大、

每服五十丸、陳米飯湯、入酢

少許、五更送下、三日三服效、

四

露宿湯 治一切痢

酸石榴皮 草果各一錢半

椿根皮二錢半 青皮二錢

杏仁十四粒 甘草一錢

右作一服、水二鍾、生薑三片、

烏梅二個、煮至一鍾、露一宿、

早晨服、

五 玄白散 治痢疾初起裏急後

重

大黃 生地黃 芍藥 當歸

檳榔 牽牛半生半炒 枳殼

莪朮 黃連各二錢

右水煎服、

外國經驗方

一 甘汞半瓦 乳糖○。三瓦

右勻分四包、先服一包、隨續

服蓖麻子油二十瓦、其後每

三時服一包、服完爲度、

二 蓖麻子油五十瓦

右先服兩食匙、如經三時久、

尙未能暢瀉、則再服一食匙、

第三日、第五日、第七日、仍須

依法照服、

三 次硝酸蒼鉛一瓦半 阿片膏

○。一五瓦 乳糖一瓦半

右研和、勻分五包、每二三時

服一包、

四 撒酸蒼鉛三瓦 單那爾並六

瓦

右分六包、一日三次、每服一

包、兩日服完、

五 單那爾並六瓦 阿片末○。

二瓦

右分六包、一日三次、每服一

包、兩日服完、

六 吐根浸(二瓦)一百五十瓦

阿片酒一瓦 亞拉毘亞謹謨

漿三十瓦

右每一二時、服一食匙、

(注意) 一二兩方、爲通利藥、自

三至六、均收斂藥、凡患痢疾、必先

得暢瀉、去其瘀積、方可收斂、若未

利而即收之、危矣、

六 霍亂

病證

西名虎列拉、卽急性胃腸

炎也、發於春末秋初之間、如胸腹受

寒、飲水惡濁、食物不慎、皆足爲致病

之源、病之發現、每在夜半、夢中驚醒、

忽然心胸苦悶、惡心嘔吐、腹中雷鳴、

繞臍作痛。遂至下瀉。瀉出之物。始係軟便。便盡瀉水。水色綠。或若泔汁。瀉猶未止。吐又續來。吐瀉交作。力乃不支。四肢厥冷。下腿拘攣。口吻奇渴。眼眶深凹。鼻梁高聳。病勢重篤者。每一小時。發至數次。壯年患之。約一日或一週時。可望停止。又二三日。可以全愈。非此。或係患最劇之霍亂。乃不可救矣。

衛生

當霍亂症流行之際。務各自加意衛生。夜臥慎弗受寒。水非煮滾。萬弗遽飲。食物亦然。瓜果生冷。嚴禁入口。患病地點。停止往來。蠅能傳病。亦須豫防。且豫服防病藥水。在患病人家。一切衣服器具。概應十分消毒。廢止一切常食。但食肉湯。雞蛋爲

宜。消化器雖有障害而不甚者。速用阿片小粉灌腸。爲設伏截襲之法。或先服甘汞等下劑。繼投阿片提神藥。腹部行溫卷法。或用湯婆子。手足諸部。則用熱水布揩拭。渴甚。可飲濃茶。藕粉等。嘔吐不止。可飲濃咖啡。或含碎冰塊。有虛脫之兆者。用種種提神藥。

中國經驗方

一 香薷散 治暑熱霍亂吐瀉腹痛

痛

香薷一兩 白扁豆五錢 厚

朴 陳皮 茯苓各三錢 黃

連二錢 甘草五分

右七味。同爲末。開水送服。

二 藿香正氣散 治腹痛吐瀉及

感受風寒暑溼不正之氣

藿香三錢 厚朴 桔梗 陳

皮 半夏 白朮各二錢 紫

蘇 白芷 大腹皮 茯苓各

一錢 甘草五分

右加薑棗煎服。

三 六和湯 治風寒暑溼霍亂

香薷 厚朴 茯苓 藿香各

四錢 半夏 縮砂 甘草

人參各一錢

右水煎服。

四 紅圓子 治傷食腹痛霍亂吐

瀉

青皮 陳皮 乾薑 三稜

莪朮 香附子各三錢 山椒

二錢

右研細末、水糊丸服、

五 不換金正氣散 一切傷寒瘟疫寒熱往來霍亂吐瀉諸症並皆治之

治之

蒼朮 厚朴 藿香 陳皮

半夏各二錢 甘草五分

右加薑棗煎服、

外國經驗方

一 稀鹽酸十瓦

右一日數次、每次取數滴、和

開水服之、名豫防霍亂藥水、

極驗、

二 甘汞一瓦 乳糖一瓦半

右研和、勻分五包、每二十分

鐘服一包、

三 芳香阿片酒 番木鱉酒 香

椒酒 精製樟腦 薄荷油各

十瓦 火酒二十瓦

右每隔一時或二三時、傾藥

二十至三十滴、和開水或酒

中服之、此即十滴藥水也、

四 阿片〇。二瓦 硝蒼半瓦

白糖五瓦

右研和、勻分十包、每一時服

一包、

五 麝香〇。三瓦 薄荷油十滴

依的兒十瓦

右調和、每時服五滴至十五

滴、虛脫者用之、

六 芥子精九十五瓦 杜松子油

五瓦

右調勻、塗兩下腿魚腹上、治

吊脚、

七 脚氣病

病證 脚氣實亦傳染病之一種。

學生、兵士、囚犯等俱易患之。壯男最多。孕婦、產婦、亦易發生。病有三種。證候各異。一曰乾性脚氣。足及下腿。疲軟無力。或如蟲行。或若麻木。又次而大腿。又次而少腹。口唇。知覺亦漸異常。下腿後部緊脹。按之發痛。膝蓋腿反射消失。故步行蹣跚。動處顛蹶。終則心跳加甚。脈來亦復頻數。病勢益進。手足癱瘓。小便減少。略動即喘。形銷骨立。二曰溼性脚氣。即水腫性脚氣。兼乾性症諸證候而益以浮腫。始於足背及下腿前面。更漸進而波及全身。三曰惡性脚氣。亦名衝心脚氣。

來時體有微熱。脈來頻數。心跳加甚。呼吸淺迫。心窩苦悶。惡心。嘔吐。小便極少。膚色青蒼。麻木益劇。不過數日。終致悶斃。三者之中。此為最險。

衛生

居處宜擇高燥之所。最忌

溼地海灘。食物宜麥飯。赤小豆。新鮮菜蔬。最忌米飯。魚肉等濃厚滋味。及糖果點心諸不消化物。惟生來虛弱。或已呈衰象者。許食牛肉。牛乳。雞蛋等滋養物。素飲酒者。速減去三分之二。不嗜者。雖一滴勿入口。入夜至九時即寢。勿遲延。臥後足勿外露。雖盛暑。必仍著長襪以寢。室內外須保持清潔。空氣尤須流通。早晨五時前即須起牀。隨散步戶外半時或一時。一切費腦力。勞筋骨之事。均宜謹避。房

事尤當切戒。一面佐以藥劑。病或可瘳也。

中國經驗方

一 七味檳榔湯 是為脚氣疏通

之劑

檳榔一錢 大黃 枳實 橘

皮各五分 桂皮 甘草 生

薑各三分

右七味水煎服

二 羌活導滯湯 治脚氣初起大

小便滯結者

羌活 獨活 當歸各二錢

防己錢半 枳實一錢 大黃

四分

右水煎服

三 加減青木香丸 治脚氣衝心

大黃一兩 大腹皮 檳榔

枳實各七分 青木香 芍藥

各六分 桂心四分

右蜜和丸服

四 沈香散 治脚氣氣急者

香附子 木瓜各二錢 甘草

一錢 檳榔末 縮砂各五分

沈香二分半 鹽少許

右七味水煎去滓溫服

五 平水丸 治脚氣腫滿水病及

下部病

商陸四兩 吳茱萸 芫花

芒硝各三兩 甘遂一兩

右糊丸或蜜丸

六 烏頭湯 專治脚氣遍身浮腫

者

商陸三錢 烏頭 檳榔 桑

白各一錢 生薑七分 大黃

三分

右六味、先以水三合煮烏頭、

至水二合、入諸藥再煎、至一

合爲度、一日服三劑、

七 松葉酒 治腳氣手足不仁或

攣急及風溼

松葉三錢 羌活 烏頭各一

錢

右三味、好酒三升、浸七晝夜、

日服一合、

八 逆衝飲 治腳氣氣急上衝心

欲死者

檳榔末二錢 生薑五分 重

便二合

右攪調頓服、

九 如神丸 治腳氣腫滿衝心氣

急不可忍者

大戟 甘草 羌花各五分

大黃三分

右同研細末、稀糊丸梧子大、

每服五分或一錢、空心薑湯

送下、宜隨虛實增減之、利水

爲佳、勿大泄下、

十 礬石五錢 芍藥 甘草各五

分

右同煎水洗脚、或加鹽少許

尤妙、或每夜以鹽擦腿膝、熱

湯溫浸趾甲、亦佳、

外國經驗方

一 硫酸苦土二十瓦 稀鹽酸一

瓦 汽水二百瓦

右一日六次、二日服完、

二 人工鹽十五瓦

右用溫開水沖服、每日清晨

頓服下、

三 硫酸苦土十瓦 純精酒石十

瓦 苦丁二瓦 汽水二百瓦

右一日六次、兩日服完、

四 毛地黃浸(二瓦)百八十瓦

醋剝四瓦 糖漿十五瓦

右一日三次、分兩日服、

五 斯篤洛仿司酒二瓦 糖漿二

十瓦 汽水百八十瓦

右一日六次、兩日服完、

六 鹽酸古加乙惶〇・一瓦 苦

扁桃水十瓦

右一日數次、每服十滴至十五滴、嘔吐者用之、

(注意) 上海沈蘭芳化驗所、現在新發明一種治腳氣之特效藥、名曰退虛精、業經實驗、效力果著、刻尙精研規定之用量用法、及對於其他諸症之功效、特披露之、爲醫界告、

八 癩病

病證 古名癘風。卽俗稱大癘瘋是也。有遺傳性。其傳染之路。大抵爲皮膚之創破面。有斑紋癩。有結節癩。有神經癩。斑紋癩者。頭面四肢臂部各處。均發現或紅或褐之斑紋。結節癩者。先發生一種結節。繼則該結節漸吸收而消散。又久之。變爲扁平之

浸潤。或崩爲淺凹之潰瘍。於是患部知覺麻木不仁。其在面部者。當各結節增大湊合之時。容貌遂一變。而如獅子。猙獰可怖。故有獅子狀貌之特名。眉毛睫毛。墮落如洗。有時且侵及黏膜。如眼瞼內面及鼻孔口內喉頭生殖器處皆是。神經癩者。先於面部發生紅斑。漸及他部。凡有紅斑處。其知覺必鈍麻。或失其觸覺痛覺。一變而麻木不仁。有時紅斑之中央變白。狀如白癩風。是曰白癩。大耳尺骨腓骨等處末梢神經。俱變肥厚。面部兩側神經。則皆麻木。筋肉瘦削。手如鷲爪。或生潰瘍。或發水泡。甚者指趾脫落。是曰截斷癩。

衛生 人患此病。惟有屏絕人慾。

遁迹深山。旣免傳染害人。亦得專心養病。飲食可一切如常。獨忌酒類。並戒暴飲暴食。其不能絕慾者。房事大忌過度。以食鹽與炭酸曹達和入浴湯。常常入浴。頗效。其他健全之人。萬不可與患癩病者接近。能遷地最佳。

中國經驗方

一 通天再造散 治大風惡疾

鬱金牛兩 大黃煨 皂角刺

黑大者炒各一兩 白牽牛半

生半炒六錢

右爲末、每服五錢、日未出時、

以無灰酒調下、

二 換肌散 治癘風久不愈或眉

毛脫落鼻梁崩壞其效如神

白花蛇 黑花蛇酒浸各三兩

地龍去土 當歸 細辛

白芷 天麻 蔓荊子 威靈

仙 荊芥穗 菊花 苦參

紫參 沙參 木賊草 白蒺

藜炒 不灰木 甘草 天門

冬去心 赤芍藥 九節菖蒲

定風草 何首烏不犯鐵

胡麻子炒 川芎 草烏頭炮

去皮脂 蒼朮 木鼈子各一

兩

右各另爲末、每服五錢、溫酒

調下、食後、

三 神仙退風丹

知母 貝母 烏梅肉 海桐

皮 金毛狗脊各等分

右研極細末、煉蜜和丸梧子

大、每日空心日中臨睡、各服

三十九、又每夜第一次睡覺

時、急於頭邊取三十九丸便服、

並用羊蹄根自然汁下、大忌

酒及房勞、及一切發風之物、

只喫淡粥一百日、皮肉漸皆

復舊、半年後、須忌房事、服藥

時、每夜專用一二勤謹人、就

病人睡處坐守、候第一次睡

覺時、便扶起吃藥一服、華宮

使親見林承務服之取效、若

不禁忌、恐無益也、

四

勝金丸 治癩病

大楓子一兩四錢 大黃 川

芎 片腦 蜈蚣石各八錢

烏蛇五錢 白蛇 藿香各四

錢 玉牛黃五分

右丸服、

五 苦參酒 治周身白點如脂如

榆莢搔之白屑落或癢或痛色白

漸展世呼白癩

苦參五斤 露蜂房五兩 蟬

皮一具

右剉碎、用水三斗、煮取一斗、

去渣、浸細麴五斤、炊黍米三

斗拌、如常醞法、酒熟、壓去糟、

每食前溫飲一小盞、

六 莽草膏 治風搔癢皮膚生瘡

癰腫疼痛

莽草一兩 當歸去蘆 芎藭

大戟去皮 川椒 附子

細辛去苗 赤芍藥 芫花

薊蘭花 薊蘭各二兩

右細剉、用酢三升、浸一宿、豬

脂三斤同煎、令附子色黃、爲

度、綿濾去渣、每塗摩病處、日

三五上、

七 加味金龍丸 治天刑病

大楓子去殼十兩 伏龍肝三

兩 芎藭 連翹 皂角刺

大黃各二兩

右丸服、當下膿血赤水、其蟲

若係紫黑色者、爲多年之病、

若係紅色者、爲近日之病、連

服數日、蟲積盡下、即停止服

藥、

外國經驗方

一 撒曹六瓦 硫苦二十瓦 薄

荷水十瓦 水百八十瓦

右一日三次、兩日服完、

二 依比知阿兒二瓦 豬油二十

瓦

右爲軟膏、外用塗搽、

三 大楓子油 椿油各等分

右注射腎筋內、隔日注射一

筒、

四 大楓子油五瓦 蒸木油二瓦

甘草末適宜

右製丸九十粒、一日三次、每

服十五粒、

五 重曹百二十瓦 食鹽二十瓦

右和入浴湯中、製成浴料、

九 流行性感冒

病證 此病流行之廣、遍於各地。

無論何人、均易感之。病來先覺疲倦。

頭痛微熱。或筋骨、骨節痛。無何、寒戰

數次。即繼以四十度以上之大熱。而

感冒諸證候亦踵至。詳細分之。尙有

神經性、氣管枝性、胃腸性三種。然其

疲乏異常。甚者脫力。精神朦朧。頭痛、

眼痛、夜不能寐。三者皆相同也。強壯

者約二三日。漸可就愈。老幼及素有

心病者。恢復較難。孕婦患此。則易小

產。病中須防肺炎、肋膜炎、心內膜炎、

中耳炎、皮膚發疹等之併來。病後須

防肺癆、神經痛、神經衰弱等之續發。

衛生 流行性感冒之病毒。恆瀰

漫於太空之中。附塵埃以飛揚。隨飲

食呼吸而入體。故一聞某地段有人

患此。即宜善自攝養。寒冷務當嚴避。

老年人及虛弱者。均以深居簡出爲是。不幸業已患生。宜速就臥牀褥。頭痛筋痛劇烈者。則內服鹽規等退熱藥。咽喉發炎過甚者。則於頭部行溫搦法。並用藥水時時含漱。咳嗽不止者。則用葡萄酒等強壯劑。咯出之痰。須嚴重消毒。因痰中之病毒。雖經數月之久。尙能害人也。既屆恢復。仍須慎防感冒。

中國經驗方

一 八解散 治四時感冒兼吐瀉

少力

人參 白朮 厚朴 茯苓

半夏 藿香各二兩 甘草一

兩

二 柴胡升麻湯 治時行瘟疫惡

風壯熱頭痛痰咳

柴胡 前胡 葛根 石膏

荊芥 芍藥各一錢 黃芩

桑白皮各六分 升麻五分

生薑三分

右水煎服、

三 麻黃湯 凡頭痛發熱身痠痛

骨節脹惡寒無汗氣喘脈尺寸俱

緊者

麻黃二錢 桂枝一錢三分

甘草六分 杏仁十粒

右水煎溫服、促其發汗、

四 九味羌活湯 傷寒傷風俱用

之

羌活 防風 蒼朮各錢半

黃芩 白芷 川芎 生地各

一錢 細辛四分 甘草少許

右加薑棗煎服、

五 桂枝湯 凡頭痛發熱出汗畏

風鼻嚏乾嘔脈緩俱主之

桂枝 芍藥各錢半 甘草五

分

右加生薑三片、水二盞、煎至

一盞、乘熱服之、

六 神朮湯 治一切感冒傷風鼻

塞聲重以及四時瘟疫頭痛發熱

諸症

蒼朮二錢半 羌活 細辛

川芎 薑本 炙甘草 香白

芷各一錢

右剉碎、入薑三片、葱白三根

同煎、不拘時溫服、