

★ 黔版中草药彩色图谱系列


5

常用中草药

CHANGYONG ZHONGCAOYAO

[图谱及配方]
TUPU JI PEIFANG

主 编 杨卫平 夏同珩
副主编 李朝斗 陈谦海



贵州科技出版社

常用中草药图谱及配方

5

主 编 杨卫平 夏同珩

副主编 李朝斗 陈谦海

编辑委员 (按姓氏笔画顺序排列)

尹武燕	云雪林	刘 冬	刘 明
李 琼	李文科	李朝斗	沈 明
冷 丽	吴筱枫	陈 芳	陈谦海
何前松	张庆乾	张华海	杨卫平
杨成华	杨传东	周 静	周惟粲
苟光前	姜东辉	夏同珩	梅 颖
黄 敏	董发发	潘晓瑛	

贵州科技出版社

虫 阳

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药图谱及配方. 5/杨卫平, 夏同珩主编.
—贵阳: 贵州科技出版社, 2012. 9
ISBN 978 - 7 - 5532 - 0036 - 1

I. ①常… II. ①杨… ②夏… III. ①中草药—图谱
②中草药—验方 IV. ①R282.7 - 64②R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 219426 号

出版发行	贵州科技出版社
地 址	贵阳市中华北路 289 号(邮政编码:550004)
网 址	http://www.gzstph.com http://www.gzkj.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	贵阳德堡快速印务有限公司
版 次	2012 年 9 月第 1 版
印 次	2012 年 9 月第 1 次
字 数	460 千字
印 张	10.125
印 数	1 ~ 3 000 册
开 本	890mm × 1240mm 1/32
书 号	ISBN 978 - 7 - 5532 - 0036 - 1
定 价	44.00 元

前 言

当前,环境问题已成为影响人类生存、经济发展和社会进步的一大问题,世界各国民众普遍关注,各国政府也高度重视,积极投入人力、物力,努力开展科学研究和对被破坏的生态及环境进行治理。与人类生老病死关系最为密切的医药卫生事业,也是环境问题的一个重要方面,一样颇受世人关注。生产各种用于防病、治病的化学药品,需要耗费大量的人力、物力、财力,也能对环境造成一定的影响。全世界工业化、现代化的高度发展,使人们生活在钢筋混凝土的高楼大厦缝隙之中,遭受汽车尾气、工业废气及各种噪声的刺激,再加上工作紧张,难免身心疲惫,渴求返璞归真,回到农耕田园生活之中;与此同时,也对防病治病提出了新的要求,希望能更多地使用天然药物,以避免或减少化学药物在防病、治病中的毒副作用对身体的伤害。这个要求,并不过分,同时也是最现实、能实现的要求。中医中药延续了几千年,在从事诊病治病的医疗实践中,历代医药人员努力工作,积累了丰富的诊病用药经验,使中国医药成了世界医药宝库的一个重要组成部分。中医中药防病治病的宝贵经验,可供世界各国借鉴和参考,这就为人们使用天然药物来防病治病打下了基础。为了充分发挥中草药这一天然药物毒副作用小、易取易得和在防病治病中的优势,本书作者在野外拍摄了近10万张有关中草药的照片,并从中挑选出近1800种常用中草药的照片,为其撰写相关文字,编著成了《常用中草药图谱及配方》一书,分六册出版。

全书编排顺序是:植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列,对每一科中的种类,基本上按拉丁学名的字母顺序排列;动物药、矿物药则排列在植物药之后。每个药按来源及药用部位(含拉丁名)、本草论述、形态特征(含生境及分布)、性味功效、常用配方(一般3~5首)、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述;每个药配有1~2张具有鉴别特

征的在生长实地拍摄的彩色照片。本书具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

本书在编写过程中，参阅了国内较多的相关书籍及刊物，不能一一作谢，在此，特向相关参考书或文章的作者表示诚挚的谢意。

本书主编之一杨卫平和编辑委员云雪林、陈芳、刘明、周静、刘各、梅颖、吴筱枫、冷丽、何前松系贵阳中医学院教师。

由于编著者的学识水平及见识有限，书中难免有疏漏和谬误之处，敬请广大读者批评指正，以备再版时订正，对此特表衷心感谢。

编 者

目 录

槲寄生	(1)	水蜈蚣	(29)
桑寄生	(2)	一箭球	(30)
鞘花	(3)	野荸荠(光棍子)	(31)
波罗蜜(菠萝蜜)	(4)	三棱(荆三棱)	(32)
楮(楮实子、构叶)	(5)	山茶花	(33)
火麻仁	(6)	油茶	(34)
柘木(穿破石)	(7)	短柱茶	(35)
无花果	(8)	茶	(36)
琴叶榕	(9)	米碎花	(37)
榕树	(10)	岗铃叶	(38)
薜荔	(11)	木荷	(39)
菩提树	(12)	华山矾	(40)
野地瓜(地瓜藤、土瓜)	(13)	华山矾根	(41)
黄葛树(黄桷榕)	(14)	四川山矾(灰灰树)	(42)
忽布花(啤酒花)	(15)	山矾叶	(43)
葎草	(16)	五爪金龙	(44)
桑枝	(17)	山茱萸	(45)
桑葚	(18)	四照花	(46)
桑叶	(19)	青莢叶(叶上珠)	(47)
桑白皮	(20)	叶上珠根	(48)
野高粱(山稗子)	(21)	棕子木(灯台树)	(49)
伞莎草	(22)	水冬瓜根(接骨丹根)	(50)
三楞草	(23)	大接骨丹	(51)
莎草	(24)	柳杉	(52)
香附	(25)	杉	(53)
乌芋(荸荠、马蹄)	(26)	商陆(见肿消、大菟菜)	(54)
牛毛毡	(27)	白芍(芍药)	(55)
两歧漂拂草(飘拂草)	(28)	牡丹皮	(56)

赤芍	(58)	水仙花	(91)
蛇菰 (草狗肾、寄生黄)	(59)	剪秋萝 (剪红纱花、剪秋罗) ...	(92)
野鸦椿	(60)	大鹅儿肠 (狗筋蔓)	(93)
白芥子	(61)	小鹅儿肠 (繁缕、鹅儿肠菜) ...	(94)
油菜 (云台、芸薹菜)	(62)	王不留行	(95)
红油菜	(63)	漆姑草	(96)
白菜 (菘、青菜)	(64)	太子参	(97)
辣菜 (芥菜)	(65)	蚤缀	(98)
芥子 (白芥子)	(66)	荷莲豆菜 (水青菜)	(99)
甘蓝	(67)	独定子 (金铁锁)	(100)
芫菁	(68)	银柴胡	(101)
荠菜	(69)	石竹	(102)
碎米荠 (水田碎米荠)	(70)	瞿麦	(103)
大青叶	(71)	使君子	(104)
板蓝根	(72)	诃子 (诃黎勒)	(105)
独行菜 (葶苈子)	(73)	柿蒂	(106)
西洋白花菜	(74)	柿饼 (柿子)	(107)
诸葛菜	(75)	柿叶	(108)
莱菔 (白萝卜)	(76)	君迁子	(109)
莱菔子	(77)	黄鳝藤 (勾儿茶)	(110)
焯菜 (野油菜)	(78)	铁包金	(111)
茛菪	(79)	女儿红根 (青龙草、女儿茶) ...	(112)
石榴皮	(80)	枳椇子 (拐枣、鸡距子)	(113)
石榴根	(81)	枳椇根	(114)
白石榴花	(82)	马甲子根 (铁篱笆、石刺木) ...	(115)
蛇足石杉 (千层塔)	(83)	黎辣根	(116)
伸筋草 (狮子草、筋骨草)	(84)	绛梨木子 (鹿角刺果)	(117)
垂穗石松 (铺地蜈蚣)	(85)	鼠李	(118)
扁枝石松 (过江龙)	(86)	鼠李皮	(119)
藤石松	(87)	大枣	(120)
文殊兰 (罗裙带、扁担叶)	(88)	酸枣仁	(121)
忽地笑 (岩大蒜、金花石蒜) ...	(89)	黄独 (黄药子)	(122)
石蒜	(90)	朱砂莲	(123)

叉蕊薯蓣·····	(124)	母丁香(鸡舌香)·····	(157)
粉草薜(粉背薯蓣)·····	(125)	番石榴干·····	(158)
草薜·····	(126)	番石榴叶·····	(159)
山药·····	(127)	铁线蕨(猪棕草)·····	(160)
穿山龙·····	(128)	华中铁角蕨·····	(161)
零余子·····	(129)	岭南铁角蕨·····	(162)
海菜(水白菜、龙爪菜)·····	(130)	石上铁角蕨·····	(163)
水车前(水白菜、水葛苣)·····	(131)	红旱莲(湖南连翘)·····	(164)
苦草·····	(132)	黄花香·····	(165)
三品一枝花(草珍珠)·····	(133)	小连翘·····	(166)
莲子(莲肉)·····	(134)	金丝桃·····	(167)
藕(莲藕)·····	(135)	地耳草(田基黄)·····	(168)
睡莲·····	(136)	水香柴(过路黄、刘寄奴)·····	(169)
荷叶·····	(137)	金丝梅·····	(170)
芡实(芡)·····	(138)	贯叶连翘·····	(171)
云南松(黄松)·····	(139)	元宝草(对月莲)·····	(172)
松节·····	(140)	水菖蒲(白菖蒲)·····	(173)
松针(松叶)·····	(141)	石菖蒲·····	(174)
松花粉·····	(142)	广东万年青·····	(175)
松脂·····	(143)	海芋·····	(176)
土荆皮·····	(144)	魔芋·····	(177)
松子仁(海松子)·····	(145)	半截烂(雪里见)·····	(178)
松萝·····	(146)	野芋·····	(179)
桫欏·····	(147)	芋头·····	(180)
刺叶苏铁·····	(148)	麒麟尾·····	(181)
苏铁根(铁树根)·····	(149)	千年健·····	(182)
苏铁叶·····	(150)	一把伞南星·····	(183)
贵州苏铁(小铁树)·····	(151)	天南星·····	(184)
锁阳(琐阳)·····	(152)	虎掌南星·····	(185)
檀香·····	(153)	雷公莲(大匹药、青竹标)·····	(186)
百蕊草(地石榴、砧草)·····	(154)	白附子(禹白附)·····	(187)
桉树叶·····	(155)	半夏·····	(188)
丁香·····	(156)	爬树龙·····	(189)

土牛膝·····	(255)	母草·····	(279)
柳叶牛膝·····	(256)	宽叶母草(小地扭)·····	(280)
千日红(小鸡冠花)·····	(257)	旱田草·····	(281)
土苋菜·····	(258)	绿兰花(通泉草)·····	(282)
鸡冠花·····	(259)	泡桐·····	(283)
青葙子·····	(260)	马先蒿(马屎蒿、马新蒿)·····	(284)
蒲黄(东方香蒲、毛蜡烛)·····	(261)	五凤朝阳草(四方盒子草)·····	(285)
小黄连刺·····	(262)	松蒿(细绒蒿、土茵陈)·····	(286)
黑石珠(三颗针)·····	(263)	胡黄连·····	(287)
鸡脚刺·····	(264)	生地黄(干地黄)·····	(288)
白八角莲·····	(265)	熟地黄·····	(289)
八角莲·····	(266)	玄参(元参)·····	(290)
淫羊藿(三枝九叶草、铁打 杵)·····	(267)	阴行草(金钟茵陈)·····	(291)
狭叶十大功劳·····	(268)	毛蕊草(毛蕊花、大毛叶)·····	(292)
十大功劳·····	(269)	水苦葵(水仙桃草、水泽兰)·····	(293)
南天竹·····	(270)	婆婆纳·····	(294)
小二仙草(豆瓣草)·····	(271)	仙桃草(蚊母草)·····	(295)
毛麝香·····	(272)	肾子草(灯笼草)·····	(296)
来江藤(猫咪花、蜜桶花)·····	(273)	腹水草·····	(297)
洋地黄·····	(274)	毛叶腹水草·····	(298)
兰石草(肉果草)·····	(275)	四方麻·····	(299)
柳穿鱼·····	(276)	钓鱼杆·····	(300)
四方草(鸭嘴癭)·····	(277)	龙头花(金鱼草)·····	(301)
羊角草(狭叶母草)·····	(278)	中文名笔画索引·····	(302)
		拉丁学名索引·····	(308)

槲寄生

【来源及药用部位】桑寄生科植物槲寄生 *Viscum coloratum* (Kom.) Nakai 的茎枝。

【本草论述】《本经》：“主腰痛，小儿背强，痈肿。安胎，充肌肤，坚发齿，长须眉。”

【形态特征】灌木，高30~80cm。茎、枝皆圆柱状，二歧或三歧，节稍膨大，小枝的节间长5~10cm。叶对生，稀3枚轮生，叶柄短；叶片厚革质或革质，长椭圆形或椭圆状披针形，基部狭，基出脉3~5条。雌雄异株；雄花序聚伞状，常3朵，雄花萼片4；雌花3~5朵，萼片4；柱头乳头状。浆果球形，成熟时淡黄或橙红色，果皮光滑。

寄生于榆树、桦树、柳树、槲树、桐树、桑树等树木上。分布于东北及内蒙古、陕西、四川、贵州、湖南、湖北、江苏、河北等地。

【性味功效】苦、甘，平。补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎。

【常用配方】1.治风湿麻木 槲寄生、红禾麻、万年茶根各20g，水煎服。2.治腰痛 槲寄生、土三七、血当归各30g，泡酒服。3.治乳汁不下 槲寄生、地瓜藤各50g，

炖猪蹄吃。4.治须发早白 槲寄生、薜荔各20g，水煎服。5.治胃痛 槲寄生20g，大青木香10g，水煎服。

【主要化学成分】含齐墩果酸，内消旋肌醇， β -香树脂醇和黄酮类化合物等。

【现代研究】药理研究显示有降压，舒张冠状血管，增加冠脉流量，利尿等作用。现代临床用于治疗高血压病，高脂血症，冠心病心绞痛，风湿病关节肿痛和类风湿性关节炎等。



桑寄生

【来源及药用部位】桑寄生科植物桑寄生*Taxillus chinensis* (DC.) Danser的带叶茎枝。

【本草论述】《本经》：“主腰痛，小儿背强，痈肿。安胎，充肌肤，坚发齿，长须眉。”

【形态特征】灌木。嫩枝、叶密被锈色星状毛，后变无毛；小枝灰褐，具细小皮孔。叶对生或近对生，叶片厚纸质，卵形至长圆形。伞形花序，腋生或生于小枝已落叶膜部。花通常2朵，苞片鳞片状，花褐色。浆果椭圆形或近球形，果皮密生小瘤体，浅黄色。

寄生于阔叶树枝上，分布于西南至华东地区。

【性味功效】苦、甘，平。祛风除湿，补肝肾。

【常用配方】**1.治风湿麻木** 桑寄生、红禾麻、万年茶根各20g，水煎服。**2.治腰痛** 桑寄生、土三七、血当归各30g，泡酒服。**3.治乳汁不下** 桑寄生、地瓜藤各50g，炖猪蹄吃。**4.治须发早白** 桑寄生、薜荔各20g，水煎服。**5.治胃痛** 桑寄生20g，大青木香10g，水煎服。

【主要化学成分】含广寄生苷，槲皮素，槲皮苷，蒽薹苷及少量右旋儿茶酚等。

【现代研究】药理研究显示有镇静，降压，舒张冠状血管，增加冠脉流量，并使血管运动中枢和交感神经中枢受到抑制；对伤寒杆菌、葡萄球菌及脊髓灰质炎病毒有抑制作用，蒽薹苷有利尿作用。现代临床用于治疗高血压病，高脂血症，冠心病心绞痛，风湿病关节肿痛和类风湿性关节炎等。



鞘 花

【来源及药用部位】桑寄生科植物鞘花*Macrosolen cochinchinensis* (Lour.) Van Tiegh.的茎枝。

【本草论述】《广西中药资源》：“治风湿、跌打、月经不调。”

【形态特征】灌木，高0.5~1.3m。全株无毛。小枝灰色，具皮孔。叶对生；叶柄长0.5~1cm；叶片革质，阔椭圆形至披针形，有时卵形，先端急尖或渐尖，基部楔形或阔楔形；中脉在上面扁平，在下面凸起，侧脉4~5对。总状花序，1~3个腋生或生于小枝已落叶腋部，花序具花4~8朵；苞片阔卵形；小苞片2枚，三角形，基部彼此合生；花托椭圆形；副萼环状；花冠橙色，冠管膨胀，具6棱，裂片6枚；花柱线状，柱头头状。浆果近球形，橙色，果皮平滑。花期2~6月，果熟期5~8月。

生于海拔200~1 600m的平原或山地常绿阔叶林中，寄生于壳斗科、山茶科、桑科植物或枫香、油桐等多种植物上。分布于华南、西南及福建、西藏等地。

【性味功效】辛，温。祛风除湿，活血调经。

【常用配方】1.治风湿痹证 鞘花10g，水煎服。2.治跌打损伤 鞘花，丢了棒、黑地雷各30g，酒泡服。3.治月经不调 鞘花，连钱草各10g，水煎服。4.治肾炎水肿 鞘花10g，肾茶15g，水煎服。

【现代研究】现代临床用于治疗风湿病，跌打损伤，月经不调和水肿等。



波罗蜜（菠萝蜜）

【来源及药用部位】桑科植物木波罗*Artocarpus heterophyllus* Lam.的果实。

【本草论述】《本草纲目》：“止渴解烦，醒酒，益气。”

【形态特征】常绿乔木，高8~15m，全体有乳汁。单叶，螺旋状排列；叶片厚革质，倒卵状椭圆形或倒卵形，先端钝而短渐尖，基部楔形稍下延，上面深绿色，光亮，下面浅绿色，略粗糙。花单性，雌雄异株；雄花序顶生或腋生，圆柱形；雄花花被2裂，雄蕊1；雌花序圆柱形或长圆形，生于树干或主枝上的球形花托内；雌花花被管状，六棱形。聚合果长圆形、椭圆形或倒卵形，黄绿色，表面有六角形的瘤状突起，果柄粗壮。花期春、夏季，果熟期夏、秋季。

生于热带地区。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南等地。

【性味功效】甘，平。清湿热，解毒消痈。

【常用配方】**1.治暑热烦渴、咽干** 波罗蜜鲜果实适量，捣汁饮服。**2.治饮酒过量** 波罗蜜干果适量，切片，水煎服；或鲜果实，捣汁饮服。

【主要化学成分】果实含脂肪油，糖类，有机酸和多种维生素等。心材含黄色色素；树皮含树脂和波罗蜜环黄酮素等。

【现代研究】主要作为水果食用。



楮（楮实子、构叶）

【来源及药用部位】桑科植物构树*Broussonetia papyrifera*(L.) Vent. 的果实、嫩叶。

【本草论述】《日华子本草》：“壮筋骨，助阳气，补虚劳，助腰膝，益颜色。”

【形态特征】落叶乔木，高达10m。茎、叶具有乳汁；叶互生；叶片卵形，长8~18cm，宽6~12cm，不分裂或3~5深裂，先端尖，基部圆形或心脏形，边缘锯齿状，上面暗绿色，下面灰绿色，密生柔毛。花雌雄异株，雄花为柔荑花序，雄蕊4；雌花为球形头状花序，雌蕊散生于苞片间，子房头状，呈扁圆形。聚花果肉质球形，橙红色。花期5月，果熟期9月。

野生或栽种。全国大部分地区均有分布。

【性味功效】甘，寒。滋肾，清肝，明目。

【常用配方】1.治精血亏虚致须发早白 楮实子、桑葚、女贞子各50g，泡酒服。

2.治老年视物昏花 楮实子、枸杞子、菟丝子各20g，水煎服。3.治顽癣痒痛 鲜构叶或树皮、土大黄各适量，醋浸泡，外搽患处。4.治肾虚腰酸乏力 楮实子、杜仲、续断、熟地黄各20g，水煎服。

【主要化学成分】含皂苷，维生素B及油脂等。种子含油脂类成分及饱和脂肪酸、油酸、亚油酸等。

【现代研究】现代临床用于治疗老年性白内障，肥大性腰椎炎，跟骨骨刺，慢性活动性肝炎及男性不育症等；构树皮割开后流出的白色浆液外用治疗臀部顽癣，颈部神经性皮炎及下肢湿疹等。



火麻仁

【来源及药用部位】桑科植物大麻*Cannabis sativa* L. 的成熟种子。

【本草论述】《药品化义》：“能润肠，体润能去燥，专利大肠气结便秘。”

【形态特征】一年生草本，高1~3m，茎直立，分枝，表面有纵沟，密被短柔毛。掌状复叶互生，茎下部的叶对生；小叶3~11片，披针形至线状披针形，先端长尖，基部楔形，边缘有粗锯齿；上面深绿色，粗糙，下面密被灰白色黏毛。花单性，雌雄异株；雄花呈疏生的圆锥花序，黄绿色，花被5；雄蕊5；雌花丛生于叶腋，绿色，雌蕊1；子房圆球形，瘦果扁卵形。花期5~6月，果熟期6~7月。

野生于荒地、山坡，各地有栽培。

【性味功效】甘，平。润肠通便，利尿，活血化瘀。

【常用配方】1. 治便秘 火麻仁、白芍、枳实、大黄各30g，厚朴、杏仁各15g，共研细粉，炼蜜为丸，每次服9g，每日1~2次。2. 治口眼歪斜 火麻仁30g，血竭12g，麝香2g，捣烂成泥，摊于棉布上，先用毫针刺患者下关穴，起针后立即将药敷于耳前面神经分布区，7天换药1次。



香2g，捣烂成泥，摊于棉布上，先用毫针刺患者下关穴，起针后立即将药敷于耳前面神经分布区，7天换药1次。

【主要化学成分】种子含脂肪油，饱和脂肪酸及不饱和脂肪酸；不饱和脂肪酸中有油酸、亚油酸、亚麻酸等，脂肪油中有大麻酚。

【现代研究】药理研究显示有刺激肠黏膜，使蠕动加快，减少大肠吸收水分产生泻下作用；还有降低血清高胆固醇，降低血清睾酮水平，抑制精子活动性等作用。火麻仁含葑毒素、胆碱等，大量（100~120g）食入可致中毒。现代临床用于治疗各种便秘，痢疾，皮肤瘙痒，产后瘀血腹痛和水肿等。

柘木（穿破石）

【来源及药用部位】桑科植物柘树 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. 的根或木材。

【本草论述】《本草求原》：“壮筋骨，活血，治跌打。”

【形态特征】落叶灌木或小乔木，高达8m。小枝黑绿褐色，光滑无毛，具坚硬棘刺，刺长0.5~3.5cm。单叶互生，近革质，叶片卵圆形至倒卵形，先端钝或渐尖，基部楔形或圆形，全缘或3裂，幼时两面均有毛。花单性，雌雄异株，头状花序；雄花被4裂，雄蕊4；雌花被4裂，雌蕊1。聚合果近球形，红色，有肉质宿存花萼及苞片包裹瘦果。花期6月，果熟期9~10月。


喜生于阳光充足的荒山、坡地、丘陵及溪旁。分布于我国大多数地区。

【性味功效】微苦，凉。止咳，利湿，解毒，通络。

【常用配方】**1.治肺热咳嗽** 柘木根30g，岩豇豆20g，水煎服。**2.治肺癆体弱、干咳** 柘木、矮地茶、功劳叶各30g，水煎服。**3.治跌打腰痛** 柘木、七叶莲、山冬青各20g，酒水各半煎服。**4.治黄疸** 柘木、铁包金各30g，水煎服。**5.治经闭** 柘木、小过路黄各20g，水煎服。

【主要化学成分】含 β -谷甾醇，桂木生黄素和降桂木生黄萜等。

【现代研究】药理研究显示有抑制葡萄球菌的作用。现代临床用于治疗跌打损伤，疮疖，湿疹，腮腺炎，关节扭伤和肺结核等。



无花果

【来源及药用部位】桑科植物无花果*Ficus carica* L. 的果实、叶。

【本草论述】《医林纂要》：“益肺，通乳。”

【形态特征】落叶灌木或乔木，高达12m。有乳汁，分枝多。单叶互生，叶柄长，叶片厚膜质，宽卵形或矩圆形，掌状3~5裂，边缘波状或有粗齿，上面粗糙，下面生短毛。花序托单生于叶腋，梨形，肉质，有短梗，成熟时紫黑色。花单性，雌雄异株，隐生于内；雄蕊1~5；雌花生另一花序托内，花被5，柱头2裂。

生于温暖湿润环境。分布于华东、华南、西南等地；各地少量栽种。

【性味功效】果实：甘，凉。健脾益胃，润肺止咳，解毒消肿。叶：微辛，平。清热解毒，祛湿消肿。

【常用配方】1. 治小儿消化不良腹泻 无花果鲜叶15~18g（或干品9g），煎水加红糖适量服。2. 治肺热咳嗽 无花果叶、腊梅花各10g，水煎服。3. 治风热咽痛干痒 无花果、麦冬、甘草、桔梗各10g，水煎慢咽。4. 治脓疱疮 鲜无花果叶50g，加水适量煎取稠汁，棉签蘸取药汁涂抹患处。

【主要化学成分】果实含有机酸类，包括枸橼酸、延胡索酸、琥珀酸、奎宁酸等，还含有B族维生素。

【现代研究】现代临床用于治疗湿疹，小儿腹泻，咽喉肿痛，痔疮和产后乳汁不下等。

