




主治医师晋升宝典

儿科主治医师 资格考试**通关必做**

精选真题 · 把脉命题方向
精编题库 · 囊括全部考点
精心解析 · 引导答题技巧

主编 刘颖



中国医药科技出版社

主治医师晋升宝典



儿科主治医师资格考试通关必做

主编 刘 颖

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为《主治医师晋升宝典》系列之一,是由具有丰富教学和考前辅导经验的专家教授在深入分析了儿科主治医师资格考试的考纲考点、细致研究了历年真题的命题规律基础上精心编写而成。书中根据大纲所要求的考点,精选试题 5000 余道,题量丰富,题型全面,题目仿真性强,并对难题和易错题做了详细解析,有助于考生快速掌握重要考点内容,在短期内高效复习、一举过关,是参加全国卫生专业技术资格考试儿科中级考试读者的首选参考书。

图书在版编目(CIP)数据

儿科主治医师资格考试通关必做/刘颖主编. —北京:中国医药科技出版社,2014.9
(主治医师晋升宝典)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6999 - 0

I. ①儿… II. ①刘… III. ①儿科学 - 医师 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 203467 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889 × 1194mm^{1/16}

印张 19

字数 528 千字

版次 2014 年 9 月第 1 版

印次 2014 年 9 月第 1 次印刷

印刷 航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6999 - 0

定价 39.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



编委会

主 编	刘 颖			
副主编	江 莉			
编 委	黄 丽	陈 俊	付 涛	侯 荣
	计 莉	蒋太春	李国静	梁 琼
	廖发金	刘 波	刘 颖	孔志坚
	刘作华	龙永强	鲁 冰	罗小娟
	马建国	聂 勇	彭景云	任 蓉
	王 莉	张 敬	张静静	赵慧慧
	付丽珠	刘葆陞	周 翠	刘 凯

编写说明

主治医师是临床医师的中级职称，是通过参加全国卫生专业技术资格（中级）考试才能取得的任职资格。该考试于每年5月下旬举行。其考试科目包括：基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力，共四个科目。各科目以100为满分计算，每科目成绩达到60分为合格。考试成绩实行2年为周期的滚动管理，即所有4个科目在2年内全部合格者可申请该级别的专业技术资格，成为主治医师。

为了帮助忙碌的临床医生顺利通过卫生专业技术资格（中级）考试，我们组织了有丰富教学和考前辅导经验的专家教授，在深入分析了各科主治医师资格考试的考纲考点、细致研究了历年真题命题规律的基础上，历时1年编写了这套《主治医师晋升宝典》丛书。

本丛书包括“考点速记”和“通关必做”2个系列，具体分册有：

1. 内科主治医师资格考试考点速记
2. 外科主治医师资格考试考点速记
3. 妇科主治医师资格考试考点速记
4. 儿科主治医师资格考试考点速记
5. 全科主治医师资格考试考点速记
6. 内科主治医师资格考试通关必做
7. 外科主治医师资格考试通关必做
8. 妇科主治医师资格考试通关必做
9. 儿科主治医师资格考试通关必做
10. 全科主治医师资格考试通关必做

“考点速记”系列，每个分册的章节结构由两部分组成：

过关必读——核心考点纵览：按照章节，依据考纲要求，采用“图表为主，文字表述为辅”的形式，梳理归纳知识要点；其间穿插【要点提示】，直击考试重点、难点及易混淆知识点，帮助读者在短期内快速掌握中级职称考试的重要考点内容。

过关必记——高频考点速记：分析整理历年考题，把常考点进行了提炼、摘要，便于读者发现命题规律和记忆高频考点。

“通关必做”系列，每个分册根据大纲所要求的考点，按学科分章节编排题目，题量丰富，题型全面，题目仿真性强。真题做导航，把脉复习方向；题库为后盾，囊括全部考点；解析是精髓，引导答题技巧。有助于读者熟悉考试题型，提前感受考试的氛围，方便自测，提高解题和应试能力。

如将两系列图书配套使用，定会使您的复习备考取得事半功倍的效果，在短期内高效复习、一举过关。

为不断提高图书品质，更好地为大家服务，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将在今后的工作中不断修订完善。反馈信息请发送至邮箱：kszx405@163.com。在此谨致谢意！

相信本丛书定会为您的职称考试提供强大助力，伴您职场一帆风顺！

编者
2014年8月

目 录

第一章 绪论	1
第二章 儿科基础与保健	3
第三章 症状与体征	25
第四章 新生儿与新生儿疾病	27
第五章 营养性疾病	52
第六章 消化系统疾病	69
第七章 呼吸系统疾病	94
第八章 循环系统疾病	117
第九章 造血系统疾病	135
第十章 泌尿系统疾病	156
第十一章 神经系统疾病	177
第十二章 心理及行为障碍	195
第十三章 风湿性疾病	197
第十四章 内分泌系统疾病	205
第十五章 遗传性和代谢性疾病	212
第十六章 小儿结核病	219
第十七章 感染性疾病	232
第十八章 免疫缺陷性疾病	248
第十九章 变态反应性疾病	253
第二十章 儿科急救	257
第二十一章 医疗机构从业人员行为规范与医学伦理学	261
第二十二章 专业实践能力（案例分析题）	267

第一章 绪 论

【A1/A2 型题】

1. 学龄前儿童行为可塑性很强, 被称为
 - A. 造型时期
 - B. 定型时期
 - C. 变型时期
 - D. 发育型时期
 - E. 矫型时期
2. 儿科学将儿童时期划分为
 - A. 胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期七个阶段
 - B. 新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄期四个阶段
 - C. 新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期五个阶段
 - D. 新生儿期、婴儿期、学龄期三个阶段
 - E. 胎儿期、新生儿期、婴儿期、学龄前期、学龄期五个阶段
3. 婴儿期是
 - A. 从新生儿期结束至满 1 岁
 - B. 出生至满 1 岁前
 - C. 出生至满 1 周岁
 - D. 从新生儿期结束至满 1 岁前
 - E. 从脐带结扎至未满 1 岁
4. 新生儿期是
 - A. 出生至 30 天
 - B. 出生至满月
 - C. 出生至满 28 天
 - D. 从脐带结扎至 28 天
 - E. 从脐带结扎至生后 28 天内
5. 学龄前儿童期对儿童关注的重点不包括
 - A. 对意外伤害和感染的预防
 - B. 关注孩子的个性发展
 - C. 加速孩子智力的开发
 - D. 与孩子的感情交流
 - E. 为孩子创造良好的环境
6. 我国现阶段采用的围生期规定为
 - A. 从胚胎形成至产后 1 周
 - B. 从妊娠满 20 周至产后 4 周
 - C. 从妊娠满 24 周至产后 1 周
 - D. 从妊娠满 28 周至产后 1 周
 - E. 从妊娠满 28 周至产后 4 周
7. 小儿年龄分期中胎儿胚胎期是指妊娠
 - A. 最初 2 周
 - B. 最初 4 周
 - C. 最初 6 周
 - D. 最初 8 周
 - E. 最初 10 周
8. 小儿年龄分期中的新生儿期指
 - A. 从出生后到 7 天
 - B. 从出生后到 14 天
 - C. 从出生后到 28 天内
 - D. 从出生后到满月
 - E. 从出生后到 30 天
9. 女孩的青春期一般从
 - A. 8~20 岁
 - B. 9~14 岁
 - C. 10~18 岁
 - D. 11~18 岁
 - E. 15 岁左右
10. 新生儿期保健的重点时间是
 - A. 生后 1 小时内
 - B. 生后 1 天内
 - C. 生后 3 天内
 - D. 生后 1 周内绪论
 - E. 生后 2 周内
11. 幼儿期年龄的划分应是
 - A. 出生到 1 岁
 - B. 出生到 2 岁
 - C. 1 岁到 3 岁
 - D. 1 岁到 4 岁
 - E. 2 岁到 4 岁
12. 小儿各年龄分期, 正确的是
 - A. 围产期, 生后脐带结扎至生后 7 天
 - B. 新生儿期, 生后脐带结扎至生后 56 天
 - C. 婴儿期, 生后至满 2 岁之前
 - D. 幼儿期, 生后满 1 岁至满 3 岁之前
 - E. 学龄前期, 生后 5 岁至满 7 岁之前
13. 小儿发病率及死亡率最高的年龄期是
 - A. 婴儿期
 - B. 新生儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 学龄期
14. 小儿年龄分期中划分恰当的是
 - A. 新生儿期从出生到生后 1 个月



- B. 婴儿期从生后到满 13 个月
C. 幼儿期 1~3 岁
D. 学龄前期 5~7 岁
E. 学龄期 7~15 岁
15. 胎儿期是指
A. 从受精开始到分娩共 280 天
B. 从受精开始到分娩共 270 天
C. 从受精开始到分娩共 294 天
D. 从末次月经第 1 天算起 40 周
E. 从受精开始到分娩 42 周
16. 胎儿期下列哪种提法是正确的
A. 从卵细胞受精开始到小儿出生前
B. 胎儿期含妊娠早期、中期和晚期
C. 从真正受精开始算起 38 周
D. 从孕妇末次月经第一天算起为 40 周
E. 从受精后到分娩时 40 周
17. 儿科学的范畴不包括
A. 研究儿童发育和行为
B. 研究儿童生长规律
C. 提高儿童疾病防治质量
D. 研究儿童对人类社会的影响
E. 提高儿童身心健康水平
18. 男孩的青春期一般从
A. 11~20 岁
B. 11~16 岁
C. 15~16 岁
D. 13~20 岁
E. 18~20 岁

参考答案

【A1/A2 型题】

1. A 2. A 3. B 4. E 5. C 6. D 7. D 8. C
9. D 10. D 11. E 12. D 13. B 14. C 15. C 16. A
17. D 18. D

精选解析

【A1/A2 型题】

6. 围生期（围产期）国内采用的定义是指胎龄满 28 周（体重 1000g）至出生后 7 足天。这一时期从妊娠的晚期经分娩过程至新生儿早期，经受了巨大的变化，是生命最危险的时期。

8. 新生儿期是从新生儿脐带结扎时开始至出生 28 天。该期是从子宫内到出母体的适应过程，经历心、肺、脑等各器官全身巨大变化。

10. 新生儿第一周是特殊护理保护年龄段以降低发病率、死亡率，并早期筛查先天性、遗传性疾病，视、听觉异常，弱智儿等。

11. 7 岁前小儿脑的发育基本完成，智力发育很快，早期教育智力开发至关重要，可塑性很强。

12. 围产期国内采用胎龄满 28 周至出生后 7 天；新生儿期自出生后脐带结扎时起至生后 28 天；婴儿期是出生后到满 1 周岁之前；幼儿期为 1 周岁后到满 3 周岁之前；学龄前期从 3 周岁到入小学前（6~7 岁）。

第二章 儿科基础与保健

【A1/A2 型题】

1. 小儿肛门内测温法, 正常应为
A. $35^{\circ}\text{C} \sim 36^{\circ}\text{C}$ B. $36^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$
C. $36.5^{\circ}\text{C} \sim 37.5^{\circ}\text{C}$ D. $36.2^{\circ}\text{C} \sim 37.2^{\circ}\text{C}$
E. $35.2^{\circ}\text{C} \sim 37.5^{\circ}\text{C}$
2. 胎儿期保健的重点内容, 哪项不恰当
A. 为孕妇考虑较好的生活和工作条件
B. 孕期指导不包括心理和性生活指导
C. 妊娠早期开始的产前检查和卫生指导
D. 积极预防和治疗各种疾病
E. 合理用药
3. 请选择恰当的儿童体重计算公式
A. $1 \sim 12$ 个月儿童的体重 = $8 + \text{年龄} \times 2$
B. $1 \sim 12$ 个月儿童的体重 = $8 + \text{年龄} \times 3$
C. $1 \sim 12$ 个月儿童的体重 = $8 + \text{年龄} \times 4$
D. $1 \sim 12$ 个月儿童的体重 = $8 + \text{年龄} \times 5$
E. $1 \sim 12$ 个月儿童的体重 = $8 + \text{年龄} \times 6$
4. 出生 5 天新生儿, 2 天来拒奶, 不哭、少动。体检: 皮温低 (重度低体温), 面颊、四肢皮肤暗红色, 僵硬。为使患儿复温, 最适宜的方法是
A. 放入 $30^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$ 温箱复温
B. 放入 $37^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 的温水中行温水浴
C. 立即放入 $37^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 的暖箱中
D. 立即放入比其体温高 $1^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C}$ 的暖箱中, 每小时提高 $0.5^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$
E. 在一般病室中, 自然复温
5. 有关小儿动作发育的规律, 下列哪种说法是恰当的
A. 会向前走即会倒退着走
B. 会走即会停下来
C. 待肢体的粗大动作发育完成后, 手的精细动作才开始发育
D. 与训练有关
E. 2 岁的小儿若仍不会走路也不一定不正常, 因为运动发育有个体差异, 还受遗传影响
6. 儿童期重要心理特点
A. 智力发育成熟时期 B. 自我意识形成
C. 人格形成的重要阶段 D. 情感活动不稳定
E. 顽皮、任性
7. 儿童体重的意义是
A. 近期营养指标
B. 若目前体重低, 可以判断其远、近期营养均不好
C. 远期营养指标
D. 仅用于筛查儿童期单纯性肥胖症
E. 是筛查营养不良的重要指标
8. 请排除不恰当的新生儿喂养方式
A. 定时定量母乳喂养, 培育良好的饮食习惯
B. 哺乳后帮助婴儿将胃里的空气呕出
C. 哺乳时将乳头和大部分乳晕送入婴儿口中
D. 患乳腺炎时应暂停哺乳
E. 母乳不足时可混合喂养
9. 小儿反复呼吸系统感染的可能原因不包括
A. 先天性免疫功能缺陷 B. 维生素 A 缺乏
C. 抵抗力差 D. 照顾不周
E. 过敏
10. 有关无母乳的婴儿请选择最适合的替代品
A. 羊奶 B. 配方奶粉
C. 全脂奶粉 D. 鲜牛奶
E. 奶糕粉
11. 某儿童, 2014 年 3 月 10 日出生, 百白破疫苗全程免疫的时间应是
A. 2014 年 5 月 10 日、2014 年 7 月 10 日
B. 2014 年 6 月 10 日、2014 年 7 月 10 日、2014 年 8 月 10 日
C. 2014 年 6 月 10 日、2014 年 8 月 10 日
D. 2014 年 5 月 10 日、2014 年 6 月 10 日、2014 年 7 月 10 日
E. 2014 年 7 月 10 日、2014 年 8 月 10 日、2014 年 9 月 10 日
12. 儿童三浴锻炼指
A. 水浴、日光浴和空气浴
B. 阳光浴、空气浴和温水浴
C. 寒冷浴、空气浴和日光浴
D. 擦浴、淋浴、日光浴
E. 冷水浴、空气浴和日光浴



13. 儿保医生为一个8个月女婴进行健康检查时发现患儿为Ⅱ度营养不良,下列哪项体格检查对诊断最有帮助
- A. 体重5kg B. 面色苍白,肌肉松弛
C. 皮肤弹性较差 D. 双下肢微肿
E. 腹部皮下脂肪厚度0.8cm
14. 某医生值班,凌晨2时接到电话被告知有一名住院的新生儿(日龄3天)突然出现呼吸困难,面色发绀,吐奶两次,该医生应该
- A. 立即去床边查看
B. 先去翻看患儿病历
C. 电话中详细询问病情
D. 电话中指导护士进行处理
E. 立即向上级医生汇报
15. 恰当的小儿喂养分类方法为
- A. 母乳喂养、人工喂养、混合喂养
B. 母乳喂养、牛乳喂养
C. 母乳喂养、人工喂养
D. 母乳喂养、人工喂养、混合喂养和其他喂养
E. 母乳喂养、其他代乳品喂养
16. 小儿肠道的解剖生理特点不包括
- A. 肠壁薄,黏膜富于血管,通透性好,细菌或肠内毒素易于吸收入血,造成或加重中毒
B. 相对于成人,肠道短
C. 肠壁薄,黏膜富于血管,通透性好,吸收率高
D. 升结肠和直肠与腹腔后壁固定差,易发生肠套叠
E. 相对于成人,小儿消化面积大
17. 母乳不足时婴儿喂养乳品的最佳选择是
- A. 鲜奶 B. 酸奶
C. 配方奶 D. 羊奶
E. 脱脂奶
18. 儿童身长的意义是
- A. 若目前身高低,可以判断其远、近期营养均不好
B. 远期营养指标
C. 近期营养指标
D. 若目前身高低,可以判断其远、近期营养均不好,或父母矮小
E. 若目前身高低,可以判断其远、近期营养均不好,且父母矮小
19. 小儿会说话指
- A. 咿呀学语
B. 有意识地叫“爸爸”、“妈妈”等
C. 会发音
D. 无意识地自言自语
E. 无意识的唇音
20. 新生儿访视内容不包括
- A. 尽可能为产妇做全面体检 B. 指导护理
C. 了解新生儿出生时的情况 D. 指导喂养
E. 为新生儿体检
21. 哪项不是新生儿免疫功能的特点
- A. 吞噬细胞游走及吞噬功能均较差
B. 细胞免疫功能尚弱
C. 非特异免疫功能发育较好
D. 新生儿的体液免疫主要为胎儿后期从母体获得的免疫球蛋白,包括IgA、IgG和IgM
E. 屏障功能差
22. 关于“新生儿期保健的重点内容”的说法,哪项不恰当
- A. 预防感染 B. 预防产伤和窒息
C. 指导喂养 D. 指导护理
E. 保健医生不负责新生儿期常见疾病的处理
23. 有关小儿视觉,下列哪种说法是不恰当的
- A. 视觉发育需要光刺激
B. 小儿视细胞是出生后才开始发育的
C. 小儿出生时有光感和瞬目反射
D. 视觉发育一般于出生时即已完成
E. 新生儿可有生理性斜视或复视
24. 为关于儿童体格生长影响因素的“观点”,哪项最恰当且最全面
- A. 后天良好的保健可以突破遗传因素的制约
B. 遗传因素决定一切
C. 主要受疾病的影响
D. 先天和后天两大类,前者主要指遗传和性别,后者主要指营养和疾病
E. 内因和外因两大类,前者主要指遗传、性别和内分泌,后者包括营养、疾病、生活环境和锻炼等
25. 儿童体格生长
- A. 遵循一定的规律,个体差异不大
B. 是一个连续的过程,且各时期生长速度不同
C. 是一个连续的过程,而且整个儿童期匀速增长
D. 无固定规律,个体差异明显
E. 是一个连续的过程,且无明显的个体差异
26. 正常情况下,健康小儿容易吐奶,主要不是因为
- A. 吃奶后兴奋运动 B. 未拍膈
C. 吃得太多 D. 胃水平位
E. 吸进较多空气
27. 有关小儿牙齿,以下哪种说法最准确、最全面
- A. 乳牙是未钙化的牙齿,因而不如恒牙坚硬耐磨
B. 一般若10个月未出牙,应高度警惕先天无牙胚

- C. 共有 20 个乳牙, 乳牙萌出时间一般为 4~12 个月龄
D. 一般于 4~10 个月龄时萌出
E. 乳牙萌出顺序无个体差异
28. 恰当选择婴儿辅食添加时间
A. 生后 2~3 个月 B. 生后 1~2 个月
C. 生后 8~10 个月 D. 生后 4~6 个月
E. 生后 7~9 个月
29. 某儿童已 5 月龄, 未接种过疫苗, 该儿童应补种哪些计划免疫疫苗
A. 卡介苗、乙肝疫苗、百白破三联混合制剂、脊髓灰质炎疫苗
B. 卡介苗、乙肝疫苗、B 型流感嗜血杆菌疫苗、脊髓灰质炎疫苗
C. 卡介苗、乙肝疫苗、风疹疫苗、脊髓灰质炎疫苗
D. 卡介苗、乙肝疫苗、麻疹疫苗、脊髓灰质炎疫苗
E. 卡介苗、乙肝疫苗、流脑疫苗、脊髓灰质炎疫苗
30. 儿童生长发育最快的时期是
A. 学龄期、青春期 B. 幼儿期、学龄期
C. 婴儿期、青春期 D. 婴儿期、幼儿期
E. 婴儿期、学前期
31. 小儿初次感染结核菌至产生变态反应的时间是
A. 48~72 小时 B. 4~6 天
C. 1~2 周 D. 2.5~3 周
E. 4~8 周
32. 36 周产女婴, 出生后反应好, 体检其指甲外观特点是
A. 指甲硬 B. 反甲
C. 甲面多白纹 D. 指甲未达指尖
E. 指甲超过指尖
33. 恒牙骨化开始的年龄是
A. 新生儿 B. 1 岁
C. 2 岁 D. 3 岁
E. 4 岁
34. 我国规定 1 岁内必须完成的计划免疫是
A. 卡介苗 B. 乙脑疫苗
C. 流脑疫苗 D. 流感疫苗
E. 甲肝疫苗
35. 3 个月小儿按公式计算其身高、头围约是
A. 55cm, 38cm B. 60cm, 40cm
C. 65cm, 42cm D. 70cm, 44cm
E. 75cm, 46cm
36. 婴儿期计划免疫, 正确的接种时间是
A. 脊髓灰质炎疫苗 2 个月以上
B. 卡介苗 2~3 个月
C. 麻疹疫苗 4~5 个月
D. 牛痘 6~8 个月
E. 乙型脑炎疫苗 9~10 个月
37. 不属于 1 岁以内婴儿计划免疫的是
A. 脊髓灰质炎疫苗 B. 肺炎链球菌疫苗
C. 麻疹疫苗 D. 百日咳疫苗
E. 乙肝疫苗
38. 5 岁小儿每日每公斤所需总热量是
A. 400kJ (100kcal) B. 460kJ (110kcal)
C. 500 kJ (120kcal) D. 540 kJ (130kcal)
E. 580 kJ (140kcal)
39. 1 岁以内婴儿基础代谢, 每日每千克约需
A. 80kcal B. 66kcal
C. 55kcal D. 44kcal
E. 30kcal
40. 我国颁布的母婴保健法规定在新生儿期进行筛查的遗传代谢内分泌疾病是
A. 21-三体综合征, 苯丙酮尿症
B. 先天性甲状腺功能减低症, 苯丙酮尿症
C. 先天性甲状腺功能减低症, 21-三体综合征
D. 先天性甲状腺功能减低症, 半乳糖血症
E. 21-三体综合征, 半乳糖血症
41. 5 岁小儿按公式计算身高、体重及头围约是
A. 118cm, 22kg, 54cm
B. 114cm, 21kg, 53cm
C. 111cm, 20kg, 52cm
D. 108cm, 19kg, 51cm
E. 105cm, 8kg, 50cm
42. 母乳喂养儿粪便中主要的细菌是
A. 大肠埃希菌 B. 肠链球菌
C. 副大肠埃希菌 D. 变形杆菌
E. 乳酸杆菌
43. 小儿特异性体液免疫的正确认识是
A. B 细胞免疫的发育较 T 细胞免疫早
B. IgG 类抗体应答需在出生 1 年后才出现
C. IgM 类抗体在胎儿期即可产生
D. 足月新生儿 B 细胞量低于成人
E. 免疫球蛋白均不能通过胎盘
44. 判断小儿体格发育最常用指标是
A. 动作发育能力 B. 语言发育程度
C. 智能发育水平 D. 神经反射发育
E. 体重、身高、头围
45. 围生期包括胎儿期一部分和婴儿期一部分, 国内普



遍采用的定义是

- A. 胎龄 27 周至出生时
B. 胎龄 28 周至生后 7 天
C. 胎龄 30 周至生后 2 周
D. 胎龄 36 周至生后 4 周
E. 胎龄 38 周至生后 1 个月
46. 生后第一年身高增长约
A. 35cm B. 32cm
C. 30cm D. 27cm
E. 25cm
47. 出生时新生儿的头围约
A. 35cm B. 34cm
C. 33cm D. 32.5cm
E. 31cm
48. 一小儿体重 9kg, 身高 75cm, 头围 46cm, 此小儿的年龄是
A. 9 个月 B. 1 岁
C. 2 岁 D. 2 岁半
E. 3 岁
49. 我国规定 1 岁内必须完成的计划免疫是
A. 麻疹疫苗 B. 乙脑疫苗
C. 流脑疫苗 D. 流感疫苗
E. 甲型肝炎疫苗
50. 1~2 岁幼儿 1 年中身高约增长
A. 5cm B. 7cm
C. 10cm D. 12cm
E. 13cm
51. 哪项提示低血钾
A. 精神萎靡
B. 心音亢进、心率减慢
C. 皮肤弹性差
D. 肠鸣音消失、四肢肌张力低下
E. 呼吸深大
52. 极低出生体重儿是指初生 1 小时内
A. 体重不足 1kg B. 体重不足 1.25kg
C. 体重不足 1.5kg D. 体重不足 2kg
E. 体重不足 2.5kg
53. Gesell 发育量表适用年龄范围为
A. 4 周~2 岁 B. 4 周~3 岁
C. 6 周~2 岁 D. 6 周~4 岁
E. 8 周~4 岁
54. 小儿体格测量指标中, 最能反映营养状况的是
A. 身长 B. 胸围
C. 体重 D. 头围
E. 上臂围
55. 男婴, 营养状况良好, 勉强扶坐, 还不能独坐。测量: 头围 41cm, 前囟 1cm × 1cm。身高 65cm, 出牙一只, 腕部 X 线摄片示骨化中心二个, 最可能的年龄是
A. 3~4 个月 B. 5~6 个月
C. 7~8 个月 D. 8~9 个月
E. 10~12 个月
56. 新生儿血气分析正常值特点是
A. 过度通气, 相对性呼吸性碱中毒, 血氧偏低
B. 过度通气, 相对性代谢性酸中毒, 血氧偏低
C. 过度通气, 相对性代谢性碱中毒, 血氧偏低
D. 过度通气, 相对性呼吸性酸中毒, 血氧偏高
E. 过度通气, 混合性酸中毒, 血氧偏低
57. 新生儿, 7 天, 1 分钟 Apgar 评分 7 分, 反应差, 吃奶减少 3 天, 抽搐 1 天, T37.5℃, 面色略青灰, 双目凝视。四肢肌张力、反射略亢进, C 反应蛋白增高, ESR: 30mm/h, 该患儿诊断最可能是
A. 低血糖症
B. 低血钙症
C. 败血症
D. 败血症合并化脓性脑膜炎
E. 缺氧缺血性脑病
58. 生后 10 小时新生儿, 外周血 WBC $22 \times 10^9/L$, N 65%, L 35%, 幼稚粒细胞偶见, 提示该新生儿为
A. 体内有感染灶 B. 正常
C. 白血病 D. 类白血病反应
E. 骨髓外造血
59. 人体每天所需的能量大约有多少来自蛋白质
A. 8% B. 10%~15%
C. 16%~20% D. 21%~25%
E. >25%
60. 母乳与牛乳相比, 营养丰富, 易于消化, 是因为母乳中
A. 蛋白质含量高 B. 含酪蛋白多
C. 含白蛋白、球蛋白较多 D. 含饱和脂肪酸多
E. 含甲型乳糖高
61. 正常足月儿的皮肤外观特点是
A. 肤色苍白, 皮下脂肪丰满
B. 肤色稍黄, 皮下脂肪少
C. 肤色红润, 皮下脂肪少
D. 肤色红润, 皮下脂肪丰满
E. 肤色稍黄, 毳毛少
62. 1 岁时头围、身高是

- A. 头围 34cm; 身高 50cm
B. 头围 46cm; 身高 75cm
C. 头围 48cm; 身高 85cm
D. 头围 50cm; 身高 105cm
E. 头围 35cm; 身高 140cm
63. 小儿 1 岁的动作能, 不可能的是
A. 会拍手 B. 会爬
C. 会自己坐起来 D. 会骑三轮车
E. 会弯腰拾东西
64. 小儿语言发育三个阶段的顺序是
A. 发音、理解、表达 B. 理解、表达、发音
C. 模仿、表达、理解 D. 听觉、发音、理解
E. 表达、理解、发音
65. 体重 6kg 的婴儿, 每天需要牛奶和水量是
A. 8% 糖牛奶 550ml, 水 240ml
B. 8% 糖牛奶 660ml, 水 240ml
C. 8% 糖牛奶 900ml, 不必再加水
D. 8% 糖牛奶 750ml, 水 150ml
E. 8% 糖牛奶 860ml, 水 240ml
66. 正常小儿每日每公斤体重所需热卡的简单计算方法是
A. 1 岁以内 110kcal, 以后每增加 3 岁减去 10kcal
B. 1 岁以内 100kcal, 以后每增加 2 岁减去 15kcal
C. 1 岁以内 100kcal, 以后每增加 3 岁减去 10kcal
D. 1 岁以内 120kcal, 以后每增加 2 岁减去 15kcal
E. 1 岁以内 115kcal, 以后每增加 4 岁减去 25kcal
67. 出生时新生儿的身长、头围平均是
A. 身长 46cm, 头围 32cm
B. 身长 50cm, 头围 34cm
C. 身长 40cm, 头围 30cm
D. 身长 42cm, 头围 31cm
E. 身长 50cm, 头围 32cm
68. 小儿体格发育的两个高峰期是
A. 学龄期、青春期 B. 学龄前期、学龄期
C. 幼儿期、青春期 D. 婴儿期、青春期
E. 新生儿期、学龄期
69. 小儿总能量的 50% ~ 60% 来自
A. 蛋白质 B. 脂肪
C. 碳水化合物 D. 维生素
E. 矿物质
70. 有一 1.5 岁小儿, 乳牙数应为
A. 8 ~ 10 颗 B. 10 ~ 12 颗
C. 12 ~ 14 颗 D. 14 ~ 16 颗
E. 16 ~ 18 颗
71. 小儿体格发育规律哪项不正确
A. 出生体重平均 3kg
B. 前半年体重为出生体重 + 月龄 $\times 0.7$
C. 2 岁时头围约为 46cm
D. 2 ~ 12 岁每年身长增长平均 7cm
E. 乳牙 2 ~ 2.5 岁出齐
72. 小儿出生后主要造血是
A. 肝脏造血 B. 骨髓造血
C. 脾脏造血 D. 淋巴结造血
E. 卵黄囊造血
73. 小儿可用口服补液治疗的是
A. 新生儿腹泻 B. 腹胀明显
C. 呕吐频繁 D. 中度脱水无周围循环衰竭
E. 重度脱水
74. 对于小儿牙齿发育哪一项是不正确的
A. 乳牙于生后 4 ~ 10 个月开始萌出
B. 乳牙共 18 个
C. 乳牙 2 ~ 2.5 岁出齐
D. 6 ~ 7 岁开始换生恒牙
E. 儿童期恒牙共 28 个
75. 正常足月新生儿生后何时可以让母亲喂奶
A. 生后半小时 B. 生后 4 ~ 5 小时
C. 生后 8 ~ 10 小时 D. 生后 12 ~ 14 小时
E. 生后 24 小时
76. 婴儿期的预防接种恰当的是
A. 2 ~ 3 个月接种卡介苗
B. 2 个月开始口服脊髓灰质炎疫苗
C. 4 ~ 5 个月注射麻疹疫苗
D. 8 ~ 10 个月注射流脑疫苗
E. 1 岁注射百白破三联疫苗
77. 有关身长的发育, 以下哪项是不恰当的
A. 身长是指从头顶至足底的全身长度
B. 身长包括头部、躯干和下肢三部分
C. 第 1 年躯干增长最快
D. 上部量与脊柱的增长有关
E. 下部量与下肢长骨的发育有关
78. 小儿脊柱的发育, 下述哪项是不恰当的
A. 新生儿的脊柱轻微后凸
B. 生后 1 岁以内脊柱增长较下肢慢
C. 3 个月抬头时出现颈椎前凸
D. 6 个月会坐时出现胸椎后凸
E. 1 岁后会行走时出现腰椎前凸
79. 身长的下部量指的是
A. 坐骨结节到足底 B. 脐部到足底



- C. 耻骨联合上缘到足底 D. 耻骨联合下缘到足底
E. 脐与耻骨联合的中点到足底
80. 上部量等于下部量的年龄是
A. 6岁 B. 10岁
C. 12岁 D. 13岁
E. 11岁
81. 新生儿期应给予预防接种或口服
A. 脊髓灰质炎疫苗
B. 百日咳、白喉、破伤风三联疫苗
C. 卡介苗
D. 流脑疫苗
E. 麻疹疫苗
82. 正常小儿视觉的发育下列哪项是恰当的
A. 新生儿对光觉不敏感
B. 3个月头眼协调较好
C. 6~7个月出现眼手协调动作
D. 8~9个月出现眼手协调动作
E. 3~4个月出现眼手协调动作
83. 小儿运动功能的标准出现时期, 下列哪项是恰当的
A. 2个月时能抬头
B. 4~5个月会爬
C. 7~8个月, 能扶着走
D. 3~4个月时, 伸出下肢会坐
E. 10~11个月时, 能独自行走
84. 小儿头围的数值恰当的是
A. 出生时 32cm B. 6个月时 42cm
C. 1岁时 46cm D. 2岁时 52cm
E. 5岁时 55cm
85. 头围与胸围的情况中, 哪一条是恰当的
A. 初生时头围 32cm, 胸围 34cm
B. 6个月时头围 46cm, 胸围等于头围
C. 1岁时头围 44cm, 胸围大于头围
D. 2岁时头围 48cm, 胸围大于头围
E. 5岁时头围 54cm, 胸围大于头围
86. 正常小儿体重的粗略推算方法中哪一条是不恰当的
A. $1\sim6$ 个月小儿体重 (kg) = 出生体重 (kg) + 月龄 $\times 0.7$ (kg)
B. $6\sim12$ 个月小儿体重 (kg) = 出生体重 (kg) + 6×0.7 (kg) + (月龄 - 6) $\times 0.4$ (kg)
C. 1岁时体重为初生体重的 3 倍 (9kg)
D. 2岁时体重为初生体重的 4 倍 (12kg)
E. 2岁至 14 岁体重 (kg) = 年龄 $\times 2$ (kg) + 8 (kg)
87. 一健康小儿会翻身, 能笑出声, 能抓面前物体, 但尚不能认识熟人和陌生人, 其年龄可能是
A. 2~3 个月 B. 4~5 个月
C. 6~7 个月 D. 8~9 个月
E. 10~11 个月
88. 小儿胸围等于头围的年龄是
A. 8 个月 B. 10 个月
C. 1 岁 D. 2 岁
E. 3 岁
89. 乳牙出齐的最迟年龄是
A. 10 个月 B. 12 个月
C. 15 个月 D. 20 个月
E. 30 个月
90. 婴儿期生长发育特点中哪一点是不恰当的
A. 生长发育最迅速
B. 智能发育突出
C. 易发生消化与营养紊乱
D. 抗病能力弱, 易患传染病
E. 应注意合理喂养
91. 百日咳、白喉、破伤风的混合疫苗初次免疫时需注射几次
A. 注射 1 次 B. 每周 1 次, 注射 2 次
C. 每月 1 次, 注射 2 次 D. 每月 1 次, 注射 3 次
E. 每周 1 次, 注射 3 次
92. 小儿机体所需的总能量中为小儿所特有是
A. 基础代谢所需的能量
B. 生长发育所需的能量
C. 食物特殊动力作用所需的能量
D. 活动所需的能量
E. 排泄损失能量
93. 哪项检查可判断为异常
A. 生后 3~4 个月内克氏征阳性
B. 生后 5~6 个月, 拥抱反射阳性
C. 2 岁以内巴氏征阳性
D. 生后 5~6 个月内双侧腹壁反射未引出
E. 生后 8~9 个月提睾反射 (双侧) 未引出
94. 婴儿对蛋白质需要量比成人相对要多是因为
A. 婴儿以乳类食品为主要食品
B. 氨基酸在体内并非全部吸收
C. 由于生长发育需要正氮平衡
D. 婴儿对蛋白质消化吸收功能差
E. 婴儿利用蛋白质的能力差
95. 1 岁小儿生长发育数值哪项是恰当的? 体重 (kg)、身长 (cm)、头围 (cm)、胸围 (cm)
A. 9、75、46、46 B. 8、75、46、44
C. 9、75、44、42 D. 9、70、42、42

- E. 9、74、46、44
96. 体重5.1kg, 身高58cm, 后囟已闭, 最可能的年龄是
A. 1个月 B. 2个月
C. 3个月 D. 4个月
E. 5个月
97. 全脂奶粉配成全牛奶按重量比为
A. 1:2 B. 1:4
C. 1:6 D. 1:8
E. 1:10
98. 正常小儿运动与精神发育哪项是不恰当的
A. 4个月时能独坐, 用手摇玩具, 能认识熟人
B. 5个月时扶腋下站得直, 伸手取物, 能辨别人声
C. 8个月会爬, 开始认识物体
D. 10个月能独站, 能招手再见
E. 15个月走得好, 能说出自己的名字
99. 预防措施哪项属于被动免疫
A. 口服小儿灰质炎疫苗 B. 注射卡介苗
C. 注射丙种球蛋白 D. 注射麻疹疫苗
E. 注射流脑疫苗
100. 正常小儿开始会坐的时间是
A. 出生后4个月 B. 出生后5个月
C. 出生后6个月 D. 出生后8个月
E. 出生后9个月
101. 有关正常小儿骨化中心的发育下列哪项是不恰当的
A. 出生时腕部无骨化中心
B. 出生时足踝部已有跟骨、距骨和胫骨的骨化中心
C. 婴儿早期腕部骨化中心有3个
D. 10岁时腕部骨化中心出齐, 共10个
E. 1~9岁腕部骨化中心的数目约为其岁数加1
102. 是符合小儿牙齿的一般正常发育的
A. 乳牙共24只
B. 4~10个月开始出牙
C. 乳牙最晚于1.5岁时出齐
D. 乳牙数=月龄-(6~8)
E. 8岁开始换牙
103. 体重为12kg, 身高85cm, 头围48cm, 胸围49cm的小儿年龄是
A. 9个月 B. 11个月
C. 15个月 D. 2岁
E. 3岁
104. 小儿神经反射的发育, 恰当的是
A. 出生1个月出现拥抱反射
B. 出生2个月出现握持反射
C. 1岁以内腹壁反射易引出
D. 2岁以下巴氏征阴性
E. 3~4个月以内克氏征阳性
105. 1岁时腕部骨化中心出现的数目为
A. 1~2个 B. 2~3个
C. 3~4个 D. 4~5个
E. 5~6个
106. 青春期生长发育最大特点是
A. 体格生长加快
B. 神经发育成熟
C. 内分泌调节稳定
D. 生殖系统迅速发育, 并趋向成熟
E. 以上都不是
107. 何时起出现第1个条件反射
A. 生后1周内 B. 生后3周
C. 生后4周 D. 生后2周
E. 生后6周
108. 小儿智力发育, 下列哪项是恰当的
A. 6个月会微笑
B. 10个月见陌生人会哭
C. 12个月能听懂自己的名字
D. 18个月会表示大小便
E. 2岁会说身体各部分名称
109. 全脂奶粉配成全牛奶按体积比为
A. 1:3 B. 1:4
C. 1:5 D. 1:6
E. 1:7
110. 小儿生长发育的一般规律中哪一点是不恰当的
A. 由上到下 B. 由远到近
C. 由粗到细 D. 由低级到高级
E. 由简单到复杂
111. 6岁小儿腕部有几个骨化中心
A. 3个 B. 4个
C. 5个 D. 7个
E. 8个
112. 小儿体重增长变化的过程中, 哪一点是不恰当的
A. 出生体重男较女重
B. 生后第1周内可出现生理性体重下降
C. 年龄越小, 体重增长越快
D. 2岁到12岁前每年体重稳步增长
E. 正常同年龄、同性别小儿的体重存在着个体差异, 一般在15%上下
113. 胎儿期生长发育最重要的时期为
A. 胚胎最初6周 B. 胚胎最初8周



- C. 从受精至胎龄 12 周 D. 从受精至胎龄 16 周
E. 从受精至胎龄 24 周
114. 正常小儿身长的中点, 下列哪项是不恰当的
A. 新生儿在脐上
B. 2 岁时脐下
C. 6 岁在脐与耻骨联合上缘之间
D. 9 岁在耻骨联合下缘
E. 12 岁在耻骨联合上缘
115. 母乳喂养的小儿断奶时间一般选择在何时为宜
A. 生后 4~5 个月 B. 生后 6~8 个月
C. 生后 10~12 个月 D. 生后 15~18 个月
E. 生后 18~24 个月
116. 正常 8 个月小儿按体重公式计算, 标准体重为
A. 6kg B. 6.5kg
C. 7.2kg D. 7.6kg
E. 8kg
117. 婴儿期的保健重点, 以下哪一项是错误的
A. 按计划免疫完成基础免疫
B. 提倡纯母乳喂养至 4~6 个月
C. 及时添加辅助食品为断母乳作准备
D. 预防缺铁性贫血和佝偻病及营养不良
E. 早期教育, 可让孩子听英语和背儿歌
118. 卡介苗初种年龄为
A. 生后 2~3 天内 B. 生后 6 个月
C. 生后 4~5 个月 D. 生后 2~3 个月
E. 生后 8 个月
119. 2 岁女孩, 因生长发育缓慢就诊, 平素多饮、多尿, 近几日乏力、腹胀, 血压 82/60mmHg, 化验检查血钾 2.8mmol/L, 尿蛋白为 ++, RBC 5 个/HP, BUN 5.6mmol/L, B 超显示有肾钙化。最可能的诊断是
A. 遗传性肾炎 B. 先天性肾病
C. 慢性肾炎 D. 狼疮性肾炎
E. 肾小管酸中毒
120. 小儿最易发生意外的年龄期是
A. 婴儿期 B. 新生儿期
C. 幼儿期 D. 学龄前期
E. 学龄期
121. 如果要拍摄 X 线片检查骨龄, 下列部位哪一处为首先选择
A. 膝关节 B. 头部
C. 腕及手部 D. 足
E. 肩关节
122. 1 个月的小儿, 下列哪项神经反射属不正常
A. 提睾反射阴性 B. 腹壁反射阴性
C. 克氏征阳性 D. 巴氏征阳性
E. 觅食反射消失
123. 小儿生长迅速、代谢旺盛
A. 对营养物质需求大, 特别是热能和蛋白质
B. 对营养物质需求大, 特别是水和热能
C. 对营养物质需求大, 特别是水和蛋白质
D. 对营养物质需求同其他人群
E. 对营养物质需求大于其他人群
124. 100ml 牛奶所产生的能量约为
A. 60kcal B. 50kcal
C. 65kcal D. 75kcal
E. 80kcal
125. 儿童时期哪个系统发育最早
A. 淋巴系统 B. 生殖系统
C. 神经系统 D. 呼吸系统
E. 循环系统
126. 新生儿期是指
A. 从脐带结扎到满 28 天
B. 从胎儿娩出到整 28 天
C. 从脐带结扎到整 1 个月
D. 从脐带结扎到整 30 天
E. 从胎儿娩出到整 1 个月
127. 7 岁的孩子, 腕部骨化中心出现的只数大约为
A. 5 个 B. 4 个
C. 6 个 D. 7 个
E. 8 个
128. 男婴, 11 个月, 单纯母乳喂养, 不规则添加辅食。因面色进行性苍白 3 个月, 发热、咳嗽、气促 2 天入院。体检: 呼吸促, 面色苍白, 唇周轻微青紫, 心率 150 次/分钟, 双肺可闻中小水泡音。肝肋下 3.0cm, 脾肋下未触及。查 WBC $15 \times 10^9/L$, Hb 60g/L, RBC $2.6 \times 10^{12}/L$, PLT $160 \times 10^9/L$; 红细胞大小不等, 中心浅染区扩大, 网织红细胞、血小板和白细胞数正常范围。下列哪项为正确的输血治疗方法
A. 按每次 10ml/kg, 快速
B. 按每次 15ml/kg, 慢速
C. 按每次 10ml/kg, 慢速
D. 按每次 5ml/kg, 慢速
E. 按每次 5ml/kg, 快速
129. 影响儿童健康的环境因素不包括
A. 化学因素 B. 物理因素
C. 遗传因素 D. 生物学因素
E. 社会因素

130. 麻疹减毒活疫苗复种时的年龄为
A. 4岁 B. 3岁
C. 5岁 D. 6岁
E. 7岁
131. 女婴, 10个月, 人工喂养, 未加辅食, 反复腹泻3个月, 渐见苍白2个月, 对周围反应差, 舌唇颤抖, 红细胞数 $2.0 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 $75g/L$, 血涂片可见红细胞大小不等, 以大红细胞多见, 可见嗜多色性和嗜碱性点彩红细胞。经维生素 B_{12} 100mg, 每周3次肌肉注射及维生素C治疗4周后, 反应已正常, 颤抖消失, 红细胞数 $3.2 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 $95g/L$, 此种情况应属于
A. 效果差, 宜加大维生素 B_{12} 剂量
B. 效果差, 宜加输血疗法
C. 正常治疗反应, 维持原有治疗
D. 效果差, 宜加用铁剂治疗
E. 诊断不对, 需重新考虑诊断
132. 在妊娠的哪一时期, 对母亲的不利因素最容易造成胎儿的先天畸形
A. 妊娠早期 B. 妊娠早、中期
C. 妊娠晚期 D. 妊娠中期
E. 妊娠中、晚期
133. 满4个月时首先考虑添加
A. 米粉(冲成糊状) B. 饼干
C. 烂面 D. 粥
E. 菜泥
134. 患者, 女, 10个月, 人工喂养, 未添加辅食, 因面色苍白、精神、食欲差2个月就诊。查体面色蜡黄, 眼结膜苍白, 心前区听诊闻及Ⅱ级柔和收缩期杂音, 肝肋下3cm, 脾肋下1cm。末梢血血红蛋白 $75g/L$, 红细胞 $2.0 \times 10^{12}/L$, 网织红细胞 0.5%。肝脾增大的原因, 最可能的是
A. 心力衰竭 B. 乙型肝炎
C. CMV 感染 D. 髓外造血
E. 先天性代谢疾病
135. 关于小儿生后造血。下列哪项是错误的
A. 生后主要是骨髓造血
B. 生后造血分骨髓造血和髓外造血
C. 必需时才出现髓外造血
D. 儿童期长骨全为红骨髓
E. 主要是红骨髓造血
136. 机体内最大最复杂的内分泌器官是
A. 脑垂体 B. 甲状腺
C. 消化道 D. 下丘脑
E. 肾脏
137. 一岁小儿的体格发育应达到以下指标, 但有一项除外
A. 身长 76cm B. 体重 9kg
C. 头围 49cm D. 出牙 6个
E. 腕部 X 线出现骨化中心 2 个
138. 接种脊髓灰质炎疫苗后可能发生麻痹的疾病是
A. X-连锁无丙种球蛋白血症
B. 选择性 IgA 缺陷病
C. X-严重联合免疫缺陷病
D. X-高 IgM 血症
E. 慢性肉芽肿病
139. 哪一种不是神经递质
A. 乙酰胆碱 B. 激肽
C. 组胺 D. 5-羟色胺
E. 去甲肾上腺素
140. 在整个妊娠过程中, 妊娠中期是指
A. 自妊娠 12 周至未满 28 周
B. 自妊娠 13 周至未满 28 周
C. 自妊娠 14 周至未满 30 周
D. 自妊娠 10 周至未满 24 周
E. 自妊娠 15 周至未满 26 周
141. 1岁, 男, 母乳喂养未添加辅食。查体虚胖, 毛发稀黄, 面色苍黄, 肝肋下 3cm, 脾肋下 1.5cm, 表情呆滞, 智力发育落后, 肢体震颤, 踝阵挛阳性。首选的实验室检查是
A. 脑电图 B. 心电图
C. B 型超声检查 D. 尿常规检查
E. 血常规检查
142. 对一个孕 34 周早产儿进行检查, 发现下列中哪一项并不具备
A. 头发乱如绒线头
B. 皮肤发亮, 水肿, 毳毛多
C. 指甲未达指尖
D. 足纹遍及整个足底
E. 耳壳软, 甚可折叠, 耳舟不清楚
143. 醛固酮的主要作用是
A. 保 Na^+ 排 K^+ B. 排 Na^+ 排 K^+
C. 排 Na^+ 保 K^+ D. 保 Na^+ 保 K^+
E. 保 H^+ 排 Na^+
144. 新生儿血清 IgG 水平
A. 未成熟儿高于成熟儿
B. 较其母体高 10% ~ 15%
C. 与正常成人相似
D. 明显低于正常成人