

最佳畅销书

2015

全国卫生专业技术
资格考试权威推荐用书

外科主治医师 资格考试冲刺试卷

(第三版)

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写



更多免费题库

考前辅导授课名师，紧扣考纲精选试题

涵盖突出考试重点，提高考前冲刺效率

中国医药科技出版社

2015 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书

外科主治医师资格考试冲刺试卷

(第三版)

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

编委 (按姓氏笔画排序)

方 艳 吴春虎 何艳新

耿东伟 郭 勇

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外科主治医师资格考试冲刺试卷/卫生专业技术资格考试研究专家组编写.
—3 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2014. 11
2015 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书
ISBN 978 - 7 - 5067 - 7065 - 1

I. ①外… II. ①卫… III. ①外科学 - 医药卫生人员 - 资格考试 - 习题集
IV. ①R6 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 247063 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm $1/16$

印张 7 $1/2$

字数 195 千字

初版 2012 年 11 月第 1 版

版次 2014 年 11 月第 3 版

印次 2014 年 11 月第 3 版第 1 次印刷

印刷 三河市腾飞印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7065 - 1

定价 26.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

目 录

冲刺试卷一	1
基础知识	3
相关专业知识	11
专业知识	19
专业实践能力	28
冲刺试卷二	37
基础知识	39
相关专业知识	47
专业知识	55
专业实践能力	63
冲刺试卷三	71
基础知识	73
相关专业知识	81
专业知识	89
专业实践能力	98
参考答案	105

冲刺试卷一

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 凝血反应不包括

- A. 接触激活
- B. 组织激活
- C. 血液中毒
- D. 溶血反应
- E. 血液凝固

2. 下列哪项是致炎反应的

- A. 细菌感染
- B. 病毒感染
- C. 细菌感染
- D. 细菌感染
- E. 细菌感染

3. 大量输血引起的并发症不包括

- A. 暂时性低钙
- B. 高钾
- C. 高钠
- D. 低钠
- E. 低血容量

4. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

5. 下列哪项是致炎反应的

- A. 细菌感染
- B. 病毒感染
- C. 细菌感染
- D. 细菌感染
- E. 细菌感染

6. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

7. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

8. 皮下血、血尿或新式血

- A. 皮下血、血尿或新式血
- B. 皮下血、血尿或新式血
- C. 皮下血、血尿或新式血
- D. 皮下血、血尿或新式血
- E. 皮下血、血尿或新式血

9. 下列哪项是致炎反应的

- A. 细菌感染
- B. 病毒感染
- C. 细菌感染
- D. 细菌感染
- E. 细菌感染

10. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

11. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

12. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

13. 下列哪项是致炎反应的

- A. 细菌感染
- B. 病毒感染
- C. 细菌感染
- D. 细菌感染
- E. 细菌感染

14. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

15. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

16. 凝血早期是其他并发症

- A. 凝血早期
- B. 凝血早期
- C. 凝血早期
- D. 凝血早期
- E. 凝血早期

一卷為陳書

基础知识

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 输血反应不包括

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 血液中毒
- D. 溶血反应
- E. 细菌污染中毒

2. 下列均属酰胺类局麻药的是

- A. 普鲁卡因、利多卡因、丁卡因
- B. 普鲁卡因、布比卡因、丁卡因
- C. 普鲁卡因、罗哌卡因、丁卡因
- D. 利多卡因、布比卡因、罗哌卡因
- E. 利多卡因、布比卡因、丁卡因

3. 大量输血引起的并发症不包括

- A. 暂时性低血钙
- B. 高血钾
- C. 高血钠
- D. 碱中毒
- E. 凝血异常

4. 输血早期最常见的并发症是

- A. 循环超负荷
- B. 发热反应
- C. 细菌污染反应
- D. 溶血反应
- E. 疾病传播

5. 下列血液成分中，最适合用于因多次输血而有发热反应的是

- A. 浓缩红细胞
- B. 全血
- C. 冰冻红细胞
- D. 少浆血
- E. 洗涤红细胞

6. 细胞外液中重要的是

- A. Na^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^- 和蛋白质
- B. Na^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^-
- C. Na^+ 、 Cl^- 、 HPO_3 和蛋白质
- D. K^+ 、 Na^+ 、 Mg^{2+} 、 HPO_3^{2-} 、 HCO_3^- 和蛋白质
- E. Na^+ 、 H^+ 、 HPO_3^{2-} 和蛋白质

7. 黑痣为良性肿物，可分为

- A. 皮内痣、皮外痣和交界痣
- B. 皮内痣、皮下痣和交界痣

C. 皮下痣、交界痣和混合痣

D. 皮内痣、交界痣和混合痣

E. 以上都不是

8. 下列不是呼吸心搏停止诊断必须依据的是

- A. 患者意识消失
- B. 无自主呼吸
- C. 大动脉无搏动
- D. 心音不能闻及
- E. 体温下降

9. 有关 MODS 发病基础的叙述，下列正确的是

- A. 严重的损伤，如大面积烧伤和大手术
- B. 严重的急腹症，如出血性坏死性胰腺炎
- C. 腹外其他部位的化脓性病变，如脓毒血症
- D. 心跳呼吸骤停复苏后、产后大出血等
- E. 以上都是

10. 心肺复苏的“生存链”中，不包括

- A. 早期识别和启动 EMS
- B. 早期后送
- C. 早期 CPR
- D. 早期除颤
- E. 早期由专业人员进行高级生命支持

11. 下列不属于氟喹诺酮类药物的药理学特性是

- A. 抗菌谱广
- B. 口服吸收好
- C. 与其他抗菌药物无交叉耐药性
- D. 不良反应较多
- E. 体内分布较广

12. 一位严重烧伤患者需要输注血浆，当地不能及时查血型，首选下列哪种血浆

- A. A 型
- B. O 型
- C. AB 型
- D. B 型
- E. A 和 B 混合血浆

13. 幽门梗阻所致持续呕吐可造成

- A. 低氯低钾性酸中毒
- B. 低氯高钾性酸中毒
- C. 低氯低钾性碱中毒
- D. 低氯高钾性碱中毒
- E. 以上都不对

14. 手部化脓性感染的手术原则中, 错误的是
 - A. 手术宜选用区域阻滞麻醉
 - B. 脓液应做细菌培养及药敏试验
 - C. 应用有效抗生素
 - D. 伤口应置引流物, 以免影响功能
 - E. 炎症消退后, 早期进行功能锻炼
15. 关于感染性休克, 下列错误的是
 - A. 通常由金黄色葡萄球菌感染引起
 - B. 治疗较低血容量休克困难
 - C. 常伴 SIRS
 - D. 皮肤可以潮红
 - E. 脉压可以 $>30\text{mmHg}$
16. 导致感染性休克的是
 - A. 革兰阳性菌
 - B. 革兰阴性菌
 - C. 链球菌感染
 - D. 两者均有
 - E. 两者均无
17. 能够较早发现肿瘤发生骨转移的检查, 下列首选的是
 - A. X 线检查
 - B. B 超
 - C. CT
 - D. MRI
 - E. 正电子发射断层扫描 (PET)
18. 关于椎管内麻醉的叙述, 不正确的是
 - A. 椎管内麻醉就是指硬膜外阻滞
 - B. 椎管内麻醉属于局部麻醉
 - C. 椎管内麻醉作用对象是脊神经根
 - D. 最细的交感神经纤维最先被阻滞
 - E. 受阻滞区域出现肌肉松弛现象
19. 输血相关性传染病不包括
 - A. 巨细胞病毒感染
 - B. 疟疾
 - C. 乙型肝炎
 - D. 甲型肝炎
 - E. 丙型肝炎
20. 以下症状体征为股骨粗隆间骨折区别于股骨颈骨折的项目为
 - A. 髋部肿胀压痛
 - B. 下肢短缩畸形
 - C. 下肢外旋 60° 畸形
 - D. 下肢外旋 90° 畸形
 - E. 髋分离试验阳性
21. 下面引起高钾血症的病因中哪项是不正确的
 - A. 组织损伤
 - B. 大量输入库血
 - C. 急性肾功能衰竭
 - D. 盐皮质激素过多
 - E. 中毒
22. 男性, 75 岁, 胃癌根治术后 7 天, 剧烈咳嗽时, 突然出现切口疼痛, 并流出少量淡红色液体, 病人最可能出现了
 - A. 切口内癌细胞种植
 - B. 切口感染
 - C. 切口裂开
 - D. 切口血肿
 - E. 切口脂肪液化
23. 对心搏呼吸骤停的初期复苏措施中不包括
 - A. 解除舌后坠
 - B. 清除分泌物或呕吐物
 - C. 口对口人工呼吸
 - D. 心脏按压
 - E. 留置导尿
24. 控制性降压的血压控制标准是
 - A. 舒张压不低于 80mmHg
 - B. MAP 在 $80 \sim 90\text{mmHg}$
 - C. 降低基础血压的 10%
 - D. 降低基础血压的 30%
 - E. 降低基础血压的 20%
25. 急性肾衰竭患者少尿期或无尿期, 需紧急处理的失调是
 - A. 低氯血症
 - B. 低钠血症
 - C. 低钾血症
 - D. 高钾血症
 - E. 高镁血症
26. 低渗性缺水时, 体液的容量改变为
 - A. 细胞外液正常, 细胞内液减少
 - B. 细胞外液减少, 细胞内液正常
 - C. 细胞外液显著减少, 细胞内液轻度减少
 - D. 细胞外液轻度减少, 细胞内液显著减少
 - E. 细胞内外液按比例减少
27. 正常人每天每千克体重静息能量消耗 (BEE) 为
 - A. 10kcal
 - B. 25kcal
 - C. 50kcal
 - D. 45kcal
 - E. 60kcal
28. 患者, 男, 59 岁。2 型糖尿病史 16 年。二甲

- 双胍 0.25g 及格列齐特 80mg 每日三次, 糖尿病控制良好。近 2 个月感乏力、体重下降 4 ~ 5kg。肠镜检查发现乙状结肠癌拟行手术治疗。围手术期糖尿病处理
- A. 停口服降糖药、减少饮水量
 - B. 改用长效胰岛素
 - C. 改用短效胰岛素
 - D. 胰岛素及胰岛素增敏剂联合治疗
 - E. 改用 α -葡萄糖苷酶抑制剂
29. 直肠癌病人术中探查见: 直肠巨大肿物与盆壁明显固定, 肠腔只可容纳小指尖, 腹膜后多发肿大淋巴结, 左肝外侧叶硬结。此时应选择何种手术方式
- A. 单纯活检后关腹
 - B. 直肠癌根治术加肝左叶切除术
 - C. 直肠癌根治术
 - D. 乙状结肠造口术
 - E. 保留肛门的直肠癌根治术
30. 心脏贯通伤的诊断要点中, 错误的是
- A. 伤口位于心脏体表投影区域或其附近
 - B. “Beck”三联征
 - C. 失血性休克和大量血胸
 - D. 伤后时间短, 病情进展迅速
 - E. X 线或 CT 检查
31. 属于外科特异性感染的是
- A. 金黄色葡萄球菌感染
 - B. 变形杆菌感染
 - C. 铜绿假单胞菌 (绿脓杆菌) 感染
 - D. 链球菌感染
 - E. 破伤风杆菌感染
32. 应激性溃疡大出血一旦发生有较高的死亡率, 下列治疗措施错误的是
- A. 鼻胃管冷冻盐水洗胃
 - B. 内镜下电凝或激光止血
 - C. 选择性胃左动脉插管注入垂体后叶素
 - D. 静脉注射生长激素
 - E. 静脉注射质子泵抑制剂如奥美拉唑等
33. 大量输入生理盐水治疗等渗性缺水可导致
- A. 血钾升高
 - B. 血钠升高
 - C. 血氯升高
 - D. 对血清电解质无影响
 - E. 血钙升高
34. 抗真菌药物应用时要特别注意
- A. 使用敏感药物
 - B. 早期预防性使用
 - C. 使用中需行肝肾功能检查
 - D. 联合用药
 - E. 在使用抗生素初期即可使用
35. DIC 治疗下列正确的是
- A. 首先治疗 DIC, 然后处理原发病
 - B. 对早期疑似 DIC 可用肝素治疗
 - C. 一经确诊为 DIC, 应立即行抗凝治疗
 - D. 在 DIC 早期应使用抗纤溶药物治疗
 - E. DIC 后期禁用肝素治疗
36. 有关肿瘤细胞分化的叙述, 错误的是
- A. 恶性肿瘤的分化程度不同, 其恶性程度亦不同
 - B. 恶性肿瘤可分为高分化、中分化与低分化 (或未分化)
 - C. 酶的活性并不随分化程度的高低而增高或降低
 - D. 未分化显示高度恶性, 核分裂较多
 - E. 高分化接近正常分化程度, 恶性程度低
37. 下列疾病手术属择期手术的是
- A. 胃穿孔
 - B. 胃溃疡
 - C. 胃癌
 - D. 幽门梗阻
 - E. 肠扭转
38. 男性, 30 岁, 十二指肠溃疡引起黑粪, 呕血, 神志尚清楚, 但较淡漠, 很口渴, 四肢肤色苍白、发冷, 脉搏 120 次/分, 血压 10.7/8kPa (80/60mmHg), 表浅静脉塌陷, 毛细血管充盈迟缓, 尿少, 提示失血量已达总血容量的
- A. 10%
 - B. 10% ~ 20%
 - C. 20% ~ 40%
 - D. >40%
 - E. 以上都不对
39. 下列恶性肿瘤可单独应用化疗治愈的是
- A. 乳腺癌
 - B. 绒毛膜上皮癌
 - C. 霍奇金病
 - D. 肾母细胞瘤

- E. 粒细胞白血病
40. 导致烧伤全身性感染, 致病菌重要的内源性来源是
A. 肠道 B. 泌尿道
C. 输液管 D. 呼吸道
E. 创面
41. 下列哪一项不是急性肾功能衰竭少尿期的水、电解质、酸碱平衡紊乱的临床表现
A. 水中毒 B. 高血钾、高血镁
C. 高磷、高钙 D. 低钠、低氯
E. 酸中毒
42. 术后拆线时间错误的是
A. 头面部 4~5 天 B. 下腹部 5~6 天
C. 会阴部 6~7 天 D. 上腹部 7~9 天
E. 四肢 10~12 天
43. 关于体液的描述, 下列错误的是
A. 水占全身体重的 50%~70%
B. 男性平均值为 50%, 女性平均值为 60%, 二者均可有 $\pm 15\%$ 的正常变异
C. 健康人实测值恒定, 随脂肪组织量和年龄等因素而定
D. 女性总体液量较低, 是由于皮下脂肪多, 而肌肉较少
E. 新生儿总液体量较高, 占 75%~80%
44. 下列静脉麻醉药镇痛作用最强的是
A. 异丙酚 B. 依托咪酯
C. 羟丁酸钠 D. 氯胺酮
E. 咪唑安定 (咪达唑仑)
45. 关于 CO_2 排出综合征, 下列错误的是
A. 其表现为血压下降、心动过速、严重心律失常, 甚至心脏停搏
B. 治疗时不必补充血容量
C. CO_2 突然排出, 可使冠脉和脑血管收缩
D. PaCO_2 持续升高一段时间后, 突然降低可诱发此症
E. 治疗 PaCO_2 升高, 通气量要逐步增加
46. 休克病人经抢救后, 血压正常, 但尿管引流仅 100ml。为确定是否有急性肾功能衰竭少尿期, 下述检查哪个是正确的
A. 尿钠降低
B. 尿中尿素值升高
C. 血细胞比容 (红细胞压积)、血浆蛋白下降
D. 尿肌酐与血肌酐的比值, 30:1
E. 血钾升高
47. 有关肿瘤的概念与描述, 下列不正确的是
A. 肿瘤是机体中正常细胞在不同的始动与促进因素长期作用下, 所产生的增生与异常分化所形成的新生物
B. 肿瘤一旦形成后, 不因病因消除而停止增生
C. 肿瘤不受机体生理调节正常生长
D. 肿瘤在生长过程中可采用生物学手段有效控制生长
E. 肿瘤可分为良性与恶性
48. 批量战伤伤员分类的目的是
A. 明确伤情
B. 明确伤类
C. 明确伤型
D. 确定救治及后送次序
E. 便于阶梯治疗
49. 心搏停止时间是指从心搏骤停起至
A. 自主呼吸恢复为止的时间
B. 意识恢复为止的时间
C. 心脏自动节律恢复为止的时间
D. 开始有效心肺复苏为止的时间
E. 呼吸心跳恢复正常为止的时间
50. 恶性黑色素瘤采取手术治疗时, 不正确的是
A. 只适用于 I~III 级的恶性黑色素瘤
B. 根治性切除包含扩大的肿瘤切除及区域淋巴结清扫
C. 切除线应距肿瘤边缘 4cm
D. 深部应包括皮下组织和深筋膜一并切除
E. 趾或指端恶性黑色素瘤可做截肢处理
51. 女性, 60 岁, 患急性化脓性胆管炎。血压 10/8kPa (75/60mmHg), 脉搏 132 次/分, 每小时尿量 <20ml, 用心血管药时宜首选
A. 去甲肾上腺素
B. 异丙肾上腺素

- C. 间羟胺（阿拉明）
D. 苯肾上腺素（去甲肾上腺素）
E. 多巴胺
52. 关于包扎的叙述，正确的是
A. 越紧越好
B. 超出伤口边缘 20cm
C. 良好的包扎能达到止痛、止血目的
D. 遇有污染的骨折端，还纳后再包扎
E. 有脱出内脏可不必包扎
53. 替尼泊苷属于下列哪类抗肿瘤药物
A. 抗生素类 B. 抗代谢类
C. 生物碱类 D. 细胞毒素类
E. 激素类
54. 为预防甲亢术后出现甲状腺危象，最关键的措施是
A. 术后用冬眠合剂镇静
B. 吸氧
C. 术后给予氢化可的松
D. 术后补钙
E. 术前使基础代谢率降至正常范围
55. MODS 的共同病理生理变化是
A. 微循环障碍
B. 组织缺血再灌注
C. 血压迅速下降
D. DIC，大量血浆渗出
E. 以上都不正确
56. 鼻导管低流量 3L/min 给氧， FiO_2
A. 24% B. 28%
C. 32% D. 36%
E. 40%
57. 术后 MODS 中较容易和较早受到损害的器官是
A. 脑 B. 肺
C. 胃肠道 D. 肾脏
E. 肝脏
58. 有助于破伤风与脑膜炎鉴别的是
A. 肌痉挛 B. 颈项强直
C. 发热 D. 有潜伏期
E. 间隙期内肌张力
59. 肝、脾破裂并大出血休克，应采取的急救措施是
A. 立即行 B 超或 CT 检查，明确诊断再决定治疗方案
B. 抗休克的同时，紧急施行剖腹探查术
C. 立即抗休克，待血压平稳后，施行剖腹探查术
D. 抗休克的同时，立即行 B 超或 CT 检查，确诊后紧急施行剖腹探查术
E. 抗休克的同时，观察病情变化
60. 下列关于体内钙的说法不正确的是
A. 机体内钙的绝大部分以磷酸钙和碳酸钙的形式贮存于骨骼中
B. 细胞外液钙仅为总钙量的 0.1%
C. 血钙中 50% 为离子化钙
D. 血钙浓度为 2.25 ~ 2.75mmol/L
E. pH 降低可使离子化钙增加
61. 有关皮肤癌病因学的叙述，下列不正确的是
A. 长期日光暴晒或受到过量的放射线照射
B. 长期接触沥青、煤焦油、砷剂等化学物质
C. 不良嗜好，如酗酒、吸烟等
D. 慢性溃疡或窦道、慢性肉芽肿
E. 遗传因素
62. 下列输血适应证，不正确的是
A. 抵抗力低，补充营养
B. 凝血异常
C. 严重贫血或低蛋白血症
D. 急性大量失血
E. 重症感染
63. 经肌间沟径路行臂丛神经阻滞，一般不会发生下列哪项并发症
A. 膈神经麻痹 B. 喉返神经麻痹
C. 霍纳综合征 D. 气胸
E. 高位硬膜外阻滞
64. 高渗性缺水的治疗一般先用
A. 10% 葡萄糖溶液
B. 10% 葡萄糖溶液 + 等渗盐水
C. 5% 葡萄糖溶液或 0.45% 氯化钠溶液
D. 5% 葡萄糖盐水
E. 复方氯化钠溶液

65. 长时间用全胃肠外营养, 理想的静脉为
A. 上肢静脉 B. 头静脉
C. 大隐静脉 D. 颈外静脉
E. 颈内或锁骨下静脉
66. 下列应激系数哪一项是正确的
A. 大中手术 1.2 B. 多发骨折 1.8
C. 严重感染 1.6 D. 大面积烧伤 2.0
E. 严重创伤 2.0
67. 关于体循环阻力, 下述错误的是
A. 外周血管阻力与血压成正比
B. 感染性休克患者 SVR 下降
C. 多巴胺受体阻滞药使 SVR 增高
D. 心源性休克时 SVR 增高
E. SVR 下降时心肌耗氧减少, 但易发生心血管虚脱
68. 烧伤病人休克改善的临床监测指标最可靠的是
A. 呼吸频率 B. 每小时尿量
C. 心率 D. 神志
E. 是否口渴
69. 下列哪一项不是低渗性脱水的临床表现
A. 尿量正常、稍多或减少
B. 尿比重低
C. 皮肤弹性差
D. 神经系统表现
E. 以上都不是
70. 休克患者在应用胶体液时, 下列不正确的是
A. 失血性休克, 尽量以全血补充失血量
B. 白蛋白一般不用于抗休克治疗
C. 胶体溶液不包括明胶和羟乙基淀粉
D. 血浆优于血浆增量剂, 特别是休克晚期有出血倾向时
E. 低分子右旋糖酐每日用量一般为 500 ~ 1000ml
71. 评定营养状态, 临床通常采用
A. 三头肌皮皱厚度、体重
B. 体重、血清白蛋白检测
C. 三头肌皮皱厚度、淋巴细胞计数
D. 氮平衡试验、淋巴细胞计数
E. 肌酐身高指数
72. 蛛网膜下腔出血的直接 CT 征象是
A. 脑室内出血
B. 脑沟、脑池密度增高
C. 脑内血肿
D. 基底节区高密度影
E. 脑水肿
73. 反映总肺泡通气量变化的最佳指标是
A. 潮气量 B. pH
C. ADO_2 D. PaO_2
E. PaCO_2
74. 纠正休克所并发的酸中毒关键在于
A. 充分换气 B. 补充碱性药物
C. 改善组织灌注 D. 提高血压
E. 应用激素
75. 剖腹术后 1 周, 伤口内有多量淡红色液体流出, 应考虑最大可能
A. 切口感染 B. 切口裂开
C. 切口液化 D. 切口内有血肿
E. 营养不良
76. 严重低渗性缺水补液治疗应首选
A. 5% 葡萄糖溶液 B. 5% 高渗盐水溶液
C. 生理盐水 D. 10% 葡萄糖溶液
E. 10% 氯化钠溶液
77. 下列海绵状淋巴管瘤的临床特点中, 错误的是
A. 面部、颈部、唇舌口腔黏膜、躯干、四肢及外阴等均可发生
B. 主要生长于皮肤、皮下组织、肌肉和肌间结缔组织间隙中
C. 呈多房囊腔, 囊壁较厚, 充满淋巴液, 压之有伸缩性
D. 表面皮肤色素沉着明显
E. 可在局部产生各种巨舌、巨唇或巨肢等畸形
78. 下列哪项不是手术后出血常见的原因
A. 术后腹腔内未放置引流管
B. 术中止血不彻底
C. 原痉挛的小动脉断端舒张
D. 创面渗血未能完全控制
E. 凝血功能障碍

79. 胸外心脏按压的正确部位是
- A. 胸骨上、中 1/3 交界处
 - B. 胸骨下 1/2
 - C. 胸骨左缘第 4 肋间
 - D. 胸骨中、下 1/3 交界处
 - E. 胸骨左缘第 4 肋间腋中线上
80. 男, 54 岁, 术前肾功能正常, 在全麻下行左肝叶切除术后转入 ICU, 第 3 天出现少尿, 下列哪项是急性肾衰竭的可靠指标
- A. 少尿
 - B. 血钠 > 20mmol/L
 - C. 高钾血症
 - D. 血清肌酐突然增加
 - E. 血尿素氮突然增加
81. 关于脊椎结核的 MRI 表现, 下列错误的是
- A. 脊椎结核的椎体信号改变, 大多数 T1WI 呈均匀的较低信号, T2WI 呈混杂高信号
 - B. 在椎体终板附近可见到低信号的米粒状病变
 - C. 受累椎间盘 T1WI 多呈低信号, T2WI 常为不均匀混杂高信号
 - D. 椎旁软组织包括脓肿和肉芽肿, T1WI 呈低信号, T2WI 多呈混杂高信号
 - E. 附件结核破坏灶在 T1WI 和 T2WI 上较易清晰显示
82. 关于颈丛神经阻滞的叙述, 不正确的是
- A. 适用于颈部外科手术
 - B. 可能并发全脊髓麻醉或广泛硬膜外阻滞
 - C. 常出现膈神经麻痹, 不宜双侧同时阻滞
 - D. 霍纳综合征是星状神经节被阻滞的结果
 - E. 出现声音嘶哑提示膈神经麻痹
83. 被动免疫预防破伤风杆菌感染的叙述不正确的是
- A. 伤后 24 小时内可注射
 - B. 注药前必须常规做过敏试验
 - C. 作用快, 而且持久
 - D. 适用于小、深、脏的创口, 严重的开放伤
 - E. 过敏后立即深部肌肉注射肾上腺素抢救
84. 要素饮食, 1ml 溶液中含有热量
- A. 3. 25kJ
 - B. 4. 18kJ
 - C. 2. 75kJ
 - D. 6. 25kJ
 - E. 5. 36kJ

85. ARDS 患者形成肺水肿的主要机制是
- A. 肺血管收缩、肺动脉高压形成
 - B. 肺微血管内静脉压升高
 - C. 血液胶体渗透压降低
 - D. 肺淋巴回流障碍
 - E. 肺泡-毛细血管膜损伤
86. 恶性肿瘤诊断中正确性最高的是
- A. 临床表现和体征
 - B. 有关的化验阳性
 - C. X 线检查
 - D. CT
 - E. 病理检查

87. 右心衰竭心功能变化为下列哪项

	CI	EF	LVEDP	RVEDP	PAWP
A	↓	↓	↓	正常	↑
B	↓	↓	↑	正常	↑
C	↓	↑	↑	正常	↑
D	↓	↓	↑	↑	↑
E	↓	↓	↓	↓	↓

- A. A
 - B. B
 - C. C
 - D. D
 - E. E
88. 一般手术手术区皮肤的准备 (备皮), 一般是提前几天
- A. 1 天
 - B. 2 天
 - C. 3 天
 - D. 4 天
 - E. 5 天
89. 女性, 36 岁, 肠扭转致广泛小肠坏死、休克, 做坏死肠切除, 术后休克有好转。对该病人做以下监护项目中哪项是不必要的
- A. 精神状态
 - B. 观察皮色、皮温
 - C. 血压、脉搏、尿量
 - D. 心电图监护
 - E. 脑电图监护
90. 氨基酸注射液通常必需氨基酸和非必需氨基酸的含量比是
- A. 1:1
 - B. 1:2
 - C. 1:3
 - D. 1:4
 - E. 1:5
91. 全胃肠外营养, 糖代谢紊乱所致最严重的并发

症是

- A. 低血糖
- B. 高渗性非酮症性昏迷
- C. 血胆红素浓度升高
- D. 转氨酶升高
- E. 电解质紊乱

92. 男性, 28 岁, 体重 60kg。因车祸伤致脾破裂, 急诊手术见腹腔积血 2500ml, 血压 80/60mmHg, 升压药维持血压。选择下列哪种成分输血注

- A. 少浆血
- B. 普通冰冻血浆
- C. 冰冻红细胞
- D. 红细胞悬液
- E. 新鲜冰冻血浆

二、B 型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用 在考前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不 被选择。

(93 ~ 96 题共用备选答案)

- A. 原发急症发病 24 小时内多器官功能衰竭 致死

- B. 原发急症发病 24 小时内 2 个以上器官同时 功能衰竭
- C. 原发急症发病 48 小时后突发 2 个以上器官 功能衰竭
- D. 原发急症发病后 1 个器官功能障碍, 经一 段稳定期后发生更多器官功能障碍
- E. 原发急症发病 48 小时后 1 个器官功能障 碍, 长期治疗不能稳定

93. MODS 速发型

94. MODS 迟发型

95. 复苏失败

96. 不属于复苏失败和 MODS

(97 ~ 100 题共用备选答案)

- A. 限制水、钠摄入
- B. 5% 碳酸氢钠溶液滴注
- C. 保持水、电解质平衡
- D. 静滴 10% 葡萄糖溶液
- E. 行透析

97. 急性肾功能不全少尿期

98. 急性肾功能不全多尿期

99. 急性肾功能不全血钾超过 5.5mmol/L

100. 严重酸中毒治疗的最佳方案是

相关专业知识

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 休克重要的代谢障碍是

- A. 代谢性酸中毒、高钾血症
- B. 代谢性碱中毒、低钾血症
- C. 低渗性脱水、低镁血症
- D. 低糖血症
- E. 低乳酸血症、糖酵解障碍

2. 硬脊膜外麻醉最严重的并发症是

- A. 血压下降
- B. 尿潴留
- C. 头痛
- D. 局麻药毒性反应
- E. 全脊髓麻醉

3. 择期手术术前禁食时间应为

- A. 6小时
- B. 8小时
- C. 10小时
- D. 12小时
- E. 14小时

4. 诊断心脏停搏的指标是

- A. 大动脉无搏动
- B. 呼吸停止
- C. 脉搏扪不清
- D. 血压测不到
- E. 瞳孔散大

5. 下肢丹毒反复发作可导致

- A. 浅静脉炎
- B. 局部脓肿
- C. 败血症
- D. 象皮肿
- E. 血栓闭塞性脉管炎

6. 清创的原则中，下列各项中错误的是

- A. 清除伤口内异物
- B. 切除失去活力组织
- C. 彻底止血
- D. 根据情况缝合伤口
- E. 必须放置引流

7. 下列哪项不是优先抢救的急症

- A. 心脏停搏
- B. 大出血
- C. 休克
- D. 前臂骨折
- E. 腹部内脏脱出

8. 感染性休克临床表现特点正确的是

- A. 暖休克病人神志淡漠或嗜睡
- B. 冷休克病人皮肤色泽淡红或潮红
- C. 暖休克病人，每小时尿量大于30ml
- D. 冷休克病人脉搏慢、搏动清楚
- E. 暖休克病人毛细血管充盈时间延长

9. 髌骨软骨软化症的治疗，下列哪项是错误的

- A. 理疗
- B. 局部封闭
- C. 确诊后应手术治疗
- D. 服用消炎镇痛药
- E. 加强股四头肌锻炼

10. 临床上区分高位肛瘘与低位肛瘘的标志为

- A. 肛提肌
- B. 内括约肌
- C. 外括约肌
- D. 联合状肌
- E. 肛管直肠环

11. 下列哪项不是单纯性甲状腺肿手术指征的依据

- A. 有明显压迫症状
- B. 胸骨后甲状腺
- C. 继发甲亢
- D. 病史较长者
- E. 疑有恶变者

12. 关于胸壁结核的临床表现，下列描述错误的是

- A. 患者一般多无明显全身症状
- B. 胸壁脓肿表现为红、肿、热、痛
- C. 皮下溃破形成经久不愈的溃疡
- D. 可形成曲折、分叉多的窦道
- E. 脓液黄白色稀薄，内含干酪样物质

13. 我国大肠癌最多发的部位在

- A. 盲肠
- B. 升结肠
- C. 横结肠
- D. 降结肠
- E. 直肠

14. 成人的颅内压正常值为

- A. 0.79~1.77kPa (80~180mmH₂O)
- B. 1.96kPa (200mmH₂O)
- C. 0.59~0.98kPa (60~100mmH₂O)
- D. 1.18kPa (120mmH₂O)
- E. 1.47kPa (150mmH₂O)

15. 脑对冲伤最容易发生的部位是
 - A. 小脑
 - B. 脑干
 - C. 额叶
 - D. 顶叶
 - E. 枕叶
16. 脑震荡最有诊断价值的表现是
 - A. 伤后昏迷时间未超过 30 分钟
 - B. 头痛、头晕和呕吐等症状剧烈
 - C. 近事遗忘
 - D. 伤后有短时生命体征变化
 - E. CT 检查未见异常
17. 锁骨骨折复位固定后拆除外固定的时间一般为
 - A. 3~5 天
 - B. 1~2 周
 - C. 3~4 周
 - D. 6~8 周
 - E. 8 周以上
18. 下列哪项对鉴别良性与恶性骨肿瘤无意义
 - A. 有无全身症状
 - B. 有无局部皮肤静脉怒张，温度增高
 - C. 是否可扪及肿块
 - D. X 线摄片上病变边界是否清楚，是否有明显的骨膜反应
 - E. 碱性磷酸酶是否升高
19. 膀胱癌最常见的临床表现是
 - A. 排尿困难
 - B. 尿中有腐肉样物排出
 - C. 无痛性血尿
 - D. 尿频
 - E. 尿流中断
20. 放射性核素治疗肿瘤的原理主要是利用哪种射线对病变进行局部照射
 - A. 纯 γ 射线
 - B. 纯 β 射线
 - C. α 射线
 - D. 中子
 - E. 质子
21. 大面积烧伤病人按照补液公式计算输液量的时间是
 - A. 从开始静脉输液时算起
 - B. 从受伤时算起
 - C. 从就诊时算起
 - D. 从接受正规治疗时算起
 - E. 从进入监护病房时算起
22. 女性，65 岁，因突发上腹痛 3 天，全腹痛 1 天就诊。查体：血压 80/50mmHg，脉搏 108 次/分，全腹压痛、反跳痛。化验血淀粉酶升高，白细胞 $20 \times 10^9/L$ 。考虑休克、急性胰腺炎，休克的原因是
 - A. 失血性休克
 - B. 神经源性休克
 - C. 心源性休克
 - D. 过敏性休克
 - E. 感染性休克
23. 男性，60 岁，慢性胆囊炎、胆囊结石，拟行手术治疗，曾患心肌梗死，手术治疗至少应在心肌梗死
 - A. 1 周以后
 - B. 2 周以后
 - C. 4 周以后
 - D. 12 周以后
 - E. 24 周以后
24. 男性，60 岁，左侧腹部隐痛 2 个月，大便次数增多，5~6 次/日，有黏液及脓血。查体：左腹部似可触及包块，有轻压痛，最有诊断意义的检查是
 - A. 血 CEA（癌胚抗原）检查
 - B. B 超检查
 - C. 乙状结肠镜检查
 - D. 全消化道造影
 - E. 血常规 + 便潜血
25. 女性，38 岁，右上腹痛，寒战、高热，呕血约 200ml。查体：皮肤巩膜黄染，肝肋下 1cm，触痛明显，Murphy 征（+），最可能的诊断是
 - A. 食管静脉曲张破裂大出血
 - B. 胃癌出血
 - C. 胆道出血
 - D. 胃息肉出血
 - E. 十二指肠溃疡出血
26. 女性，20 岁，甲状腺次全切除术后，饮水时出现呛咳，无声音嘶哑，初步诊断是
 - A. 喉返神经损伤
 - B. 交感神经损伤
 - C. 气管损伤
 - D. 食管损伤
 - E. 喉上神经损伤
27. 下肢静脉曲张，行 Perthes 试验是为了检查
 - A. 大隐静脉瓣膜功能
 - B. 小隐静脉瓣膜功能
 - C. 交通支静脉瓣膜功能

- D. 大隐静脉瓣膜功能
E. 深静脉有无阻塞
28. 女性, 40 岁, 教师, 右下肢静脉迂曲扩张 15 年, 长时间站立有酸胀感, 近 2 年右小腿胫前皮肤颜色加深, 可凹性水肿, Trendelenburg 试验 (+), Perthes 试验 (-), 诊断可能是
A. 单纯性下肢静脉曲张
B. 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全
C. 下肢深静脉血栓形成
D. 动静脉瘘
E. 血栓性浅静脉炎
29. 男性, 43 岁, 右上腹痛不适, 无畏寒、发热、黄疸, B 超检查时右肝有一直径 3.5cm 占位病变, AFP 1000U/L, 最有效的治疗方法是
A. 手术切除
B. 化疗
C. 放疗
D. 免疫治疗
E. 肝移植
30. 女性, 40 岁, 1 小时前跌伤右腕部。查体: 右腕关节肿胀, 呈“餐叉”样畸形, 压痛并活动受限。可能的诊断为
A. 右腕舟骨骨折
B. Smith 骨折
C. 桡神经损伤
D. Colles 骨折
E. 右腕关节脱位
31. 女性, 50 岁, 左拇指痛 3 天, 屈伸活动有弹响。查体: 第一掌指关节掌侧可及圆形结节, 直径 0.3cm, 压痛, 随患指屈伸移动, 疼痛加重。诊断为
A. 第一掌骨头病理性骨折
B. 左拇指屈肌腱狭窄性腱鞘炎
C. 腱鞘囊肿
D. 类风湿关节炎
E. 拇深屈肌腱断裂
32. 男性, 40 岁, 跑步后出现右腰疼痛 1 天, 尿呈淡洗肉水样, 首先应行下列哪项检查
A. 血常规和肾功能检查
B. 肝功能和肾功能检查
C. CT 和磁共振检查
D. 尿常规检查和泌尿系 X 线平片
E. 24 小时尿钙分析
33. 患儿, 男, 9 个月, 体重 10kg, 间歇性哭闹 20 小时, 有规律性, 伴呕吐, 排果酱样便 2 次, 查体: 腹部触及包块。最可能的诊断是
A. 细菌性痢疾
B. 蛔虫性肠梗阻
C. 肠道肿瘤
D. 肠套叠
E. 过敏性紫癜
34. 胸壁结核, 是一种比较常见的胸壁疾病。其临床特点, 下列不正确的是
A. 是胸壁软组织、肋骨或胸骨的结核病变
B. 往往继发于肺、胸膜或纵隔的结核病变, 为结核病的局部表现
C. 胸壁无痛性肿块, 有波动感和轻压痛, 冷脓肿穿破皮肤形成慢性窦道
D. 可合并化脓性感染
E. 脓肿形成, 及时切开引流
35. 颈内动脉海绵窦瘘行闭塞颈内动脉应作好下述准备中, 哪一项是最重要的
A. 术前行 MRI 了解其静脉走向
B. 术前行 CT 检查了解并发伤, 脑血管造影了解瘘口大小
C. 行脑血管造影及颅多普勒了解瘘口大小流速
D. 压迫病侧颈动脉试验, 耐受 30 分钟以上, 对侧颈总动脉造影证实病侧半球侧支循环良好
E. 压迫病侧颈动脉试验, 耐受 20 分钟, 血管造影示瘘口小
36. 关于房间隔缺损修补术, 下述哪项不恰当
A. 修补上腔型缺损时应识别是否合并右肺静脉畸形引流
B. 缝合下缘时应注意识别下腔静脉瓣
C. 筛状缺损应先剪成单孔再修补
D. 闭合缺损前应注意膨肺排气
E. 停止体外循环后输液不能过快以防止发生右心衰和急性肺水肿
37. 有关颈动脉体瘤的临床特点中, 下列不正确的是
A. 位于颈动脉分叉处的化学感受器肿瘤
B. 约有 5% 以上的可发生恶变
C. 肿块表面光滑, 质韧, 边界清楚, 无明显粘连, 多无压痛