

四季花城
SISHIHUACHENG

岭南

冬 季 花 木

朱根发 徐晔春 操君喜 编著



中国农业出版社



四季花城



岭南冬季花木

朱根发 徐晔春 操君喜 编著



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

岭南冬季花木 / 朱根发, 徐晔春, 操君喜编著. —
北京 : 中国农业出版社, 2014.6
(四季花城)
ISBN 978-7-109-18778-8

I . ①岭… II . ①朱… ②徐… ③操… III . ①花卉-
介绍-广东省 IV . ①S68

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第001855号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街18号楼)
(邮政编码 100125)
责任编辑 石飞华

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2014年6月第1版 2014年6月北京第1次印刷

开本：880mm×1230mm 1/32 印张：4.875

字数：200千字

定价：35.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



目 录

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

乔木/1

杧果 / 1	火烧花 / 2	美丽异木棉 / 3
叉孢苏铁 / 4	浙江润楠 / 5	红花羊蹄甲 / 6
深山含笑 / 7	玉兰 / 8	二乔木兰 / 9
高红槿 / 10	乌墨 / 11	白金汉 / 12
梅 / 13	钟花樱桃 / 14	红皮糙果茶 / 15
山茶 / 16	油茶 / 17	茶梅 / 18
广宁红花油茶 / 19		

灌木/20

假杜鹃 / 20	朱蕉 / 21	狗尾红 / 22
一品红 / 23	龙脚叶 / 24	瑞木 / 25
羽叶熏衣草 / 26	迷迭香 / 27	柳叶润楠 / 28
珍珠相思 / 29	火红萼距花 / 30	星花木兰 / 31
棱果花 / 32	宝莲花 / 33	角茎野牡丹 / 34
铜盆花 / 35	金珠柳 / 36	松红梅 / 37
云南素馨 / 38	蓝花丹 / 39	深红树萝卜 / 40
吊钟花 / 41	西洋杜鹃 / 42	石楠杜鹃 / 43
厚叶石斑木 / 44	非洲芙蓉 / 45	金花茶 / 46
米碎花 / 47	烟火树 / 48	冬红 / 49

藤蔓与攀缘植物/50

黄花老鸦嘴 / 50	烟斗马兜铃 / 51	炮仗花 / 52
绿玉藤 / 53	金钩吻 / 54	白花酸藤子 / 55

叶子花 / 56
蔓马缨丹 / 59

蛇王藤 / 57

艳桢桐 / 58

草本花卉 / 60

金苞花 / 60
大叶红草 / 63
南美水仙 / 66
红掌 / 69
彩色马蹄莲 / 72
擎天凤梨 / 75
蟹爪兰 / 78
黄晶菊 / 81
达科他州金色堆心菊 / 84
瓜叶菊 / 87
小岩桐 / 90
风信子 / 93
紫背天鹅绒竹芋 / 96
春兰 / 99
杂交兰 / 102
春剑 / 105
摩帝兜兰 / 108
紫毛兜兰 / 111
海南钻喙兰 / 114
欧洲报春 / 117
黑仔树 / 120

板蓝 / 61
君子兰 / 64
洋水仙 / 67
金钱树 / 70
丽格秋海棠 / 73
红花草凤梨 / 76
蔓枝满天星 / 79
大丽花 / 82
白晶菊 / 85
长寿花 / 88
金鱼花 / 91
杂交百合 / 94
波浪竹芋 / 97
大花蕙兰 / 100
墨兰 / 103
香港毛兰 / 106
肉饼兜兰 / 109
彩云兜兰 / 112
纯色万代兰 / 115
蒲包花 / 118

金边虎尾兰 / 62
垂筒花 / 65
水仙 / 68
马蹄莲 / 71
喜炮凤梨 / 74
仙人指 / 77
矢车菊 / 80
非洲菊 / 83
非洲万寿菊 / 86
天竺葵 / 89
香雪兰 / 92
宫灯百合 / 95
鹤望兰 / 98
垂花蕙兰 / 101
莲瓣兰 / 104
杏黄兜兰 / 107
麻栗坡兜兰 / 110
蝴蝶兰 / 113
仙客来 / 116
香堇菜 / 119

水生花卉 / 121

大花水蓑衣 / 121

圆叶节节菜 / 122

参考文献 / 123

四季花木总索引 / 124

中文名索引 / 124

拉丁名索引 / 140



乔木

杧果

Mangifera indica
芒果、蜜望子
漆树科杧果属

【识别要点】常绿大乔木，高10~20m。叶薄革质，常集生枝顶，叶形和大小变化较大，通常为长圆形或长圆状披针形，先端渐尖、长渐尖或急尖，基部楔形或近圆形，边缘皱波状，无毛，叶面略具光泽。圆锥花序，多花密集，分枝开展，花小，杂性，黄色或淡黄色，花瓣长圆形或长圆状披针形，开花时外卷。核果大，成熟时黄色，中果皮肉质，肥厚，鲜黄色，味甜，果核坚硬。



【花果期】花期冬春，果期夏季。

【产地】云南、广东、广西、福建及台湾。生于海拔200~1350m的山坡、沟谷或旷野的林中。东南亚也有。

【繁殖】播种、嫁接。



【应用】果大，悬垂于枝间，观赏性极佳，园林中常用于园路边、建筑物旁栽培观赏，也可作行道树。其果实为世界著名水果，成熟后可直接食用，也可制作罐头或果酱等。

火烧花

Mayodendron igneum

缅木
紫葳科火烧花属



【识别要点】常绿乔木，高可达15m。树皮光滑，嫩枝具长椭圆形白色皮孔。大型奇数2回羽状复叶，小叶卵形至卵状披针形，长8~12cm，宽2.5~4cm，顶端长渐尖，基部阔楔形，偏斜，全缘。花序有花5~13朵，组成短总状花序，着生于老茎或侧枝上；花萼佛焰苞状，花冠橙黄色至金黄色，筒状，基部微收缩。蒴果长线形，下垂。

【花果期】花期冬末到初夏；果期5~9月。

【产地】台湾、广东、广西、云南南部。常生于海拔150~1900m的干热河谷、低山丛林。越南、老挝、缅甸、印度也有。

【繁殖】播种或扦插。



【应用】开花繁盛，花美丽，着生于老茎上，果似面条悬垂于枝干间，观赏性强，适合作庭园树及行道树等，可于道路两边列植或植于庭园的园路边、草地边或墙隅等处；花可作蔬菜。西双版纳傣族将火烧花作为野生蔬菜食用，将花水煮后用油、佐料小炒。



美丽异木棉

Ceiba speciosa
美人树
木棉科美人树属


【识别要点】落叶大乔木，株高10~15m。树干下部膨大。掌状复叶有小叶5~9片，小叶椭圆形。花单生，花冠淡紫红色，中心白色。蒴果椭圆形。



【花果期】花期冬季；种子翌年春季成熟。

【产地】巴西及阿根廷。

【繁殖】播种。



【应用】开花繁密，花期长，极为美丽，为优良的观花树种，可用作广场、草地中、庭园一隅或风景区等孤植或三五株丛植，也可列植用作行道树。



叉孢苏铁

Cycas segmentifida
山菠萝
苏铁科苏铁属



【识别要点】棕榈状小乔木，株高70cm以上。叶长圆形，扁平，革质，基部下延，边缘平或稍波状，先端渐狭。雄球花黄色，小孢子叶楔形，不育叶卵形、宽卵形或心形。种子淡黄色，球状或宽倒卵形。



【花果期】花期冬春；种子成熟期11~12月。

【产地】广西、贵州及云南东南部。

【繁殖】播种、扦插。



【应用】易栽培，观赏性较佳，除盆栽外，园林中适合山石边、庭院一隅及园路边栽培观赏。

浙江润楠

Machilus chekiangensis
长序润楠
樟科润楠属

【识别要点】乔木。枝褐色，散布纵裂的唇形皮孔。叶常聚生小枝枝梢，倒披针形，先端尾状渐尖，尖头常呈镰状，基部渐狭，革质或薄革质。圆锥花序，花两性，细小，黄绿色，雄蕊基部有腺体。果序生当年生枝基部，纤细；嫩果球形，绿色，干时带黑色。



【花果期】花期冬末春初；果期4～5月。

【产地】浙江、福建、江西、广东及香港等地。

【繁殖】扦插、播种。



【应用】
株形美观，花小，有一定的观赏性，适合公园、绿地绿化作风景树，也可用于城市道路作行道树。



红花羊蹄甲

Bauhinia blakeana
红花紫荆、紫荆花
豆科羊蹄甲属



【花果期】全年均可开花，主要花期为12月至翌年3月。

【产地】杂交种。

【繁殖】扦插、高空压条。



【识别要点】乔木。分枝多，小枝细长，被毛。叶革质，近圆形或阔心形，基部心形，有时近截平，先端2裂为叶全长的 $1/4 \sim 1/3$ ，裂片顶钝或狭圆，上面无毛，下面疏被短柔毛。总状花序顶生或腋生，有时复合成圆锥花序，被短柔毛；花大，美丽；花蕾纺锤形；花萼佛焰状，有淡红色和绿色线条；花瓣红紫色，具短柄，倒披针形，近轴的一片中间至基部呈深紫红色。通常不结果。



【应用】开花时节繁花满树，清香宜人，在园林中常用作风景树或行道树，孤植、列植景观效果皆佳。



深山含笑

Michelia maudiae
光叶白兰花、莫夫人含笑花
木兰科含笑属

【识别要点】 乔木，高达20m。叶革质，长圆状椭圆形，很少卵状椭圆形，先端骤狭短渐尖或短渐尖而尖头钝，基部楔形、阔楔形或近圆钝。花芳香，花被9片，纯白色，基部稍呈淡红色，外轮的倒卵形，内两轮则渐狭小。果实为聚合果；蓇葖长圆形、倒卵圆形、卵圆形；种子红色，斜卵圆形。



【花果期】 花期冬末春初；果期9～10月。

【产地】 浙江、福建、湖南、广东、广西、贵州。生于海拔600～1500m的密林中。

【繁殖】 播种。



【应用】 叶鲜绿，花纯白美丽，为著名庭园观赏树种，可列植或孤植栽培观赏，也可提取芳香油或供药用。

玉兰

Yulania denudata
木兰
木兰科木兰属



【识别要点】落叶乔木，高达25m。树皮深灰色，粗糙开裂。叶纸质，倒卵形、宽倒卵形或倒卵状椭圆形，基部徒长枝叶椭圆形，先端宽圆、平截或稍凹，具短突尖，中部以下渐狭成楔形。花先叶开放，直立，芳香，花被9片，白色，基部常带粉红色，长圆状倒卵形。聚合果圆柱形；蓇葖厚木质，褐色；种子心形，侧扁。



【花果期】花期冬末春初；果期8～9月。

【产地】江西、浙江、湖南、贵州。生于海拔500～1 000m的林中。

【繁殖】播种。



【应用】早春白花满树，艳丽芳香，为驰名中外的庭园观赏树种，在我国南北均有种植，孤植、列植均宜。

二乔木兰

Yulania soulangiana
二乔玉兰
木兰科玉兰属

【识别要点】小乔木，高6~10m。小枝无毛。叶纸质，倒卵形，先端短急尖， $\frac{2}{3}$ 以下渐狭成楔形，上面基部中脉常残留有毛，下面多少被柔毛。花蕾卵圆形；花先叶开放，浅红色至深红色，花被6~9片，外轮3片常较短，约为内轮长的 $\frac{2}{3}$ 。果实为聚合果；蓇葖卵圆形或倒卵圆形，熟时黑色。



【花果期】花期冬末春初；果期9~10月。

【产地】系玉兰和紫玉兰的杂交种。

【繁殖】高空压条、嫁接。



【应用】品种繁多，全国各地有栽培，开花量大，为著名的观花植物，适于园路旁、草坪中、庭院等处丛植或片植观赏。



高红槿

Hibiscus elatus

锦葵科木槿属



【识别要点】常绿乔木，高5m。幼枝被白霜，平滑无毛。叶近圆心脏形，先端短渐尖头，基部心形，全缘至有短齿，上面疏被星状柔毛，渐变无毛，下面被灰色星状茸毛。花单生于叶腋或顶生，有托叶状苞片2；花大，钟状，红色，花瓣5，倒卵状匙形或长圆状匙形。果实未见。

【花果期】花期几乎全年，以初冬为盛。

【产地】原产西印度群岛。我国华东南部及华南有栽培。

【繁殖】扦插。

【应用】花大色艳，极美丽，在岭南地区有少量栽培，可用作行道树及风景树，列植、孤植均可，也适合与其他观花乔木配植。



乌墨

Syzygium cumini
海南蒲桃、乌楣
桃金娘科蒲桃属


【识别要点】 乔木，高15m。嫩枝圆形，干后灰白色。叶片革质，阔椭圆形至狭椭圆形，先端圆或钝，有一个短的尖头，基部阔楔形，稀为圆形。圆锥花序腋生或生于花枝上，偶有顶生，花白色，3~5朵簇生。果实卵圆形或壶形，种子1颗。



【花果期】 花期冬末春初。

【产地】 台湾、福建、广东、广西、云南等地。常见于平地次生林及荒地上。中南半岛、马来西亚、印度、印度尼西亚、澳大利亚等地也有。

【繁殖】 播种。



【应用】 树干通直，四季常绿，树姿优美，花美丽、洁净、素雅，为优良的庭院绿荫树和行道树种。



白金汉


Buckinghamia celsissima
白金汉木
山龙眼科白金汉属




【花果期】花期12月至翌年4月；果期夏季。

【产地】澳大利亚昆士兰州。

【繁殖】播种。



【识别要点】常绿乔木，株高可达25m以上。如在稍冷区域种植，树高不超过8m。叶二型，幼叶常羽状深裂；成株叶互生，长椭圆形，先端尖，基部楔形，两侧不对称，绿色，全缘。花序穗状，花瓣及花丝白色至奶油黄色。



【应用】花奇特，开花极为繁茂，且适应性强，抗性佳。岭南地区有少量引种，适合用作行道树或风景树，也可孤植于草地中观赏。