

大衆萬病顧問問

下冊

耳鼻咽喉科

眼科

齒科

皮膚科

急救科

傷科

性病科

花柳科


戒烟科

總論

醫理須知

【耳之生理】耳屬腎。腎開竅於耳。腎氣和則耳能聞五音矣。
【耳之構造】耳分外耳、中耳、內耳三部。


（耳的構造）



總

論

（骨聽三的內耳中）




1 耳翼 2 聽骨 3 卵圓窗
4 半圓管 5 蝸牛殼 6
聽神經 7 耳氣管 8 正
圖窗 9 鼓室 10 鼓膜
11 外聽道 12 前庭

○外耳 外耳由耳翼和外聽道合成。耳翼為一片彎曲軟骨。下端柔軟肥厚。外聽道為一彎曲細管。管內密生細毛。並有耳膠腺分泌物質。以防外物侵入。

○中耳 中耳即鼓室。其外壁以有彈性的鼓膜與外耳隔開。鼓膜內面連接錘骨、砧骨和鐮骨。這三骨的排列。恰成槓桿作用。使聲

（造構的耳內）



管圓半 2 庭前 1
經神聽 4 壳牛蝸 3

1 鼓膜 2 錘骨 3 砧骨
4 鐮骨

混由三骨的振動。而傳於內耳。故又名聽骨。中耳底部。又有歐氏管。或稱耳氣管。通於咽部。能使鼓膜內外的氣壓平均。不致因劇烈振動而破裂。

○內耳 內耳或稱迷路。構造複雜。其主要部分。為前庭、半圓管、蝸牛壳三部。前庭為一空腔。半圓管有三個。內藏淋巴。故人體轉旋。管內淋巴亂流。即覺昏迷。不能直立。故為均衡身體的器官。蝸牛壳內藏聽神經。末梢上通前庭。下通

鼓室。

【聽覺作用】聲浪由外聽道

達於鼓膜。鼓膜振動。故中耳內的三骨。也同時振動。更波及於蝸牛壳內的淋巴。刺激神經細胞。傳達於大腦的聽覺中樞。就成聽覺作用。但聽覺作用。雖由輾轉傳達而起。而所需的時間很短。

【聽官衛生】耳毛防止塵物


侵入。不可除去。倘有異物侵入。可用溫湯洗出。挖耳易致創傷傳染。最宜謹慎。遇劇烈聲浪。宜即張口。免使鼓膜受損。平時慎防感冒。免使耳氣管發生障礙。過高過低。或均一的音調。易使聽神經疲勞。宜避之。而對小兒尤應注意。

【鼻之生理】鼻屬肺。肺開竅

於鼻。肺氣和。則鼻能覺香臭矣。
【嗅覺作用】鼻腔為呼吸門戶。故對於空氣鮮濁與否之辨別。


端賴鼻腔有嗅覺作用。嗅覺作用起於鼻腔黏膜裏面的嗅細胞。以嗅神經而連於大腦。鼻腔黏膜既與空氣接觸。則各種具有香臭氣味的分子。就刺激嗅神經而傳達於中樞。遂成嗅覺作用。嗅覺作用對於氣狀的物質。最銳敏。但奇香惡臭。不但使嗅神經疲勞。嗅覺遲鈍。且於神經系亦有害處。故宜避之。

(鼻腔的嗅覺器)




【咽喉生理】經曰。咽喉者。水穀之道也。咽喉者。咽以嚥食。喉以候氣也。故咽喉內之兩竅。一曰喉竅。俗名氣管。下接於肺。主氣之呼吸。肺為華蓋。以覆諸臟。司呼吸出入。為人身之管籥也。一曰咽竅。俗名食管。下接於胃。為飲食之路。水穀向下。並歸於胃。乃糧運之關津。


(喉咽)




1 咽即食管 2 喉即氣管
(喉管之一)



(二之管喉)



(管咽)



以司六腑之出納者也。

論治須知

【咽喉總論】夫左為咽屬胃。右為喉屬肺。乃一身百節之關。呼吸出入之門。內經云。一陰一陽結而為痺。一陰者。手少陰君火心之脈氣也。一陽者。手少陽相火三焦之脈氣也。二脈共絡於喉。氣熱則

內結。結甚則腫脹。脹甚則氣痺。痺者不仁之謂。此喉痺之所由名。而乳蛾喉閉。纏喉等症。皆痺類也。(吳氏說)有風寒火溼毒虛之別。或風火相搏。或寒溼相聚。其症變幻不一。如漫腫而多痰。風與溼也。淡白而牙緊。風寒也。紫色不腫而爛者。風伏寒也。紅腫而脈浮者。風火也。脈沉實爛而不腫者。毒也。脈細數而浮者。虛火也。脈細而緩者。虛寒也。六者之象。可類推也。大凡初起之症。診右寸洪緊。肺風也。兩關浮數。胃火肝風也。左寸浮洪。心火也。右寸沉遲。肺伏寒也。右寸沉數。肺伏熱也。右尺洪大。三焦火旺也。左尺浮洪而無力。腎虛火升也。六脈大略論治。俱可用六味湯加減。症若凶險。脈宜細診。更察形弱源。對症用藥。自然可愈。

【咽喉治法總論】醫者當審

其病由。參之時令。必須大湧其痰。去痰之法。先備溫水。使病人漱口。如點刺。或吹藥。令其垂頭。流去痰涎。俟痰涎不止。仍以溫水頻頻漱口。如虛弱人及病勢重者。須要着人扶好。或用銀針刺其患處。風熱者散之。甚者下之。陰寒者溫之。若初起驟用寒涼之藥。則上熱未除。中寒復生。其毒乘虛而入。即喘不休。死不救矣。大抵風熱症十之七。火症十之三。寒症十中一二也。病昏沉。痰多氣急。飲食不進。發熱不退。牙關緊閉。脈息微弱者。症必重。人事不省。痰氣上攻。聲如雷鳴。噎食眼張。天柱倒陷。面黑身焦。鼻如烟煤。張煽不定。目睛突出。汗發如雨。咽喉乾痛。聲啞無痰。手足麻至膝蓋。發喘及呃。脈息如絲。乃死症也。臨症用藥。生死反掌。醫者不可懷希冀之心。故意延挨。病者不可

起懈怠之念。以致決裂。古云。老馬看咽喉。不可少頃者。即此謂也。遇症用藥後。痰少腫退。即愈。如已潰用藥後。越二日即可進飲食者。三日後無不收功。癰喉用藥後。患處要變紅色。知痛癢。有津液潤澤者。可治。用刀針須向自己勾來。不可向病人口內剔去。咽喉忌下刀之地。有四處。嚙化。啞門穴。喉關兩均。上舌下筋。若用刀。其刀頭上須蘸已藥。或亥申藥。庶不作痛。臨症先診其脈象輕重。後看其患處深淺。若脈絕。脈怪。脈死。則毋須用藥矣。因毒已入腹。非藥力所能挽回也。纏喉風。及陰虛喉癰二症。最險而難治。至危而不易識。纏喉風。內外無形。其患在關內。上面有紅絲。如未入心。尚可用藥。已入心。則不治。凡遇此證。宜早治。在一日半日之內。可保無虞。陰虛喉癰。如勞蝦皮

形。有青白點子。高低大小。狀如暑天瘡子。其症雖危。延時最久。或一年半載而死。或一月半月而死。如起病數日之前治之。十症可得九愈。看喉腫處。其色變紅者。即成膿之候。可不刺而自潰也。喉症用糯米泔水。或甘桔湯。或薄荷湯。俱要溫和為主。山查焙燥。磨細末。煎藥內可加一撮。乃消腫解毒。治咽喉之要藥也。病人壯者藥可猛。弱者攻宜緩。動針不可傷小舌。要緊。夜晚看症。宜倍加細心。藥用六味湯。天明復看。再為加減。凡針舌下兩邊青筋。血紅生。血黑死。宜服清腦消痰解毒之劑。

【咽喉絕症絕形總論】

咽喉絕症有四。①為走馬喉風。②即緊喉風。③為鎖喉風。④為走馬牙疳。⑤為纏喉風。凡此四者。皆凶險之症。若不吐不瀉。針之無血。藥不

能入。皆為不治。慎之慎之。咽喉絕形有一六。①為舌捲囊縮。②為角弓反張。③為油汗如珠。④為十指無血。⑤為喉啞噎食。⑥為喉乾無痰。⑦為吐血喉癰。⑧為六脈沉細。⑨為聲如鋸拽。⑩為大便十日不通。⑪為鼻煽唇青。⑫為天柱倒場。⑬為脈細身涼。⑭為兩目直視。⑮為痰壅氣塞。⑯為喉菌不治。凡此皆難治之死證也。

【喉症分經總論】喉有二孔。左為咽。屬胃。納食之關也。右為喉。屬肺。納氣之關也。口內上腭屬胃。陰下腭屬脾陽。舌之中屬心。四圍屬脾。舌根亦屬心。小舌又名蒂丁。屬胃。喉之左右。舌根屬肝。外兩耳垂下亦屬肝。牙根上屬胃。下屬脾。舌胎自主寒。黃主熱。焦熱甚。黑熱極。凡舌胎不單論色。但有津者。非真熱。不可概投涼藥。宜引火歸原。

也。

預防須知

喉痧證治要略曰。喉痧及白喉。爲傳染病之急性症。一經傳染。救治不及。不如未病預防。故述預防法三種。曰醫師預防。曰未病預防。曰臨症預防。臚舉於左。

【醫師預防】

○凡入疫喉家

視病。宜飽腹。須先飲雄黃酒一杯。

再以香油調雄黃末。蒼朮末。塗鼻

孔。則不致傳染。出則紙捻探鼻內。

得嚏爲佳。○凡醫師入疫病家。診

脈看喉。不宜與病者近坐。及正對

坐。宜存氣少言。

【未病預防】

凡有疫喉之處。

未病之家。宜用驅疫散。（大黃二

兩。降香茵陳各一兩。蒼朮五錢。共

研細。燒烟熏之。以免未病者傳

染。但病人臥牀近處不可用。恐防

病者咳嗽。慎之。

○食物

凡喉病發生之時。宜

多食植物物品。（如蔬菜、水果、蘿

生梨、橄欖、藕粉等）少食動物物品。

（如豬、羊、牛、雞、鵝、鴨、魚、蝦、海腥等）

以動物肉含有毒質也。宜戒飲酒。

酒能損血液。宜戒吸紙烟、鴉片烟。

水旱烟。因各烟含有毒質。能變壞

腦神血液。及喉頭之組織。專釀喉

症。其他辛辣香燥等助火之品。亦

不可食。

○飲料

宜以河水、江水、水濾淨。

煮沸飲之。麥粥飯亦須用此。若不

流通之河水。及水之污穢變色者。

不可飲。井水近陰溝便所者。尤不

可飲。又隔宿之茶。與不潔之茶葉。

變色變聲者。皆不可飲。若微有喉

病。卽以青果一兩。蘿藦二兩。合搗

汁。開水沖服。方雖平淡。效驗頗著。

○衣服

衣服被褥。宜時常洗

換。衣服宜寬鬆。不宜過緊。緊則血

液循環。受其壓迫。久不洗換。則血

中防染不潔之患。衣服亦不宜過

暖。過暖則易於出汗。易感外邪。

○居室 無論堂座、臥室、廚房、

明堂。皆須灑掃潔淨。不可容留污

穢雜物。及薰土臭水。凡案椅桌。每

日均須洗抹。窗牖宜常開。以通日

光空氣。陰溝宜常時疏通。且宜常

澆石灰水。以消毒。痰罐宜每日洗

刷換水。

○起居

晨起宜早。夜臥不宜

過遲。每日須有一二時休息。不可

操勞太過。戒憂鬱忿怒。尤宜節慾。

凡此皆能引起內火。而致喉病。

【臨病預防】

○隔離法

家中

有喉痧病人。須將小兒、婦女等離

居別室。不可令其接近。有疫喉病

人之所。不可入。有喉痧病人。不可使之入境。

○消毒法

喉痧病之痰唾糞

溺。須埋入土中。不可任意傾棄。喉

痧病人所用之手巾、碗筷。均須隨

時洗滌。

綜上所述。皆預防喉痧之要法。簡

便可行。極有功效。惟願各界諸君。

留心採納。互相告誡。則喉痧之病。

庶幾可以絕迹。否則任其蔓延。撲

滅非易矣。

外治須知

【針六穴法】

凡治咽喉病。宜

用針刺之法。以洩毒勢。病可減輕。

不少。普通針法。凡針六穴。○頭面

頰車穴。（在耳垂下八分。足陽明

胃經）少商穴。（在大指內甲角

手太陰肺經）○右手。中沖穴。（在

中指內甲角。手厥陰心包絡經）

少沖穴。（在小指內甲角。手太陽

小腸經）○左手。商陽穴。（在食

指內甲角手陽明大腸經（關冲穴）（在無名指內甲角手少陽三焦經）凡此六穴行針之後每能化險為夷也。

【移喉秘法】

凡患喉病宜用

移轉法使病移向不緊要之處則

病勢立刻變輕此法極驗毫無危

險茲為利益公衆起見將此法盡

情宣布依此治喉無不立效切宜

注意法以鮮蒜頭（無鮮乾者亦

可）搗爛貼虎叉之後方（即虎

口一名合谷）左喉病貼左虎口

右喉病貼右虎口二面俱病左右

俱貼貼後以蚌壳伏之裹以白布

兩時一易不半日該地腫大如喉

腫狀越日流膿血而喉愈矣。

【吹喉法】

凡爛喉痧風熱白

喉初起速宜吹錫類散（方見喉

痧）玉鑰匙金不換等方外貼異

功散（方俱在喉痧內）凡喉風喉

痺痰聲漉漉呼吸急促肺氣將閉速以桐油錢法探吐之（法詳喉痺內）或服雄黃解毒丸（方見喉風內）吐去痰涎即可有命。

勿藥自療須知

喉科有七十二症頭緒紛繁證治

複雜非一般人所能了解茲擇其

簡便易行功效神速切於家庭實

用者數則摘錄於後以供社會人

士之研究。

【青龍白虎湯】

生橄欖生蘿

蘆水煎常服可免喉患此王孟英

先生所製方也橄欖色青能清足

厥陰內寄之火風而靖其上騰之

焰蘿蘆色白化手太陰外來之燥

熱而肅其下行之氣合而為劑消

經絡留滯之痰解膏梁魚麪之毒

用以代茶則龍馴虎伏臟腑清和

固不僅喉病之可免也且二味處

處皆有人人可服物易功優久任無弊實能弭未形之患幸勿以平淡而忽之。

【法製蘿蔔】

凡人於三四月

間有喉病者皆因冬天寒氣鬱結

不開至春始發須於初交冬時多

買蘿蔔菜掛在竹竿放露天下任

其風霜雨雪吹打不要收下直到

立春前一日收掛在無日處陰乾

春二三月收來切碎和醬或鹽牧

在碗中飯鍋上蒸熟當家常小菜

食之一家永無喉患若有人患喉

風等症者以此菜煮湯服之甚效

【鹽藕節】

平時取新鮮藕節

烘乾用鹽醃好封固遇有喉痛者

嚼汁嚥之極為神效陰虛喉疼更

妙每晨起身時常服淡鹽湯一杯

可降虛火而解喉毒亦是免喉患

之簡效良方也凡覺喉嚨疼痛時

即於頸窩處（即頸動脈部位）搽

香油少許用厚銅錢一文刮之如刮痧狀（要順刮切忌倒刮）左痛刮左右痛刮右以見紫紅點片為

度或以次指中指彎曲蘸酒按左

右頸窩捻之尤為易行一經刮捻

之後輕者勿藥自愈重者亦漸轉

輕易於調治以喉毒風熱得從外

洩不致蘊結傷喉故也此法較之

貼喉異功散尤為妥善予嘗試多

驗凡喉症初起時即用蝦礪砂少

許開水沖化候冷時時漱口可免

蔓延難愈凡咽喉初覺壅塞時即

以紙撚探鼻孔內得噴嚏數次則

熱毒可散免生意外之虞喉中結

塊水食不通危急欲死者用百草

霜（即鍋煙子以燒野草者為佳

燒煤炭者忌用）和蜂蜜為丸如

芡實大新汲井水化一丸灌下甚

者不過二丸此名百靈丸

凡喉間方覺脹滿痺痛時急以食

鹽搥手掌心。鹽乾復易新鹽搥之。數刻即消。極有效。凡遇喉風。忽然腫痛。喉間閉塞。飲食不能下咽。急用白礬研末。沖開水服之。即愈。冬月燒煤爐取暖。每多喉疼之患。若每日常嚼生蘿蔔（紅色綠色者為佳。連皮嚼下）一二枚。可防喉症。使之不發。喉症既起時。多嚼生蘿蔔。亦可消毒於無形。常啖香蕉。可免喉病。若將香蕉連皮用水煎之。取湯服。治喉病如神。經曰。望而知之。謂之神。是以目察色也。聞而知之。謂之聖。是以耳識音也。問而知之。謂之工。是以言審病也。切而知之。謂之巧。是以指別脈也。神聖工巧四者。乃診病要道。醫者明斯。更能互相參合。則可識萬病根源。以之療治。自萬舉而萬當矣。

望色要訣

【耳科望色要訣】 聞人言語。似不甚解。以手掩耳。湊向前者。此耳聾也。耳中出血。此耳衄也。以手護耳。時時皺眉。頻頻呻吟者。此耳痛也。耳內悶腫出膿。此耳疳也。時時以物挖耳。更搖頭者。此耳中者。物也。凡形如痰核。生於耳後者。此耳根毒也。凡耳後那蜂房樣高起者。此耳發疽也。凡耳竅暗藏之處。如丁釘之狀。此耳疔也。時時以手搔耳。必耳癢也。凡有物形如櫻桃。亦有形如羊奶。此耳痔也。凡有物類如麻菇。頭大蒂小。是耳蕈也。若形如棗核。細條而長。露出耳外。是耳挺也。耳後生瘡作爛。是耳瘡耳爛也。凡此皆耳科望色之要訣。苟能舉一以反三。應用自無窮矣。

【鼻科望色要訣】 鼻中出血。是鼻衄也。鼻中赤癢。連唇生瘡。是鼻疳也。鼻竅內。時覺乾燥疼痛。狀如粟粒。是鼻贅也。鼻中時流黃膿。腥涕。香臭不聞。是鼻淵也。鼻中如丁釘之狀。疼痛麻木。是鼻疔也。瘡生鼻柱。堅硬木痛。是鼻疽也。起碎疙瘩。形如黍屑。發於面鼻者。是粉刺也。鼻準紅赤。乃酒皸鼻也。鼻內有形如石榴子。漸大下垂。氣息難通。是鼻痔也。凡此皆鼻科望色之要訣。切宜注意。

【咽喉科望色要訣】 喉痛。身熱而現痧癍。是喉痧也。咽喉間有白點。白條。白塊。是白喉也。喉內紅腫。或連及項外者。是喉風也。咽喉之旁。狀如蠶蛾。亦有形若棗栗者。是乳蛾也。喉中閉塞不通。是喉痺也。喉間紅腫而痛。是喉癰也。喉中破爛。腐衣疊若蝦皮。是喉疳也。咽喉腫痛。是咽痛也。喉中生瘡。是喉瘡也。耳前聽會穴。形似瘰癧者。是喉毒也。關內兩旁。形如圓眼者。是喉瘤也。喉間生苔癍者。是喉癰也。喉間有形如靴釘者。是喉疔也。凡此皆喉科望色之要訣。舉一反三。自可應用無窮。

聞聲要訣

【耳科聞聲要訣】 問之不答。時時搖頭者。此耳聾也。以手護耳。時時呻吟者。此必耳痛耳脹也。耳中時聞如蟻鬪之聲者。此耳鳴也。【鼻科聞聲要訣】 其人言語之間。有哼聲者。此鼻中有病也。不能聞香臭者。是鼻淵也。以手掩鼻。時時呻吟者。是鼻中生瘡也。小兒啼哭不已。以手抓鼻者。此鼻中塞豆粒也。

咽喉科聞聲要訣

發語音低而沙者。是音啞也。時時呻吟。不能湯水者。是喉中生重病也。頻頻呻吟。喉痛身熱。而現痧癍。是喉痧

也。呼吸急促。痰聲漉漉。是喉間將閉塞也。頻頻呼痛。喉間紅腫者。成喉癰也。懶言。喉中破爛。腐衣疊若蝦皮。是喉疳也。

問證總訣

凡診耳鼻咽喉病。第一句當問其病起何日。以新病者多實。久病者多虛。次當問其飲食如常否。能飲食者是胃氣強壯。雖病劇。必自愈也。不能飲食者。或胃氣虛弱。或咽喉阻塞。或喉中受傷。多屬難治。又次當問其小溲如何。小溲清長者。熱毒輕微。小溲渾濁者。熱毒盛也。大溲如何。大溲通暢者。熱毒輕。大溲澀結者。熱毒盛也。又喜熱飲。或冷飲。亦應詳問。喜熱飲者。屬寒。屬痰。屬溼。喜冷飲者。屬熱。屬燥。凡診其人鼻流黃濁涕者。當問其能聞香臭否。若不能聞香臭者。必成鼻


淵也。凡診耳鳴。更當問其腰痠痛否。頭目眩暈否。病前曾否動於房慾。藉明其屬虛屬實。凡診咽痛。當問其有否寒熱。身有痧點否。藉明其是否喉痹。其人音啞。當問其暴起與久病。音啞以前曾吐血否。房慾過度否。如未吐血及房慾過度。音雖啞。而有痰阻之聲者。此屬實。若曾經吐血。咳血及房慾過度。音啞而乾枯者。此屬虛。凡此皆耳鼻咽喉問證之要訣。舉一反三。應用無窮矣。

切脈要訣

【脈之部位】秦越人曰。寸口者。脈之大會。手太陰之動脈也。五臟六腑之所終始。故法取於寸口也。以寸關尺分爲三部。浮中沉別爲九候。九候者。寸之浮中沉。關之浮中沉。尺之浮中沉也。茲特以臟

腑支配於三部。繪圖如下。

(脈之部位)



右圖左寸所以列心。腹中。小腸者。以小腸爲心之腑。腑宜從臟。腹中乃心主之宮城。代心宣化。爲臣使之官。故皆列於左寸也。左關所以列肝膽者。以膽爲肝之腑。肝乃藏血之臟。位居腎上。故列之於左關也。左尺所以列腎。膀胱及小腸者。腎與心。爲坎離相合。膀胱乃腎之腑。腸位居下。且心與腎。陰陽互根。

故皆列之於下也。左手三部主血者多。心主血。肝藏血。腹中代心宣化。小腸與心表裏相通。右寸所以列肺。胸中。大腸者。胸中乃肺之部分。九腸與肺爲表裏。故皆列之於右寸也。右關所以列脾胃者。脾胃位居中州。胃主納。脾主化。故皆列於右關也。右尺所以列命門。三焦。大腸者。難經右爲命門。左爲腎。三焦根於命門。大腸位原居下。故皆列之於下也。右手三部主氣者多。肺主氣。脾胃之納化。大腸之傳導。三焦之敷布。無不藉氣以行也。【診脈手法】凡診人之脈。令仰其手。視掌後有高骨隆起。卽是關部脈也。醫者覆手取之。先將中指取定關部。方下前後二指於寸尺之上。病人長則下指宜疏。病人短則下指宜密。因其界乎尺寸二部之間。故名曰關。從高骨上至

魚際。長一寸。因此命名曰寸。從高骨下至尺澤。長一尺。因此命名曰尺。寸部候上。故為陽也。尺部候下。故為陰也。



【一呼一吸】醫者一呼一吸。病者脈來四至為和平無病之象。若五至六至為太過。三至二至為不及。此皆病脈。非平脈也。

【脈學大綱】切脈之法。全在

識其大綱。大綱不過是浮沉遲數四個字。浮沉是審其起伏。遲數是察其至數。浮沉之間。遲數寓焉。凡脈一見浮沉遲數之象。即是病脈。若是無病之人。其脈必不浮不沉而在中。不遲不數而四至。是謂平脈。是有胃氣。可以神求。不可以象求也。病脈則浮象在表。應病亦為在表。浮者輕按乃得。重按不見之謂也。在浮脈雖或有裏證。而主表是其大綱。沉象在裏。應病亦為在裏。沉者輕按不得。重按乃得之謂也。沉脈雖或有表證。而主裏是其大綱。一息五六至者曰數。脈數為陽。陽主熱。而數有浮沉。浮而數應表熱。沉而數應裏熱。雖數脈亦有病在臟者。然六腑為陽。陽脈營其腑。則主腑是其大綱。一息三至或二至者曰遲。遲為陰。陰主寒。而遲有浮沉。浮而遲應表寒。沉而遲應

裏寒。雖遲脈多有病在腑者。然五臟為陰。而陰脈營其臟。則主臟是其大綱。脈狀種種。總該括於浮沉遲數四個字。然四者之中。又當以獨沉獨浮獨遲獨數為準。則而獨見於何部。即以何部探求其表裏腑臟之所在。則病無遁情。

【脈之常變】

以上所論。不過

言乎病脈之常。而猶未盡其變也。今試言其變。瘦小之人。氣居於表。六脈常帶浮洪。肥盛之人。氣斂於中。六脈常帶沉數。此因肥瘦而異者。其變一也。性急之人。五至方為平脈。性緩之人。四至便作熱證。此因性情而異者。其變二也。身長之人。下指時宜疏。身短之人。下指時宜密。此因短長而異者。其變三也。北方之人。每見強實。南方之人。每多柔弱。此因地之南北而異者。其變四也。春脈弦。夏脈鉤。秋脈毛。冬脈石。此因天氣之寒暖而異者。其變五也。少壯之人。脈多大。老年之人。脈多虛。嬰兒之脈常七至。此因年之老小而異者。其變六也。酒後之脈多數。飯後之脈多洪。遠行之脈必疾。久饑之脈必空。此因饑飽勞役而異者。其變七也。婦人女子。尺脈常盛。右手之脈常大。而怨女尼姑。脈多濡弱。此因境遇而異者。其變八也。明乎此。則知切脈之要。不僅在逐脈審察。尤貴在隨人變通。

總訣

○鼻衄時發。宜以鮮紫頭一枚。

燒灰存性。和入冰片少許。研為細末。儲有蓋磁瓶中。毋洩氣。每逢鼻衄時。嗅入少許。衄即止也。○預防鼻淵。當於初流黃涕時。即服龍腦散。外以鼻烟方嗅之。使風邪解散。

病根即拔。③預防酒醴鼻粉刺宜少食辛辣香燥膏粱厚味。④治療

耳聾以鐵屑磁石方為最著功效。無論虛實俱可用也。⑤耳鳴由腎虛肝旺所致者最多。故此病一方

耳聾證

服藥培補一方宜節慾藏精平心靜氣使陰平陽秘肝腎調和即可痊愈也。⑥凡咽喉服藥俱宜緩緩含嚥使其藥性常留咽喉即可見效。若一次頓服則藥過病所效力自緩也。⑦咽喉病勢危急宜用針刺之法泄其毒熱病即減輕。⑧凡治咽喉宜愈速愈妙切勿遲延。⑨凡爛喉痧病勢危急小舌腐去速宜服清化會厭退腐湯。白鳳飲內宜吹加味珠黃散或金不換方自能毒熱清解小舌重生也。⑩凡咽喉閉塞痰聲漉漉危在頃刻者速以桐油錢探吐之虛者必見汗出髮潤兩目直視形容枯槁脈細無力等症。宜服獨參湯。凡此皆耳鼻咽喉之總訣切宜注意。

何謂耳聾耳中隆隆然不能聽聞是謂耳聾。

耳聾證共分五類。①風熱耳聾。②風溼耳聾。③閉塞耳聾。④氣虛耳聾。⑤腎虛耳聾。

耳聾證諸病之主要治法如何。①風熱耳聾用銀翹散。②風溼耳聾用蒼芷散。③閉塞耳聾用鐵屑磁石方。④氣虛耳聾用補中益氣方。⑤腎虛耳聾用六味地黃丸。

風熱耳聾類

【病源】感受風熱其人感受風熱閉塞耳竅遂令耳聾是謂風熱耳聾病。

【病狀】耳中嘈嘈作聲。風熱耳聾病其人身熱口渴耳聾經脈欲行而不通衝激其中鼓動聽戶

其火男則用逆收藏於兩腎之間。女則用逆歸藏於兩乳之下咽津降氣。①定息靜坐咬緊牙關以二指捏緊鼻孔怒睜二目使氣串耳通竅內覺轟轟有聲即止行之二三目以竅通為度。②時常將兩耳返聽於歸元取靜或存閉口中氣及鼻中氣使不妄出單意想從耳中出又收返聽耳自然聰。

耳聾失治有何變症耳聾失治其聾久久不瘥變為痼疾遺憾終身也。

【變症】風熱內陷風熱耳聾病失治其人身熱不揚耳聾不巳心神昏憤躁煩譫語此熱邪內陷心胞有生命危險也。

【療法】①耳中嘈嘈作聲之療法風熱耳聾病其人身熱口渴耳聾經脈欲行而不通衝激其中鼓動聽戶隨其氣之微盛而作風而嘈嘈諸聲銀翹散主之荷葉散亦主之。

②風熱內陷之療法風熱耳聾病失治其人身熱不揚耳聾不巳心神昏憤躁煩譫語此熱邪內陷心胞有生命危險也清宮湯主之牛黃丸紫雪丹至寶丹亦主之。

【調養】①忌食厚味風熱耳聾病忌食辛辣香燥煎炒炙爆雞鴨羊肉膏粱厚味等物。

耳聾之主要調養法如何。①搓掌心五十度趁熱按閉耳門心存空觀如此六度再用意推散

○薄荷代茶。風熱耳聾病宜以薄荷泡湯代茶。清泄風熱。以通耳竅。自有神效也。

○服藥靜臥。風熱耳聾病服藥後宜靜臥片刻。不可吹風受冷。

風溼耳聾類

【病源】感受風溼。其人感受風溼。閉塞耳竅。遂令耳聾。是謂風溼耳聾病。

【病狀】耳垢甚多。風溼耳聾病耳中隆隆。不能聽聞。耳垢甚多。舌苔垢膩而滑。胸悶頭痛。目重。口不渴。

【變症】耳竅閉塞。風溼耳聾病失治。風溼不去。耳聾益甚。久之耳竅閉塞。變為痼疾。

【療法】○耳垢甚多之療法。

風溼耳聾病耳中隆隆。不能聽聞。耳垢甚多。舌苔垢膩而滑。胸悶頭

痛。目重。口不渴。蒼芷散主之。外以細辛散綿裹塞耳。自有神效。

○耳竅閉塞之療法。風溼耳聾病失治。風溼不去。耳聾益甚。久之耳竅閉塞。變為痼疾。宜用鐵屑磁石方有神效也。

【調養】○忌食滋膩。風溼耳聾病忌食一切滋膩生冷厚味。

○宜居燥處。風溼耳聾病患者宜居高燥之處。忌處卑溼之地。

○挖去耳垢。風溼耳聾病其人耳垢甚多。宜時時挖去。則耳易聽也。

閉塞耳聾類

【病源】氣機閉滯。肥人或多溼之人。氣機忽然窒滯。致令耳聾。隆隆然無所聞。是謂閉塞耳聾病。

【病狀】耳中作嘈嘈聲。閉塞耳聾病其人經脈欲行而不通。衝

激其中。鼓動聽戶。隨其氣之微盛而作風雨嘈嘈諸聲。除此之外。他無所苦。飲食洩便一如常人。

【變症】耳久不瘥。閉塞耳聾病失治。其人氣機閉滯益甚。聾久不瘥。變為痼疾也。

【療法】耳中作嘈嘈聲之療法。閉塞耳聾病其人經脈欲行而不通。衝激其中。鼓動聽戶。隨其氣

之微盛。而作風雨嘈嘈諸聲。除此

之外。他無所苦。飲食洩便一如常人。宜用鐵屑磁石方。內宜服菖蒲湯。自有神效也。

【調養】○忌食厚味。閉塞耳聾病忌食膏粱厚味。生冷水果等物。

○切戒動怒。閉塞耳聾病其人切戒動怒。以怒則氣鬱。氣鬱則閉塞益甚。耳聾加劇也。

【驗方數則】閉塞耳聾病除

上述正治法外。茲復有驗方數則。俱頗靈驗。附錄於此。以供參考。

①狗耳根骨方。狗耳根骨一

付（陰陽瓦焙研）當門子一分。共研細。每用分許。裝入葱管尖內。有藥一頭。用絲綿裹好。插入耳竅內。但鼻中聞見葱味。其耳即聰。

②鼠膽方。鼠膽一枚。龍齒一分。硃砂一分。冰片一分。麝香一分。乳香五釐。潮腦五釐。研細。人乳和丸。如梧子大。外用絲綿包裹塞入耳底。三日即愈。

③小蛇皮方。小蛇皮（頭尾全者煨灰）三釐。冰片三釐。麝香三釐。共研細。鵝管吹入耳內即通。

④烏龜枕方。藤枕或竹枕內。放烏龜一只。夜間枕之。日久即聰。

氣虛耳聾類

【病源】勞力過度。其人勞力

過度。傷及氣分。或氣分素弱。致氣不上升。而令耳聾。是謂氣虛耳聾病。

【病狀】肢體倦怠。氣虛耳聾。病其人氣不上升。耳聾不聞。面黃肌瘦。肢體倦怠。口中無味。時時澹澹。脈大而無力。或濡而細。

【變症】肌膚枯槁。氣虛耳聾。病失治。氣虛益甚。耳益聾。肌膚枯槁。泄瀉頻頻。若兼見大肉陷下。身熱不食等症。有生命危險也。

【療法】肢體倦怠之療法。氣虛耳聾。其人氣不上升。耳聾不聞。面黃肌瘦。肢體倦怠。口中無味。時時澹澹。脈大而無力。或濡而細。宜內服補中益氣湯。外以鐵屑磁石方引通之。自有神效也。

【調養】①切戒勞力。氣虛耳聾。病其人宜時時休養。切戒勞力。

②人參黃湯代茶。氣虛耳聾。

病其人宜以人參黃湯代茶。

③忌用剋伐藥。氣虛耳聾。病宜用補正之藥。緩緩收功。忌服一切剋伐之品。犯之輕病變重。重病變危也。

腎虛耳聾類

【病源】勤於房慾。其人勤於房慾。或手淫過度。腎精大傷。腎氣虧虛。遂令耳聾。腎開竅於耳。是謂腎虛耳聾病。

【病狀】渾渾渾渾。腎虛耳聾。病耳聾。渾渾渾渾。由腎陰虛者。必兼見體瘦色黑。口乾腸燥。手足心熱。兩尺脈大。或左脈虛大等症。由腎陽虛者。必兼見小溲頻數。尿色清白。足部冷。膝蓋寒。尺脈遲弱等症。

【變症】變為虛損。腎虛耳聾。病無論陰虛陽虛。俱宜速治。遲則

其虛益甚。腰部痠痛如折。精出連連。變為虛損。有生命危險。若係陽虛。則小便益多。口渴不已。每成下消而死。

【療法】①渾渾渾渾之療法。

腎虛耳聾。病耳聾。渾渾渾渾。由腎陰虛者。必兼見體瘦色黑。口乾腸燥。手足心熱。兩尺脈大。或左脈虛大等症。六味地黃丸主之。坎離丸。本事地黃湯亦主之。由腎陽虛者。必兼見小溲頻數。尿色清白。足部冷。膝蓋寒。尺脈遲弱等症。宜服腎氣丸。燒腎散。益腎散。補腎丸。肉苁蓉丸。桑螵蛸湯之屬。

②腎虛耳聾之外治法。腎虛耳聾。病無論陰虛陽虛。外治法俱相同。

(1)川椒萆薢方。川椒一錢。巴豆一錢。萆薢一錢。同研細。松香黃蠟為丸。塞耳中。一日一換。

數日便通。

(2)鐵屑磁石方。磁石蠶豆大一塊。穿山甲二分。燒研。綿包裹塞耳。口含生鐵一塊。耳中如風雨聲。即愈。

【調養】①切戒房慾。腎虛耳聾。病切戒房慾。

②常服地黃。腎虛耳聾。病愈後。宜常服六味地黃丸。大補腎氣。防其復發。

③不可行遠。腎虛耳聾。病初愈。切戒勞力。不可行遠負重。

【結論】耳為腎之竅。足少陰經之所主。然心亦寄竅於耳。在十二經脈中。除足少陽手厥陰外。其餘十二脈絡。皆入於耳中。人體精明之氣。多走此竅。而聽覺生矣。然苟一經一絡有虛實失調者。亦足以亂此竅之精明。或鳴或癢。以至於聾。然聾症又有虛實之異。由

於年衰體弱。精氣不足者爲虛。若黑瘦健壯而聾者。則精氣固藏閉塞所致。乃稟賦有餘之兆。例多高壽。無須治也。又有爲外物所傷。或大聲所震。致聽官膜破者。亦不能療。惟暴聾之病。陰陽隔絕之未甚。經脈欲行而不通。衝擊其中。鼓動聽戶。隨其氣之微盛。而作風雨嘈嘈諸聲者。可審證施治。大抵脈浮而盛者爲風。宜疏散。脈洪而實者爲熱。宜疏利。脈濡而濡者爲虛。宜調養。俟邪氣並退。再以通脈調氣安腎法善其後。自可全愈。

各方淺解

一 風熱耳聾類各方

●銀翹散（溫病條辨方）

連翹一兩。銀花一兩。
苦桔梗六錢。薄荷六錢。
竹葉四錢。生甘草五錢。

荊芥穗四錢。淡豆豉五錢。

牛蒡子六錢。

右杵爲散。每服六錢。鮮葦根湯煮。香氣大出。卽取服。勿過煎。肺藥取輕清。過煎則味厚而入中焦矣。病重者約二時一服。日三服。夜一服。輕者三時一服。日二服。夜一服。病不解者。作再服。蓋肺位最高。藥過重則過病所。少重又有病重藥輕之患。

【淺解】本方銀花、連翹、竹葉、

清營泄熱。桔梗、薄荷、芥穗、豆豉、牛蒡、疏風泄邪。以通閉滯。風熱耳聾。由風熱閉塞清竅故也。清其熱。泄其風。邪氣一去。竅門一通。耳自聰也。

●荷葉散（大辭典方）

連翹三錢。牛蒡子三錢。桔梗一錢。飛滑石三錢（包）
乾荷葉三錢（去心用邊。有鮮

時宜用鮮） 鑊鈴羊角一錢。

（貧者以鮮竹葉三錢代之）

苦丁茶一錢。生甘草三分。

右以水二碗煮。取一碗。去渣。頓服。

【淺解】本方以連翹、苦丁、滑

石、清熱解毒。鈴羊清肝息風。牛蒡、桔梗、荷葉、疏風泄邪。以通閉滯。而開清竅。則耳自聰矣。本方與右方較。右方祛風之藥多。清熱之藥少。此方祛風之藥少。而清熱之藥多。故病勢盛或熱勢盛者。宜服右方。病勢輕熱勢輕者。宜服本方。

●清宮湯（溫病條辨方）

元參心三錢。連心麥冬三錢。

連翹心二錢。竹葉捲心二錢。

犀角二錢（磨沖）

蓮子心五分。

右以水二碗煮。取一碗。去渣。頓服。

【加減法】熱痰盛。加竹瀝五

匙。梨汁五匙。咳痰不清。加枯荑皮

一錢五分。熱毒盛。加金汁二匙。人中黃一錢半。漸欲神昏。加銀花三錢。荷葉二錢。石菖蒲一錢。

【淺解】此鹹寒甘苦法。清膈

中之方也。謂之清宮者。以膈中爲心之宮城也。俱用心者。凡心有生。生不已之意。心能入心。卽以清穢濁之品。使心中生生不已之生氣。救性命於微茫也。火能令人昏。水能令人清。神昏譫語。水不足而火有餘。又有穢濁也。且離以坎爲體。元參味苦屬水。補離中之虛。犀角靈異味鹹。辟穢解毒。所謂靈犀一點。善通心氣。色黑補水。亦能補離中之虛。故以二物爲君。蓮心甘苦鹹。倒生根。由心走腎。能使心火下通於腎。又回環上升。能使腎水上潮於心。故以爲使。連翹象心。能退心熱。竹葉心銳而中空。能通竅清火。故以爲之佐。麥冬之所以用心

者。以散心中穢濁之結氣。故以爲臣。

●安宮牛黃丸（溫病條辨方）

牛黃一兩。鬱金一兩。

犀角一兩。黃連一兩。

硃砂一兩。梅片二錢五分。

眞珠五錢。麝香二錢五分。

山梔一兩。金箔衣一兩。

黃芩一兩。

右爲極細末。煉老蜜爲丸。每丸一錢。金箔爲衣。蠟護。脈虛者。人參湯下。脈實者。銀花薄荷湯下。每服一丸。兼治飛尸卒厥五瀉中惡。大人小兒。瘧厥之因於熱者。大人病重體實者。日再服。甚至日三服。小兒服半丸。不知再服半丸。

【淺解】此芳香化穢濁而利

諸竅。藏寒保腎水而安心體。苦寒通火腑而瀉心用之方也。牛黃得日月之精。通心主之神。犀角主治

百毒。邪鬼瘴氣。眞珠得太陰之精。而通神明。合犀角補水救火。鬱金草之香。梅片木之香。（按冰片洋外老杉木浸成。近世以樟腦打成。爲之樟腦。發水中之火。爲害甚大。斷不可用。）雄黃石之香。麝香乃精血之香。合四香以爲用。使閉錮之邪熱溫毒。深在厥陰之分者。一齊從內透出。而邪穢自消。神明可復也。黃連瀉心火。梔子瀉心與三焦之火。黃芩瀉膽肺之火。使邪火隨諸香一齊俱散也。硃砂補心體。合金箔墮痰而鎮固。再合眞珠犀角爲督戰之主帥也。

●紫雪丹方（本事方）

滑石一斤。石膏一斤。

寒水一斤。磁石二斤。

（水煮搗煎去渣。入後藥）

羚羊角五兩。水香五兩。

犀角五兩。沉香五兩。

丁香一兩。升麻一斤。元參一斤。炙甘草半斤。右八味。並搗。挫入前藥汁中煎去渣。入後藥。朴硝二斤。硝石二斤。提淨入前藥汁中微火煎。不住手將柳木攪。候汁欲凝。再加入後二味。辰砂三兩。研細。麝香一兩二錢。研細入煎藥拌勻。上合成。退火氣。冷水調服一二錢。

【淺解】諸石利水火而通下

竅。磁石、元參、補肝腎之陰。而上濟君火。犀角、羚羊、瀉心膽之火。甘草和諸藥而敗毒。且緩肝急。諸藥皆降。獨用一味升麻。蓋欲降先升也。諸香化穢濁。或開上竅。或開下竅。使神明不致坐困於濁邪。而終不克復其明也。丹砂色赤補心。而通心火。內含汞而補心體。爲坐鎮之用。諸藥用氣。硝獨用質者。以其水鹵結成。性峻而易消。瀉火而散結也。

也。●至寶丹方（太平惠民和劑局方）

龍腦五錢。犀角一兩（鎊）

牛黃五錢。硃砂一兩（飛）

麝香五錢。琥珀一兩（研）

玳瑁一兩（鎊）

右以安息重湯燉化。和諸藥爲丸。一百丸。蠟護。

【淺解】此方薈萃各種靈異。

皆能補心體。通心用。除穢邪。解熱結。共成撥亂反正之功。大抵牛黃、紫雪、至寶三方相較。牛黃丸最涼。紫雪次之。至寶又次之。主治略同。而各有所長。臨用對證斟酌可也。

二風溼耳聾類各方

●蒼芷散（冰玉堂驗方）

蒼朮一錢。白芷一錢。

荷葉一個（須全用）

右以水二碗煮取一碗去渣頓服。

【淺解】本方以蒼朮化溼荷葉白芷疏風通氣以治耳聾。

●細辛散（驗方）

北細辛一錢（細末）真麝香一分。

右以蠟溶化爲丸如鼠糞大以綿裹塞耳一二次即愈切戒惱怒。

【淺解】本方係通氣之意使氣機通利則耳自聰也。

●鐵屑磁石方（濟生方）磁石豆大一塊鯪鯉甲三片燒存性綿裹塞耳口中銜生鐵少許覺耳中如有風雨聲即愈。

【淺解】本方磁石善吸鐵鯪鯉甲善通風口銜生鐵以爲餌使與磁石相爭吸則耳內隔滯即可藉此通利故聾自瘥矣。

三 閉塞耳聾類各方

●鐵屑磁石方（濟生方）見本證風溼耳聾類各方淺解。

●菖蒲湯（千金方）鮮菖蒲五錢。

右一味以水一碗煮取六分去渣頓服。

【淺解】本方鮮菖蒲通耳竅開閉塞爲治閉塞耳聾之特效藥。

四 氣虛耳聾類各方

●補中益氣湯（李東垣方）黃耆一錢（蜜炙）人參五分甘草五分（炙）當歸身一錢（酒製）橘皮七分升麻二分柴胡二分白朮五分（土炒）

右加入生薑三片大棗二枚以水二碗煮取一碗去渣頓服。

【淺解】此方爲治勞倦傷脾穀氣不勝陽氣下陷陰中發熱之良劑蓋風寒外傷其形爲有餘脾胃內傷其氣爲不足故遵內經勞者溫之損者益之之義屏苦寒之藥用甘溫之品以黃耆護皮毛而固腠理人參培中宮而補元氣白朮健脾當歸行血再以陳皮通之甘草和之如胃中清氣下陷則用升麻柴胡之氣輕味薄者升之補中之劑參以發表而中益安益氣之劑參以清氣而氣益培故凡脾胃不足喜甘惡苦喜補惡攻喜溫惡寒喜通惡滯喜升惡降喜燥惡溼者此方最宜氣虛耳聾由於氣分虛弱氣不上升者速服本方自有神效。

●鐵屑磁石方（濟生方）見本證風溼耳聾類各方淺解。

五 腎虛耳聾類各方

●六味地黃丸（錢乙方）熟地黃八兩（砂仁酒拌九蒸九曬杵膏）山茱萸肉四兩（酒潤炒）乾山藥四兩（炒）牡丹皮三兩（酒洗微炒）白茯苓三兩（人乳汁製焙）澤瀉三兩（淡鹽酒拌炒）

右研爲細末和地黃膏加煉蜜爲丸如梧桐子大每服七八十丸（一作二三錢）空腹食前淡鹽湯或百沸湯送下。

【淺解】腎虛精少虛火妄行則下虛上實百病叢生此方脫胎於腎氣丸去桂附之辛熱而注重於填補地黃山茱萸補血益精以壯水之主山藥茯苓健脾滲溼以培水之源（脾旺則能運化食物而生精血）丹皮澤瀉清血排毒疏水道之滯凡耳聾由於腎陰虛者宜服本方自有神效也。

●坎離丸（沈氏尊生書方）

●六味地黃丸（錢乙方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●補中益氣湯（李東垣方）

●菖蒲湯（千金方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

●鐵屑磁石方（濟生方）

當歸二兩。(酒製) 熟地四兩。

生地四兩。(酒製) 山茱萸

四兩。牛膝四兩。(酒製) 天

門冬四兩。麥門冬四兩。白

芍三兩。(酒製) 五味子三兩。

山藥三兩。龜板三兩。(酥

炙) 知母四兩。(酒製鹽製

各半) 川黃柏各三兩。(酒

製鹽製) 川芎一兩。

右共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子

大。每服三五十丸。鹽湯送下。

【淺解】 本方補陰液。清虛火。

治腎陰虛之耳聾。有神效也。

⑤地黃湯(本事方)

生地黃五錢。靈磁石八分。

元參三錢。石菖蒲八分。

遠志肉八分。(甘草煮)

人參一錢。

右以水三碗。煮取一碗。去渣。頓服。

【淺解】 本方以地黃補腎陰。

磁石納腎氣。元參清腎熱。菖蒲。遠志通心氣。以治耳聾。用人參和之。使去病而不傷正也。

④腎氣丸(金匱要略方)

熟地黃八兩。山藥四兩。

山茱萸四兩。白茯苓三兩。

丹皮三兩。澤瀉三兩。

桂枝一兩。附子一枚。(炮)

右共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子

大。每服十五丸。加至二十丸。溫酒

送下。日再服。

【淺解】 此方以熟地。山藥滋

腎臟之陰。山茱萸。附子壯腎臟之陽。

桂枝化肺氣。茯苓行水道。丹皮。澤

瀉。以排除血液中毒質。使腎臟之

機能健。則小便之多者能少。祕者

可通。腎臟之精血充。則虛損可除。

而耳聾自瘥也。

③燒腎散(衛生寶鑑方)

活磁石一兩。(煨赤醋淬七次

飛淨) 附子一枚。(炮去皮

臍) 蜀椒五錢。(去目及閉

口者炒去汗取椒紅)

右爲散。每服一錢。用豬腎一枚。去

筋膜。細切。葱白韭白各一分。鹽花

一字。和勻。裹十重溼紙。於塘灰火

中煨熟。空腹細嚼。溫酒送下。以粥

壓之。十日有效。

【淺解】 本方以豬腎補腎。磁

石納腎氣。附子補腎陽。蜀椒。葱韭

通腎氣。以治耳聾。

②益腎散(證治準繩方)

靈磁石一兩。(製) 巴戟一兩。

川椒一兩。(開口者) 石菖

蒲五錢。沉香五錢。

右研爲細末。每服二錢。用豬腎一

只。(細切)和葱白食鹽並藥溼紙

十重裹之。煨令香熟。空腹細嚼。溫

酒送下。

【淺解】 本方與右方。意義相

同。效力亦相同。

①補腎丸(證治準繩方)

巴戟 二兩。(去心)

芍藥 二兩。乾薑 二兩。(炮)

山茱萸 二兩。桂心 二兩。

遠志 二兩。(去心)

菟絲子 二兩。(酒製)

細辛 二兩。澤瀉 二兩。

石斛 二兩。黃耆 二兩。

乾地黃 二兩。當歸 二兩。

蛇牀子 二兩。牡丹皮 二兩。

肉苁蓉 二兩。(酒浸)

人參 二兩。附子 二兩。(炮)

甘草 二兩。石菖蒲 一兩。

白茯苓 五錢。防風 一兩五錢。

羊腎 二枚。

右共研細末。以羊腎研爛細。酒煮

麪糊爲丸。如梧桐子大。每服五十

丸。空腹時鹽湯送下。

【淺解】 本方係補腎陽。通腎

氣治腎陽虛而耳聾之良方也。

●肉蓯蓉丸(證治準繩方)

肉蓯蓉五錢(酒浸焙) 菟絲

子五錢(酒浸另研) 山芋五

錢 白茯苓五錢(去皮) 人

參五錢 官桂五錢(去粗皮)

防風五錢(去叉) 熟地黃

五錢 芍藥五錢 黃耆五錢

附子二錢五分(炮去皮臍)

羌活二錢五分(去蘆) 澤

瀉二錢五分 羊腎一對(薄

切去筋膜炙乾)

右研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子

大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【淺解】 本方與右方意義相

同。爲治腎陽虛而耳聾之良方。

●桑螵蛸湯(證治準繩方)

桑螵蛸十枚(炙) 當歸一兩

白朮一兩(米泔水浸炒)

白茯苓一兩 官桂一兩 附

子一兩。牡荊子一兩。磁石

一兩。菖蒲一兩。乾地黃一

兩(焙) 大黃五錢(剉炒)

細辛五錢(去苗) 川芎五錢

丹皮五錢

右研末。每服五錢。先以水三碗。煮

豬腎一只。取汁一碗。去腎入藥。煮

至七分。去渣。食前溫服。

【淺解】 本方以芎歸地黃補

血和陰。茯苓白朮補氣和中。附子

官桂細辛和陽散寒。磁石螵蛸納

腎氣。菖蒲通腎氣。

耳鳴證

●何謂耳鳴 耳中嘈雜。如蟬

鬬之聲。或忽然之間。聞晶晶鈴鈴

之聲。此皆耳鳴。

●耳鳴證共分五類 ①氣虛

耳鳴類 ②血虛耳鳴類 ③腎虛耳

鳴類。④肝火耳鳴類。⑤痰火耳鳴

類。

●耳鳴證諸病之主要治療法

如何 ①氣虛耳鳴。用加味補中

益氣湯。②血虛耳鳴。用加味四物

湯。③腎虛耳鳴。用正元散。④肝火

耳鳴。用平肝湯。⑤痰火耳鳴。用復

聰湯。

●耳鳴證諸病之主要調養法

如何 凡患耳鳴。其人宜靜自休

養。切戒動怒。切戒憤鬱。切戒房慾。

不宜勞力。不宜行遠。

●耳鳴失治有何變症 耳鳴。

由身體虛弱者多。速峻補之。使正

氣健旺。則鳴自瘥也。若遷延失治。

則虛者愈虛。每令延入損途。而不

可救。

氣虛耳鳴類

【病源】中氣虛弱 其人中氣

虛弱。而令耳鳴。是謂氣虛耳鳴病。

【病狀】精神疲弱 氣虛耳鳴

病其人耳中時鳴。或如蟬噪。或如

鐘鼓。或如水激。不一而足。精神疲

乏。四肢無力。面黃肌瘦。飲食無味。

大便溏泄。

【變症】大肉陷下 氣虛耳鳴

病失治。氣虛益甚。耳鳴益劇。泄瀉

無度。肌肉消削。大肉陷下。飲食減

少。午後骨蒸。此延入損途。有生命

危險也。

【療法】精神疲弱之療法 氣

虛耳鳴病。其人耳中時鳴。或如蟬

噪。或如鐘鼓。或如水激。不一而足。

精神疲乏。四肢無力。面黃肌瘦。飲

食無味。大便溏泄。加味補中益氣

湯主之。加味四君子湯亦主之。

【調養】①不可勞力 氣虛耳

鳴病。切戒勞力房慾。並不可行遠

路。