

最新修订版 **2015**

全国护士执业资格考试 模拟试卷 与解析

主 编 姜小鹰 胡 荣

副主编 林 婷 肖惠敏 宋继红

修订超过30%

荟萃考试新要求

- 权威专家编写
- 学考紧密衔接
- 备考实用高效



人民卫生出版社



网络
增值服务
ONLINE SERVICES

2015

全国护士执业资格考试

模拟试卷与解析

主 编 姜小鹰 胡 荣

副主编 林 婷 肖惠敏 宋继红

编 者 (以姓氏笔画为序)

王小燕 王玉琴 方 艳 庄嘉元 刘 敦 肖惠敏
吴炜炜 邱萍萍 宋继红 张 旋 张玉萍 陈云雪
陈玲玲 陈美榕 陈艳清 陈起燕 林 雁 林 婷
林天安 林迎春 林晓云 罗 利 郑婉玲 胡 荣
胡蓉芳 姜小鹰 高 骥

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2015 全国护士执业资格考试模拟试卷与解析/
姜小鹰,胡荣主编.—北京:人民卫生出版社,2014
ISBN 978-7-117-19734-2

I. ①2… II. ①姜…②胡… III. ①护士-资
格考试-题解 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 216351 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询,在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导,医学数 据库服务,医学教育资 源,大众健康资讯

版权所有,侵权必究!

2015 全国护士执业资格考试
模拟试卷与解析

主 编:姜小鹰 胡 荣
出版发行:人民卫生出版社(中继线 010-59780011)
地 址:北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮 编:100021
E - mail: pmph@pmph.com
购书热线:010-59787592 010-59787584 010-65264830
印 刷:北京华联印刷有限公司
经 销:新华书店
开 本:787×1092 1/16 印张:13
字 数:374 千字
版 次:2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号:ISBN 978-7-117-19734-2/R·19735
定 价:38.00 元
打击盗版举报电话:010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com
(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

第一篇 模拟试卷

模拟试卷一	1
专业实务卷	1
实践能力卷	12
模拟试卷二	24
专业实务卷	24
实践能力卷	34
模拟试卷三	46
专业实务卷	46
实践能力卷	57
模拟试卷四	69
专业实务卷	69
实践能力卷	80
模拟试卷五	92
专业实务卷	92
实践能力卷	103

第二篇 模拟试卷答案及解析

模拟试卷一:参考答案及解析	115
模拟试卷二:参考答案及解析	131
模拟试卷三:参考答案及解析	146
模拟试卷四:参考答案及解析	162
模拟试卷五:参考答案及解析	179

第一篇

模拟试卷

模拟试卷一

专业实务卷

一、A1型题(以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。)

1. 以下关于护士行为规范的说法错误的是
A. 不宜佩戴任何饰物
B. 应淡妆上岗
C. 坐姿时应坐在椅子前的2/3处
D. 行走时应步态轻盈
E. 衣着服饰要整洁
2. 病室内应定时开窗通风,每次约
A. 10分钟 B. 20分钟 C. 30分钟
D. 40分钟 E. 50分钟
3. 以下哪项属于“以疾病为中心的护理”阶段的特点
A. 执行医嘱和护理常规
B. 确立人是一个整体的概念
C. 应用科学的工作方法及护理程序工作
D. 工作范围由患者扩展到所有人
E. 新的健康观的提出
4. 两张病床间的距离不得少于
A. 1m B. 2m C. 3m
D. 4m E. 5m
5. 取半坐卧位时,床头支架的角度应呈
A. $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ B. $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$
C. $20^{\circ}\sim 40^{\circ}$ D. $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$
E. $45^{\circ}\sim 65^{\circ}$
6. 以下哪项不属于医院内感染的主要因素
A. 医院内病原体来源广泛,环境污染严重
B. 易感人群增多
C. 有效控制大量新型抗生素的开发和使用
D. 各种侵入性诊疗手段增多
E. 医务人员对医院内感染的严重性认识不足
7. 为长期应用激素的患者进行口腔护理时,应注意观察
A. 黏膜有无溃疡
B. 有无特殊气味
C. 黏膜有无真菌感染
D. 黏膜有无出血点
E. 口唇有无干裂
8. 以口腔温度为标准,体温过低的范围是指
A. 35°C 以下 B. $35\sim 36^{\circ}\text{C}$
C. $36.6\sim 37.5^{\circ}\text{C}$ D. $37.3\sim 38^{\circ}\text{C}$
E. $38.1\sim 38.5^{\circ}\text{C}$
9. 以下哪项测量脉搏的方法是错误的
A. 用示指、中指和无名指诊脉
B. 患者剧烈活动后应休息20分钟再测
C. 异常脉搏需测1分钟
D. 绌脉者先测心率,后测脉率
E. 偏瘫患者选择健侧肢体测脉
10. 一般成人胃管插入的长度为
A. $14\sim 16\text{cm}$ B. $20\sim 30\text{cm}$
C. $45\sim 55\text{cm}$ D. $60\sim 70\text{cm}$
E. $80\sim 90\text{cm}$
11. 昏迷患者用热水袋的水温不可超过
A. 30°C B. 40°C C. 50°C
D. 60°C E. 70°C
12. 以下哪项属于0.1%肥皂液大量不保留灌肠的禁忌证
A. 中暑时降温

- B. 清除肝性脑病患者肠道的有毒物质
C. 分娩前清洁肠道
D. 解除便秘
E. 腹部术前肠道准备
13. 实习护生进行抽药操作,方法正确的是
A. 抽吸后药液,立即用双手套上针套
B. 掰安瓿时适当垫以纱布
C. 用手折弯针头
D. 用手直接传递锐器
E. 用手直接接触医疗废物
14. 青霉素过敏性休克的最佳处理方法是
A. 停药、平卧、注射盐酸肾上腺素、保暖、吸氧
B. 停药、平卧、吸氧、注射抗组胺药物
C. 停药、平卧、测血压、注射呼吸兴奋剂
D. 停药、吸氧、保暖、注射间羟胺
E. 停药、吸氧、保暖、注射地塞米松
15. 以下患者在进行输液时,滴速可调整至 60 滴/分的是
A. 严重脱水,心肺功能良好的成人
B. 重度营养不良的婴幼儿
C. 输入高渗盐水者
D. 输入升压药物者
E. 老年肺部感染者
16. 下列哪项不属于输血的目的
A. 增加血红蛋白
B. 补充抗体
C. 补充各种凝血因子
D. 维持酸碱平衡
E. 补充血容量
17. 下列哪项不属于标本采集的原则
A. 根据检验目的选择容器
B. 培养标本须放在无菌容器内
C. 应在空腹时进行
D. 停用干扰检查结果的药物
E. 立即送检,必要时注明时间
18. 按疼痛的三阶梯镇痛疗法,适合于第一阶梯使用的药物是
A. 美沙酮 B. 布洛芬 C. 吗啡
D. 可待因 E. 氧吗啡
19. 下列医嘱中哪项属于长期备用医嘱
A. 一级护理 B. X线摄片
C. 眼科会诊 D. 吸氧 prn
E. 餐后血糖
20. 下列选项中,属于护士权利的是
A. 遵守法律、法规、规章和诊疗技术规范
的规定
B. 保护患者隐私
C. 对医疗卫生机构和卫生主管部门的工作提出意见和建议
D. 发现患者病情危急,立即通知医师
E. 能力不足时不能参加患者的抢救
21. 影响人际沟通效果的个人心理因素是
A. 沟通者情绪烦躁
B. 沟通者听力障碍
C. 沟通双方距离较远
D. 沟通双方信仰不同
E. 沟通双方价值观不同
22. 呼吸困难患者采取半坐位有利于呼吸的主要原理是
A. 保持上呼吸道开放
B. 心脏位置下降
C. 膈肌位置下降
D. 肋间肌活动范围增大
E. 腹肌放松
23. 风湿性心脏瓣膜病最常见的病因是
A. 金黄色葡萄球菌
B. 厌氧菌
C. 肺炎杆菌
D. 铜绿假单胞菌
E. A 族乙型溶血性链球菌
24. 溃疡性结肠炎最重要的实验室诊断方法是
A. 血液检查
B. 粪便检查
C. 自身免疫抗体检测
D. 结肠镜检查
E. X线钡剂灌肠
25. 肠结核最好发的部分是
A. 十二指肠球部 B. 十二指肠球后
C. 升结肠 D. 回盲部
E. 降结肠
26. 关于空肠扭转致闭袢性肠梗阻患者的临床表现,下列不正确的是
A. 突然发作
B. 持续性腹部绞痛伴阵发性加剧
C. 呕吐发生早且频繁
D. 均匀性全腹胀
E. 排出血性黏液样便
27. 烧伤休克发生的基本原因是
A. 水摄入不足
B. 输液量不足

- C. 失血过多
D. 输血不足
E. 毛细血管通透性增加
28. 妊娠合并心脏病孕产妇死亡是
A. 心力衰竭与肺动脉高压所致
B. 非直接产科死亡原因的首位
C. 剖宫产后并发感染性休克所致
D. 并发羊水栓塞或产后出血所致
E. 产后出血与肺动脉高压所致
29. 下列关于妊娠合并糖尿病终止妊娠的时间,正确的是
A. 33 周 B. 35 周 C. 37 周
D. 39 周 E. 40 周
30. 反映骨骼发育最主要的指标是
A. 体重 B. 身高 C. 头围
D. 胸围 E. 坐高
31. 婴儿易发生溢乳的原因是
A. 胃呈水平位
B. 胃呈垂直位
C. 消化道梗阻
D. 胃底部肌张力高
E. 幽门括约肌发育较差

二、A2 型题(以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。)

32. 患者,女,49 岁,甲状腺癌,经手术治疗后康复出院,护士在出院前对患者说:“回家好好休息,按时服药,有什么问题及时给我们打电话。”这属于
A. 招呼用语 B. 介绍用语
C. 电话用语 D. 安慰用语
E. 迎送用语
33. 护士小李在值夜班,为了营造安静环境,下列做法不妥的是
A. 说话轻 B. 走路轻
C. 关门轻 D. 少巡视
E. 操作轻
34. 患者,男,76 岁,“脑梗死”昏迷入院,大小便失禁,护士为其更换床单时,以下哪项是错误的
A. 松开被尾,协助患者翻身至对侧
B. 松开近侧各层床单
C. 扫净橡胶单塞患者身下
D. 自床头至床尾扫净床垫
E. 换各层单,逐层拉平铺好
35. 患者,男,32 岁,因支气管哮喘入院。护士发现他缺乏预防哮喘复发的知识,下列护理诊断陈述正确的是
A. 知识缺乏
B. 知识缺乏(特定的)
C. 知识缺乏 与患者学历低有关
D. 知识缺乏:缺乏有关预防哮喘复发的知识
E. 知识缺乏 与哮喘发作有关
36. 患者,女,54 岁,诊断为“糖尿病”。住院期间因琐事与护士争执而感到焦虑不安、心慌气促。此情况属于
A. 机械性损伤 B. 温度性损伤
C. 生物性损伤 D. 社会性损伤
E. 医源性损伤
37. 患者,女,52 岁,子宫肌瘤切除术后,护士为其进行会阴冲洗,此时应为患者摆
A. 去枕平卧位 B. 屈膝仰卧位
C. 中凹卧位 D. 侧卧位
E. 半坐卧位
38. 患者,女,28 岁,诊断为“SARS”入院。对此患者采取的隔离措施应为
A. 严密隔离 B. 昆虫隔离
C. 保护性隔离 D. 消化道隔离
E. 接触性隔离
39. 患者,男,48 岁,诊断为“丙型肝炎”入院,患者需抽血做肝功能检查。抽血后护士消毒双手方法正确的是
A. 刷洗范围应在污染范围内
B. 流动水冲洗时,腕部应高于肘部
C. 洗手时,身体靠近洗手池
D. 双手共刷洗 2 分钟
E. 刷手毛刷可重复使用
40. 护士小张,为患者进行换药,以下操作错误的是
A. 打开无菌容器盖时,盖子可拿在手中
B. 倒无菌溶液时,溶液瓶标签朝向掌心
C. 戴上无菌手套后双手应保持在腰部以上的位置
D. 无菌包开包后如物品未用完,应按十字法包好
E. 无菌持物钳每 4h 更换

41. 患者,女,65岁,车祸致左上肢和左下肢骨折。术后护士为其床上擦浴时下列哪项是错误的
- A. 热水温度为50~52℃
 - B. 擦浴前按需要给予便器
 - C. 洗脸时由外眦向内眦擦拭眼部
 - D. 擦浴应在15~30分钟内完成
 - E. 擦浴时应注意观察病情
42. 患者,女,40岁,急性胆囊炎术后第2天,护士为其晨间护理的内容不包括
- A. 漱口
 - B. 洗脸
 - C. 梳头
 - D. 检查局部伤口
 - E. 会阴冲洗
43. 患者,男,58岁,患有高血压病,护士为其测量血压时放气速度应适宜,每秒钟下降
- A. 20mmHg
 - B. 16mmHg
 - C. 12mmHg
 - D. 8mmHg
 - E. 4mmHg
44. 患者,男,56岁,肺炎。入院时测得体温为40.0℃。为观察体温的变化,测量体温的频率应为
- A. 每8小时1次
 - B. 每6小时1次
 - C. 每4小时1次
 - D. 每日1次
 - E. 每晚1次
45. 患者,女,75岁。因高血压入院,护士为其测量血压,下列方法可使测量血压值偏高的是
- A. 放气太慢
 - B. 肱动脉高于心脏水平
 - C. 视线高于水银柱弯月面水平
 - D. 衣袖过紧
 - E. 听诊器胸件塞到袖带下
46. 患者,男,75岁,慢性肺源性心脏病。为减轻心脏负担,饮食宜采用
- A. 高蛋白饮食
 - B. 低脂饮食
 - C. 低盐饮食
 - D. 少渣饮食
 - E. 低胆固醇饮食
47. 患者,男,27岁,因流感发热3天,体温维持在38.1℃左右,为保证患者足够营养宜选择的饮食是
- A. 普通饮食
 - B. 软质饮食
 - C. 半流质饮食
 - D. 流质饮食
 - E. 鼻饲饮食
48. 患者,男,45岁,贲门癌,术后鼻饲供给营养。在插管过程中,患者出现恶心时,护士应
- A. 立即拔出胃管
 - B. 稍停插管,嘱患者深呼吸
 - C. 立即快速插入
 - D. 检查胃管是否盘在口中
 - E. 请患者坚持一下
49. 患者,女,69岁,因走路不慎致踝部扭伤,2小时后来院就诊,正确的处理方法是
- A. 热敷
 - B. 冷敷
 - C. 按摩
 - D. 红外线照射
 - E. 绷带包裹
50. 患者,女,78岁,肺癌晚期,疼痛剧烈。以下因素中对其疼痛感觉程度没有影响的是
- A. 年龄
 - B. 血压高低
 - C. 护士的态度
 - D. 注意力
 - E. 家属的陪伴
51. 患者,男,78岁,阿尔茨海默病3年,因肠道感染出现腹泻,以下措施哪项不妥
- A. 卧床休息,给予腹部保暖
 - B. 饮食给予热米粥
 - C. 遵医嘱补充电解质
 - D. 注意观察记录腹泻性质和量
 - E. 可行抗菌药物保留灌肠
52. 患者,男,62岁,直肠息肉术后导致尿潴留,医嘱导尿。导尿时提高阴茎使之与腹壁呈60°角,可使
- A. 耻骨前弯消失,耻骨下弯存在
 - B. 耻骨下弯消失,耻骨前弯存在
 - C. 耻骨前弯、耻骨下弯均消失
 - D. 耻骨前弯、耻骨下弯均存在
 - E. 尿道的三个狭窄消失
53. 患者,女,20岁,因扁桃体化脓性感染用青霉素治疗。皮试结果:皮丘红肿1.2cm,皮肤痒、胸闷、面色苍白、出冷汗。为患者采取的护理措施,首先是
- A. 人工呼吸
 - B. 皮肤涂氟轻松
 - C. 注射盐酸肾上腺素
 - D. 静滴地塞米松
 - E. 吸氧
54. 患者,男,32岁,TAT皮试结果阳性,因病情需要,采用脱敏注射,正确的方法和药物剂量为
- A. 分3等份分次注射
 - B. 分4等份分次注射
 - C. 分3次注射,剂量递增

- D. 分4次注射,剂量递增
E. 分4次注射,剂量递减
55. 患者,男,患血友病,在输血过程中出现头部胀痛、四肢麻木、腰背剧痛、黄疸、血压下降等症状。护士判断此患者发生了
- A. 发热反应
B. 过敏反应
C. 溶血反应
D. 枸橼酸钠中毒反应
E. 急性肺水肿
56. 患者,女,55岁,因急性胃肠炎而输液1200ml,每分钟50滴,从上午8点20分开始,估计何时可输完
- A. 12:20 B. 13:20 C. 14:20
D. 15:20 E. 16:20
57. 患者,男,36岁,口腔溃疡1周,采集标本进行真菌培养,正确的采集方法是
- A. 采集患者24小时痰液
B. 用无菌长棉签擦拭腭弓分泌物
C. 用无菌长棉签擦拭咽部分泌物
D. 用无菌长棉签快速擦拭扁桃体分泌物
E. 用无菌长棉签在口腔溃疡表面上取分泌物
58. 患者,女,40岁,于1小时前口服农药(药名不详)而来急诊。检查:神志清楚,呼气有蒜臭味,血压及脉搏正常。护士正确的洗胃操作是
- A. 患者取坐位
B. 插管后先抽吸后灌注
C. 用2%碳酸氢钠溶液洗胃
D. 每次灌入洗胃液1000ml以上
E. 洗胃液总量不得超过5000ml
59. 患者,女,42岁,因输血感染艾滋病,病情每况愈下,日渐衰落。患者怨恨命运不公,动辄摔打物品,拒绝治疗,此心理反应属于
- A. 否认期 B. 愤怒期 C. 协议期
D. 忧郁期 E. 接受期
60. 患者,女,48岁,因高热入院,T 39.8℃,护士为其在头部使用热水袋,以下做法错误的是
- A. 冰袋内应装满冰块
B. 备冰时将小冰块放在冷水中除去棱角
C. 装冰块之后应将袋内空气排尽
D. 装冰块之后应检查冰袋有无破损
E. 冰袋放置时间不超过30分钟
61. 林某,女,35岁,某医院心内科护士长。最近她受护理部委托进行全院专科护士培训的筹备工作,这让她感到压力很大,而心内科病房的日常管理工作也受到了影响。这种情况违背的管理组织原则是
- A. 管理幅度的原则
B. 专业化分工与协作的原则
C. 统一指挥的原则
D. 职责与权限相应的原则
E. 稳定性与适应性相结合的原则
62. 患者,男,54岁,因患有精神分裂症入院治疗。住院期间,患者精神状态不稳定,有暴力倾向。此时,护士应当
- A. 持续给予约束
B. 不予约束,注意观察
C. 向家属解释,运用必要手段适当给予约束
D. 尊重家属的意见
E. 尊重患者的意见
63. 患儿,女,11岁,患甲状腺癌伴淋巴结转移。护士告诉患儿家属,其女需做甲状腺癌根治术,但术后其身体外观和功能会受到一定损害。家属因考虑到手术后遗症而断然拒绝治疗,带孩子出院。过了不久,家属考虑到癌症将危及患儿的生命,又再次来到医院要求给予治疗,医院将其收治入院并予手术治疗。此案例中,涉及了除哪项以外的患者权利
- A. 基本医疗权 B. 自我决定权
C. 自我选择权 D. 知情同意权
E. 隐私保密权
64. 患者,男,52岁,肺癌术后第2天。护士询问其伤口疼痛情况时,宜采用的非语言沟通技巧是
- A. 谈话时始终直视患者眼睛
B. 交流时使患者处于仰头位
C. 边书写病历边和患者交谈
D. 交谈时身体略向患者倾斜
E. 与患者距离越近越好
65. 患者,女,60岁,因糖尿病入院治疗。护士为患者介绍病区环境,并了解患者的一般情况与病情进展。此时,护患关系处于
- A. 工作期 B. 准备期 C. 发展期
D. 结束期 E. 开始期
66. 患者,女,23岁,诊断为SLE入院治疗。确诊后,该患者始终否认患病,不愿接受治疗。该患者出现的角色行为改变属于

- A. 角色行为强化 B. 角色行为缺如
C. 角色行为冲突 D. 角色行为差异
E. 角色行为消退
67. 患者,女,71岁,慢性肾小球肾炎、肾衰竭尿毒症期。遵医嘱行血液透析。透析前血压150/110,体重66kg。在血液透析过程中,突然出现恶心、胸闷,面色苍白,测量血压110/90mmHg。该患者可能出现了
- A. 失衡综合征 B. 肌肉痉挛
C. 透析器反应 D. 低血压
E. 心律失常
68. 患者,男,65岁,高血压病史十余年,吸烟史三十余年。在家宴请时突然剧烈头痛、呕吐、意识不清,摔倒在地,考虑为脑出血收入院。患者家属询问护士:“什么诱发了脑出血?”护士的回答应为:脑出血最常见的诱因是
- A. 长期吸烟 B. 血压升高
C. 饮食不当 D. 头部外伤
E. 气候变化
69. 患者,女,38岁,诊断为慢性特发性血小板减少性紫癜。护士对其发病机制的解释哪项不妥
- A. 体内产生血小板抗体
B. 巨核细胞成熟障碍
C. 血小板在脾被破坏
D. 毛细血管脆性增高
E. 血小板寿命缩短
70. 患者,女,26岁,诊断为SLE,病情处于缓解状态,可能诱发患者发病的有关因素是
- A. 气候寒冷 B. 饮食失调
C. 过度疲劳 D. 日光照射
E. 营养缺乏
71. 患者,男,15岁,消瘦外观,健康体检时发现空腹血糖为8.5mmol/L,住院诊断为1型糖尿病,该患者发病的原因是
- A. 过度肥胖导致胰岛素受体减少
B. 长期应用糖皮质激素
C. 遗传因素
D. 糖摄入过多
E. 胰岛素绝对分泌不足
72. 患者,男,50岁,头部受重物撞击入院,CT检查提示硬膜外血肿,幕上血肿约30ml,其脑疝形成并导致昏迷的直接原因是
- A. 脑缺氧 B. 脑缺血
C. 呼吸循环障碍
D. 脑干受压
E. 脑脊液循环受阻
73. 患者,女,42岁,以“腰腿痛1个月”为主诉入院,确诊为“腰椎间盘突出症”,患者向护士询问其最基本的病因是
- A. 椎间盘退行性变
B. 损伤
C. 妊娠
D. 营养不良
E. 遗传因素
74. 患者,女,35岁,3个月前无明显诱因出现黏液血便,大便次数增多,有排便不尽感。于当地医院按“慢性细菌性痢疾”治疗无效。发病以来体重下降3kg。护士对该患者进行病情判断后,其结果可能为
- A. 左半结肠癌 B. 直肠癌
C. 结肠炎 D. 慢性痢疾
E. 直肠息肉
75. 患者,女,27岁,近半年来经常排便后滴少量鲜血。近1个月排便时出现一软结节突出,需用手辅助回纳,并伴有肛门部瘙痒感,护士对该患者进行疾病评估后,应考虑为
- A. 直肠息肉 B. 混合痔
C. 直肠癌 D. Ⅲ期内痔
E. Ⅳ期内痔
76. 患者,男,58岁,活动后出现腰痛和血尿,疑有上尿路结石。首选的影像学检查是
- A. B超
B. 肾动脉造影
C. 排泄性尿路造影
D. 尿路平片
E. 逆行肾盂造影
77. 患者,女,55岁,绝经5年,近1个月阴道水样白带,近半个月出现阴道间断少量流血,查子宫颈光滑,宫体稍大且软,附件未扪及。其正确的护理评估应除外
- A. 分段诊断性刮宫
B. 宫腔镜检查
C. B型超声检查
D. 按子宫内膜癌评估
E. 阴道镜检查
78. 23岁初产妇,妊娠39周,规律宫缩12小

时。近2小时产程无进展,产妇呼喊疼痛,腹部拒按,子宫呈痉挛性收缩,胎位触不清,胎心150次/分。肛查宫口开3cm,胎头S+1。以下处理措施正确的是

- A. 静脉滴注缩宫素
 - B. 立即行剖宫产术
 - C. 行人工破膜
 - D. 遵医嘱肌注哌替啶100mg
 - E. 阴道检查后再决定分娩方式
79. 患者,女,25岁,体检发现卵巢囊肿直径5cm,今在排练舞蹈旋转时,突感左下腹持续疼痛,且逐渐加剧。局部压痛,拒按。最可能发生卵巢囊肿的哪种并发症
- A. 破裂
 - B. 内出血
 - C. 感染
 - D. 蒂扭转
 - E. 恶性变
80. 男婴,2个月,其家长来保健门诊咨询预防佝偻病的保健知识,护士遵医嘱指导家长给婴儿口服维生素D的剂量是
- A. 200~400IU/d

- B. 400~800IU/d
- C. 800~1000IU/d
- D. 1000~2000IU/d
- E. 2000~5000IU/d

81. 患儿,男,8个月,体重5.8kg,身高55cm,诊断“营养不良”,其最易伴发以下哪种维生素缺乏
- A. 维生素A
 - B. 维生素B
 - C. 维生素C
 - D. 维生素D
 - E. 维生素E
82. 足月儿,生后2周,黄疸逐渐加重,以结合型胆红素增加为主,肝脏进行性增大,大便呈灰白色,家长咨询其原因,护士的正确解释是
- A. 生理性黄疸
 - B. 母乳性黄疸
 - C. 新生儿溶血症
 - D. 新生儿败血症
 - E. 新生儿胆道闭锁

三、A3型题(以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属方框涂黑。)

(83~85题共用题干)

患者,女,65岁,因胆囊炎、胆石症入院准备手术治疗,小方是该患者的责任护士,她与患者讨论术前准备的有关事宜。

83. 小方与患者讨论术前准备时所采取的合适距离为
- A. 0~0.5m
 - B. 0.46~1.2m
 - C. 1.2~3.6m
 - D. 3.6~4.5m
 - E. 5m以上
84. 小方在倾听患者诉说过程中需避免的做法是
- A. 适当做一些记录
 - B. 保持眼神的接触
 - C. 使患者处于仰视位
 - D. 身体稍向患者倾斜
 - E. 使用表达信息的举动
85. 交谈过程中,可引起沟通障碍的是
- A. 适当做一些记录
 - B. 适当保持沉默
 - C. 复述关键内容
 - D. 适时抚摸患者
 - E. 经常改换话题

(86~87题共用题干)

患者,女,67岁,肺源性心脏病,患者表现为呼吸困难,喉中有痰,不易咳出,患者家离医院较远,家人探视少,患者因此焦虑,无人时常哭泣。

86. 护理该患者首先应解决的问题是
- A. 清理呼吸道无效
 - B. 皮肤完整性受损
 - C. 语言沟通障碍
 - D. 活动无耐力
 - E. 便秘
87. 除解决上述问题外,护士还应注意满足患者
- A. 生理的需要
 - B. 安全的需要
 - C. 爱与归属感的需要
 - D. 尊敬的需要
 - E. 自我实现的需要

(88~89题共用题干)

患者,男,34岁,晨起突然排出大量柏油样黑便,并出现心悸、头晕、无力,诊断为胃溃疡大出血入院,医护人员对其进行抢救处理。

88. 因抢救未能及时记录的医疗护理文件,有关医护人员应当在抢救结束后几小时内补记
- A. 2 小时 B. 4 小时 C. 6 小时
D. 8 小时 E. 10 小时

89. 经积极治疗后,患者康复出院,下列护士对患者文件处理哪项是**错误**的
- A. 用红笔在体温单相应栏内纵写出院时间
B. 出院病案按顺序排列
C. 诊断卡、治疗卡夹入病历内
D. 注销床尾卡、饮食卡等
E. 填写患者出院登记表

(90~92 题共用题干)

患者,女,65 岁,长期卧床,护士在为其生活护理。

90. 患者为长发,以下床上梳头的方法**错误**的是
- A. 床上梳头可以去除头皮污秽,减少感染的机会
B. 对于将头发编成发辫者,可 2~3 天松开发辫一次,经梳理后再编好
C. 长发者应沿发梢到发根的方向进行梳理
D. 发辫不宜扎得太紧,以免引起疼痛
E. 头发梳理过程中可用指腹按摩头皮,促进头部血液循环
91. 如为患者进行背部按摩,应用乙醇的浓度
- A. 20% B. 50% C. 75%
D. 90% E. 100%
92. 如为患者进行床上大小便,以下方法**错误**的是
- A. 不可强行塞、拉便盆
B. 取出便盆时,应先抬起臀部
C. 及时倒掉排泄物
D. 冬天时金属便盆应加热后使用
E. 即使患者能够自理,也应协助患者擦净肝门

(93~95 题共用题干)

患者,女,50 岁,因“有机磷农药中毒”入院,意识不清,躁动。

93. 为限制患者手腕和踝部的活动,用宽绷带约束患者,宽绷带应打成
- A. 外科结 B. 死结 C. 双套结
D. 滑结 E. 单套结
94. 使用约束带时,应注意保持患者肢体处于
- A. 患者舒适的位置
B. 患者喜欢的位置

- C. 接受治疗的强迫位置
D. 容易变换的位置
E. 功能位置

95. 使用约束带时,应注意观察

- A. 患者神志是否清楚
B. 患者体位是否舒适
C. 衬垫是否合适
D. 患者被约束部位皮肤的颜色
E. 约束带是否牢靠

(96~98 题共用题干)

护士小张,是一名新入职的护士,在急诊科工作 3 个月。

96. 小张必须接受的预防接种种类是
- A. 流行感冒疫苗 B. 卡介苗
C. 伤寒菌苗 D. 天花疫苗
E. 狂犬疫苗
97. 被锐器损伤皮肤后,小张的处理方法中**错误**的是
- A. 从伤口的近心端向远心端挤出血液
B. 生理盐水冲洗皮肤
C. 用肥皂水清洗伤口
D. 在伤口局部按压止血
E. 用碘伏消毒伤口
98. 小张在配制化疗药品时**错误**的是
- A. 抽取药液后,按常规方法进行排气
B. 应戴乳胶手套
C. 掰开安瓿时应垫纱布
D. 溶解药物时溶媒应沿瓶壁注入瓶底
E. 应穿低渗透隔离衣

(99~101 题共用题干)

患者,女,48 岁,支气管肺炎,痰多不易咳出。医嘱:生理盐水 30ml、 α -糜蛋白酶 5mg、庆大霉素 8 万单位,超声雾化每次 20 分钟。

99. 超声雾化器雾化罐内放药液,其药量一般稀释至
- A. 5~10ml B. 10~20ml
C. 20~30ml D. 30~50ml
E. 50~60ml
100. 水槽内应保持足够的水量,水温不宜超过
- A. 20℃ B. 30℃ C. 40℃
D. 50℃ E. 60℃
101. 雾化结束后的以下处理措施**错误**的是
- A. 协助擦干患者面部

- B. 协助其取舒适卧位
- C. 放掉水槽内的水
- D. 将口含嘴、雾化罐、螺纹管先洗净再消毒
- E. 记录患者的反应及效果

(102~103 题共用题干)

患者,男,36岁,南方人,出差来到北方,因不明原因发热而入院,入院出现便秘,主要原因是对于蹲式如厕方式不习惯。

102. 护士进行护理诊断,下列诊断正确的是
- A. 便秘 与环境改变有关
 - B. 发热 与出差有关
 - C. 便秘 与发热有关
 - D. 发热 与便秘有关
 - E. 便秘 与活动改变有关
103. 以下针对目前情况所制订的护理目标,哪项是错误的
- A. 2天后,掌握正确的蹲式排便护理措施
 - B. 3天后,护士教会患者正确的饮食方法
 - C. 4天后,患者会准确说出预防便秘的措施
 - D. 5天后,患者大便松软较易排出
 - E. 6天后,患者养成1天1次规律排便的习惯

(104~105 题共用题干)

患者,男,69岁,因脑梗死发作住院治疗已经1周,偏瘫、失语症状有所好转,患者下肢无力,肢体可移动位置和抬起,关节活动范围缩小。

104. 住院的前两夜,患者因夜间输液、不适应环境等影响,出现白天昏昏沉沉,夜间失眠等现象,患者烦躁不安。患者此时出现了
- A. 昼夜性节律去同步化
 - B. 梦魇
 - C. 睡眠呼吸暂停
 - D. 睡眠剥夺
 - E. 发作性睡眠
105. 该患者目前的骨骼肌力为
- A. 1级
 - B. 0级
 - C. 2级
 - D. 4级
 - E. 3级

(106~107 题共用题干)

患者,男,30岁。主诉咽痛不适、鼻塞、流

涕、咳嗽,伴有食欲减退、乏力、全身酸痛。检查T 39.2℃,白细胞与中性粒细胞计数增高。需肌肉注射抗生素。

106. 臀大肌注射用连线法的定位,正确的是
- A. 髂嵴和尾骨连线的外上1/3处
 - B. 髂嵴和尾骨连线的下1/3处
 - C. 髂前上棘和尾骨连线的下1/3处
 - D. 髂前上棘和尾骨连线的中1/3处
 - E. 髂前上棘和尾骨连线的外上1/3处
107. 下列注射的措施与无痛注射原则无关的是
- A. 分散注意力
 - B. 进针后,注射前,忌抽动活塞
 - C. 体位舒适、肌肉松弛
 - D. 注射时做到“二快一慢”
 - E. 注射刺激性强的药物,进针要深

(108~110 题共用题干)

患者,男,66岁,因病情需要行加压静脉输液。当护士去治疗室取物品回到患者床前时,发现患者呼吸困难,有严重发绀。患者自述胸闷、胸骨后疼痛、眩晕,护士立即给患者测量血压,其值为75/55mmHg。

108. 此患者可能出现了
- A. 心脏负荷过重的反应
 - B. 心肌梗死
 - C. 空气栓塞
 - D. 过敏反应
 - E. 心绞痛
109. 护士应立即协助患者
- A. 取右侧卧位
 - B. 取左侧卧位
 - C. 取仰卧位,头偏向一侧
 - D. 取半卧位
 - E. 取端坐卧位
110. 下列措施中可以有效预防上述情况发生的是
- A. 正确调节滴速
 - B. 预防性服用舒张血管的药物
 - C. 预防性服用抗过敏药物
 - D. 加压输液时护士应在患者床旁守候
 - E. 严格控制输血量

(111~113 题共用题干)

患者,男,67岁,1年前诊断为心绞痛,今日午后无明显诱因出现胸前区疼痛,服硝酸甘油

不能缓解,急诊入院,医嘱要求检查血清肌酸磷酸激酶(CPK)。

111. 适宜的采血时间是

- A. 即刻
- B. 睡前
- C. 晚饭前
- D. 服药后 2 小时
- E. 次日晨起空腹

112. 采集血标本时,正确的措施是

- A. 取静脉血 1ml
- B. 采血后避免振荡,防止溶血
- C. 采血后更换针头再注入试管内
- D. 可在静脉留置针处取血
- E. 快速将血液注入试管内

113. 下列哪项不属于试管外标签注明的内容

- A. 科室
- B. 床号
- C. 姓名
- D. 采血量
- E. 送检目的

(114~115 题共用题干)

患者,男,33 岁,因车祸致颅脑损伤,观察病情时发现患者呼吸突然停止。

114. 如判断患者无呼吸、无意识,首先应

- A. 心脏按压
- B. 立即呼救
- C. 人工呼吸
- D. 打开气道
- E. 测量血压

115. 如为患者实施心脏按压,频率为

- A. 50 次/分
- B. 60 次/分
- C. 80 次/分
- D. 90 次/分
- E. 100 次/分以上

(116~118 题共用题干)

患者,女,78 岁,肝癌晚期,处于濒死期。

116. 关于濒死患者常见的希氏面容的描述,下列哪项是错误的

- A. 面部呈铅灰色
- B. 双眼半睁呆滞
- C. 下颌下垂
- D. 牙关紧闭
- E. 眼眶凹陷

117. 如按照临终关怀的原则进行护理,以下哪项不属于临终关怀的基本原则

- A. 护理照顾为主的原则
- B. 提高生命质量的原则
- C. 注重心理支持的原则
- D. 尊重患者尊严和权利的原则
- E. 尽力延长生命的原则

118. 如患者死亡,为患者进行尸体护理时,头下垫枕头的目的是

- A. 使尸体包裹后外观良好
- B. 便于尸体护理
- C. 防止面部淤血发紫
- D. 防止下颌下垂
- E. 便于家属辨认

(119~120 题共用题干)

患者,女,56 岁,3 小时前因上腹部剧痛伴恶心、呕吐 1 次,30 分钟后突然晕厥、出冷汗伴濒死感而急诊入院。入院时间为 14:30。体格检查:腋温 38.5℃,脉搏 102 次/分,呼吸 22 次/分,血压 70/50mmHg。

119. 关于入院时间的记录方法,表述正确的是

- A. 在体温单上 40~42℃ 栏内蓝笔纵行书写
- B. 在体温单上 <35℃ 栏内红笔纵行书写
- C. 在体温单上 40~42℃ 栏内红笔纵行书写
- D. 在体温单上 <35℃ 栏内蓝笔纵行书写
- E. 在体温单底栏书写

120. 关于生命体征的绘制方法,正确的是

- A. 呼吸的记录符号为红“○”
- B. 腋温的记录符号为蓝“×”
- C. 脉搏的记录符号为红“○”
- D. 心率以红“●”表示
- E. 物理降温后的体温以蓝“○”表示

(121~122 题共用题干)

某医院的组织结构中设护理副院长与护理部主任各 1 名,中层管理者内科总护士长、外科总护士长、门诊护士长各 1 名,基层管理者每个专科病区护士长各 1 名。

121. 这种组织结构类型是

- A. 直线型
- B. 职能型
- C. 直线-职能型
- D. 矩阵型
- E. 团队

122. 这种组织结构的优点是

- A. 组织关系简明
- B. 可能形成多头领导
- C. 权力高度集中于最高领导
- D. 管理分工较细

E. 当环境变化时适应性强

(123~124 题共用题干)

患者,男,18岁,因突然发热入院,医师遂按感冒处理。因患者3天未退热,发现白细胞中有极少数未成熟细胞,护士遵医嘱告知患者3天后再做化验,此后患者家长多次询问护士要求其告知患者的化验结果。

123. 此案例中,患者家长要求了解化验结果,属于行使患者的何种权利

A. 平等医疗权 B. 诊疗自主权

C. 知情同意权 D. 保护隐私权

E. 医疗监督权

124. 此案例中,护士应当采取的正确行为是

- A. 在患者家长追问下,告知其患者的化验结果
B. 在患者家长追问下,直接告知患者的化验结果
C. 主动将化验结果告知患者
D. 主动将化验结果同时告知患者与家长
E. 主动将化验结果告知家长,取得家长配合,先不告知患者本人

四、A4型题(以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属方框涂黑。)

(125~129 题共用题干)

患者,男,65岁,急性上呼吸道感染入院,入院时测得体温38.9℃,神志清楚,面色潮红,口唇干裂,体质消瘦,卧床不起,食欲差。

125. 入院时患者的体温属于

A. 正常 B. 低热 C. 中等热
D. 高热 E. 超高热

126. 入院时属于发热过程中的

A. 体温上升期 B. 高热持续期
C. 退热期 D. 体温下降期
E. 低热期

127. 用冰袋为该患者进行物理降温,其散热的原理是

A. 传导
B. 辐射
C. 对流
D. 抑制下丘脑活动
E. 蒸发

128. 行冰袋降温后,给患者重测体温的时间为

A. 10分钟后 B. 20分钟后
C. 30分钟后 D. 40分钟后
E. 60分钟后

129. 该患者宜采用的饮食为

A. 普通饮食 B. 软质饮食
C. 半流质饮食 D. 流质饮食
E. 要素饮食

者神志清楚,T 38.5℃,P 96次/分,R 20次/分,血压126/85mmHg。

130. 患者的症状会表现为

A. 尿频、尿急、尿痛
B. 尿潴留
C. 多尿
D. 少尿
E. 尿失禁

131. 其排出的尿液颜色会表现为

A. 棕色 B. 酱油色
C. 黄褐色 D. 白色混浊
E. 乳白色

132. 其排出的新鲜尿液的气味会表现为

A. 无味 B. 氨臭味
C. 烂苹果味 D. 蒜味
E. 腐臭味

133. 因增加尿量可对尿道起到冲洗作用,护士可建议患者

A. 大量运动 B. 使用利尿剂
C. 适量饮酒 D. 大量饮水
E. 多喝咖啡

134. 女性比男性更易发生尿路感染,其主要原因是

A. 女性尿道较男性短、直、粗
B. 女性情绪波动较男性大
C. 随着年龄的增长,女性尿道口回缩
D. 男性活动量较女性大
E. 男性喝水量较女性多

(130~134 题共用题干)

患者,女,56岁,因尿路感染入院。入院时患

实践能力卷

一、A1型题(以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。)

1. 心源性水肿最常见的病因是
A. 右心衰竭
B. 左心衰竭
C. 原发性高血压
D. 心肌梗死
E. 病毒性心肌炎
2. 最常见的小细胞低色素性贫血是
A. 急性失血性贫血
B. 再生障碍性贫血
C. 巨幼细胞贫血
D. 缺铁性贫血
E. 溶血性贫血
3. 失代偿期呼吸衰竭患者除原发病的表现外,临床上最早出现的症状是
A. 发热 B. 咳嗽 C. 发绀
D. 呼吸困难 E. 神志恍惚
4. 糖皮质激素和免疫抑制剂治疗主要用于
A. 肾病综合征
B. 急性肾小球肾炎
C. 肾盂肾炎
D. 慢性肾小球肾炎
E. 肾功能不全代偿期
5. 按照国际通用 WHO 糖尿病病因学分型标准,属于胰岛素抵抗的是
A. 1型糖尿病
B. 2型糖尿病
C. 妊娠糖尿病
D. 类固醇性糖尿病
E. 免疫介导性糖尿病
6. 帕金森病患者常见的步态是
A. 剪刀步态 B. 偏瘫步态
C. 正常步态 D. 共济失调
E. 慌张步态
7. 流行性乙型脑炎的后遗症期是指恢复期神经系统残留症状超过几个月尚未恢复者
A. 2 B. 3 C. 4
D. 6 E. 8
8. 患者经常受到幻听干扰,早上起来见到护士就说:“护士,我的邻居在说我的坏话,我很烦”,此时护士的反应恰当的是
A. 告诉患者这是症状,不要去理会
B. 为了让患者感到护士和他站在一起,护士承认也听到了声音
C. 接受患者的感受,但向其澄清没有听到声音的事实
D. 分析解释幻听产生的原因让患者了解
E. 制止患者的陈述,并批评患者
9. 胆道结石患者的典型临床表现除了腹痛外还有
A. 腹部肿块、黄疸
B. 恶心、呕吐、嗝气
C. 腹部肿块、嗝气
D. 寒战、高热、黄疸
E. 寒战、高热、便血
10. 颈部蜂窝织炎引起的并发症中,最危急的是
A. 全身脓毒血症
B. 休克
C. 呼吸困难、窒息
D. 吞咽困难
E. 化脓性海绵状静脉窦炎
11. 以下哪项是肠套叠患者的典型临床表现
A. 持续性腹痛、黏液血便和腹部肿块
B. 阵发性腹痛、果酱样血便和腊肠样肿块
C. 持续性腹痛、果酱样血便和菜花样肿块
D. 阵发性腹痛、鲜血便和腊肠样肿块
E. 持续性腹痛、鲜血便和菜花样肿块
12. 烧伤患者病原菌侵入的最主要途径是
A. 呼吸道 B. 肠道
C. 创面 D. 静脉导管
E. 留置尿管
13. 小脑幕切迹疝时,病变侧瞳孔变化的规律是
A. 先缩小后散大,再继续散大
B. 先散大继续散大,再缩小
C. 先缩小后散大,再缩小
D. 先散大后缩小,再散大
E. 时大时小,最后散大固定
14. 对于泌尿系结石最有效的预防方法是

- A. 控制感染 B. 调整饮食
C. 多活动 D. 大量饮水
E. 调整尿液 pH
15. 乳癌患者乳房皮肤出现“酒窝征”是由于
A. 癌肿侵犯乳房 Cooper 韧带
B. 癌细胞堵塞皮下淋巴管
C. 癌肿与胸肌粘连
D. 癌肿与皮肤粘连
E. 癌肿侵犯乳管
16. 治疗下肢静脉曲张的根本有效方法是
A. 手术治疗 B. 抬高患肢
C. 注意休息 D. 避免久站
E. 使用弹力绷带或穿弹力袜
17. 关于双胞胎妊娠的正确处理是
A. 第一胎娩出后即人工破膜
B. 第一胎娩出后肌注催产素
C. 第一胎娩出后静滴催产素
D. 第一胎娩出后应立即断脐
E. 第二胎为横位则剖宫产
18. 输卵管妊娠时,应立即手术治疗的指征是
A. 后穹窿穿刺术阳性
B. 阴道持续流血
C. 一侧附件扪及包块
D. 出现晕厥或休克症状
E. 妊娠试验阳性
19. 腹痛是输卵管妊娠孕妇最主要的主诉,腹痛的性状不可能是
A. 进食后加剧
B. 一侧撕裂感
C. 一侧下腹酸胀感
D. 肩胛部放射痛
E. 肛门坠胀感
20. 常规人工破膜术时,见有“血性羊水”,应首先考虑可能是
A. 宫内感染 B. 凝血障碍
C. 误伤胎盘 D. 前置胎盘
E. 胎盘早剥
21. 心功能Ⅲ~Ⅳ级、既往有心力衰竭病史的患者不宜妊娠,是因为患者在孕期极易
A. 发生感染 B. 引发胎儿畸形
C. 发生流产或早产
D. 发生贫血
E. 诱发心力衰竭
22. 下列哪种情况,心脏病患者可以妊娠
A. 心功能Ⅰ级,合并肺动脉高压
B. 心功能Ⅰ级,有严重心律失常
C. 心功能Ⅱ级,既往有心力衰竭病史
D. 心功能Ⅱ级,既往无心力衰竭病史
E. 心功能Ⅲ级,心力衰竭已控制
23. 小儿乳牙出齐的年龄是
A. 1岁~1岁半 B. 1岁半~2岁
C. 2岁~2岁半 D. 2岁半~3岁
E. 3岁~3岁半
24. 小儿急性喉炎、喉头水肿时,咳嗽的特点是
A. 刺激性干咳
B. 典型的犬吠样咳嗽
C. 改变体位时咳嗽加重
D. 伴有呕吐的痉挛性咳嗽
E. 咳嗽无力,但可听到痰鸣音
25. 轮状病毒性肠炎大便特点是
A. 黏液便
B. 脓血便
C. 豆腐渣样便
D. 暗绿色水样便
E. 水样或蛋花汤样便
26. 新生儿胃容量为
A. 10~30ml B. 30~60ml
C. 60~80ml D. 80~100ml
E. 100~120ml
27. 属于右向左分流型先天性心脏病的有
A. 法洛四联症 B. 房间隔缺损
C. 室间隔缺损 D. 肺动脉狭窄
E. 动脉导管未闭
28. 眼部被有机磷污染可用于冲洗的液体是
A. 肥皂水
B. 2%碳酸氢钠溶液
C. 酒精
D. 热水
E. 高锰酸钾溶液

二、A2型题(以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。)

29. 患者,女,16岁,诊断为哮喘2年,护士观察

到患者正在使用准纳器(舒利迭)吸入药