

高等数学

GAO DENG SHU XUE

罗晓晖 王晓艳 主编



中国财政经济出版社

高等数学

主 编：罗晓晖 王晓艳
副主编：刘泮振 侯俊林 王军民

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高等数学 / 罗晓晖, 王晓艳主编. — 修订本. — 北京: 中国财政经济出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1623 - 2

I. ①高… II. ①罗… ②王… III. ①高等数学 - 教材 IV. ①013

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 188440 号

责任编辑: 刘五书

责任校对: 胡永立

封面设计: 孙俪铭

版式设计: 董生平

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 41.5 印张 717 000 字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—4 000 定价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1623 - 2 / O · 0020

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

质量投诉电话: 88190744

前 言

本书是根据高等学校理工科数学教学大纲所编写的, 全书分为上、下两册, 每节后配有基础练习题, 每章后配有总复习题, 书末有习题答案。此书可作为高等学校理工科高等数学的教材或其他有关学校和有关专业的教学参考书。

本书注重基本理论和基础知识的介绍, 概念的引入力求与学生中学的知识相衔接, 并适当地压缩了一些与中学知识重复的地方。每节的基础练习题有助于学生理解和消化所学内容, 每章的最后一节都是综合举例环节, 此节的大多数例题都有详细的注解, 使学生增强对本章知识的综合应用能力, 提高解题技巧, 以适应高年级的考研或工作后应用的需要, 而每章后的总复习题选用了历年研究生入学考试的一些试题, 是对学生所学知识的综合检测。

在编写的过程中广泛参阅了国内外的有关著作, 力求适用理工科不同专业的需要, 增加了导数及定积分的元素法在经济或其他领域的应用, 以开拓学生的视野。书中*号部分为学生选学内容, 学生可视自己情况而定。

参加本书编写工作的是河南财经学院具有多年教学经验的数学教师。王媛(第一章)、王晓艳(第二章、第三章)、耿向平(第四章)、刘泮振(第五章)、张丽丽(第六章)、侯俊林(第七章)、罗晓晖(第八章)、高丽萍(第九章)、王军民(第十章)、李海银(第十一章)。臧振春教授统审了全书, 并提出了许多宝贵的意见和建议。

本书在出版的过程中, 得到了河南财经学院教务处及中国财政

经济出版社的大力支持和帮助,在此我们表示衷心的感谢。

限于编者水平,教材中一定存在不妥之处,希望广大读者和同行专家提出批评和指正。

前 言

编 者

2012年6月15日

本书是根据教育部《工科类本科数学基础课程教学基本要求》,结合我校工科类本科数学基础课程的教学实际,在广泛参考国内外优秀教材的基础上,由我校数学系教师共同编写而成的。本书可作为工科类本科数学基础课程的教学用书,也可供从事数学工作的工程技术人员参考。

本书共分十章。第一章为预备知识,第二章至第十章为微积分学。本书在编写过程中,参考了国内外许多优秀的教材和有关文献,并吸收了我校多年来的教学经验和成果。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进,力求做到科学性、系统性和可读性的统一。本书可作为工科类本科数学基础课程的教学用书,也可供从事数学工作的工程技术人员参考。

本书在编写过程中,得到了许多领导和同事的支持和帮助,特别是我校数学系领导的大力支持,使本书得以顺利出版。在此,我们表示衷心的感谢。同时,我们也希望广大读者和同行专家对本书提出批评和指正,以便我们今后进一步改进和提高。

本书的编写工作是在我校数学系领导的关心和指导下完成的。本书的编写工作得到了许多领导和同事的支持和帮助,特别是我校数学系领导的大力支持,使本书得以顺利出版。在此,我们表示衷心的感谢。同时,我们也希望广大读者和同行专家对本书提出批评和指正,以便我们今后进一步改进和提高。

本书的编写工作是在我校数学系领导的关心和指导下完成的。本书的编写工作得到了许多领导和同事的支持和帮助,特别是我校数学系领导的大力支持,使本书得以顺利出版。在此,我们表示衷心的感谢。同时,我们也希望广大读者和同行专家对本书提出批评和指正,以便我们今后进一步改进和提高。

目 录

第一章 函数 极限 连续	(1)
第一节 函数	(1)
第二节 初等函数	(11)
第三节 数列的极限	(19)
第四节 函数的极限	(25)
第五节 函数极限的基本性质	(31)
第六节 无穷小量与无穷大量	(34)
第七节 极限的运算法则	(39)
第八节 极限存在的准则和两个重要极限	(45)
第九节 无穷小量的比较	(53)
第十节 函数的连续性	(57)
第十一节 初等函数的连续性	(62)
第十二节 闭区间上连续函数的性质	(68)
第二章 导数与微分	(75)
第一节 导数的概念	(75)
第二节 求导法则	(87)
第三节 隐函数及参数式函数的导数	(99)
第四节 高阶导数	(107)
第五节 函数的微分	(113)
第三章 微分中值定理与导数的应用	(124)
第一节 微分中值定理	(124)
第二节 未定式的极限	(134)

第三节 泰勒公式	(141)
第四节 函数的单调性与极值	(150)
第五节 函数的凸凹性与曲线的拐点	(163)
第六节 函数作图	(169)
第七节 曲线的曲率	(175)
 第四章 不定积分	(184)
第一节 原函数与不定积分	(184)
第二节 换元积分法	(193)
第三节 分部积分法	(208)
第四节 有理式的积分	(213)
 第五章 定积分及应用	(225)
第一节 定积分的概念及性质	(225)
第二节 定积分的计算	(233)
第三节 广义积分	(242)
第四节 定积分的元素法	(251)
 第六章 空间解析几何与向量代数	(271)
第一节 向量及其线性运算	(271)
第二节 数量积 向量积 混合积	(284)
第三节 曲面及其方程	(293)
第四节 空间曲线及其方程	(305)
第五节 平面及其方程	(310)
第六节 空间直线及其方程	(316)
 第七章 多元函数微分学	(329)
第一节 多元函数的极限与连续性	(329)
第二节 偏导数与全微分	(336)
第三节 多元复合函数与隐函数的求导法则	(348)
第四节 空间曲线的切线与法平面、曲面的切平面与法线、方向 导数与梯度	(362)

第五节 多元函数的极值	(373)
第八章 二重积分与曲线积分	(388)
第一节 二重积分的概念和性质	(388)
第二节 直角坐标系下二重积分的计算	(393)
第三节 极坐标系下二重积分的计算	(400)
第四节 第一类曲线积分	(406)
第五节 第二类曲线积分	(412)
第六节 格林公式	(420)
第九章 三重积分与曲面积分	(434)
第一节 三重积分	(434)
第二节 柱面坐标与球面坐标下三重积分的计算	(440)
第三节 第一类曲面积分	(445)
第四节 第二类曲面积分	(449)
第五节 高斯公式与斯托克斯公式	(458)
第六节 场论初步	(466)
第七节 积分应用	(469)
第十章 无穷级数	(480)
第一节 常数项级数的概念	(480)
第二节 常数项级数敛散性的判别法	(487)
第三节 幂级数	(498)
第四节 函数的幂级数展开及其应用	(507)
*第五节 函数项级数的一致收敛性	(518)
第六节 傅立叶级数	(525)
第七节 周期为 T 的函数的傅立叶级数展开	(537)
第十一章 常微分方程	(542)
第一节 常微分方程的基本概念	(542)
第二节 分离变量方程与变量代换	(548)
第三节 一阶线性微分方程和全微分方程	(560)

§4.4 第四节 高阶微分方程 (570)

§4.5 第五节 常系数线性微分方程 (580)

§4.6 第六节 变系数线性方程和常系数线性方程组 (593)

附录一 几种常用的曲线 (602)

附录二 习题答案 (606)

附录三 习题答案 (606)

附录四 习题答案 (606)

附录五 习题答案 (606)

附录六 习题答案 (606)

附录七 习题答案 (606)

附录八 习题答案 (606)

附录九 习题答案 (606)

附录十 习题答案 (606)

附录十一 习题答案 (606)

附录十二 习题答案 (606)

附录十三 习题答案 (606)

附录十四 习题答案 (606)

附录十五 习题答案 (606)

附录十六 习题答案 (606)

附录十七 习题答案 (606)

附录十八 习题答案 (606)

附录十九 习题答案 (606)

附录二十 习题答案 (606)

附录二十一 习题答案 (606)

附录二十二 习题答案 (606)

附录二十三 习题答案 (606)

附录二十四 习题答案 (606)

附录二十五 习题答案 (606)

附录二十六 习题答案 (606)

附录二十七 习题答案 (606)

附录二十八 习题答案 (606)

附录二十九 习题答案 (606)

附录三十 习题答案 (606)

第一章 函数 极限 连续

高等数学的研究对象是变量，函数是变量之间的一种依赖关系，极限方法是研究变量的一种基本方法，连续是变量变化的一种常见形式，本章将介绍这些基本概念，以便为高等数学的学习打下坚实的基础。

第一节 函 数

一、常量与变量

在实际问题中，我们常遇到各种各样的量，如长度、重量、时间、距离等等，这些量一般可分为两种，一种在我们考察的过程中没有变化，即保持同一数值，这种量叫做常量；另一种在考察过程中有所变化，即可以取不同的数值，这种量叫做变量，常量一般用字母 a 、 b 、 c 等表示，变量一般用 x 、 y 、 z 等表示。

常量与变量并不是绝对的，一种量在某一过程或在某一环境中是常量，而在另一过程或在另一环境中可能就是变量，如重力加速度在某一地方为常量，但在不同地方，重力加速度有不同的值，在具体研究中，有时把变化很小或对所研究的问题影响不大的量也看成常量。

常量也可看成是变量仅取一个值时的特例。

二、映射

集合是数学中的一个基本概念，不同的集合中有不同的元素，而两个集合之间往往有某种联系。

例1 某地所有机动车辆构成的集合 A 与其车牌号码构成的集合 B 之间有对应关系：每一辆车都有一个车牌号码，不同的车牌号码表示不同的车辆。

例2 某班级有50名学生，他们构成集合 A ，某次测验后各自都有自己的成绩，若定义集合 B 为一个闭区间 $[0, 100]$ ，那么集合 A 与 B 之间也有对应关系：每个学生都有自己的成绩。

这种对应关系在数学上我们称之为映射。

定义1 设 X, Y 为两个集合，如果对 X 中的每一个元素 x ，按照某种规则 f ，集合 Y 中都有惟一确定的元素 y 与之对应，则称这种规则 f 为从 X 到 Y 的一个映射。

称与 x 对应的 y 为 x 的像， x 称为 y 的原像。由定义可知， X 中的每一个元素有且只有一个像，但 Y 中的某一个元素 y ，可能有原像，也可能没有原像，在有原像时，原像也不一定惟一。

如果对 Y 中的每一个元素 y ，至少有一个原像，则称这种映射为满射。如果对 X 中的任意两个不同元素 x_1, x_2 ，其像 y_1, y_2 也不相同，即有原像的元素 y 其原像惟一，则称这种映射为单射。如果一个映射既为满射又为单射，则称这种映射为一一对应。

例1中 A 与 B 的对应关系可建立 A 到 B 的一个映射，而且这个映射是一一对应的。

例2中 A 与 B 的对应关系也可建立 A 到 B 的一个映射，但这个映射不是满射，也不一定是单射。

映射的例子很多，特别是一般集到数集的映射，如学生与学生证号，地理位置与邮政编码，各单位与电话号码等等。这种映射可以使一般集合数字化，从而充分利用数学工具，加上计算机的广泛使用，大大简化处理非数字信息的难度，增加处理速度。

将一般集合转化为数集来考虑后，数集之间的关系就显得更为重要。数集之间的关系实际上就是变量之间的关系，从数集到数集的映射就是函数。

三、函数的概念

我们经常会遇到彼此之间有依赖关系的变量，如圆的面积 y 与它的半径 r 之间有关系

$$y = \pi r^2$$

自由落体运动中, 若开始下落的时刻为 $t=0$, 则落下的距离 s 与下落的时间 t 之间有关系

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

其中 g 为重力加速度. 我们把这种依赖关系称之为函数关系.

下面给出两个变量之间的函数关系的严格定义:

定义 2 设 D 是一个非空的实数集合, 有两个变量 x 和 y , 如果对每一个数 $x \in D$, 变量 y 按照某种确定的法则 f 有惟一确定的实数值与之对应, 则称 y 是 x 的函数, 称法则 f 为定义在 D 上的一个函数关系, 记作

$$y = f(x) \quad x \in D$$

x 叫做自变量, y 叫做因变量, 数集 D 称为这个函数的定义域.

对于 D 中的某一个值 x_0 , 因变量相应的值记为 y_0 , 则 $y_0 = f(x_0)$, 称 y_0 为函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 时的函数值, 全体函数值的集合称为这个函数的值域.

由定义可以看出, 函数是从定义域到值域的一个满射.

函数符号也常用 g 、 ϕ 、 F 等. 如 $y = \phi(x)$, $y = F(x)$.

在实际问题中, 函数的定义域是根据实际意义确定的. 如圆面积 $y = \pi r^2$ 中, 半径 r 为自变量, 其取值范围即函数定义域为 $D = (0, +\infty)$.

在不考虑函数实际意义的情况下, 定义域指的是能使数学式子有意义的一切实数值的集合. 如函数 $y = \sqrt{1-x^2}$ 的定义域为 $D = \{x | -1 \leq x \leq 1\}$.

在函数定义中, 强调对每一个 $x \in D$, 有惟一确定的 y 与之对应, 若不强调这点, 仅要求有确定的 y 与之对应, 则可能对某一 $x_0 \in D$, 有两个甚至两个以上的函数值. 有时也把这种情况叫做函数. 为区别起见, 分别称之为单值函数和多值函数. 本书中若无特别说明, 函数都是指单值函数.

四、函数的表示法

1. 解析法 (公式法)

自变量 x 和因变量 y 之间的函数关系直接用公式表示出来, 如 $y = \sin x$.

有时函数关系用两个或两个以上的数学式子分段表示, 这种函数称为分段函数.

$$\text{例 3} \quad y = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

这一函数称为绝对值函数.

$$\text{例 4 } y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

这一函数称为符号函数. 对任一实数 x , 显然有 $x = \operatorname{sgn} x \cdot |x|$.

$$\text{例 5 } y = [x]$$

这一函数称为取整函数, 它表示不超过 x 的最大整数, 如 $[-3.5] = -4$.

$$\text{例 6 } y = \begin{cases} 1 & x \text{ 为有理数} \\ 0 & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

这一函数称为狄利克雷函数.

应该注意的是, 分段函数虽然是由两个或两个以上的式子来表示, 但决不能看成是多个函数, 也不能看成是几个函数联立而成的, 它满足函数的定义, 只不过对定义域的不同区间有不同的表达式而已.

$$\text{例 7 } y = f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x} & 0 \leq x < 1 \\ 1-x & x \geq 1 \end{cases}, \text{ 求 } f\left(\frac{1}{2}\right), f(1), f(2).$$

$$\text{解 } f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \quad f(1) = 1 - 1 = 0$$

$$f(2) = 1 - 2 = -1$$

还有一个特殊的函数, 称为最值函数.

$$\text{例 8 } y = \min_{x \in D} \{x\}$$

它表示取所有 x 中的最小者, 即 x 的最小值.

$$y = \max_{x \in D} \{x\}$$

它表示取所有 x 中的最大者, 即 x 的最大值.

2. 列表法

将一系列自变量的值与对应的函数值列成表格. 如某商店在一年内各月的销售额 (单位: 万元) 如下:

月份 (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
销售额 (y)	825	740	521	495	625	531	435	462	508	675	585	760

它表示销售额 y 随着月份 t 的变化而改变的函数关系, 可以看出, 春节前后 (12 月、1 月和 2 月) 及 5 月和 10 月为旺季, 其他月份为淡季.

3. 图示法

把自变量 x 和函数 y 分别作为坐标平面上点的横坐标和纵坐标, 这些平面上的点 (x, y) 所描出的平面曲线 (有的函数描出一些散点) 就表示了 y 与 x 的函数关系. 如某气象站利用自动记录仪测出该地一昼夜气温的变化情况, 如图 1-1. 此图表示气温 T 随时间 t 变化的函数关系:

$$T = f(t)$$

为了更直观地描述函数关系, 通常由解析法表示的函数, 用图示法画出其图形, 如本节例 3、例 4、例 5 的图形分别为图 1-2, 图 1-3, 图 1-4. 例 7 的图形为图 1-5.




图 1-1




图 1-2




图 1-3




图 1-4




图 1-5

五、函数的几何特性

1. 单调性

设函数 $y = f(x)$ 在集合 D 上有定义, 对任意的 $x_1, x_2 \in D$, 当 $x_1 < x_2$ 时,

若都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，则称 $f(x)$ 在 D 上单调增加；而若都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，则称 $f(x)$ 在 D 上单调减少．单调增加或单调减少统称为函数的单调性．在定义域集合 D 上具有单调性的函数，称为单调函数．如 $y = x^3$ 在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 内单调增加（如图 1-6）， $y = 1 - x$ 在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 内单调减少（如图 1-7），所以这两个函数都是单调函数．




图 1-6




图 1-7

函数的单调性意味着随着自变量的增加，函数值增大或减小，从图形上看，曲线 $y = f(x)$ 是上升的或下降的．

有时函数在定义域的不同区间具有不同的单调性．如 $y = x^2$ （如图 1-8），在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 内不具有单调性，即 $y = x^2$ 不是单调函数．但在 $(0, +\infty)$ 内单调增加，在 $(-\infty, 0)$ 内单调减少．我们把 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 叫做 $y = x^2$ 的两个单调区间．




图 1-8

2. 有界性

设函数 $y = f(x)$ 在集合 D 上有定义，如果存在实数 k_1 ，对任意的 $x \in D$ ，都有 $f(x) \leq k_1$ ，则称 $f(x)$ 在 D 上有上界，并称 k_1 为 $f(x)$ 在 D 上的一个上界；如果存在实数 k_2 ，对任意的 $x \in D$ ，都有 $f(x) \geq k_2$ ，则称 $f(x)$ 在 D 上有下界，并称 k_2 为 $f(x)$ 在 D 上的一个下界．如果存在正数 M ，对任意 $x \in D$ ，都有 $|f(x)| \leq M$ ，则称函数 $f(x)$ 在 D 上有界，如果这样的 M 不存在，则称 $f(x)$ 在 D 上无界．在定义域集合 D 上有界的函数称为有界函数．如 $y = \sin x$ 对于 $x \in (-\infty, +\infty)$ ，有 $|\sin x| \leq 1$ ，故 $y = \sin x$ 是有界函数．

显然有界函数一定有上界又有下界，而有上界又有下界的函数一定是有界的．上界和下界只要存在就有无穷多个．

有的函数只有下界而无上界，有的函数只有上界而无下界，这样的函数

是无界函数, 如 $y = e^x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界, 但它有下界 0; $y = 1 - x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界, 但它有上界 1.

有的函数在定义域内无界 (即本身是无界函数), 但可以在定义域内的某个区间上有界, 如 $y = \frac{1}{x}$ 在定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内无界, 但在 $(1, +\infty)$ 内有界, 在 $(-\infty, -1)$ 内也有界, 这样的有界区间可以有无穷多个.

函数的有界性意味着函数值在某一范围之内, 从图形上看, 函数 $y = f(x)$ 在 D 内的图形夹在两条直线 $y = M$ 和 $y = -M$ 之间 (如图 1-9).

3. 奇偶性

设函数 $y = f(x)$ 在关于原点对称的集合 D 上有定义, 如果对任意的 $x \in D$, 都有 $f(-x) = -f(x)$ 成立, 则称 $f(x)$ 为 D 上的奇函数; 如果对任意的 $x \in D$, 都有 $f(-x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为 D 上的偶函数. 在定义域集合




图 1-9

D 上的奇 (偶) 函数称为奇 (偶) 函数. 如 $y = x^3$ 是奇函数, $y = x^2$ 是偶函数.

从图形上看, 奇函数 $y = f(x)$ 的曲线关于坐标原点对称, 偶函数 $y = f(x)$ 的曲线关于 y 轴对称.

例 9 判断下列函数的奇偶性.

$$(1) y = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (2) y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (3) y = \frac{\sin x}{x} + x$$

解 (1) 因为 $D = (-\infty, +\infty)$, 且 $f(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = f(x)$ 所以 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 是偶函数.

(2) 因为 $D = (-\infty, +\infty)$, 且

$$\begin{aligned} f(-x) &= \ln(-x + \sqrt{(-x)^2 + 1}) = \ln(-x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ &= \ln \frac{(-x + \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = -f(x) \end{aligned}$$

所以 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 是奇函数.

(3) 因为 $f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} + (-x) = \frac{\sin x}{x} - x \neq f(x)$, 而且 $f(-x) \neq -f(x)$, 所以 $y = \frac{\sin x}{x} + x$ 是非奇非偶函数.

若函数 $f(x)$ 的定义域是关于原点对称的集合, 则 $f(x) + f(-x)$ 一定是偶函数, 而 $f(x) - f(-x)$ 一定是奇函数. 由于 $f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$, 可得出结论: $f(x)$ 可表示为偶函数与奇函数之和的形式.

4. 周期性

设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 如果存在一个正数 T , 使对任意的 $x \in D$ (同时要求 $x + T \in D$), 都有 $f(x) = f(x + T)$, 则称 $f(x)$ 为周期函数, 称满足上式的最小正数 T 为 $f(x)$ 的周期. 如 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 皆为周期函数, 周期为 2π , $y = \tan x$ 也是周期函数, 周期为 π .

从图形上看, 周期函数 $y = f(x)$ 的曲线上的点在横坐标相距为 T 的两点的纵坐标相等, 所以在区间 $[x, x + T]$ 上的图形与在区间 $[x + kT, x + (k + 1)T]$ (k 为整数) 上的图形是相同的. 如图 1-10.




图 1-10

例 10 $y = x - [x]$ 是周期函数吗? 画出它的图形.

解 因为对任意正整数 n , 有 $f(n + x) = (n + x) - [n + x] = n + x - (n + [x]) = x - [x] = f(x)$, 所以 $y = x - [x]$ 是周期 $T = 1$ 的周期函数, 图形如图 1-11.




图 1-11