



江苏鸟类

BIRDS OF JIANGSU


鲁长虎 主编



中国林业出版社

致 谢:

本书出版得到“江苏高校优势学科建设工程项目”资助



江苏鸟类

BIRDS OF JIANGSU



鲁长虎 主编

中国林业出版社

编委会

主 编	鲁长虎				
编 委	范 明	李 航	雷 铭	薄顺奇	章 麟
摄 影	安爱国	薄顺奇	戴美杰	董国泰	范 明
	干晓静	顾云芳	韩永祥	何 鑫	胡亚荣
	黄渡荫	李 航	李庆玺	李全江	林 植
	罗 刚	秦裕峰	沈 平	宋 晔	田穗兴
	吴志华	王吉衣	王乘东	翁发祥	夏 淳
	熊林春	闫 军	严少华	张高峰	张 宇
	赵夏明	Coke Smith	Peter Bjurenstål	Ulf Ståhle	



图书在版编目 (CIP) 数据

江苏鸟类 / 鲁长虎等主编. — 北京: 中国林业出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5038-7695-0

I. ①江... II. ①鲁... III. ①鸟类—介绍—江苏省
IV. ①Q959.708

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第245795号

责任编辑: 洪 蓉

出 版: 中国林业出版社
(100009 北京市西城区德内大街刘海胡同7号)

电 话: (010) 83143564

发 行: 中国林业出版社

制 版: 北京美光制版有限公司

印 刷: 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次

成品尺寸: 185mm × 210mm

印 张: 14.5

字 数: 700千字

定 价: 150.00元



Preface 前言

江苏省位于东经 $116^{\circ}18' \sim 121^{\circ}57'$ ，北纬 $30^{\circ}45' \sim 35^{\circ}20'$ ，地处长江、淮河下游，黄海、东海之滨，北接山东，西连安徽、河南，东南与上海、浙江接壤，是长江三角洲地区重要的组成部分。全省总面积约 10.26万km^2 。全省地势平坦，平原面积 8.79万km^2 （含内陆水面面积 1.73万km^2 ），低山丘陵岗地面积 1.47万km^2 。全省气候温和，四季分明，年平均气温 $13.5 \sim 16.0^{\circ}\text{C}$ ，降水量 $800 \sim 1100\text{ mm}$ 。

江苏省是东亚候鸟迁徙的必经之路，沿海滩涂及大量的内陆河流湖泊湿地为迁徙鸟类提供了非常重要的停歇地和越冬场所。每年迁徙过境停歇及越冬的鸟类种类和数量众多，其中拥有一批具有国际重要意义的鸟类，如丹顶鹤、东方白鹳、黑脸琵鹭、遗鸥和勺嘴鹬等。同时，列为国家一级重点保护的鸟类10种，二级重点保护的鸟类68种。

江苏省的鸟类研究开展较早，很多学者做了大量工作。1988年，由南京林业大学周世锷先生整理的江苏省鸟类名录（内部资料）中包含448种。由于近年来鸟类分类系统发生变化，种和亚种修正较多；且时隔多年，环境变化等原因，物种消失和新的分布记录均有表现。在江苏省林业局野生动植物保护站、江苏省环保厅生态处的支持下，我们对近几年来野外专项调查的鸟类分布情况进行了统计分析；同时在省内及省外众多野鸟保护者的无私支持下，撰写了本书，以期对江苏鸟类进行一个阶段性总结。本书共收录鸟类447种，隶属于18目、73科，对每种鸟类在江苏省的分布和种群情况进行了描述，并配备了441种鸟类照片。书后附录了《江苏省鸟类名录》。


本书中的鸟类分类体系、鸟种及亚种学名、鸟种分布，综合参考《中国鸟类分类与分布名录》（第二版）（郑光美，2011）、《中国鸟类野外手册》（约翰·马敬能等，2000），以及*HBW and Bird Life International Illustrated Checklist of the Birds of the World*。本书中的分布若无特别提出均指中国境内的分布概况。

需要提出的是，广大鸟类爱好者在观鸟中不断有江苏省新的分布记录发现，作者希望本书中的鸟类名录能够起到抛砖引玉的作用，使未来江苏省鸟类种类组成得到更科学的统计分析。限于水平，书中错误和不当之处敬请批评指正。

编者

2014年10月

目录 *Contents*



前 言

潜鸟目 / Gaviiformes	1
鸊鷉目 / Podicipediformes	5
鸕形目 / Procellariiformes	9
鹈形目 / Pelecaniformes	11
鹳形目 / Ciconiiformes	17
雁形目 / Anseriformes	33
隼形目 / Falconiiformes	59
鸡形目 / Galliformes	85
鹤形目 / Gruiformes	89
鸻形目 / Charadriiformes	103
鸽形目 / Columbiformes	153
鹁形目 / Cuculiformes	159
鸱形目 / Strigiformes	167
夜鹰目 / Caprimulgiformes	177
雨燕目 / Apodiformes	179
佛法僧目 / Coraciiformes	183
翼形目 / Piciformes	191
雀形目 / Passeriformes	197
附 录 江苏省鸟类名录	316
中文名索引	333
拉丁学名索引	338
鸟名中常用生僻字注音	344

潜鸟目

GAVIIFORMES

本目鸟类均为较原始的水鸟，极其适应于水生生活，属于实心的重骨鸟类。嘴直尖、嘴峰较平直，嘴底上翘，上下喙缘均向内侧包卷。腿部偏后、跗跖侧扁，难以在岸上活动。外趾长于中趾，前三趾具满蹼。羽色两性相同，唯冬夏不同。主要栖息在森林、苔原的湖泊地带，潜水觅食鱼类和其他水生动物。冬季迁徙到南方沿海。江苏省共1科4种。



红喉潜鸟

Gavia stellata

形态 体长53~69cm。

生境 湖泊、海域。

分布 繁殖于北方森林苔原带的湖泊、江河与水塘中，迁徙期间和冬季则多栖息在沿海海域，海湾及河口。自黑龙江、辽宁向南至广东的沿海地区有分布。江苏境内分布于连云港近海（大板跳—埭子口12月有过记录）及长江口一带，旅鸟。

种群 罕见。



摄影：薄顺奇



摄影：薄顺奇

黑喉潜鸟

Gavia arctica viridigularis

形态 体长58~73cm。

生境 湖泊、海域。

分布 分布于北起乌苏里江向南至福建沿海，为冬候鸟和旅鸟。江苏境内分布于连云港近海，前三岛海域近年来冬季（1~3月）有记录，旅鸟，可能有少数个体越冬。

种群 罕见。



摄影：韩永祥

白嘴潜鸟

Gavia adamsii

形态 体长75~100cm，下喙略微有向上弧度。

生境 湖泊、海域。

分布 繁殖于欧亚大陆及北美洲极北部，冬抵太平洋东西两岸的沿海地带。分布在中国辽东半岛至福建沿海地区。江苏境内分布于连云港近海，前三岛海域1月有过记录，旅鸟，可能少数个体越冬。

种群 罕见。

太平洋潜鸟

Gavia pacific

形态 体长66cm。

生境 湖泊、海域。

分布 繁殖于西伯利亚东部至阿拉斯加及加拿大；越冬于日本沿海及北美洲西部，南至北纬23°。有记录经过辽东半岛，可能也经过北戴河及山东。江苏境内分布有待确认，周边地区未见记录。

种群 不明。



摄影：张宇

鸕鷀目

PODICIPEDIFORMES

分布广泛而常见的水鸟。嘴型多直尖。具有瓣蹼足，跗跖侧扁，善于潜水而难以在陆地行走。无尾羽。在沼泽、湖泊、池塘等水域活动，单个或集小群，频频潜水觅食。食物有小鱼、虾、水生昆虫、蛙类，兼吃植物性食物。江苏省共1科3种。



小鸕鷀


Tachybaptus ruficollis poggei

形态 体长23~28cm。成鸟夏羽颈部红色。

生境 河流、湖泊、池塘等。

分布 广泛分布。江苏境内湖泊、水库、沼泽湿地和坝塘等平缓水域中均有分布，几乎遍布各地，留鸟。

种群 十分常见。



凤头鸕鹚


Podiceps cristatus cristatus

形态 体长52~58cm。成鸟夏羽颈上部具有丛生长羽组成的皱领。

生境 河流、湖泊、池塘等。

分布 主要繁殖在北方地区，越冬时南迁至长江以南、东南沿海等地。江苏境内分布于沿海地区、长江附近水域及太湖地区，冬候鸟，可能有繁殖个体。

种群 偶见。



摄影：范明

黑颈鸊鷉

Podiceps nigricollis nigricollis

形态 体长28~34cm。

生境 河流、湖泊、池塘等。

分布 繁殖于北方地区，在华南、东南沿海、四川、云南一带越冬。江苏境内分布于沿海地区、长江流域附近水域，旅鸟，可能有个体越冬。

种群 罕见。



鹱形目

PROCELLARIIFORMES

本目鸟类是体型似鸥、具有长翅膀的海鸟，显著的特征是管状鼻。善飞行，常长时间在海面上空低飞，发现鱼群等食物时，则急速下降捕食。在水中游泳时身体露出水面甚多，尾抬得较高。主要以鱼类、浮游动物和软体动物为食。江苏省共2科2种。



黑叉尾海燕

Oceanodroma monorhis

形态 体长约20cm。

生境 海域。

分布 分布于山东以南的沿海各省，直抵广东、台湾以北的岛屿。江苏境内分布于连云港沿海地区，于近海海域的岛礁附近活动，车牛山岛9月有过记录，繁殖鸟，或有越冬个体。

种群 罕见。



鹈形目

PELECANIFORMES

均为大、中型水鸟，一些种类是海鸟。嘴型多近圆锥形，颌下皮肤有的扩大为喉囊。跗跖短，全蹼足，拇趾发达。善于捕鱼及其他动物，适宜在开阔水域生活。栖息于湖泊、江河、沿海水域，喜群居和游泳。江苏省共4科6种。





摄影：韩永祥

卷羽鹳鹕

Pelecanus crispus

形态 体长160~180cm。

生境 沿海湿地。

分布 于东北地区繁殖，冬季迁至福建、广东沿海地区。江苏沿海地区连云港临洪口湿地、盐城珍禽自然保护区射阳境内有记录，旅鸟或有越冬个体。

种群 罕见。IUCN列为易危，国家 II 级重点保护。该种曾列为斑嘴鹳鹕（*Pelecanus philippensis*）的亚种。

褐鲣鸟

Sula leucogaster plotus

形态 体长75~80cm，翼展可达150cm。

生境 热带海洋、岛屿。

分布 分布在我国南海地区，自上海至海南岛的沿海偶有记录。江苏境内近年没有野外记录。

种群 罕见。



摄影：黄渡萌