


鸥类识别手册

A gull identification handbook revised edition

氏原巨雄・氏原道昭 著

丁楠雅 魏晨韬 陈学军 译



东北林业大学出版社
Northeast Forestry University Press

版权专有 侵权必究 举报电话: 0451-82113295

图书在版编目 (CIP) 数据

鸥类识别手册 / (日) 氏原巨雄, (日) 氏原道昭著; 丁楠雅, 魏晨韬, 陈学军译. — 哈尔滨: 东北林业大学出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5674-1169-2

I. ①鸥… II. ①氏… ②氏… ③丁… ④魏… ⑤陈…
III. ①鸥形目—识别—手册 IV. ①Q959.7-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第 154858 号

KAMOME SIKIBETSU HANDBOOK

© OSAO UJIHARA / MICHIAKI UJIHARA 2010

Originally published in Japan in 2010 by BUN-ICHI SOGO SHUPPAN CO.

Chinese (Simplified Character only) translation rights arranged with BUN-ICHI SOGO SHUPPAN CO. through TOHAN CORPORATION, TOKYO.

鸥类识别手册

OULEI SHIBIE SHOUCE

责任编辑: 于之承

封面设计: 乔鑫鑫

出版发行: 东北林业大学出版社

(哈尔滨市香坊区哈平六道街6号 邮编: 150040)

印 装: 哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/32

印 张: 2.75

字 数: 30千字

版 次: 2017年7月第1次印刷

印 次: 2017年7月第1版

定 价: 30.00元

如发现印装质量问题, 请与出版社联系调换。(电话: 0451-82113296 82191620)

本书描绘的 30 种鸥涵盖了《中国鸟类野外手册》中鸥族的全部种类，其中 20 种以上都在中国大陆及香港地区，尤其中国北方及东部沿海有分布，可以满足国内观鸟者对鸥类辨识的需求。

本书在翻译过程中根据《中国鸟类名录》v4.0 和郑光美先生的《世界鸟类分类与分布名录》对中文名进行了校订。部分鸟种的中文名没有文献可供参考，则采用了译者们认为恰当的中文名。在分类方面，本翻译本与日文版保持了一致，然而鸥类中关于分类学方面的争议较多且不断有新的证据和观点发表，对分类有兴趣的读者应在阅读多方最新文献基础上加以判断。本书中第 1 页、第 28 页、第 33 页、第 73 页中以方括号标注的部分内容，请参考本书译者注部分。

译者们力求本翻译本呈现日文版中许多微妙的措辞。如“体形”和“体型”，前者强调鸟体大小，后者侧重表示鸟体轮廓，含义略有不同。对一些缺乏中文对应表述的措辞则尽量译得自然。如将“パターン”翻译为“图纹”或“样式”，将“切れ込み”翻译为“咬合状图案”或“浅色 V 形羽缘”等。

译者们水平有限，译文不当之处敬请读者批评指正。



本手册的特点与使用方法	1	北极鸥	40
鸥类身体各部名称	2	泰氏鸥	42
鸥类辨识技巧	4	冰岛鸥	44
9个基本鸥种成鸟检索图	6	加州鸥	45
红嘴鸥	8	白鸥	46
细嘴鸥	10	杂交种	47
棕头鸥	11	世界鸥类★北半球	50
小鸥	12	世界鸥类★南半球	51
博氏鸥	13	不同情况下的观感变化	52
笑鸥	14	鸥的雌雄差异	53
弗氏鸥	15	大型鸥换羽状态的分辨方法	54
遗鸥	16	东亚的银鸥 10月下旬时标准的	
渔鸥	17	换羽状态	56
叉尾鸥	18	东亚的银鸥 1月下旬时标准的	
楔尾鸥	19	换羽状态	57
三趾鸥	20	蒙古银鸥幼羽至第二年冬羽	58
红脚三趾鸥	21	蒙古银鸥幼羽及第一年冬羽的	
黑嘴鸥	22	相似种举例	59
环嘴鸥	23	几种具灰褐色翼的大型鸥幼羽及	
海鸥	24	第一年冬羽	60
黑尾鸥	26	几种体色比西伯利亚银鸥暗的	
乌灰银鸥	28	大型鸥幼羽	61
西伯利亚银鸥	30	西伯利亚银鸥的近缘种的	
里海银鸥	32	繁殖分布	62
里海银鸥 <i>barabensis</i> 亚种	33	一目了然鸥类图鉴	63
蒙古银鸥	34	后记 / 作者简介	81
美洲银鸥	35	译者简介 / 译者注	62
灰背鸥	36	本书收录鸥类中日名称对照	83
灰翅鸥	38	参考文献	85

鸥类识别手册

氏原巨雄·氏原道昭 / 著
丁楠雅·魏晨韬·陈学军 / 译



东北林业大学出版社


本手册的特点与使用方法

这是一本面向野外辨识的鸥类图解手册。鸥是鸟类中甚难识别的类群之一，为了方便初学者从基础学起，本书在卷首列出了9个基本鸥种的检索图，正文的前半部分主要借助插图和文字对各个种进行介绍，正文的中间部分重点解说野外观察鸥类的要点和技巧，正文的后半部分则以“一目了然”为主题，以照片横向比较的形式力求为读者模拟实际的野外观察体验。书中虽已尽量囊括年龄、换羽状态等信息，然而对于鸥类尤其是大型鸥而言，其变化之丰富用“千鸥千面”来形容恐怕也不为过，姿态及光线条件的细微差异也能造成观察印象大相径庭，将所有变化网罗进一本小册子里显然是不可能的。因此，建议读者抓住插图和解说中描述的每种鸥的代表形态，结合自己的实际观察经验灵活应对。此外，本书虽然尽可能反映了各个种最新的学名和分类地位，然而随着近年来分类学中DNA分析的不断发展，鸥类的分类状况今后很有可能会继续发生各种变动，谨希望读者带着这一意识阅读本书。

修订版中发生变更的中文名、学名和英文名如下。

黄脚银鸥	<i>mongolicus</i> 亚种	<i>Larus cachinnans mongolicus</i>	Yellow-legged Gull
▶ 蒙古银鸥		<i>Larus (vegae/cachinnans) mongolicus</i>	Mongolian Gull ^[1]
黄脚银鸥	<i>cachinnans</i> 亚种	<i>Larus cachinnans cachinnans</i>	Yellow-legged Gull
▶ 里海银鸥		<i>Larus cachinnans</i>	Caspian Gull ^[2]
灰林银鸥	<i>taimyrensis</i> 亚种	<i>Larus heuglini taimyrensis</i>	Heuglin's Gull
▶ 泰梅尔银鸥		<i>'taimyrensis'</i>	
银鸥	<i>smithsonianus</i> 亚种	<i>Larus argentatus smithsonianus</i>	Herring Gull
▶ 美洲银鸥		<i>Larus smithsonianus</i>	American Herring Gull ^[3]

鸥类身体各部名称



用词解说

全长：在本书中用 L 表示，指鸟腹面朝上呈平躺状态时喙的端部至尾羽端部的长度。

翼展：在本书中用 W 表示，指将鸟的翼前缘伸展至平直状态时两翼端部之间的长度。


幼羽：孵化后最先长出的正羽，直至换成第一年冬羽前的羽毛。

第一年冬羽：出生后幼羽第一次换羽获得的羽毛。

第一年夏羽：出生后次年春季至夏季间的羽毛。

第二年冬羽：出生后次年秋季换羽获得的羽毛。

成鸟：达到不再随成长而发生羽色改变的年龄的个体。成为成鸟通常需要 2-4 年的时间。



换羽：指旧的羽毛脱落并长出新的羽毛的现象。鸥类秋季时全身都进行换羽，春季时多数种类只在除飞羽和尾羽之外的部分进行换羽。

纵斑：与体轴平行的斑点或条带。

上体：在本书中指停歇时背、肩羽、覆羽以及三级飞羽等的可见部分的总和。

下体：在本书中指前颈、胸、腹、胁、

下腹、尾下覆羽的总和。

背部灰色：在本书中意义等同于上体的灰色。

尾端黑带：指各枚尾羽上的黑斑相连所呈现的带状斑纹。

翼镜：翼尖的黑色部分中可见的白色斑块，而不是指初级飞羽末端的白点。



在野外碰到其他观鸟者时经常听到这样的抱怨：“鸥类真是太难识别了。”成鸟为单调的灰色、黑色、白色的集合，幼鸟则是清一色的茶色，各个种看上去大同小异，难怪会有人抱怨“完全搞不懂那里是如何区别的”，尤其是大型鸥的种间差异非常微小，不仅如此，每个种从幼羽到第四年冬羽直至成鸟的羽色还随年龄发生微妙的变化，当这些不同种、不同年龄的个体在海港和岸边无序地混杂成群时，不难想象许多人都因为太过麻烦而放弃了辨识。毫不夸张地说，鸥类是所有鸟中最考验观鸟者野外经验的类群。即使是那些“观鸟达人”，在隔一段时间之后再在野外见到鸥时也会仍然会感到混乱。所以说要提高鸥类辨识能力，恐怕除了长年累月地积累野外经验之外就没有其他方法了。

出于方便，我们通常根据体形大小将鸥分为大型鸥、中型鸥和小型鸥。在这三大类中，首先应该对大型的西伯利亚银鸥（或灰背鸥）、中型的黑尾鸥、小型的红嘴鸥这些所谓的常见种进行彻底的观察，将常见种牢牢掌握之后，其他种就自然而然地变得容易辨识了。日本能够见到的小型鸥绝

大部分是红嘴鸥，其他种视地域不同也就黑嘴鸥相对多见，因此小型鸥的辨识还是比较容易的。而中型鸥只要能区分黑尾鸥和海鸥就够了，所以难于分辨的说到底还是大型鸥。大型鸥主要以背部灰色的深浅、嘴的大小、头的形状、翼的长度、翼尖黑色图纹的差异等为辨识要点。以背部灰色为例，在从北极鸥发白的青灰色到灰背鸥的灰黑色的色系变化中，约有十种鸥的灰色是特定的，但有的亚种存在深浅差异，因而实际情况会更复杂一些。比较灰色深浅的时候，需要特别注意灰度会强烈受天气和光线等环境条件的影响，即使是同一种的两个个体并排站立在一起，也可能由于些许的朝向差异而使灰度呈现出惊人的不同，导致看上去像是两个种。再说嘴的大小。嘴最大的是灰翅鸥；相对体形而言嘴显小的是冰岛鸥，它的嘴只有中等体形的黑尾鸥的嘴那么大。观察嘴的大小要注意鸥的头部羽毛状态的不同会显得嘴有时大有时小，羽毛伏贴时头部变小，从而显得嘴大；反之，当羽毛蓬起时就显得嘴小。

观察时非常重要的一点是与附近的其他鸥种进行比较。以辨识难度比



背部颜色最深的灰背鸥（右）及最浅的冰岛鸥（左）。

成鸟还高的第一年冬羽为例，如果说区分各个种的典型羽色和斑纹还相对容易一些，分辨那些特征不够典型的相似个体可太难了。实际上我们经常能在野外遇到完全无法辨识的情况。第一年冬羽的羽毛在深冬时节往往已经严重磨损褪色，导致斑纹变得模糊不清。故观察第一年冬羽的最佳时机是羽毛尚未磨损褪色的十一、十二月份前后，这个时期鸟的羽色尚新，斑纹也较为清晰，能提供更多的辨识线索。当凭斑纹难以识别时，可着眼于鸟体整体的观感和形态特征上的差异，掌握每个种成鸟的形态特征，这对识别第一年冬羽会很有帮助。比如灰背鸥和泰氏鸥的第一年冬羽的斑纹很相似，有时难以区分，这时观察较容易识别的成鸟可知，灰背鸥的嘴大而翼较短、初级飞羽突出于尾羽外较

少，这些要点可以直接应用于第一年冬羽的识别。对大型鸥观察得多了之后，可以感觉到各个种都具有独特的面相，这种面相在一定程度上也是能起辅助辨识作用的。可能会有人认为面相是个很暧昧的东西，但这里的面相指的是一种综合鸥头部各部分特征给人的感觉，并不是什么暧昧或不确定的概念。比如灰背鸥的面相有点险恶凶悍的感觉，泰氏鸥则看上去温柔且乖巧，会给人这种印象的原因可能是由于灰背鸥的额弓较低，显得眼睛和头顶较为接近，一张大嘴沿头部轴线略向下伸出；而泰氏鸥的头圆且嘴较小，眼睛也比较大。

当然，不仅是鸥类，对于任何鸟类的一个类群的辨识来说，有空就看看照片和图鉴、尽可能多地到野外积累经验都是十分重要的。



9 个基本鸥种成鸟检索图

● 体形大小?



比乌鸦大
60 cm 左右

大型鸥



乌鸦一般大或略小
45 cm 左右

中型鸥
至①



鸽子一般大或略大
30 ~ 45 cm 左右

小型鸥
至②

● 初级飞羽颜色?



黑底白斑



灰底白斑



白色

● 背部颜色?



中等灰色 ※

西伯利亚银鸥 p30



灰翅鸥

p38

冰岛鸥 *kumlienii* 亚种 p44

杂交种

p47-48



北极鸥

p40

冰岛鸥 *glaucoides* 亚种 p44

白化个体

其他候选项



暗灰色 ※

灰背鸥

p36

乌灰银鸥

p28

秦梅尔银鸥

p28

蒙古银鸥

p34

美洲银鸥

p35

泰氏鸥

p42-43

里海银鸥

p32

里海银鸥 *barabensis* 亚种

p33


加州鸥

p45

①嘴的颜色和尾部的图纹？



较大，有黑斑和红斑



较小，没有斑或是斑不明显



尾羽有黑带

黑尾鸥 p26-27

尾羽白色
(幼鸟有暗色块)

海鸥 p24-25

②背的颜色和脚的长度？




中等灰色 ※

脚较短



三趾鸥 p20



浅灰色 ※

标准长度

嘴红色

红嘴鸥 p8-9

嘴黑色且短




黑嘴鸥 p22

其他中、小型鸥

环嘴鸥	p23
遗鸥	p16
棕头鸥	p11
细嘴鸥	p10
博氏鸥	p13
小鸥	p12
弗氏鸥	p15
笑鸥	p14
红脚三趾鸥	p21
叉尾鸥	p18
楔尾鸥	p19
白鸥	p46

※ 注意不同的光线条件下会有不同的观感



分布 广泛繁殖于欧亚大陆北部。冬季日本全境常见。

特征 体形比黑尾鸥小的小型鸥。日本可见的小型鸥大部分是本种。

成鸟冬羽▶ ①嘴红而端黑。②脚红色。眼后方具黑色块斑。③上体灰色比西伯利亚银鸥浅。**成鸟夏羽**▶ ④头为略带褐色的黑色，具白色的上下眼睑。嘴和脚

比冬羽时发黑。**第二年冬羽**▶ 嘴和脚不似成鸟冬羽红艳而是橙色，有的个体外侧初级飞羽第2、第3枚的外羽瓣残有黑色羽缘，应该也是第二年冬羽。**第一年夏羽**▶ 少数个体头部变成如成鸟夏羽般的完整头罩，多数个体头部黑白相杂。覆羽、三级飞羽和次级飞羽残有褐色斑，也有不少个体完全没有褐色斑。**第一年**

第一年冬羽

第一年冬羽
· 深色型

幼羽



第一年冬羽

第一年夏羽



幼羽

冬羽 ▶ 5 嘴和脚为橙色或粉色带黄，嘴端黑色。覆羽、三级飞羽和尾羽具褐色斑。**第一年冬羽 · 深色型** ▶ 覆羽、初级飞羽和次级飞羽上黑褐色较多，甚罕见。**幼羽** ▶ 头顶、颈背及肩羽为褐色。

相似种 黑嘴鸥体形比红嘴鸥小一圈，嘴黑且短。成鸟各枚初级飞羽羽尖的白点大而显眼。成鸟夏羽时头纯黑，不带

褐色。白色的上下眼睑更粗而醒目。博氏鸥体形比红嘴鸥小一圈，翼下无明显黑色。嘴黑色。第一年冬羽上翼面的“M”形图纹及后缘的细黑带十分显眼。细嘴鸥体形稍大，嘴长。颈长，额弓较低。虹膜浅色。眼后方的暗色斑不明显。下体粉色调较重。



分 布 繁殖于地中海周边、黑海、加勒比海等地区。日本福冈有迷鸟记录。

特 征 体形比红嘴鸥略大，①下体粉色调较重的小型鸥。②额弓较低。③嘴、脚、颈及尾羽较长。

成鸟夏羽▶头白色，带粉色调。下体粉色调更重。**成鸟冬羽**▶④眼后方的黑斑不如红嘴鸥显著。⑤虹膜呈浅色。**第一年夏羽**▶似成鸟夏羽，但嘴、脚的颜色

较浅，下体的粉色调也较弱。**第一年冬羽**▶嘴和脚肉色，虹膜浅色。覆羽、三级飞羽具黑褐色斑，尾羽具黑带。**幼羽**▶肩羽具黑褐色斑。

相似种 红嘴鸥体形较小，嘴较短，虹膜通常为暗色。夏羽头黑色，冬羽眼后方的黑斑更明显。下体的粉色调较弱。棕头鸥翼尖的黑色较为显眼。

棕头鸥 (チャガシラカモメ)

Chroicocephalus brunnicephalus / Brown-headed Gull [L: 41-45 cm, W: 105-115 cm]

11



分布 繁殖于咸海至中国西部，主要繁殖地在青藏高原。日本利根川入海口夏季有成鸟夏羽的记录。

特征 体形比红嘴鸥大，①嘴粗。

成鸟▶②虹膜浅色，③翼尖的图纹与红嘴鸥明显不同，具大块黑色。④停歇时可见初级飞羽 P10 的腹面也不同，红嘴鸥的白色一直延伸至基部，而该种的白色斑块为长椭圆形，呈翼镜状。第二年

冬羽▶嘴和脚不似成鸟般赤红而带橙色。初级飞羽翼镜较小或只有一个，尚未完全发育。**第一年冬羽**▶虹膜暗色。停歇时⑤可通过观察初级飞羽 P10 腹面无红嘴鸥那样的白色斑加以区分。⑥飞翔时可通过观察翼尖的黑色三角形加以区分。越冬后期基本完成换羽，停歇时除嘴和脚的颜色外⑦羽色几乎与成鸟无异。



分布 繁殖于欧洲东部、西伯利亚东部及西部、北美洲等地。日本有数笔迷鸟记录。

特征 鸥类中体形最小的种类。

成鸟冬羽 ▶ 眼后方具黑斑，①头顶灰黑色。黑色的嘴细且尖。脚为不鲜明的红色。停歇时②初级飞羽白色。飞翔时③翼尖较圆，④翼下颜色发黑，后翼缘白且宽。

成鸟夏羽 ▶ 头变为黑色，但没有其他小型鸥那样的白色上下眼睑。嘴带上红色调，脚的红色变得鲜艳。**第二年冬羽** ▶ 似成鸟冬羽，但初级飞羽具黑斑。翼下较成鸟色淡。**第一年冬羽** ▶ 覆羽、三级飞羽具黑褐色斑，尾端具黑带。

相似种 楔尾鸥的尾为楔形。博氏鸥成鸟的翼下白色，第一年冬羽的后翼缘黑色。