



2017国家执业药师考试

通关必做2000题

药学综合知识与技能

(第二版)

主 编 张万金

100%解析
赠2套模拟试卷

赠

① 精品题库请扫二维码

② 药师在线20元优惠券

中国医药科技出版社

壹佰零玖

2017 国家执业药师考试通关必做 2000 题

(第二版)

药学综合知识与技能

主 编 张万金

副主编 袁 芳

编 者 张万金 袁 芳 刘 畅 卢丽霞

常州大学图书馆
藏书章



药师在线
WWW.51YAOSHI.COM

国家执业药师资格考试
2017年购课优惠券 面值20元



微信扫一扫 题库马上用

1. 本优惠券仅供购买“药师在线”线上产品使用，每满200元可以使用一张，特殊商品除外；
2. 随书赠送精品题库，扫描二维码立即可使用；
3. 本券有效期2017年1月1日至2017年10月31日；
4. 具体使用方法，请登录www.51yaoshi.com，如有疑问，请致电4000987818；
5. 本活动最终解释权归中国医药科技出版社所有。

因为专注 所以卓越

卡号：17TSQ0587589

密码：

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由从事执业药师考前培训的权威专家根据最新版执业药师资格考试大纲及考试指南的内容要求精心编写而成。本书习题按考试指南章节编排,便于考生系统复习。习题题型包括最佳选择题、配伍选择题、综合分析选择题和多项选择题,并根据2016年执业药师考试真题各章节考试分值,对各章节习题总量和各题型比例做了合理分配。书后附有两套模拟试卷,以方便考生系统复习后自查备考。本书题量丰富,考点覆盖全面,题型与真题完全一致,是参加2017年国家执业药师资格考试考生的首选必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

药学综合知识与技能 / 张万金主编. —2版. —北京:中国医药科技出版社,2017.1

2017 国家执业药师考试通关必做 2000 题

ISBN 978-7-5067-8954-7

I. ①药… II. ①张… III. ①药理学-资格考试-习题集 IV. ①R9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 312448 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm $\frac{1}{16}$

印张 15 $\frac{1}{2}$

字数 449 千字

初版 2016 年 3 月第 1 版

版次 2017 年 1 月第 2 版

印次 2017 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8954-7

定价 75.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

出版说明

执业药师资格制度的核心是保障职业准入人员具备良好的职业素质和能力。国家执业药师资格考试以执业药师岗位职责和实践内容为出发点,以培养在药品质量管理和药学服务方面具有综合性职业能力、具备自主学习和终身学习的态度和意识、能较好地服务公众健康的人才为目标。

为了更好地服务于考生,帮助考生应对考试,我们组织国内工作在教学一线、有着丰富考前培训经验的专家编写了这套丛书。本丛书紧紧围绕最新版国家执业药师资格考试大纲的要求,密切配合最新版考试指南,在对2016年考试真题的考点分布及题型比例、出题难度进行深入研究的基础上编写而成。力求语言规范化、试题原创性和考点全覆盖。

本丛书具有以下特点。

1. 紧扣最新考试大纲。第七版考试大纲从考试内容、重点要求、考题类型等多方面,更加强调实际应用,要求药学服务从业人员系统地掌握“药”“用药”以及“用药治病”三方面的综合知识和技能。本丛书题目的设计紧紧围绕“以用定考”这一中心原则。

2. 精选通关试题。本丛书所设题型与实际考试完全一致,包括最佳选择题、配伍选择题、综合分析选择题和多项选择题,并根据2016年执业药师考试真题中各章节所占分值比重,对各章节习题总量和题型比例做了合理配置。对重要考点,多角度出题,可帮助考生举一反三,利用联想记忆、对比记忆等方法掌握相关考点内容。

3. 精准试题解析。为了方便考生及时补救知识缺漏,我们针对每道试题均设有解析。针对难点和重点题目做了详细解析,旨在开拓考生解题思路。

4. 精编模拟试卷。书后附有两套模拟试卷,模拟考场,题型、题量与真题完全一致,以方便考生系统复习后自查备考,熟悉考试,提高实战能力。

5. 合理题量安排。本丛书各分册均设计试题2000余道,题量丰富,旨在使考生通过反复做题,从不同角度熟悉考点,提高复习效率和应试能力。

6. 全方位增值服务。考生可配套享受政策咨询、电话疑难解答、在线名师指导、精品课程免费试听等一系列增值服务。备考路上,我们伴您一路同行。

为了不断提升本系列图书的品质,欢迎广大读者提出宝贵意见,我们将在今后的工作中不断修订完善。

中国医药科技出版社

2017年1月

目录 Contents

上篇 通关试题

第一章 执业药师与药学服务	2
第二章 药品调剂和药品管理	4
第三章 用药教育与咨询	17
第四章 用药安全	27
第五章 药品的临床评价方法与应用	40
第六章 药物治疗基础知识	42
第七章 常用医学检查指标的解读	44
第八章 常见病症的自我药疗	50
第九章 呼吸系统常见疾病	68
第十章 心血管系统常见疾病	75
第十一章 神经系统常见疾病	86
第十二章 消化系统常见疾病	91
第十三章 内分泌及代谢性疾病	94
第十四章 泌尿系统常见疾病	101
第十五章 血液系统疾病	103
第十六章 恶性肿瘤	105
第十七章 常见骨关节疾病	108
第十八章 病毒性疾病	110
第十九章 妇科疾病与计划生育	113
第二十章 中毒解救	115

下篇 试题答案与解析

第一章 执业药师与药学服务	121
第二章 药品调剂和药品管理	122
第三章 用药教育与咨询	132
第四章 用药安全	140



第五章 药品的临床评价方法与应用	150
第六章 药物治疗基础知识	151
第七章 常用医学检查指标的解读	152
第八章 常见病症的自我药疗	158
第九章 呼吸系统常见疾病	172
第十章 心血管系统常见疾病	176
第十一章 神经系统常见疾病	185
第十二章 消化系统常见疾病	189
第十三章 内分泌及代谢性疾病	191
第十四章 泌尿系统常见疾病	197
第十五章 血液系统疾病	199
第十六章 恶性肿瘤	200
第十七章 常见骨关节疾病	202
第十八章 病毒性疾病	203
第十九章 妇科疾病与计划生育	205
第二十章 中毒解救	206
模拟试卷一	211
模拟试卷二	219
模拟试卷答案与解析	227



第一章

执业药师与药学服务

一、最佳选择题

1. 有关药学服务的概念,叙述错误的是
A. 提供与用药有关的服务
B. 既有直接服务,也有间接服务
C. 既有实物形式,也有信息形式服务
D. 服务于治疗性药物和预防性药物,不服务于保健用药
E. 涵盖了用药相关的全部需求
2. 下列工作内容不属于药学服务范畴的是
A. 选择药物
B. 疗效跟踪
C. 书写处方
D. 调整用药方案与剂量
E. 公众健康教育
3. 药学服务的对象是
A. 广大公众
B. 所有患者
C. 重症疾病患者
D. 特殊人群患者
E. 住院患者
4. 药学服务的重要人群不包括
A. 慢性支气管哮喘患者
B. 流感患者
C. 合并患有心肌梗痛、高血压、糖尿病的患者
D. 新生儿患者
E. 聋哑患者
5. 不属于药学服务重要人群的是
A. 肝肾功能不全者
B. 过敏体质者
C. 妊娠期妇女
D. 血液透析患者
E. 急性结膜炎患者
6. 不属于药学服务特殊人群的是
A. 过敏体质者
B. 老年患者
C. 盲人
D. 特殊体质者
E. 终生用药者
7. 药学服务的特殊人群有
A. 长期用药人群
B. 儿童
C. 联合用药人群
D. 需做监测的给药人群
E. 有药物不良反应者
8. 作为执业药师,应具备的专业技能不包括
A. 药物警戒技能
B. 与患者沟通技能
C. 药品管理技能
D. 药历书写技能
E. 审核医生疾病诊断是否正确技能
9. 与患者的沟通技巧,正确的是
A. 使用专业术语
B. 一次性提供给患者尽可能多的信息
C. 对老年患者可以适当给予宣传资料
D. 尽可能单向交流,避免患者说得过多,而影响判断
E. 观察患者表情,决定是否需要沟通
10. 药历书写是药师进行规范化药学服务的一项工作,下列内容一般不作为药历书写内容的是
A. 患者基本信息
B. 用药评价
C. 临床诊断要点
D. 用药记录
E. 患者知情同意书
11. 下列内容不会出现在药历上的是
A. 患者手机号码
B. 患者所患疾病
C. 患者所用药物的名称、剂量、给药途径等
D. 患者所用药物的禁忌证、适应证、主要不良反应
E. 患者用药后的疗效和不良反应
12. 下列有关药历的叙述,正确的
A. 与病历相同,由医师填写
B. 药师为患者建立的用药档案
C. 是患者病危抢救时的用药记录
D. 可作为患者退药的唯一证据
E. 不能干涉医师的药物治疗方案
13. 不会出现在中国药历上的内容是
A. 患者遗传史
B. 患者过敏史
C. 患者疾病诊断的实验室检查数据
D. 对患者的用药指导

E. 药物的化学名

14. 下列哪一项不属于药学服务实施的主要内容

- A. 把医疗、药学、护理结合起来,让医师、药师、护士齐心协力,共同承担医疗责任
- B. 既为患者个人服务,又为整个社会公众健康教育服务
- C. 积极参与疾病的预防、治疗、保健
- D. 指导、帮助患者合理使用药物
- E. 代替医护人员制定和实施药物治疗方案

15. 药学服务的具体工作不包括

- A. 处方审核及处方点评
- B. 参与临床药物治疗和治疗药物监测
- C. 药物利用研究和评价及药学信息服务
- D. 药物不良反应监测和报告
- E. 对医生所开处方发现错误后,可自行决定修改并发药

16. 对慢性病患者进行长期管理与服务,以达到优化药物治疗和提高患者治疗效果的目的,这种新发展起来的药学服务形式称为

- A. 药学干预
- B. 药物重整
- C. 药物治疗管理
- D. 药物警戒
- E. 不良反应监测

17. 药物治疗管理(英文简称 MTM)是由美国多家药师协会/学会提出的一种更全面、更细致的药学服务,旨在提高患者的生活质量和生命质量,目前我国药学服务行业也属于热门话题。下列人群中最需要提供药物治疗管理的是

- A. 沙眼患者
- B. 糖尿病患者
- C. 肺炎患者
- D. 湿疹患者
- E. 便秘患者

二、多项选择题

1. 药学服务的重要人群包括

- A. 慢性病患者
- B. 终生用药者
- C. 病情复杂患者
- D. 特殊人群
- E. 需要监测给药的患者

2. 药师进行药学服务应具备的专业技能包括

- A. 患者用药教育技能
- B. 沟通技能
- C. 疾病诊断技能
- D. 药历书写技能
- E. 药物警戒技能

3. 药师在与患者进行沟通交流时,需要注意的事项是

- A. 开放式提问
- B. 尽可能使用专业术语
- C. 适当给予宣传资料
- D. 尽可能长时间交流

E. 一次性尽可能提供更多信息

4. 与患者的沟通技巧包括

- A. 开放式提问
- B. 认真聆听
- C. 尽量使用专业术语
- D. 注意掌握时间
- E. 正确使用微笑、手势等肢体语言

5. 国内药历推荐格式项目包括

- A. 基本情况
- B. 病历摘要
- C. 用药记录
- D. 用药评价
- E. 患者投诉

6. 药历的内容包括

- A. 病人的个人信息
- B. 病历的部分摘要
- C. 病人用药后的不良反应
- D. 病人用药后的药效评价
- E. 药物的禁忌证

7. 有关药历的描述,正确的是

- A. 属于专业技术档案
- B. 个体化给药依据
- C. 同于病历
- D. 与病历无关
- E. 由医生记录

8. 教学药历的内容包括

- A. 病人的遗传史
- B. 病人的用药评价
- C. 病人的疾病诊断结果
- D. 学员自我总结
- E. 教师对学员药历书写的评价

9. 药学服务的具体工作包括

- A. 处方审核
- B. 静脉药物配置
- C. 参与临床药物治疗
- D. 治疗药物监测
- E. 药学信息服务与患者健康教育

10. 执业药师在进行药学服务时,下列哪些工作属于此范畴

- A. 审核处方中药物的给药途径是否合理
- B. 和医师共同制定个体化给药方案
- C. 监测药物不良反应,有责任向国家药监局有关部门汇报
- D. 进入社区为广大群众进行健康教育
- E. 对病人用药后的疗效和安全性进行评价

11. 药师在开展药学服务时应特别关注老年人用药,应做到

- A. 反复交代药物的用法用量,直至患者完全明白
- B. 对药名或药盒包装容易混淆的药物,应贴附提示标签
- C. 有条件者应配备分剂药盒
- D. 掌握患者的整体用药情况,开展用药评估
- E. 尽量采用专业术语让患者充分了解药物信息



第二章

药品调剂和药品管理

一、最佳选择题

- 关于处方的描述,错误的是
A. 由实习医师填写 B. 患者报销的凭据
C. 具有法律性 D. 具有技术性
E. 具有经济性
- 关于处方的法律性,描述错误的是
A. 医师具有诊断权 B. 医师具有开具处方权
C. 药师具有审核权 D. 药师具有调配处方权
E. 药师具有修改处方权
- 处方正文书写的内容是
A. 患者姓名 B. 医师签名
C. 药品通用名 D. 药师签名
E. 患者住院病历号
- 处方正文书写的内容不包括
A. 药品通用名 B. 药品剂型
C. 药品规格 D. 药品不良反应
E. 药品用法用量
- 关于处方的说法,正确的是
A. 由医务人员开具,药师审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书
B. 由执业药师开具,药师审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书
C. 由注册医师开具,药师审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书
D. 由实习医师开具,药师审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书
E. 由注册医师开具,护士审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书
- 《中华人民共和国药典》收录的处方属于
A. 法定处方 B. 医师处方
C. 协定处方 D. 普通处方
E. 急诊处方
- 药师审核用药适宜性,不包括的内容是
A. 对于必须做皮试的药品,审核是否注明过敏试验及结果的判断
B. 审核处方用药与临床诊断的相符性
C. 审核是否有重复给药现象
D. 审核剂型、剂量、疗程是否合理
E. 审核患者年龄是否准确
- 下列处方属于合理的是
A. 给流感患者开具左氧氟沙星
B. 咳嗽患者经实验室检查,白细胞和C反应蛋白均正常,开具阿奇霉素治疗
C. 给高血压患者开具坦洛新
D. 给I类手术切口患者开具头孢拉定预防感染
E. 给输尿管结石患者开具黄体酮,注明了原因并有医生签名
- 关于处方书写要求,错误的是
A. 处方上需要标明临床诊断结果,特殊情况除外
B. 一张处方最多可以为2名患者开具药品
C. 处方当天有效
D. 处方如果涂改,需要在涂改处有医师签名
E. 处方上须书写药品用法用量,不可以用“遵医嘱”代替
- 一张处方所开具的药品种类(中药饮片除外),不能超过
A. 1种 B. 2种
C. 3种 D. 4种
E. 5种
- 下列哪种书写符合处方书写规则
A. 医生签名与药学部门备案的式样不一致
B. 开具处方完毕没有在空白处划斜线
C. 开具的药品没有分行书写
D. 药品数量用阿拉伯数字书写
E. 超剂量没有标明原因
- 为避免重复用药,书写处方时,药品名称应采用
A. 商品名 B. 通用名

- C. 化学名 D. 专利名
E. 非专利名
13. 对食道癌患者给予顺铂、依托泊苷、氟尿嘧啶、多柔比星治疗,该处方可定义为
A. 无适应证用药 B. 超适应证用药
C. 有禁忌证用药 D. 过度治疗用药
E. 重复用药
14. 氯苯那敏用于花粉过敏治疗时,不宜用于
A. 伴有高血压的病人 B. 伴有青光眼的病人
C. 伴有胃溃疡的病人 D. 伴有湿疹的病人
E. 伴有荨麻疹的病人
15. 老年人服用含有盐酸伪麻黄碱的抗感冒药后,可导致的不良反应是
A. 蛋白尿 B. 肺栓塞
C. 血压升高 D. 胃出血
E. 低血糖
16. 司来吉兰的禁忌证是
A. 尿潴留 B. 抑郁症
C. 低血压 D. 过敏性鼻炎
E. 甲状腺功能低下
17. 通常情况下,80岁以上老年人的用药剂量是中青年人的
A. 90% B. 80%
C. 70% D. 50%
E. 20%
18. 对于老年性高血压患者,适宜的给药途径是
A. 静脉滴注 B. 肌肉注射
C. 口服给药 D. 舌下给药
E. 栓剂
19. 下列中药和化学药联合应用中,不存在重复用药的是
A. 新癀片+吡罗昔康胶囊
B. 曲克芦丁片+维生素C片
C. 脉君安片+氢氯噻嗪片
D. 消渴丸+格列本脲片
E. 珍菊降压片+氢氯噻嗪片
20. 根据《中华人民共和国药典临床用药须知》,使用前必须做皮试的药物是
A. 红霉素 B. 氨苄西林
C. 克林霉素 D. 维生素K₁
E. 万古霉素
21. 药物相互作用在药动学方面的影响不包括
A. 影响吸收 B. 影响分布
C. 影响代谢 D. 影响排泄
E. 影响配伍
22. 下列复方制剂中,不具有联合增效意义的是
A. 阿莫西林-克拉维酸钾
B. 替卡西林-克拉维酸钾
C. 亚胺培南-舒巴坦
D. 头孢哌酮-舒巴坦
E. 氨苄西林-舒巴坦
23. 青蒿素与乙胺嘧啶、磺胺多辛联合应用的主要意义是
A. 降低毒性 B. 增强吸收
C. 减少代谢 D. 降低耐药性
E. 抑制排泄
24. 长期应用利血平后,如果使用具有直接作用的拟肾上腺素药,如肾上腺素、去甲肾上腺素,可以使升压作用增强,这一现象称为
A. 协同增效 B. 非竞争性拮抗
C. 敏感化作用 D. 受体脱敏
E. 竞争性拮抗
25. 肝素钠在用于血栓患者的溶栓治疗时,为防止出血风险,禁止与其合用的药物是
A. 阿司匹林 B. 普萘洛尔
C. 洛伐他汀 D. 硝苯地平
E. 硝酸甘油
26. 甲氧氯普胺与吩噻嗪类抗精神病药合用,可以增强的毒副作用是
A. 胃肠道刺激 B. 锥体外系反应
C. 耳毒性 D. 肾毒性
E. 血液系统毒性
27. 与链霉素合用,可以增强耳、肾毒性的药物是
A. 青霉素 B. 红霉素
C. 头孢拉定 D. 呋塞米
E. 磺胺嘧啶
28. 能够延缓胃排空,增加其他药物吸收的是
A. 甲氧氯普胺 B. 多潘立酮
C. 莫沙必利 D. 对乙酰氨基酚
E. 阿托品
29. 可以加快胃肠道蠕动,减少其他药物吸收的是
A. 阿托品 B. 颠茄浸膏
C. 多潘立酮 D. 丙胺太林
E. 东莨菪碱



30. 属于肝药酶诱导剂的药物是
A. 酮康唑 B. 利福平
C. 异烟肼 D. 西咪替丁
E. 阿奇霉素
31. 能够与青霉素配伍的注射剂是
A. 葡萄糖注射剂 B. 阿托品注射剂
C. 氨茶碱注射剂 D. 维生素 C 注射剂
E. 氯化钠注射剂
32. 更昔洛韦与亚胺培南配伍, 容易引发的不良反应是
A. 二重感染 B. 癫痫发作
C. 粒细胞减少 D. 胃肠道刺激出血
E. 高血压
33. 阿昔洛韦与齐多夫定合用, 最常见的毒性反应是
A. 肾毒性 B. 肝毒性
C. 血液系统毒性 D. 消化系统毒性
E. 呼吸系统毒性
34. 将丙谷胺与甘草、白芍、冰片制成复方制剂, 其主要临床用途是治疗
A. 痛风 B. 支气管哮喘
C. 肝炎 D. 消化性溃疡
E. 糖尿病
35. 合用维生素 B₁₂ 与陈皮, 可以达到的效果是
A. 促进维生素 B₁₂ 的吸收
B. 抑制维生素 B₁₂ 的代谢
C. 加快维生素 B₁₂ 的排泄
D. 减少维生素 B₁₂ 的氧化
E. 提高人体对维生素 B₁₂ 的敏感性
36. 氟尿嘧啶、环磷酰胺与海螵蛸粉、白芨、奋乃静、鲨肝醇做成复方制剂的目的是
A. 减轻焦虑 B. 保肝
C. 减轻胃肠道反应 D. 减轻骨髓抑制
E. 防止脱发
37. 与中成药舒肝丸药理作用拮抗, 禁止两者合用的化学药是
A. 颠茄浸膏 B. 阿托品
C. 对乙酰氨基酚 D. 甲氧氯普胺
E. 普萘洛尔
38. 蛇胆川贝液联合应用可待因, 可能导致的危险是
A. 成瘾性加大 B. 镇痛作用降低
C. 镇咳作用减弱 D. 呼吸抑制加剧
E. 便秘不良反应加大
39. 禁止与黄连上清丸合用的药物是
A. 青霉素 B. 乳酶生
C. 呋喃唑酮 D. 磺胺嘧啶
E. 四环素
40. 服用金银花制剂, 不能合用的药物是
A. 青霉素 B. 培菲康
C. 磺胺甲噁唑 D. 红霉素
E. 氨苄西林
41. 应当判定为不规范处方的是
A. 药物剂型不合理的处方
B. 适应证不适宜的处方
C. 未有医师签名的处方
D. 重复给药的处方
E. 无正当理由开具高价药品的处方
42. 属于超常处方的是
A. 早产儿未标明体重或日、月龄
B. 中药饮片和西药开在一张处方上
C. 用法、用量写“遵医嘱”、“自用”字样
D. 无正当理由不首选国家基本药物
E. 无正当理由为同一患者同时开具 2 种以上药理作用机制相同的药物
43. 下列处方属于用药不适宜处方的是
A. 开具麻醉药品使用白色处方纸
B. 适应证不适宜
C. 单张处方开具 6 种药品
D. 涂改处无医生签名
E. 无正当理由超说明书用药
44. 药师在调配下列药品时, 需要登记的是
A. 吗啡注射液 B. 双氯芬酸钠缓释片
C. 甲硝唑栓剂 D. 普萘洛尔片剂
E. 胰岛素笔
45. 药师在给阴道炎患者发放克霉唑栓剂时, 药品袋标签上应写明
A. 室温保存 B. 置于 2℃~8℃ 保存
C. 避光保存 D. 凉暗处保存
E. 真空保存
46. 甲硝唑的别名是
A. 安宫黄酮 B. 咳必清
C. 雷米封 D. 灭滴灵
E. 吗丁啉
47. 药品说明书上标明药品需要在“凉暗处”贮存, 指的是

- A. 10℃~30℃ B. ≤20℃
C. ≤20℃并遮光 D. 2℃~10℃
E. ≤-4℃
48. 药品说明书上标明药品需要在“阴凉处”贮存,指的是
A. 10~30℃ B. ≤20℃
C. ≤20℃并遮光 D. 2~10℃
E. ≤零下4℃
49. 单剂量调配的优点不包括
A. 便于患者服用 B. 防止服错药
C. 提高药品稳定性 D. 降低成本
E. 提高患者依从性
50. 药师在给患者的服药标签上,下列书写不合理的是
A. 每次2片 B. 每日3次
C. 每次50mg D. 服药后禁止驾车
E. 避光保存
51. 影响药品质量的环境因素不包括
A. 日光 B. 时间
C. 震荡 D. 管理人员设置
E. 空气
52. 在药品运输过程中,既要冷链运输,又要防止震荡的药品是
A. 胰岛素制剂 B. 破伤风免疫球蛋白
C. 白喉抗毒素 D. 链激酶
E. 人促红细胞生成素
53. 下列药品中,无需避光贮存的是
A. 维生素C注射液 B. 奥美拉唑注射液
C. 硝苯地平缓释片 D. 氯化钠注射液
E. 硫酸亚铁片
54. 药品仓库一般的湿度要求是
A. 10%~20% B. 20%~30%
C. 30%~40% D. 35%~75%
E. 70%~85%
55. 下列药品中,不需要避潮湿贮存的是
A. 维生素C片剂 B. 奥美拉唑肠溶片
C. 布洛芬颗粒剂 D. 氯化钠注射液
E. 罗红霉素散剂
56. 下列药品中,属于高警示药品的是
A. 咪达唑仑片剂
B. 普萘洛尔胶囊
C. 0.9%氯化钠注射液
D. 胰岛素注射液
E. 阿司匹林肠溶片
57. 下列药品中,不属于高警示药品的是
A. 25%葡萄糖注射液
B. 100ml 灭菌注射用水
C. 氨茶碱静脉注射液
D. 腹膜透析液
E. 硫酸镁片剂
58. 按照药品管理要求规范,阿维A胶囊属于
A. 麻醉药品
B. 高警示药品
C. 第一类精神药品
D. 第二类精神药品
E. 兴奋剂
59. 实行“印鉴卡”管理的药品是
A. 高警示药品
B. 贵重药品
C. 麻醉药品和第一类精神药品
D. 第二类精神药品
E. 兴奋剂
60. 不需要向指定的药品经营单位采购,但需要向具有相关药品经营资质的企业购买的是
A. 高危药品
B. 贵重药品
C. 麻醉药品和第一类精神药品
D. 第二类精神药品
E. 兴奋剂
61. 第二类精神药品每张处方用量不应超过
A. 3d B. 5d
C. 7d D. 14d
E. 30d
62. 下列药品不需要凭处方购买的是
A. 可待因片剂 B. 地西泮片剂
C. 人促红细胞生成素 D. 罗红霉素胶囊
E. 维生素C片剂
63. 下列药物,不属于兴奋剂范畴的是
A. β受体阻断剂 B. 肽类激素
C. 麻醉药品 D. 药品类易制毒化学品
E. 非甾体类抗炎药
64. 对于蛋白同化激素类药物的销售记录保管,一般要求保管超过药品有效期
A. 半年 B. 1年



- C. 2 年 D. 5 年
E. 10 年
65. 要求冷链运输管理的药品是
A. 麻醉药品 B. 高警示药品
C. 第一类精神药品 D. 生物制品
E. 第二类精神药品
66. 我国对生物制品和血液制品的管理要求, 不包括的是
A. 专人管理
B. 每批产品均要检验、审核
C. 一个单采血浆站只能与一个血液制品生产单位签约和提供原料血浆
D. 药库应设置血液待验区、合格区、不合格区
E. 储存库要求无菌
67. 关于医疗机构制剂的管理, 错误的是
A. 医疗机构不能研制生产市场上已有的品种
B. 不能生产生物制品 (变态反应原除外)
C. 不能生产麻醉药品、精神药品、放射性药品
D. 不能在市场上流通销售
E. 不能调剂给其他医疗机构使用
68. 已知盐酸地卡因的冰点值为 -0.109°C , 血液冰点值为 -0.52°C , 如果配制 100ml 盐酸地卡因等渗溶液, 那么需要加入盐酸地卡因的量约为
A. 1.2g B. 2.4g
C. 3.6g D. 4.8g
E. 6.0g
69. 已知盐酸地卡因冰点值为 -0.109°C , 血液冰点值为 -0.52°C , 氯化钠冰点值为 -0.578°C , 配制 1% 盐酸地卡因等渗溶液 100ml, 需要加入氯化钠的量约为
A. 0.41g B. 0.51g
C. 0.61g D. 0.71g
E. 0.81g
70. 普鲁卡因等渗当量值为 0.21, 氯化钠等渗当量值为 0.9, 配制 1% 盐酸普鲁卡因等渗溶液 100ml, 需加入氯化钠的量为
A. 0.39g B. 0.49g
C. 0.59g D. 0.69g
E. 0.79g
71. 普鲁卡因等渗当量值为 0.21, 氯化钠等渗当量值为 0.9, 配制 1% 盐酸普鲁卡因等渗溶液 100ml, 需加入普鲁卡因的量约为
A. 1.285g B. 2.285g
C. 3.285g D. 4.285g
E. 5.285g
72. 1IU 的青霉素 G 钠盐相当于
A. $0.6\mu\text{g}$ B. $6\mu\text{g}$
C. $60\mu\text{g}$ D. $600\mu\text{g}$
E. $6000\mu\text{g}$
73. 配制 10% 葡萄糖注射液 500ml, 现用 50% 和 5% 两种浓度葡萄糖注射液混合配制, 分别需要
A. 56ml 和 444ml B. 72ml 和 428ml
C. 85ml 和 415ml D. 94ml 和 406ml
E. 106ml 和 394ml
74. 万古霉素 0.5g 溶于生理盐水 100ml 中, 每毫升相当于 15 滴, 每分钟滴数 25 滴, 滴定时间需要
A. 20min B. 30min
C. 40min D. 50min
E. 60min
75. 1U 维生素 A 相当于视黄醇当量
A. $0.344\mu\text{g}$ B. $3.44\mu\text{g}$
C. $34\mu\text{g}$ D. 3.4mg
E. 34mg
76. 患者, 男, 11 个月, 患有社区获得性肺炎, 体温 37.8°C 。处方左氧氟沙星, 每次口服 0.1g tid。药师在审核处方时, 发现存在严重错误, 错误的原因是
A. 未注明皮试
B. 所开具药品不适合儿童
C. 所开具药品与疾病诊断不相符
D. 给药途径不合理
E. 未采用商品名开具处方
77. 患者, 男, 65 岁, 因感冒自行购买酚麻美敏, 下列药师应提醒患者的信息中错误的是
A. 如果患者患有高血压, 应避免使用
B. 如果患者患有青光眼, 不宜服用
C. 如果患者患有前列腺增生症, 不宜服用
D. 服药期间禁止饮酒
E. 如果患者没有胃溃疡, 可同时服用阿司匹林, 以加强治疗效果
78. 患者到药店购买“扑尔敏片”, 药师应给予其
A. 氯苯那敏片 B. 阿昔洛韦片
C. 更昔洛韦片 D. 奥司他韦片
E. 苯海拉明片

79. 黄体酮是由卵巢分泌的天然孕激素, 临床用药历史悠久。下列案例中, 采用黄体酮治疗属于超适应证用药的是
- 治疗习惯性流产, 肌内注射, 每次 10~20mg, 每日 1 次, 一直用到妊娠第 4 个月
 - 治疗痛经, 月经之前 6~8 日每日注射 5~10mg, 给药 4~6 天
 - 治疗输尿管结石, 每日 2 次, 每次 20mg, 肌内注射
 - 治疗经血过多, 每日注射 10~20mg, 给药 5~7 天
 - 治疗先兆流产, 每日 25~50mg
80. 患者, 男, 72 岁, 患有前列腺增生症, 排尿困难, 长期服用坦洛新缓释胶囊, 药师应提醒患者服用坦洛新期间不宜同时服用的药物是
- 氨氯地平
 - 非那雄胺
 - 度他雄胺
 - 阿莫西林
 - 对乙酰氨基酚
81. 患者, 男, 29 岁, 身高 170cm, 体重 98kg, 因烧伤致昏迷入院治疗, 不能自行进食, 医生给予多种营养剂和药物治疗, 不适宜该患者的是
- 10% 葡萄糖注射液
 - 复方氨基酸注射液
 - 生理盐水
 - 脂肪乳注射液
 - 复方维生素注射液
82. 患儿, 男, 6 岁, 患有带状疱疹病毒感染, 药师在审核处方和发药时, 应该正确判断出
- 如果处方中出现阿糖腺苷, 属于适应证用药
 - 如果处方中出现阿糖胞苷, 属于适应证用药
 - 阿糖腺苷禁用于儿童
 - 阿糖胞苷禁用于儿童
 - 阿糖腺苷的别名是阿糖胞苷, 处方中出现任意一个名字都属于正确用药
83. 患者, 男, 62 岁, 血压 160/95mmHg, 诊断结果为 2 级高血压。处方所列药物包括: 脉君安片 (0.5g×3 片, tid, po)、氢氯噻嗪片 (25mg×1 片, qd, po)。药师判断处方为不合理处方, 原因是
- 氢氯噻嗪片给药途径不合理
 - 两个药物存在重复用药现象
 - 脉君安属于无适应证用药
 - 两个药物之间存在配伍禁忌
 - 中成药与化学药不能同时出现在一张处方上
84. 珍菊降压片是由野菊花膏粉、珍珠层粉、芦丁和两种化学药组成的中成药。3 级高血压患者在服用该药时, 应避免同时联合服用的降压药是
- 普萘洛尔
 - 硝苯地平
 - 可乐定
 - 卡托普利
 - 氯沙坦
85. 患者, 男, 因患单纯性淋病而就诊, 经检查后, 医生开具阿莫西林胶囊治疗。实习护士在给患者做皮肤过敏试验时, 咨询药师如何测试, 药师应给予的正确指导是
- 让患者服用 1 粒阿莫西林, 在医院观察 30min 后做出判断
 - 将 1 粒阿莫西林胶囊去壳, 碾碎药物, 将药物用少量水湿敷在患者手腕处, 观察 30min
 - 咨询患者以前是否有过该药的过敏现象, 如果没有, 可免做皮试
 - 给患者皮内注射 0.1ml 青霉素钠, 观察 30min
 - 给患者皮下注射 0.1ml 青霉素钠, 观察 30min
86. 肾盂肾炎患者服用左氧氟沙星, 治疗期间, 若同时服用下列哪种药物, 可导致治疗效果降低, 甚至延误病情而致发展成为慢性肾盂肾炎
- 复方钙铁锌口服液
 - 颠茄浸膏
 - 阿莫西林胶囊
 - 硫酸阿托品片
 - 西咪替丁
87. 患者, 女, 62 岁, 患有 2 型糖尿病, 长期服用格列本脲。近期患者经常感觉饥饿、心悸、颤抖、出汗, 前来就诊。检查发现其血糖偏低, 经询问, 患者最近有服用过其他药物缓解类风湿关节炎, 那么, 最可能导致上述问题的药物是
- 对乙酰氨基酚
 - 布洛芬
 - 阿司匹林
 - 双氯芬酸钠
 - 吡罗昔康
88. 老年失眠患者服用地西洋, 第二天晨起容易出现“宿醉现象”, 睡前应避免同时服用, 否则可加剧这一现象甚至导致患者嗜睡不起的药物是
- 利福平
 - 苯妥英钠
 - 卡马西平
 - 圣约翰草提取物
 - 环丙沙星
89. 下列处方中属于合理处方的是
- 高血压患者, 女, 62 岁, 开具卡托普利片剂 12.5mg×20, 用法 12.5mg, bid, po; 福辛普利片剂 10mg×14, 用法 10mg, qd, po
 - 流感患者, 男, 16 岁, 开具酚麻美敏片 12 片, 用法每次 2 片, tid, po; 对乙酰氨基酚片



- 0.3g×6, 用法 0.3g, tid, po
- C. 真菌性阴道炎患者, 女, 37 岁, 开具克霉唑阴道片 0.5g×10 枚, 用法 0.5g, qd, po
- D. 急诊感染性腹泻患者, 女, 3 岁, 开具小檗碱片 100mg×100, 用法 200mg, tid, po
- E. 失眠患者, 女, 46 岁, 开具地西洋片 2.5mg×14, 用法 5mg, qd, 睡前口服
90. 多潘立酮能够促进胃肠道蠕动, 可用于功能性、器质性、饮食性、放疗等引起的恶心、呕吐, 但具有潜在的猝死风险。患者在购买下列药品时, 药师应提示伴有心脏病的患者慎用, 或提醒患者可具有心脏相关风险的药物是
- A. 灭滴灵 B. 黄连素
- C. 吗丁啉 D. 甲氧咪胍
- E. 核黄素
91. 药库接受了一批药品, 其中需要在冷处贮存的是
- A. 西地碘片 B. 硫普罗宁片
- C. 双歧三联活菌胶囊 D. 乳酶生片
- E. 托烷司琼注射液
92. 药店新进 5 箱布洛芬混悬液, 药师需要验收入库。关于药师验货的说法, 下列错误的是
- A. 打开最小包装, 检查塑料瓶, 瓶盖不应出现松动现象, 随机打开一瓶, 药液不应出现刺鼻性气味
- B. 仔细观察瓶内液体, 不应该有霉变现象
- C. 摇匀后, 固体颗粒应全部溶解, 溶液澄清透明
- D. 每个最小包装均应带有药品说明书
- E. 药品保质期不能太久, 确保药品在正常销售进度下, 于有效期之前尽可能售完
93. 将 0.5g 氨茶碱注射液加入到 5% 葡萄糖注射液 250ml 中, 临床要求给药速度为 60mg/h, 输注速度应是
- A. 10ml/h B. 30ml/h
- C. 20ml/h D. 60ml/h
- E. 83.3ml/h
94. 某复方维生素制剂含有多种维生素和微量金属离子, 每片中主要维生素含量如下: 维生素 A (323.6μg)、维生素 B₁₂ (1.44μg)、维生素 C (61.7mg)、维生素 D (3.0μg)、维生素 E (8.8mg)。该药用法为每日 1 次、每次 1 片, 那么每天正常服用该药所获取维生素 A、D 的效价 (U) 分别是
- A. 941、120 B. 323.6、300

C. 940、300 D. 323.6、120

E. 120、300

二、配伍选择题

[1~4 题共用备选答案]

- A. 第一类精神药品处方 B. 第二类精神药品处方
- C. 普通处方 D. 急诊处方
- E. 儿科处方

1. 用淡黄色处方纸书写的是
2. 用淡绿色处方纸书写的是
3. 用白色处方纸书写, 右上角无标注的是
4. 用淡红色处方纸书写的是

[5~6 题共用备选答案]

- A. 1 日用量 B. 3 日用量
- C. 5 日用量 D. 7 日用量
- E. 30 日用量

5. 门诊处方一般不超过
6. 急诊处方一般不超过

[7~9 题共用备选答案]

- A. qd B. qn
- C. q4h D. hs
- E. qh

7. 每 4 小时给药的外文缩写是
8. 每晚给药的外文缩写是
9. 临睡前给药的外文缩写是

[10~12 题共用备选答案]

- A. bid B. tid
- C. qid D. qod
- E. St

10. 每天给药 3 次的外文缩写是
11. 隔天给药 1 次的外文缩写是
12. 立即给药的外文缩写是

[13~15 题共用备选答案]

- A. Cap B. gtt
- C. Inj D. Mist
- E. ung

13. 注射剂的外文缩写是
14. 合剂的外文缩写是
15. 胶囊剂的外文缩写是

[16~19 题共用备选答案]

- A. im B. ih
- C. iv D. ivgtt
- E. po

16. 口服给药的外文缩写是
17. 肌肉注射给药的外文缩写是
18. 静脉注射给药的外文缩写是
19. 静脉滴注给药的外文缩写是

[20~22 题共用备选答案]

- | | |
|-------|-------|
| A. Ac | B. pc |
| C. po | D. qn |
| E. pm | |
20. 处方中“餐后给药”的外文缩写是
 21. 处方中“餐前给药”的外文缩写是
 22. 处方中“必要时”的外文缩写是

[23~25 题共用备选答案]

- A. 小檗碱
 - B. 盐酸地芬诺酯
 - C. 双八面体蒙脱石散剂
 - D. 胰酶
 - E. 胃蛋白酶
23. 用于治疗细菌感染性腹泻的药物是
 24. 用于治疗激惹性腹泻及化学刺激所致腹泻的药物是
 25. 用于治疗急慢性功能性腹泻的药物是

[26~27 题共用备选答案]

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 超适应证用药 | B. 有禁忌证用药 |
| C. 盲目联合用药 | D. 过度治疗用药 |
| E. 无适应证用药 | |
26. 脂肪乳用于脂质骨髓炎属于
 27. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥属于

[28~30 题共用备选答案]

- | | |
|---------|---------------|
| A. 便秘 | B. 妊娠高血压 |
| C. 急性皮炎 | D. 经尿道行前列腺切除术 |
| E. 水肿 | |
28. 口服硫酸镁用于
 29. 肌注硫酸镁用于
 30. 湿敷硫酸镁用于

[31~33 题共用备选答案]

- | | |
|---------|---------|
| A. 静脉滴注 | B. 舌下给药 |
| C. 口服给药 | D. 栓剂 |
| E. 溶液剂 | |
31. 阴道炎轻症患者宜选用的给药剂型是
 32. 有破损的湿疹轻症患者宜选用的给药剂型是
 33. 稳定型心绞痛患者发作时给予硝酸甘油的适宜给药途径是

[34~37 题共用备选答案]

- | | |
|-----------|----------|
| A. 对乙酰氨基酚 | B. 盐酸麻黄碱 |
|-----------|----------|

- | | |
|---------|--------|
| C. 硫酸亚铁 | D. 碳酸钙 |
|---------|--------|

- | |
|---------|
| E. 格列本脲 |
|---------|

34. 不能与消咳宁片合用的药物是
35. 不能与速感康胶囊合用的药物是
36. 不能与健脾生血颗粒合用的药物是
37. 不能与珍黄胃片合用的药物是

[38~40 题共用备选答案]

- | | |
|----------|---------|
| A. 肾功能衰竭 | B. 膀胱梗阻 |
| C. 低血糖 | D. 低血钾 |
| E. 粒细胞减少 | |

38. 中成药含氯苯那敏会导致
39. 中成药含格列本脲会导致
40. 中成药含氢氯噻嗪会导致

[41~44 题共用备选答案]

- | | |
|----------|--------|
| A. 甲氧苄啶 | B. 阿托品 |
| C. 西司他丁钠 | D. 苄丝肼 |
| E. 维生素 C | |

41. 与磺胺甲噁唑合用,可以起到抗菌增效作用的药物是
42. 与硫酸亚铁合用,可以促进铁剂吸收的药物是
43. 与亚胺培南合用,可以抑制肾肽酶代谢的药物是
44. 与解磷定合用,可以对抗胆碱能神经中毒兴奋症状的药物是

[45~46 题共用备选答案]

- | | |
|----------|----------|
| A. 甲氧苄啶 | B. 阿托品 |
| C. 西司他丁钠 | D. 克拉维酸钾 |
| E. 卡比多巴 | |

45. 与阿莫西林联合使用,可以提高药物对 β -内酰胺酶稳定性的是
46. 与左旋多巴联合使用,可以防止药物在外周被多巴脱羧酶代谢的是

[47~51 题共用备选答案]

- | | |
|----------|-----------|
| A. 降低抗药性 | B. 降低不良反应 |
| C. 增强敏感性 | D. 相互拮抗 |
| E. 增强毒性 | |

47. 普萘洛尔与硝酸甘油合用的结果是
48. 青蒿素与乙胺嘧啶和磺胺多辛合用的结果是
49. 链霉素与万古霉素合用的结果是
50. 地高辛与氢氯噻嗪合用的结果是
51. 甲苯磺丁脲与氢氯噻嗪合用的结果是

[52~55 题共用备选答案]

- | | |
|---------|-----------|
| A. 美西律 | B. 硝酸异山梨酯 |
| C. 硝苯地平 | D. 阿托品 |