


【中华药饮经典·养生保健全书】

传统工艺中药饮片的炮制 家庭养生的必备图谱

紫苏子

辛，温。归肺，大肠经。

降气化痰，止咳平喘，润肠通便。



白前

降气·消痰·止咳



冬虫夏草

补肾益肺·止血化痰



黄栀子

清热·泻火·凉血



大血藤

清热解毒·活血通络
祛风止痒

CHANGYONG ZHONGCAOYAO
JI YINPIAN TUPU

图
谱

中
草
药
及
饮
片

常
用

编著

张林余霖
静

本书收录了330余种中药材品种，660余幅图片，对常用中药饮片的炮制进行说明，每个品种包括文字和图片，文字部分主要说明了各品种的名称、原植物、生境分布、采收加工、药材性状、炮制与饮片、性味功能、主治用法等。



中医古籍出版社

Publishing House of Ancient Chinese Medical Books


【中华药饮经典·养生保健全书】

传统工艺中药饮片的炮制 家庭养生的必备图谱

紫苏子

辛，温。归肺，大肠经。

降气化痰，止咳平喘，润肠通便。



CHANGYONG ZHONGCAOYAO
JH YINPIAN TUPU

常用

编著

林余霖
张静

中草药及饮片

图谱



白前

降气·消痰·止咳



冬虫夏草

补肾益肺·止血化痰



黄栀子

清热·泻火·凉血



大血藤

清热解毒·活血通络
祛风止痒

本书收录了330余种中药材品种，660余幅图片，对常用中药饮片的炮制进行说明，每个品种包括文字和图片，文字部分主要说明了各品种的名称、原植物、生境分布、采收加工、药材性状、炮制与饮片、性味功能、主治用法等。



中医古籍出版社

Publishing House of Ancient Chinese Medical Books

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药及饮片图谱 / 林余霖, 张静编著. — 北京: 中医古籍出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5152-1614-0

I. ①常… II. ①林… ②张… III. ①中草药—图谱
②饮片—图集 IV. ①R282-64; R283.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 271839 号

常用中草药及饮片图谱

编 著: 林余霖 张静

责任编辑: 于峥

出版发行: 中医古籍出版社

社 址: 北京市东直门内南小街 16 号 (100700)

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

发 行: 全国新华书店发行

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 15

字 数: 310 千字

版 次: 2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5152-1614-0

定 价: 48.00 元

前言

我国幅员辽阔，药材资源丰富。中医中药对中华民族的繁衍昌盛、世界医药的发展做出了卓越贡献。《常用中药材及饮片图谱》的顺利出版，是普及中医药的一件幸事。

《常用中药材及饮片图谱》以《中华人民共和国药典》（2015年版）为蓝本，收载植物基源的常见中药330余种，精选原植物、药材饮片彩色图片共计660余幅，真实、准确地反映了原植物生境、原植物形态和药材饮片形状，突出了“图文并茂”的特点。

编著者长年跋山涉水、不畏艰辛深入药材产地拍摄记录植物及生境图片，采挖药材，并依照《中华人民共和国药典》加工方法制得原药材，在中药师指导下炮制饮片，再经专业摄影，真实还原了药材和饮片形状。因此，该书收载大量清晰药材和饮片图片，具有很大的科学性和真实性，实为难得。

为了便于读者使用，每种药物的内容文字均按照以下顺序编排。

- 1.【来源】说明基源植物的名称及所属的科名，以及该植物的入药部位。
- 2.【原植物】原植物的拉丁学名使用《药典》中的记述、植物别名、植物的形态特征、花果期。
- 3.【生境分布】记述该物种的生长环境和分布地区。
- 4.【采收加工】记述该药材的采收时间和产地的加工方法。
- 5.【炮制及饮片】依《药典》2015版描述，按净制、切制、炮炙工艺描述。
- 6.【性味功能】记述该药的性味和功能。
- 7.【主治用法】记述该药物的主要用途。

相信本书对从事中医药教育、科研、生产、检验人员及广大中医药爱好者，一定会颇多良益。

目录

二画

丁香	1
八角茴香	1
人参	2
九里香	3
刀豆	4

三画

三七	4
三白草	5
干姜	6
土木香	7
土贝母	7
土荆皮	8
土茯苓	9
大血藤	9
大枣	10
大腹皮	11
山麦冬	11
山豆根	12
山茱萸	13
山药	14
山银花	14
山柰	15
山楂	16
山慈菇	17
千年健	18
千金子	18
川木香	19

川木通	20
川贝母	21
川牛膝	22
川乌	23
川射干	23
川芎	24
川楝子	25
广枣	25
广金钱草	26
广藿香	27
女贞子	27
小茴香	28
小蓟	29
马齿苋	29
马钱子	30
马兜铃	31
马鞭草	32

四画

王不留行	33
天仙子	33
天门冬	34
天麻	35
天葵子	35
木瓜	36
木香	37
木贼	38
木蝴蝶	38
木鳖子	39
五加皮	40

五味子	40
太子参	41
车前子	42
车前草	43
牛蒡子	43
牛膝	44
升麻	45
片姜黄	46
化橘红	46
月季花	47
丹参	48
乌药	48
乌梅	49
火麻仁	49
巴豆	50
巴戟天	51
水红花子	52
水飞蓟	52

五画

玉竹	53
功劳木	54
甘松	55
甘遂	55
艾叶	56
石韦	57
石菖蒲	58
石榴皮	58
龙眼肉	59
平贝母	60
北豆根	60
北沙参	61
生姜	62
仙茅	62
仙鹤草	63
白芨	64

白术	64
白头翁	65
白芍	66
白芷	67
白附子	67
白茅根	68
白果	69
白前	70
白扁豆	71
白薇	71
白鲜皮	72
白薇	73
瓜蒌	74
冬瓜皮	75
冬虫夏草	75
冬葵果	76
玄参	76
半枝莲	77

六画

老鹳草	78
地肤子	79
地骨皮	80
地黄	81
地榆	81
地锦草	82
亚麻子	83
西河柳	84
西洋参	84
百合	85
百部	86
当归	87
肉豆蔻	88
肉苁蓉	89
肉桂	89
竹节参	90

延胡索	91
合欢皮	92
关黄柏	92
决明子	93
灯心草	94
防己	95
防风	95
红豆蔻	96
红花	97
红芪	97

七画

麦冬	98
远志	99
赤小豆	100
赤芍	101
芫花	102
花椒	102
芥子	103
苍耳子	104
芡实	105
芦根	106
苏木	106
杜仲	107
两面针	108
连钱草	109
连翘	109
吴茱萸	110
牡丹皮	111
何首乌	112
伸筋草	112
佛手	113
皂角刺	114
余甘子	114
谷芽	115
谷精草	116

辛夷	116
羌活	117
沙苑子	118
沙棘	119
诃子	119
补骨脂	120
灵芝	121
陈皮	122
附子	123
忍冬藤	124
鸡血藤	124
鸡冠花	125

八画

玫瑰花	125
青风藤	126
青果	127
青葙子	128
青蒿	128
板蓝根	129
苦地丁	129
苦木	130
苦杏仁	131
苦参	132
苦楝皮	132
苘麻子	133
枇杷叶	134
南鹤虱	135
松花粉	135
刺五加	136
郁李仁	137
虎杖	138
明党参	138
罗布麻叶	139
罗汉果	140
知母	140

委陵菜	141
垂盆草	142
使君子	143
侧柏叶	143
佩兰	144
金果榄	145
金佛草	145
金荞麦	146
金钱草	147
金银花	147
金樱子	148
狗脊	149
肿节风	149
鱼腥草	150
京大戟	151
闹羊花	152
卷柏	152
泽兰	153
泽泻	154
细辛	154

九画

荆芥	156
茜草	156
草乌	157
草豆蔻	158
草果	159
茵陈	159
茯苓	160
苍蔚子	161
葫芦巴	162
胡椒	163
荔枝核	163
南五味子	164
南板蓝根	165
南鹤虱	166

枳壳	166
枳实	167
柏子仁	168
栀子	169
枸杞子	170
枸骨叶	170
柿蒂	171
威灵仙	172
厚朴	173
厚朴花	174
砂仁	174
鸦胆子	175
韭菜子	176
骨碎补	177
香加皮	177
香附	178
香薷	179
重楼	180
禹州漏芦	181
独活	181
胖大海	182
急性子	183
前胡	184
首乌藤	184
姜黄	185
洋金花	186
穿心莲	186
络石藤	187
秦艽	188
珠子参	189
桂枝	190
桔梗	190
桃仁	191
胡桃仁	192

十画

莱菔子	193
莲子	193
莲子心	194
莲房	194
莲须	195
荷叶	195
夏天无	196
夏枯草	196
柴胡	197
鸭跖草	198
积雪草	199
射干	199
徐长卿	200
凌霄花	201
高良姜	201
粉葛	202
粉萆薢	203
益母草	203
益智	204
拳参	204
浙贝母	205
海金沙	206
浮萍	206
桑叶	207
桑白皮	208
桑枝	208
桑寄生	208
桑葚	209
通草	209

十一画

黄芩	210
黄芪	211

黄柏	212
菝葜	213
菟丝子	213
菊花	214
梅花	215
常山	215
野菊花	216
蛇床子	217
银杏叶	217
银柴胡	218
猪牙皂	218
猪苓	219
猫爪草	219
旋复花	220
麻黄	221
麻黄根	222
鹿衔草	222
商陆	223
淡竹叶	224
密蒙花	224
续断	225
绵萆薢	226

十二画

款冬	226
葛根	227
葶苈子	228
楮实子	229
棕板	229
紫花地丁	230
紫苏子	231
紫苏叶	231
紫苏梗	232
紫菀	232

二画

丁香 Dingxiang

◇ 来源

丁香为桃金娘科 (Myrtaceae) 植物丁香的花蕾；母丁香为植物丁香的干燥果实。

◇ 原植物

丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 别名：母丁香（果实）、公丁香（花蕾）。

常绿乔木，高达 10m。叶对生，叶柄长 1 ~ 2cm，两侧有下延叶基；叶长圆状卵形或长圆状倒卵形，革质，长 5 ~ 10cm，宽 2.5 ~ 5cm，先端渐尖或急尖，基部渐狭至叶柄，全缘，两面无毛。聚伞状圆锥花序顶生，花直径约 6mm，芳香；花萼肥厚，绿色后转淡紫色，长管状，先端 4 裂，裂叶三角形；花冠白色，带淡紫色，短管状，4 裂；雄蕊多数，花丝纤细，花药纵裂；子房下位，与萼管合生，花柱粗厚，柱头不明显。浆果红棕色，长方椭圆形，长 1 ~ 1.5cm，有光泽，先端宿存花萼，裂片肥



厚，有香气。花期 6 ~ 7 月。果期 8 ~ 9 月。

◇ 生境分布

生于温暖潮湿的热带地区。原产印度、越南及东非沿海等地，我国海南、广东、广西、云南等省、自治区有栽培。

◇ 采收加工

丁香在 9 月至次年 3 月间，花蕾由青转为鲜红时采收，采下后除去花梗、杂质、晒干。母丁香在果实近成熟时采摘，除去果梗、杂质、晒干。

◇ 炮制及饮片

除去杂质。用时捣碎。

◇ 性味功能

味辛，性温。有温中，降逆，补肾助阳，下气止痛的功能。

◇ 主治用法

用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿，小儿吐乳，腰膝酸痛，阴冷等症。用量 1 ~ 3g。



八角茴香 Bajiaohuixiang

◇ 来源

八角茴香为木兰科 (Magnoliaceae) 植物八角茴香的果实。

◇ 原植物

八角茴香 *Illicium verum* Hook. f. 别名：大茴香、八角、大料（通称）。

常绿乔木，高达 15m。树皮灰褐色或红褐色，有不规则裂纹。叶互生或 3 ~ 6 叶簇生于枝端，叶柄长 1cm；叶片革质，椭圆状倒卵形或椭圆状倒披针形，长 5 ~ 12cm，宽 2 ~ 4cm，先端渐尖或急尖，基部楔形，全缘，稍内卷，上面有光泽，具油点，下面被疏柔毛。花单生于叶腋或近顶生，花梗短；花被 7 ~ 12，排成数轮，覆瓦状排列，内轮粉红色至深红色；雄

蕊多数，排成1~2轮；心皮8~9，离生；子房长约2mm，花柱短于或近等长于子房。果实由8个骨突果放射排列成八角形的聚合果，直径3.5~4cm，红褐色或淡棕色，果柄弯曲呈钩状，长1~3cm，骨突果扁平，先端钝尖或钝，成熟时由腹缝线裂开。种子1，扁卵形，红褐色，表面有光泽。花期4~5月。果期6~7月。

◇ 生境分布



生于温暖、湿润的山谷中。栽培或野生。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南等省区。

◇ 性味功能

味辛，性温。有温中散寒，理气止痛的功能。

◇ 主治用法

用于胃寒呕吐，食欲不振，疝气腹痛，肾虚腰痛。用量3~6g。



人参 Renshen

◇ 来源

人参为五加科 (Araliaceae) 植物人参的根。

◇ 原植物

人参 *Panax ginseng* C.A.Mey. 别名：园参（栽培品），山参（野生品）。

多年生草本，高30~60cm。主根肉质，圆柱形或纺锤形，有分枝，淡黄色，须根细长，有小疣状物；根茎短，每年增生一节，通常称芦头，有不定根。茎单一，圆柱形，绿色。掌状复叶轮生茎端，常1年生者为1片三出复叶，2年生为1片五出复叶，3年生为2片五出复叶，以后每年增加1片，最长达6片。复叶有长柄；小叶多为5。基部1对较小，长



2~3cm，宽1~1.5cm，上部小叶长4~15cm，宽2~4cm，椭圆形、长椭圆形，先端长渐尖，基部楔形，下延，边缘有细锯齿，上面沿脉有少数刚毛。总花梗长7~12cm，由茎端叶柄中央抽出。伞形花序顶生；花小，多数，淡黄绿色，有小花梗；花萼绿色，5裂；花瓣5；雄蕊5；子房下位，2室；花柱2，离生。核果浆果状，扁球形，熟时鲜红色。种子白色，扁卵圆形。花期6~7月。果期7~9月。

◇ 生境分布

生于海拔数百米的阴湿山地落叶阔叶林或针叶阔叶混交林下。野生于黑龙江、吉林、辽宁及河北北部，现吉林、辽宁栽培甚多，北京、河北、山西也有引种栽培。

◇ 采收加工



秋季挖取生长5~7年的园参或野山参，晒干，前者称“生晒参”，后者称“生晒山参”。经水烫，扎孔浸糖后干燥，称“白糖参”；蒸制后晒干或烘干，称“红参”。

◇ 炮制及饮片

生晒参：润透，切薄片，干燥。

生晒山参：用时粉碎或捣碎。

红参：润透，切薄片，干燥或用时捣碎。

◇ 性味功能

味甘、微苦，性温。有大补元气，益肺补脾，生津养血，安神的功效。

◇ 主治用法

用于体虚欲脱，气短喘促，自汗肢冷，精神倦怠，食少吐泻，气虚作喘，久咳，津亏口渴，失眠多梦，惊悸健忘，阳痿，尿频，一切气血津液不足等。用量1.5~9g，大量15~30g，文火另煎兑服。反藜芦，畏五灵脂，均不宜同用。

九里香 Jiulixiang

◇ 来源

九里香为芸香科(Rutaceae)植物九里香和千里香的干燥叶和带叶嫩枝。

◇ 原植物

1. 千里香 *Murrayapaniculata*(L.)Jack 别名：七里香，九秋香，七路香。

常绿灌木或小乔木，高1~3m。树皮及枝灰白色或黄灰色，当年生枝条绿色。单数羽状复叶互生，叶轴无毛，小叶3~7(~9)，小叶柄短，小叶卵形或卵状披针形，长2~7cm，宽1~3cm，先端长渐尖，稀短尖，基部楔形，常偏斜，全缘，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色。聚伞花序腋生或顶生，花大，芳香。萼片5，卵形；花瓣5，长圆形，白色，散生淡黄色半透明油点；雄蕊10，长短不一，着生于花盘周围，药隔背部无腺体。；子房2室，花柱细长，柱头头状。浆果卵形或卵圆形，长1~2cm，宽0.5~1.4cm，熟时朱红色，表面密布油腺点。种子1~2，种子有绵质毛。花期4~9月或秋冬季。果期9~11月。

2. 九里香 *Murrayaexotical*L. 别名：红奶果，

山桔子，夜来香。

形态似千里香，但叶片倒卵形，顶端钝或圆，叶轴微被细柔毛；药隔背部通常有细小腺点2颗。

◇ 生境分布

九里香生海拔128~1200米干旱旷野或灌丛中，在滇南栽培作绿篱，分布于台湾、福建、广东、广西、贵州等省区。千里香生于低丘陵、山地或密林中或栽培，分布于福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南等省区。

◇ 采收加工

叶全年可采，于阴凉处阴干。

◇ 炮制及饮片

除去杂质，切碎。

◇ 性味功能

味辛、苦，性温。有小毒。有行气止痛，活血散瘀的功能。

◇ 主治用法

用于胃痛，风湿痛，跌打肿痛，风湿骨痛，牙痛，破伤风，流行性乙型脑炎，蛇虫咬伤，局部麻醉。用量6~12g。



刀豆 Daodou

◇ 来源

刀豆为豆科 (Leguminosae) 植物刀豆的干燥成熟种子。

◇ 原植物

刀豆 *Canavaliaglabrata*(Jacq.)DC.

一年生缠绕状草质藤本，长可达数米，无毛或稍被毛。三出复叶，叶柄长 7 ~ 15cm；顶生小叶片通常宽卵形，长 8 ~ 20cm，宽 5 ~ 16cm，顶端渐尖，基部宽楔形或近圆形，全缘，两面无毛，侧生小叶基部圆形，偏斜。总状花序腋生，花常 2 ~ 3 朵簇生于花序轴上；萼管钟状，稍被毛，上唇大，具 2 裂齿，下唇有 3 裂齿，卵形；花冠蝶形，淡红色或淡紫色，长 3 ~ 4cm，旗瓣宽椭圆形，顶端凹入，基部具不明显的耳及宽爪，翼瓣和龙骨瓣均弯



曲，具向下的耳；雄蕊 10，合生，对着旗瓣的 1 枚基部稍离生；子房线状，具短柄，有疏长硬毛；胚珠多数。荚果线形，扁而略弯曲，长 10 ~ 35cm，宽 3 ~ 6cm，先端弯曲或钩状，边缘有隆脊。种子 10 ~ 14 粒，种子椭圆形、长椭圆形或肾形，种皮粉红色、红色或褐色，种脐约为种子全长的 3/4。花期 6 ~ 9 月，果期 8 ~ 11 月。

◇ 生境分布


栽培于气候温暖地带。分布于江苏、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、湖南、广东、广西、陕西、四川等省区。

◇ 炮制及饮片

除去杂质，用时捣碎。

◇ 性味功能

味甘，性温。有温中下气，益肾补元的功能。



三画

三七 Sanqi

◇ 来源

三七为五加科 (Araliaceae) 植物三七的根。

◇ 主治用法

用于虚寒呃逆，呕吐，肾虚腰痛，痰喘。
用量 4.5 ~ 9g。

◇ 原植物

三七 *Panaxnotoginseng*(Burk.)F.H.Chen 别名：参三七、田七（通称）。

多年生草本，高达 60cm。根状茎短；主根肉质，倒圆锥形或圆柱形，长 2 ~ 5cm，宽 1 ~ 3cm，棕黄色或暗褐色，有疣状突起和分枝。茎单一，近圆柱形，有纵条纹。掌状复叶 2 ~ 5 轮生于茎顶；叶柄长 4 ~ 10cm，基部有多数披针形或卵圆形托叶状附属物；小叶 5 ~ 7，

膜质，长椭圆形或倒卵状椭圆形，长8~10cm，宽2.5~3.5cm，先端渐尖或长渐尖，基部圆楔形，稍偏斜，下延，边缘有细锯齿，上面脉上有刚毛；小叶柄长约2cm。伞形花序单生于茎顶，花小，数朵，淡黄绿色，总花梗长15~30cm，小花梗长约1cm，基部有多数鳞片状苞片；花萼5齿裂；花瓣5，卵圆形，先端尖；雄蕊5，花药纵裂；子房下位，2室；花柱2。浆果，肾形，熟时红色。种子扁球形。花期6~8月。果期8~10月。

◇ 生境分布

生于山坡丛林下。分布于福建、浙江、江西、广东、广西、四川等省区。今野生者少见，现云南南部和广西南部多有栽培。

◇ 采收加工



秋季开花前采收栽培3年以上的植株，除去茎叶及泥土，剪下芦头、侧根及须根，分别晒干。支根习称“筋条”，芦头（茎基）习称“剪口”。

◇ 炮制及饮片

三七粉：取三七，洗净，干燥，碾细粉。

◇ 性味功能

味甘、微苦，性温。有散瘀止血，消肿定痛的功能。

◇ 主治用法

用于吐血，咯血，衄血，便血，血痢，崩漏，产后血晕，瘀血胸腹刺痛，跌扑肿痛，外伤出血，痛肿。用量1~3g，研末；或水煎服，3~9g。外用适量，研末敷，或磨汁涂。孕妇慎服。



三白草 Sanbaicao

◇ 来源

三白草为三白草科（Saururaceae）三白草的干燥地上部分。

◇ 原植物

三白草 *Saururus chinensis* (Lour.) Baill. 别名：过塘藕，白水鸡，三点白。

多年生草本，高30~80cm。根状茎较粗，

白色，茎直立，下部匍匐状。叶互生，纸质，叶柄长1~3cm，基部与托叶合生为鞘状，稍抱茎。叶卵形或卵状披针状形，长5~15cm，宽3~6cm，先端渐尖或短尖，基部心形或耳形，全缘，两面无毛，基出脉5。总状花序顶生，1~3枝，花序有2~3片乳白色叶状总苞；花小，无花被，生于苞片腋内；雄蕊6，花丝与花药等长；雌蕊由4个合生的心皮组成，子房上位，圆形，柱头4，向外卷曲。果实分裂为4个分果片，分果近球形，表面多疣状突起，不开裂，种子球形。



花期6~7月。果期8~9月。

◇ 生境分布

生于沟边、溪畔或沼泽等低湿处。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南、山东及长江流域和以南各省区。

◇ 采收加工

四季均可采挖全草；根茎秋季采挖，洗净，晒干或鲜用。

◇ 炮制及饮片

除去杂质，洗净，切段，晒干。

◇ 性味功能

味甘、辛，性寒。有清热利尿，解毒消肿的功能。

◇ 主治用法

用于尿道感染，尿路结石，肾炎水肿，黄疸，脚气，白带过多，支气管炎。外用于疔疮痈肿，皮肤湿疹。用量15~30g。外用鲜品适量捣烂敷于患处。

干姜 Ganjiang

◇ 来源

干姜为姜科(Zingiberaceae)植物姜的干燥根茎。

◇ 原植物

姜 *Zingiber officinale* Rosc. 别名：药姜

多年生草本，高40~100cm。根状茎横走，肥厚，扁平，具分枝，断面黄白色，具辛辣味。叶2列，无柄，具抱茎叶鞘；叶舌膜质，长2~4mm；叶片披针形至条状披针形，长15~30cm，宽约2cm，先端渐尖，基部渐窄，光滑无毛。花亭单独从根茎抽出，直立，长15~25cm，被覆瓦状排列的鳞片；穗状花序卵形或椭圆形，花密，长4~5cm；苞片淡绿色，卵圆形，长约2.5cm，先端具硬尖，覆瓦状排列；花冠黄绿色，管长2~2.5cm，裂片披针形，长不及2cm；唇瓣中央裂片矩园状倒卵形，短于花冠裂片，具紫色条纹及淡黄色斑点，侧裂片卵形，长约6mm，具紫色边缘；雄蕊1；子房3室，无毛。花期7~8月，果期12月至翌年1月。

◇ 生境分布

原产亚洲热带，我国除东北外，大部分地区有栽培。

◇ 采收加工

冬至霜降前采挖根茎，除去茎叶须根，洗净晒干或微火烤干。炮姜是将干姜切成小块，放锅内炒至外面棕黄色，断面棕褐色并发泡鼓起，喷洒少许清水取出晾干。干姜搓去外皮为去皮干姜。

◇ 炮制及饮片

干姜除去杂质，略泡，洗净，润透，切厚片或块，干燥。

姜炭取干姜块，炒至表面黑色、内部棕褐色。

炮姜取洁净河砂置锅内，一般用武火炒热后，加入净干姜，不断翻动，烫至表面鼓起，表面棕褐色，取出，筛去河砂。

◇ 性味功能

味辛，性热。有温中散寒，回阳通脉，温肺化饮的功能。

◇ 主治用法

用于脘腹冷痛，肢冷脉微，痰饮喘咳。用量3~9g。



土木香 *Tumuxiang*

◇ 来源

土木香为菊科(Compositae)植物土木香干燥根。

◇ 原植物

土木香 *Inula helenium* L. 别名: 祁木香, 新疆木香。

多年生高大草本, 高1~2m, 全株密生短柔毛。主根肥大, 侧根多, 圆柱形至长圆锥形, 有香气, 深棕色。基生叶阔大, 有长柄; 广椭圆形或圆状披针形, 长达40cm, 宽达10~18cm, 先端锐尖, 基部渐窄, 下延成翅状, 边缘有不整齐锯齿, 上面密生白色或淡黄色绒毛; 茎生叶较小, 无柄; 叶长椭圆形, 长10~30cm, 宽5~14cm, 基部心形, 半抱茎。头状花序腋生, 数个排列成伞房状, 直径5~8cm, 总苞半球形, 总苞片5~10层, 外层苞片叶质, 长1~1.5cm, 有茸毛, 内层干膜质, 较外层长。花黄色, 边花1层, 为舌状



雌花, 长2~3cm, 先端3齿裂; 中央管状花两性, 花药基部有长尾。瘦果有4~5棱, 冠毛浅灰白色, 长约1cm。花期5~7月。果期7~9月。

◇ 生境分布

生于河边、田边及河谷等潮湿处。分布于东北、华北及陕西、甘肃、新疆、河南、浙江、四川等省、自治区。多有栽培。

◇ 采收加工

秋末挖根, 除去残茎, 泥沙, 截断, 较粗的纵切成瓣, 晒干。

◇ 炮制及饮片

除去杂质, 洗净, 润透, 切片, 晒干。

◇ 性味功能

味辛、苦, 性温。有健脾和胃, 调气解郁, 止痛安胎的功能。

◇ 主治用法

用于胸腹胀满疼痛, 慢性胃炎, 胃肠功能紊乱, 呕吐泄泻, 慢性肝炎, 痢疾里急后重, 蛔虫病等症。用量3~10g。多入丸散服。



土贝母 *Tubeimu*

◇ 来源

土贝母为葫芦科(Cucurbitaceae)植物土贝母的干燥块茎。

◇ 原植物

土贝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet. 别名: 大贝母、假贝母。

多年生攀援草本, 鳞茎近球形, 肉质, 白色, 由几个至十余个肥厚鳞叶组合而成。茎细长长达3m, 顶端卷须单一或分叉。叶互生, 叶

柄长1~2cm; 叶片卵状近圆形, 长5~10cm, 宽4~9cm, 掌状5~7深裂, 裂片再3~5浅裂, 基部心形, 边缘有浅裂状锯齿, 基部裂片顶端有白色腺体1~2对, 两面有毛。花单性, 雌雄异株; 腋生圆锥花序排列疏散, 花梗细长柔弱; 雄花直径约1.5cm; 花黄绿色, 花冠与花萼相似, 基部合生, 上部5深裂, 裂片窄长, 先端尾尖; 雄蕊5, 花丝1个分离, 其余4个基部成对连合; 子房下位, 3室, 花柱3, 柱头6。蒴果圆柱形, 长1.5~2.5cm, 成熟时顶端盖裂。种子6, 棕黑色, 斜方形, 先端有膜质翅。花期6~7月。果期8~9月。

◇ 生境分布

生于山坡、林下或草丛中。多有栽培。分布于辽宁、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南、山东、云南等省、自治区。

◇ 采收加工

秋季采挖鳞茎，剥下肥厚的白色鳞叶，洗净，煮至无白心时取出，晒干。

◇ 炮制及饮片

除去杂质，用时打碎。



◇ 性味功能

味苦，性微寒。有清热解毒，散结消肿及抗肿瘤的功能。

◇ 主治用法

用于乳痈瘰癧，乳癌，乳腺炎，颈淋巴结结核，慢性淋巴结炎，肥厚性鼻炎，痰核，疮疡肿毒，蛇虫毒。用量4.5~9g。外用于外伤出血。用量9~30g。外用适量，研末敷或熬膏摊贴。



土荆皮 *Tujingpi*

◇ 来源

土荆皮为松科 (Pinaceae) 植物金钱松的干燥根皮或近根树皮。

◇ 原植物

金钱松 *Pseudolarix amabilis* (Nelson) Rehd.

落叶乔木，高20~40m。茎干直立，枝轮生，平展；叶在长枝上螺旋状散生，在短枝上15~30片簇生，呈辐射状。叶线形，长3~7cm，宽1~2mm，先端尖，基部渐狭，下面沿中脉有2条气孔带，秋后呈金黄色。花单性，雌雄同株；雄花柔荑状，下垂，黄色，数个或数十个聚生于短枝顶端，雌球花单生于



短枝顶端，苞鳞大于珠鳞，珠鳞的腹面基部有胚珠2。球果卵圆形，直立，有短柄。种鳞木质，广卵形至卵状披针形，先端微凹或钝尖，基部心形，成熟后脱落；苞鳞短小；种翅稍厚。花期4~5月。果期10~11月。

◇ 生境分布

喜生于向阳处。分布于江苏南部、浙江、福建北部、安徽南部、江西、湖南及湖北西部、广东等。

◇ 采收加工

多于5月剥取根皮或近根树皮，晒干。

◇ 炮制及饮片

洗净，略润，切丝，晒干。

◇ 性味功能

