



国家护士(师)资格考试



直通车系列

2018

护理学(护师)考试 易混易错2000题

主编 韩燕 贺静

高含金量

高频考点全覆盖, 含历年真题

高针对性

2000个易混易错知识点深度剖析(含真题)

高附加值

赠送《考试宝典》体验卡

高含金量+高针对性+高附加值=高通过率

中国医药科技出版社

国家护士（师）资格考试直通车系列

2018

护理学（护师）考试 易混易错 2000 题

主编	韩燕	贺静			
编者	巩莹	赵剑	刘杰		
	田峰	门彤	潘盼		
	田娟	张婷	曹阳		
	沈星星	梁轶群			
组织	覃丽洁	杨丽芬			

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为国家护士(师)资格考试直通车系列图书之一,全书共20套单元测试卷,每套测试卷的题型划分均按考试标准进行,试题紧扣考试大纲,全书依托于《考试宝典》的海量题库和强大的考生后台数据,选取2000道考生易错易混淆知识点试题,由名师对易错知识点进行深度剖析,对易混淆知识点试题进行对比解析,使考生更容易去区分、掌握这些易错易混淆的知识点,提高考生做题正确率。

图书在版编目(CIP)数据

2018 护理学(护师)考试易混易错2000题 / 韩燕,贺静主编. —北京:中国医药科技出版社,2017.7

国家护士(师)资格考试直通车系列

ISBN 978-7-5067-9275-2

I. ①2… II. ①韩… ②贺… III. ①护理学-资格考试-习题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第087670号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm^{1/16}

印张 15

字数 377千字

版次 2017年7月第1版

印次 2017年7月第1次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-9275-2

定价 35.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

护理学（护师）考试是为贯彻原人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年正式开始实行。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，我们特组织有关专业教师编写了《2018 护理学（护师）考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取 2000 道考生易错、易混淆知识点试题，由名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点，特别是本书包含了部分历年真题中易混、易错试题，供考生参考复习。

《2018 护理学（护师）考试易混易错 2000 题》全书的亮点：

1. 专业的编写委员会。编写成员均是在高校任职的一线教师兼在医院任职，对护理学（护师、主管护师）专业技术资格考试有着十多年的教学、培训经验。特别感谢西安交通大学医学院附属红会医院及广西科技大学等单位参与编写本书的各位老师。

2. 试题的含金量高。全书紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。

3. 解析全面详细、举一反三。

4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

预祝各位考生，搭乘本“直通车”，顺利通过考试。

编 者
2017 年 3 月

目 录

单元一	1
单元二	16
单元三	30
单元四	44
单元五	57
单元六	68
单元七	80
单元八	91
单元九	103
单元十	114
单元十一	125
单元十二	136
单元十三	148
单元十四	159
单元十五	170
单元十六	182
单元十七	192
单元十八	204
单元十九	214
单元二十	224

单元一

一、A1/A2 型题

1. 新生儿期是指
 - A. 自出生脐带结扎到 1 周岁
 - B. 自受孕到出生脐带结扎时
 - C. 自出生脐带结扎开始到满 28 天
 - D. 自出生后第一天到生后第 30 天
 - E. 自出生后第一天到生后第 40 天
2. 病人, 近 1 周来感乏力、食欲不振、巩膜黄染, 医嘱要求查碱性磷酸酶, 应何时取血
 - A. 饭前
 - B. 饭后 2 小时
 - C. 即刻
 - D. 睡前
 - E. 晨起空腹时
3. 性兴奋时润滑阴道口的分泌物来自于
 - A. 那氏腺
 - B. 前庭大腺
 - C. 尿道旁腺
 - D. 宫颈分泌物
 - E. 阴道黏膜腺体
4. 病人, 1 周前行胃大部切除术, 术后持续高热不退, 痰多, 黄色黏稠, 不易咳出, 双肺底满布湿啰音, 疑肺炎, 需作痰培养。以下叙述不正确的是
 - A. 应用多贝尔液及清水漱口后留取
 - B. 嘱病人做深呼吸后用力咳嗽
 - C. 应准备广口的无菌培养瓶
 - D. 应即刻留取痰标本
 - E. 应立即送检
5. 能兴奋体温调节中枢, 具有升高体温作用的激素是
 - A. 雌激素
 - B. 孕激素
 - C. 雄激素
 - D. 促卵泡素
 - E. 促黄体生成素
6. 病人, 女, 2 岁。白血病, 化疗过程中因口腔溃疡需做咽拭子培养, 采集标本部位应选
 - A. 口腔溃疡面
 - B. 两侧腭弓
 - C. 舌根部
 - D. 扁桃体
 - E. 咽部
7. 乙肝第一次接种的年龄是
 - A. 出生时
 - B. 1 个月
 - C. 2 个月
 - D. 3 个月
 - E. 4 个月
8. 肺炎球菌肺炎病人咳出的痰液为
 - A. 白色泡沫痰
 - B. 脓绿色痰
 - C. 铁锈色痰
 - D. 红色胶冻样痰
 - E. 脓痰放置后分三层
9. 病人, 男, 80 岁。平素体健, 社区医生为其查体测量血压结果为 140/60mmHg, 心率 59 次/分, 律齐, 心尖部偶可闻及第三心音, 呼吸 18 次/分。请问该检查结果中哪项的病理意义最大
 - A. 呼吸频率加快
 - B. 收缩压升高
 - C. 出现异常心音
 - D. 心率低于正常
 - E. 脉压增大
10. 全胃肠外营养 (TPN) 支持病人可能发生的最严重的代谢并发症是
 - A. 高钾血症
 - B. 低钾血症
 - C. 肝功能异常
 - D. 高血糖高渗性非酮性昏迷
 - E. 高氨血症
11. 如病人咳出的痰液有恶臭味提示
 - A. 肺炎链球菌
 - B. 肺炎克雷伯杆菌
 - C. 铜绿假单胞菌
 - D. 支原体
 - E. 厌氧菌
12. 抗休克治疗时, 下列哪项药物对改善肾缺

血有利

- A. 去甲肾上腺素
- B. 肾上腺素
- C. 小剂量多巴胺
- D. 麻黄碱
- E. 去氧肾上腺素

13. 产生第一心音的主要机制是

- A. 主动脉瓣、肺动脉瓣关闭
- B. 主动脉瓣、肺动脉瓣开放
- C. 二尖瓣、三尖瓣关闭
- D. 二尖瓣、三尖瓣开放
- E. 心房、心室肌收缩

14. 下列关于 SLE 的说法错误的是

- A. 盘状红斑狼疮可发展为 SLE
- B. 大多有皮肤损害
- C. 紫外线可使皮肤症状恶化
- D. 妊娠期病情好转
- E. 肾损伤常见

15. 心前区疼痛最常见的原因

- A. 高血压病
- B. 心绞痛和心肌梗死
- C. 心脏瓣膜病
- D. 心律失常
- E. 心力衰竭

16. SLE 病人应用糖皮质激素时，下列哪项不正确

- A. 维持用药时间较长
- B. 通常采用泼尼松
- C. 病情好转后缓慢逐渐减量
- D. 每日或隔日顿服
- E. 用药剂量应逐渐加大

17. 进行电复律治疗时，护士操作配合不妥的是

- A. 使病人仰卧于绝缘床上
- B. 撤去心电监护仪
- C. 电极板均匀涂抹导电糊
- D. 电极板紧贴病人皮肤
- E. 除颤前医护人员远离床单位

18. 病人，女，32 岁。有系统性红斑狼疮 7 年，一直服用药物治疗，最近主诉视力下降，可能因为服用了

- A. 阿司匹林
- B. 吲哚美辛
- C. 抗疟药
- D. 布洛芬
- E. 地塞米松

19. 急性感染性多发性神经根炎最危险的并发症是

- A. 心肌炎
- B. 心力衰竭
- C. 吞咽困难
- D. 呼吸肌麻痹
- E. 肺部感染

20. 病人，男，35 岁。1 周前受凉后出现发热，体温 37.8℃，咽痛，颌下淋巴结肿大，轻度心悸、气短，伴关节疼痛，以肩、肘、腕为主，血沉 85mm/h，血白细胞 $10.9 \times 10^9/L$ ，免疫学检查异常，可能的诊断是

- A. 风湿性心脏病
- B. 风湿性关节炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 风湿热
- E. 类风湿关节炎

21. 1860 年南丁格尔创建世界上第一所正式的护士学校的地点是

- A. 美国的纽约
- B. 英国的伦敦
- C. 日本的东京
- D. 法国的巴黎
- E. 德国的柏林

22. 下列哪一项不是生活中毒的常见原因

- A. 谋害
- B. 自杀
- C. 成瘾
- D. 生产农药时不注意防护
- E. 误服毒物

23. 外科临床最常见的脱水类型是

- A. 高渗性脱水
- B. 低渗性脱水
- C. 慢性脱水
- D. 等渗性脱水
- E. 原发性脱水

24. 急性中毒首先采取的措施是

- A. 清除尚未吸收的毒物
- B. 促进体内已吸收的毒物排出
- C. 应用特效解毒剂
- D. 对症治疗
- E. 迅速脱离中毒环境

25. 上消化道出血病人的粪便可呈

- A. 脓血样
- B. 果酱样
- C. 黏液便
- D. 柏油样
- E. 鲜血便

26. 有机磷中毒时, 下列哪一项不符合毒蕈碱样表现

- A. 肌力减弱
- B. 呕吐、腹痛、腹泻
- C. 瞳孔针尖样缩小
- D. 心率减慢
- E. 多汗

27. 男性, 25 岁, 因高热 2 日未能进食, 自诉口渴、口干、尿少色黄。查体: 口舌干燥, 皮肤弹性差, 眼窝凹陷。实验室检查: 尿比重 1.028, 血清钠浓度为 155mmol/L。考虑病人出现

- A. 等渗性脱水
- B. 低渗性脱水
- C. 轻度高渗性脱水
- D. 中度高渗性脱水
- E. 重度高渗性脱水

28. 有机磷杀虫剂中毒引起昏迷时, 最佳的解毒治疗方案是

- A. 阿托品
- B. 碘解磷定或氯磷定
- C. 碘解磷定 + 阿托品
- D. 纳洛酮
- E. 尼可刹米 (可拉明)

29. 正常成年人每日需要氯化钠

- A. 3g
- B. 3~4g
- C. 5~9g
- D. 10~12g
- E. 12~15g

30. 肺癌病人进行纤维支气管镜检查后不能立即喝水, 是为了防止

- A. 呕吐
- B. 喷嚏
- C. 呃逆
- D. 误吸
- E. 咳嗽

31. 休克期相当于

- A. 微循环收缩期
- B. 微循环痉挛期
- C. 微循环扩张期
- D. 微循环衰竭期
- E. 微循环代偿期

32. 关于医院获得性肺炎, 哪项不正确

- A. 多继发于有各种原发疾病的危重病人, 治疗困难
- B. 革兰阳性球菌所占比例最高, 常为混合感染

C. 耐药细菌日益增多

D. 一些非致病菌亦常导致医院获得性肺炎

E. 在医院内感染的肺炎

33. 生理反射分为浅反射和深反射, 深反射包括

- A. 角膜反射
- B. 腹壁反射
- C. 跖反射
- D. 膝腱反射
- E. 肛门反射

34. 病人, 男, 57 岁。因绞窄性肠梗阻行“回肠部分切除术”, 术后 4 天病人出现以脐周最为明显的腹痛, 腹腔引流管间断引出血性液每天约 200ml。体检: T 38.7℃, R 22 次/分, P 95 次/分, BP 135/76mmHg。腹胀, 脐周中度压痛, 未达 1 级肿块, 肠鸣音弱。血常规: 白细胞 $13.7 \times 10^9/L$, 中性粒细胞比例 0.83。关于该病人的护理, 以下不正确的是

- A. 取低半坐卧位
- B. 予全胃肠外营养
- C. 充分负压引流
- D. 如行灌洗, 应用等渗盐水
- E. 若引流管堵塞, 应高压冲洗

35. 有关骨盆入口平面的说法, 下列正确的是

- A. 是骨盆的最小平面
- B. 呈纵椭圆形
- C. 是真假骨盆的分界面
- D. 是真骨盆的出口
- E. 由两个不在同一平面的三角形组成

36. 关于肺炎链球菌肺炎的临床表现, 下列哪项是错误的

- A. 最常见的症状是突发的寒战、发热、咳嗽、咳痰与胸痛
- B. 咳痰呈红棕色胶冻状
- C. 可出现呕吐、腹痛、腹泻
- D. 严重者可出现昏迷
- E. 可出现发绀与口周疱疹

37. 终止室性心动过速的发作, 首先应用的药物为

- A. 利多卡因
- B. 卡托普利
- C. 硝苯地平
- D. 呋塞米
- E. 美托洛尔

38. 最常见的成人肺结核是
- 原发型肺结核
 - 血行播散型肺结核
 - 浸润型肺结核
 - 慢性纤维空洞型肺结核
 - 结核性胸膜炎
39. 下列关于骨盆底组织的说法, 错误的是
- 骨盆底由多层肌肉和筋膜组成
 - 骨盆底封闭了骨盆的出口
 - 骨盆底有承载和支持盆腔脏器的作用
 - 会阴不属于骨盆底的一部分
 - 骨盆底间有尿道、阴道和直肠通过
40. 某病人, 72 岁, 1 个月来大便带血, 消瘦, 拟行直肠镜检查。应采用的卧位是
- 膝胸卧位
 - 左侧卧位
 - 截石位
 - 蹲位
 - 平卧位
41. 中暑高热的首选治疗原则是
- 迅速降温
 - 治疗脑水肿
 - 防治并发症
 - 纠正缺氧
 - 饮用冰水或饮料
42. 毛细血管搏动征可见于
- 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
 - 主动脉瓣狭窄
 - 主动脉瓣关闭不全
 - 三尖瓣狭窄
43. 周围神经病人感觉障碍的特点是
- 末梢型感觉障碍
 - 节段型感觉障碍
 - 传导束型感觉障碍
 - 交叉型感觉障碍
 - 皮质型感觉障碍
44. 尿常规检查的标本采集不正确的是
- 盛尿的容器要清洁
 - 留取尿量以 100 ~ 200ml 为宜
 - 查肾脏疾病以留取晨尿最佳
 - 女病人避免白带混入尿液内
 - 月经期取后段尿
45. 医疗行为中, 医务人员有责任为病人的隐私保密, 这主要是体现医学伦理原则中的
- 不伤害原则
 - 有利原则
 - 尊重原则
 - 公正原则
 - 人道主义原则
46. 急性病期病人对疾病缺乏思想准备易产生哪种情绪
- 恐惧
 - 焦虑
 - 沮丧
 - 消极
 - 悲观
47. 护患关系是指在护理工作中, 护理人员对护理服务对象的躯体、心理及社会的需求做出反应, 并进行
- 全方位的影响因而建立起的一种相互依赖的关系
 - 全方位的影响因而建立起的一种相互关怀的关系
 - 全方位的照顾因而建立起的一种相互支持的关系
 - 全方位的关怀和照顾因而建立起的一种相互影响的关系
 - 全方位的关怀和照顾因而建立起的一种相互依赖的关系
48. 心室颤动的脉搏特征是
- 快而规则
 - 慢而规则
 - 快而不规则
 - 慢而不规则
 - 触不到
49. 对构成犯罪的医务人员要
- 给予道德谴责
 - 舆论压力
 - 免除职务、罚款
 - 赔礼道歉
 - 依法追究刑事责任
50. 男性, 69 岁, 发现前颈部无痛性肿块半年。肿块约杏核大小。质硬, 表面不光滑, 随吞咽上下移动。¹³¹I 扫描为冷结节。首先考虑的疾病是
- 结节性甲状腺肿
 - 甲状腺腺瘤
 - 甲状腺癌
 - 颈部恶性淋巴瘤
 - 颈淋巴结结核
51. 护士不注重病人的主诉或尊严, 引起病人的不满, 属于侵犯病人的
- 知情权
 - 就医权利
 - 生命权和隐私权
 - 安全权
 - 人生权

52. 护理健康教育学属于
- 护理学科
 - 教育学科
 - 人文学科
 - 综合应用学科
 - 交叉应用学科
53. 采集标本的正确方法是
- 若病人正在输液, 为了避免再次穿刺可直接从输液针头抽血
 - 若病人血管暴露不明显, 可尽可能地延长止血带压迫时间, 直至血管暴起
 - 为了便于抽血, 止血带尽可能绑紧
 - 若采血比较费力, 可用手挤压局部组织迫使血液流出
 - 抽得血液后, 应先将针头卸掉, 再将血液沿试管壁徐徐注入试管内
54. 护理健康教育学研究对象是
- 病人及其家属
 - 病人、家属和护士
 - 所有医务人员
 - 病人、家属、社会人群及护士
 - 所有工作人员
55. 慢性阻塞性肺疾病锻炼腹式呼吸的目的是
- 有利于痰液排出
 - 借助腹肌进行呼吸
 - 使呼吸幅度扩大增加肺泡通气量
 - 增加肺泡张力
 - 间接增加肋间肌活动
56. 自我照顾模式是由谁提出的
- 纽曼
 - 佩皮劳
 - 汉斯·塞利
 - 马斯洛
 - 奥瑞姆
57. 肝硬化腹水应用利尿剂治疗无效, 可用
- 螺内酯
 - 氢氯噻嗪
 - 甘露醇
 - 白蛋白
 - 血浆
58. 病人, 女, 28 岁。突发右下腹剧烈腹痛, 伴恶心、呕吐, 诊断为“宫外孕”, 根据马斯洛的需要层次论, 此时首先应保证病人
- 生理的需要
 - 安全的需要
 - 爱与归属的需要
 - 尊重的需要
 - 自我实现的需要
59. 急性白血病化疗诱导缓解后, 病人头痛、呕吐、颈强直, 但不发热, 最可能发生
- 脑出血
 - 脑血栓
 - 中枢神经系统白血病
 - 脑膜炎
 - 蛛网膜下隙出血
60. 自我护理能力训练不包括下列哪项
- 日常生活能力训练
 - 自数脉搏训练
 - 自测血糖定性训练
 - 胸腔闭式引流自我护理训练
 - 戒烟训练
61. 糖尿病急性并发症有
- 糖尿病心血管病变
 - 糖尿病肾脏病变
 - 糖尿病周围神经病变
 - 糖尿病视网膜病变
 - 糖尿病酮症酸中毒
62. 病人, 女, 62 岁。双眼晚期白内障待手术, 在护理过程中, 有效的沟通方式是
- 让病人用点头或摇头回答问题
 - 用手势或面部表情来加强信息传递
 - 让病人用“是”或“不是”回答问题
 - 及时对病人所听到的声响作出解释
 - 必要时用文字进行交流
63. 有机磷中毒中枢神经系统症状, 严重时可发生
- 呼吸肌麻痹
 - 呼吸困难
 - 肺水肿
 - 呼吸中枢衰竭或脑水肿而死亡
 - 抽搐和昏迷
64. 病人, 全心衰竭, 全身重度水肿, 每日钠的摄入量不超过
- 0.3g
 - 0.5g
 - 1g
 - 1.2g
 - 3g
65. 下列有关器官系统发育不平衡性的描述中正确的是

- A. 生殖系统发育较早
B. 神经系统发育较早
C. 淋巴系统到青春期开始发育
D. 皮下脂肪年长时发育较发达
E. 肌肉组织的发育到青春期才加速
66. 下列哪项不是触诊的内容
A. 肢体末梢湿度
B. 心包摩擦音
C. 腹部包块的位置
D. 颈部淋巴结的移动度
E. 心前区震颤
67. 妊娠晚期羊水主要来自于
A. 母体血清经羊膜的透析液
B. 胎儿尿液
C. 胎儿呼吸道黏膜的透析液
D. 胎儿皮肤的透析液
E. 脐带表面的透析液
68. 病人肢体可脱离床面，但不能对抗阻力，肌力为
A. 0 级 B. 1 级
C. 2 级 D. 3 级
E. 4 级
69. 引起 DIC 最常见的原因是
A. 休克 B. 感染
C. 严重创伤 D. 恶性肿瘤
E. 中毒
70. 在严重创伤或感染时，最易受损的器官是
A. 肾 B. 肝
C. 脑 D. 肺
E. 心
71. 下列有关颅底骨折表述不正确的是
A. 颅底骨折时易撕裂硬脑膜形成脑脊液漏
B. 颅底骨折其严重性并不在于骨折本身，而是颅内血肿及脑损伤
C. 颅底骨折不与外界直接相通，一般视其为闭合性骨折
D. 颅底骨折潜在并发症：颅内感染、颅内出血
E. 颅底骨折病人出现脑脊液漏一般在 2 周内愈合

72. 病人，男，55 岁。车祸造成多发性损伤，急救车首先要处理的情况是

- A. 开放性骨折
B. 腹部外伤后肠管脱出
C. 外伤性大出血
D. 颅脑外伤
E. 膀胱破裂

73. 慢性阻塞性肺气肿的危害主要是可导致

- A. 左侧心力衰竭 B. 自发性气胸
C. I 型呼吸衰竭 D. 急性呼吸衰竭
E. II 型呼吸衰竭

74. 病人，1 周前工作时受外伤，今日为清创缝合后 5 天，护士在检查伤口时发现有一针眼发红并且有小脓疱，护士正确的处理方法是

- A. 局部热敷
B. 拆除缝线，置管引流
C. 提前拆去此缝线
D. 70% 乙醇湿敷
E. 拆除缝线，敞开引流

75. 发生心室颤动的病人，应立即采取

- A. 静脉注射利多卡因
B. 同步直流电复律
C. 非同步直流电复律
D. 静脉注射胺碘酮
E. 安装心律转复起搏器

76. 病人，男，20 岁。左足被开水烫伤，疼痛剧烈，局部有水疱，其烧伤面积及深度为

- A. 3.5%，浅 II 度 B. 3.5%，I 度
C. 7%，浅 II 度 D. 4%，深 II 度
E. 3%，I 度

77. 母乳中的乙型乳糖可抑制肠道中

- A. 乳酸杆菌的生长
B. 变形杆菌的生长
C. 大肠埃希菌的生长
D. 白色念珠菌的生长
E. 葡萄球菌的生长

78. 病人，男，30 岁。大面积烧伤 6 小时，转送途中输液 1000ml。入院后监测 CVP 4cmH₂O (0.39kPa)，血压 80/60mmHg，尿量 20ml/h，四肢厥冷。正确的处理是

- A. 减慢输液速度加升压药
- B. 维持原输液速度
- C. 减慢输液, 加利尿剂
- D. 减慢输液速度
- E. 加快输液速度

79. 急性肾衰竭少尿期病人可出现的电解质紊乱是

- A. 低钠血症
- B. 低镁血症
- C. 低钾血症
- D. 高钙血症
- E. 低磷血症

80. 下列哪个部位的肿瘤可出现精神障碍

- A. 中央前回肿瘤
- B. 额叶前部肿瘤
- C. 枕叶肿瘤
- D. 听神经肿瘤
- E. 脑干肿瘤

81. 关于病人自控镇痛方法的叙述中正确的是

- A. 镇痛效果不佳
- B. 无法防止用药过量
- C. 需要在处方下使用
- D. 操作复杂
- E. 力求以最小剂量达到有效效果

82. 脑瘤术后引流管拔出的时间一般为术后

- A. 3~4 天
- B. 5~7 天
- C. 4~5 天
- D. 3~7 天
- E. 4~8 天

83. 治疗 ARDS, 纠正低氧血症, 改善肺泡换气功能的最佳措施是

- A. 吸入 100% 氧气
- B. 维持有效循环
- C. 机械通气, 选用 PEEP
- D. 积极抗感染治疗
- E. 营养支持

84. 可作为肿瘤定性诊断的检查是

- A. CT
- B. B 超
- C. X 线造影
- D. MRI
- E. 病理检查

85. 下列关于甲状腺功能亢进术前药物准备正确的是

- A. 普萘洛尔不能与碘剂合用
- B. 硫脲类药物和碘剂不能合并应用

C. 服用硫脲类药物控制甲状腺功能亢进症状后再进行手术

D. 使用碘剂 2~3 周后, 甲状腺功能亢进症状基本控制便可进行手术

E. 服用普萘洛尔时应每 8 小时给药一次, 术后应继续服用 2~3 周

86. 病人, 男, 38 岁。颈部肿块 2 个月, 无痛, 生长速度快, 位于胸锁乳突肌周围、锁骨上三角处, 肝、脾大, 纵隔淋巴结肿大。应考虑为

- A. 颈部淋巴结化脓性炎
- B. 恶性淋巴瘤
- C. 甲状舌管囊肿
- D. 颈部淋巴结结核
- E. 淋巴结转移癌

87. 病人, 男, 68 岁。因肝癌进行化疗。下列护理措施错误的是

- A. 每周查血常规 1~2 次
- B. 限制饮食, 以防呕吐
- C. 白细胞低于 $3 \times 10^9/L$ 时, 给予升血细胞药
- D. 鼓励病人多饮水
- E. 静脉用药应稀释到要求浓度

88. 病人, 男, 60 岁。肺癌病人, 在护士静脉推注化疗药物阿霉素 20mg + 生理盐水 20ml 的过程中, 不慎将药液漏至血管外。以下哪项处理错误

- A. 停止注射, 拔出针头
- B. 支托痛处
- C. 普鲁卡因注入局部皮下
- D. 局部热敷
- E. 氢化可的松油膏外敷

二、A3 型题

(89~91 题共用题干)

病人, 女, 30 岁。心悸、牙龈出血、头晕、月经量过多, 曾服止血药治疗未愈。近几天因呼吸道感染、发热、牙龈出血严重来医院检查, 诊断为再生障碍性贫血。

89. 经雄激素治疗后, 首先升高的是

- A. 血清铁蛋白
- B. 红细胞计数
- C. 网织红细胞数
- D. 血小板计数
- E. 白细胞计数

90. 鉴别急性白血病和再生障碍性贫血主要的依据是

- A. 胸片检查
- B. 治疗效果
- C. 骨髓象检查
- D. 预后观察
- E. 临床表现

91. 数天后，病人在活动时突然呕吐、意识障碍、头痛、视物模糊，下列护理措施错误的是

- A. 头戴冰帽
- B. 平卧位
- C. 迅速开放静脉
- D. 吸氧
- E. 头部略低，保证脑部供氧

(92~93 题共用题干)

男性，17 岁，学习游泳不慎误入深水区，溺水，经抢救出水，当即发现心搏、呼吸已停。

92. 现场首先的处理是

- A. 送往医院
- B. 打 999 急救电话
- C. 立即抢救，控水，使呼吸道通畅
- D. 立即口对口人工呼吸
- E. 立即胸外心脏按压

93. 下一步处理是

- A. 打 120 急救电话
- B. 送往医院
- C. 立即心肺复苏
- D. 寻找病人家人
- E. 袖手旁观

(94~96 题共用题干)

病人，男，28 岁。因外出春游出现咳嗽、咳白色黏痰伴喘息 1 天入院，体检：体温 36.6℃，脉搏 90 次/分，呼吸 28 次/分，血压 120/80mmHg，在肺部可闻及广泛哮鸣音，既往有哮喘史。

94. 该病人最可能的诊断是

- A. 肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 肺源性心脏病
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

95. 该病人哮喘发作最可能的诱因是

- A. 花粉
- B. 尘螨
- C. 动物的毛屑
- D. 病毒感染
- E. 精神因素

96. 病人因感冒使原有支气管哮喘发作，呼吸困难，有轻微发绀，神志清醒。该病人属于哪种呼

吸困难

- A. 喘息性
- B. 吸气性
- C. 浮浅性
- D. 呼气性
- E. 混合性

三、B 型题

(97~98 题共用备选答案)

- A. 连续 3 次或以上快而规则的房性或交界性期前收缩
- B. 心室内心肌纤维发生快而微弱的不协调颤动，心室完全丧失射血功能
- C. 各种原因引起心脏冲动起源或冲动传导的异常，可引起心脏活动规律发生紊乱
- D. 异位起搏点兴奋性增高，过早发生冲动引起的心脏搏动
- E. 连续 3 次或 3 次以上室性期前收缩

97. 阵发性室上性心动过速是指

98. 期前收缩是指

(99~101 题共用备选答案)

- A. 3 天拆线
- B. 4 天拆线
- C. 5 天拆线
- D. 7 天拆线
- E. 提前拆线

99. 正常会阴切口

100. 会阴切口有感染者

101. 剖宫产后

答案与解析

一、A1/A2 型题

1. C。自胎儿娩出脐带结扎至生后 28 天称新生儿期。故本题选 C。

2. E。不同的血液化验项目，对其标本的采集时间要求不同。如平时检查红细胞、血红蛋白、白细胞以及血小板等随时都可以查。但是，如查肝功能、肾功能、生化检查、葡萄糖耐量试验和血液血清学检查等，则要求病人在第二天清晨空腹时抽血送检。空腹时机体处于基础代谢相对稳定状态，能排除饮食、运动、精神等因素对血液中各种化学成分浓度的影响。故选 E。解题关键：肝功能、肾功

能、血糖检查需要空腹。

3. B。性兴奋时,前庭大腺分泌的这种黏液。

4. D。采集时间以清晨的痰为好。留取痰标本为减少口腔常居菌的污染,应先漱口再从气管深部咳出痰液(非唾液)吐入广口无菌容器内。痰液最好立即送检,以免污染影响检查结果。气管穿刺法主要用于厌氧菌培养。检查结核分枝杆菌时,为提高阳性率应收集24小时痰液。故选D。解题关键:为减少口腔常居菌的污染,应先漱口再从气管深部咳出痰液。

5. B。孕激素能通过中枢神经系统起到升温作用,正常妇女在排卵后基础体温可升高 $0.3 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$,这种基础体温的改变。

6. A。咽部拭子细菌培养能分离出致病菌,有助于白喉、化脓性扁桃体炎、急性咽喉炎等的诊断。咽拭子标本就是用医用的棉签,从人体的咽部蘸取少量分泌物,口腔溃疡者应取溃疡面。故选A。

7. A。乙型病毒性肝炎第一次接种的年龄为出生时。故本题选A。

8. C。①白色泡沫痰:见于慢性气管炎、支气管炎及支气管哮喘而无严重感染时;②脓绿色痰:首先考虑铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)肺炎;③脓痰放置后分三层:肺脓肿病人的痰;④红色胶冻样痰:克雷伯杆菌肺炎;⑤铁锈色痰:肺炎链球菌肺炎。故选C。解题关键:肺炎链球菌肺炎病人咳出的痰液为铁锈样。

9. E。脉压指收缩压与舒张压之差,正常范围是 $30 \sim 40\text{mmHg}$ 。一般大于 60mmHg ,称为脉压增大,小于 20mmHg 称为脉压减小。该病人血压结果为 $140/60\text{mmHg}$,提示脉压增大,故选E。解题关键:凡能影响收缩压和舒张压的因素,都可以影响到脉压。

10. D。最严重的代谢性并发症——非酮性高渗性高血糖性昏迷,常见原因:①单位时间内输入过量葡萄糖;②胰岛素相对不足,临床主要表现为血糖升高、渗透性利尿、脱水、电解质紊乱、中枢神经系统功能受损,甚至昏迷。尤其在老年人,有糖尿病、尿毒症及严重应激状态下,TPN输液太快,糖浓度相对过高时易于发生。故选D。解题关键:肠外营养代谢最严重并发症为非酮性高渗性高血糖性昏迷。

11. E。本题考核对痰液气味的观察,痰液有恶臭味提示厌氧菌感染。

12. C。用于抗休克的血管活性药物种类很多,常用的有:①多巴胺是最常用的血管收缩剂。小剂量,兴奋多巴胺受体具有扩张内脏血管作用;大剂量,收缩外周血管,外周阻力增加。②多巴酚丁胺。③去甲肾上腺素。④垂体后叶素(加压素)。故选C。解题关键:多巴胺是生成去甲肾上腺素的儿茶酚胺的前体,可以改变心排血量的分布,使肾血流量增加,具有双重作用,小剂量扩张内脏血管;大剂量收缩血管,主要为外周血管。

13. C。第一心音的产生机制是二尖瓣、三尖瓣关闭瓣叶突然紧张引起的震动所致,第二心音的产生机制是主动脉瓣、肺动脉瓣关闭引起的瓣膜震动所致。故选C。

14. D。盘状红斑狼疮可分两型:①局限型皮肤损害仅限于颈部以上的皮肤;②播散型皮损累及全身广泛部位的皮肤,播散型容易转变为系统性红斑狼疮。系统性红斑狼疮是一种涉及许多系统和脏器的自身免疫性疾病,由于细胞和体液免疫功能障碍,产生多种自身抗体,可累及皮肤、浆膜、关节、肾及中枢神经系统等。病人多有光敏感,紫外线可使皮肤症状恶化。妊娠可诱发狼疮活动,在非缓解期,应严格避孕。无中枢神经系统、肾脏或其他脏器严重损害、病情处于缓解期达半年以上者,一般可安全妊娠。故选D。解题关键:系统性红斑狼疮是一种自身免疫性疾病。

15. B。心绞痛、心肌梗死是引起心前区疼痛最常见的原因,梗阻性肥厚型心肌病、急性主动脉夹层瘤、心包炎、胸膜炎等均可引起疼痛,心血管神经症亦可引起心前区疼痛,但与精神刺激和环境因素密切相关。

16. E。系统性红斑狼疮病人治疗:糖皮质激素是目前治疗本病的主要药物,适用于急性或暴发性病例,通常采用泼尼松(强的松),每日或隔日顿服。用药原则:起始剂量要足、减量要慢、维持时间要长。故选E。解题关键:糖皮质激素治疗系统性红斑狼疮原则:起始剂量要足、减量要慢、维持时间要长。

17. B。护士在心电复律治疗时应给予病人心电监护,监测病人生命体征,记录病人心电变化,观察QRS波时限及Q-T间期变化,配合抢救工作,以达到相应的治疗目的。故答案B做法错误。

18. C。抗疟药主要适用于盘状红斑狼疮和系统性红斑狼疮的以皮损、关节病变为主要临床表现

者,代表药物主要有氯喹、羟基氯喹、奎宁。其副作用有食欲不振、恶心呕吐、腹泻等胃肠道症状;皮肤瘙痒、湿疹,皮炎及中枢神经系统症状;该药易沉积于视网膜色素上皮细胞,引起视力下降;有降低白细胞、致畸胎等作用。故选 C。解题关键:抗疟药对于患有视网膜病变者、孕妇及严重贫血者禁用。

19. D。呼吸肌麻痹是急性感染性多发性神经根炎最危险的并发症,对此并发症的抢救成功是增加本病治愈率、降低死亡率的关键。

20. D。风湿热是链球菌感染后引起的一种自身免疫性疾病,可累及关节、心脏、皮肤等多系统。临床表现:①前驱症状:咽喉炎或扁桃体炎等上呼吸道感染表现,如发热、咽痛、颌下淋巴结肿大等。②风湿性关节炎:呈游走性、多发性关节炎。以膝、踝、肘、肩等大关节受累为主。③其他:心脏炎、皮下结节、环形红斑和舞蹈病。血沉快,白细胞增多。故选 D。解题关键:风湿热:①前驱症状:发热、咽痛、颌下淋巴结肿大。②风湿性关节炎。③心脏炎、皮下结节、环形红斑和舞蹈病。血沉快,白细胞增多。

21. B。1860 年南丁格尔在英国伦敦创建世界上第一所正式的护士学校。

22. D。生产农药时不注意防护是属于生产性中毒(生产性中毒也可因设备密闭不严等出现中毒),其他属于生活中毒的常见原因,故选 D。

23. D。等渗性脱水为外科病人最常见的缺水类型,常见的原因有:①消化液急性丧失,如大量呕吐和肠痿等。②体液丧失于第三腔隙,如肠梗阻、急性腹膜炎、腹腔内或腹膜后感染、大面积烧伤等。故本题选 D。

24. E。急性中毒的治疗原则:①立即脱离中毒现场;②清除进入人体内已被吸收或尚未吸收的毒物;③如有可能,选用特效解毒药;④对症治疗。故选 E。

25. D。脓血样便,大便中有脓状物质或红色血量覆盖,常见于肛门疾病;果酱样便常见于阿米巴痢疾;黏液便常见于细菌性痢疾及各类肠炎;柏油样便常见于上消化道疾病或全身性疾病导致的上消化道出血,大便隐血(+),无血块;鲜血便常见于下消化道出血。故选 D。

26. A。急性有机磷中毒的毒蕈碱样表现(M样症状):这组症状出现最早,主要是副交感神经末

梢兴奋所致,类似毒蕈碱作用,表现为平滑肌痉挛和腺体分泌增加。临床表现有恶心、呕吐、腹痛、多汗、尚有流泪、流涕、流涎、腹泻、尿频、大小便失禁、心跳减慢和瞳孔缩小;支气管痉挛和分泌物增加、咳嗽、气急,严重病人出现肺水肿。故选 A。解题关键:急性有机磷中毒毒蕈碱样表现平滑肌痉挛和腺体分泌增加;烟碱样症状:肌束颤动、肌力减退、肌痉挛、呼吸肌麻痹;注意两者区别。

27. D。该病人口渴、皮肤弹性差、眼窝凹陷,实验室检查:尿比重 1.028 比正常高,血清钠浓度为 155mmol/L 超过正常值 145mmol/L 符合中度高渗性脱水的特征。故本题选 D。

28. C。有机磷中毒最佳解毒治疗方案是胆碱酯酶复活药与阿托品两药合用:①胆碱酯酶复活药,即碘解磷定,对解除烟碱样毒作用较为明显;②抗胆碱药阿托品,阿托品有阻断乙酰胆碱对副交感神经和中枢神经系统毒蕈碱受体的作用,对缓解毒蕈碱样症状和对抗呼吸中枢抑制有效,但对烟碱样症状和恢复胆碱酯酶活力没有作用。两者合用效果最佳,故选 C。解题关键:有机磷中毒时需胆碱酯酶复活药和抗胆碱药联合应用。

29. C。食盐是人体维持正常生理活动的重要物质。人体细胞中约含氯化钠 0.9%,一般成年人每日需氯化钠的量为 5~9g。

30. D。纤维支气管镜是目前呼吸系统疾病诊断和治疗的主要方法之一。因为检查时需行咽喉局部麻醉,导致病人的吞咽反射减弱,易使食物误入气管造成误吸,因此术后不能立即喝水。故选 D。

31. C。微循环收缩期、微循环扩张期、微循环衰竭期分别对应的是休克代偿期、休克抑制期、休克失代偿期。故本题选 C。

32. B。医院获得性肺炎是指病人在入院时既不存在、也不处于潜伏期,而是在住院 48 小时后发生的感染,也包括出院后 48 小时内发生的肺炎。主要是由于口咽部定植菌误吸引起,目前其耐药细菌日益增多。致病菌中革兰阴性杆菌所占比例最高。故选 B。解题关键:医院获得性肺炎致病菌主要是革兰阴性杆菌。

33. D。角膜反射、腹壁反射、跖反射、肛门反射均属于浅反射,膝腱反射属于深反射。

34. E。术后嘱病人取半卧位,促进引流液排出,A 做法对。禁食,给予全胃肠外营养,B 做法对。密切观察引流管状况,保证引流通畅,给予负

压引流,必要时进行腹腔灌洗,灌洗液要用等渗盐水,若引流管堵塞时用负压吸引堵塞物,因此C、D做法对,E错误,故本题正确答案为E。解题关键:术后重在保证引流管通畅,熟悉引流管的护理要点。

35. C。骨盆入口平面即真假骨盆的交界面,呈横椭圆形,前方为耻骨联合上缘,两侧为髂耻线,后方为骶岬。

36. B。肺炎链球菌肺炎的症状是发病前常有、受凉、醉酒、疲劳、病毒感染和生活在拥挤环境等诱因,可有数日上呼吸道感染的前驱症状。典型表现为起病急骤、畏寒或寒战、高热,体温可在数小时内达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$,呈稽留热,或高峰在下午或傍晚。全身肌肉酸痛,患侧胸痛明显,可放射至肩部,深呼吸或咳嗽时加剧,病人常取患侧卧位。开始时痰少,可带血丝,24~48小时后可呈铁锈色,与肺泡内浆液渗出和红细胞、白细胞渗出有关。重症时有惊厥、谵妄及昏迷等中毒性脑病的表现,较大儿童可见唇部疱疹。故选B。解题关键:肺炎链球菌肺炎多起病急剧,表现为突发高热、咳嗽、胸痛、纳差、疲乏和烦躁不安,咳铁锈色痰。早期可有呕吐,腹痛,腹泻的症状。重症时有惊厥、谵妄及昏迷等中毒性脑病的表现,较大儿童可见唇部疱疹。

37. A。考查学生对于室性心动过速治疗要点的掌握,终止室性心动过速的发作,首先应用的药物为利多卡因或普鲁卡因。

38. C。肺结核可分为四型:原发型肺结核(I型),血行播散型肺结核(II型),浸润型肺结核(III型),慢性纤维空洞型肺结核(IV型),其中原发型肺结核(I型)最常见于小儿,而浸润型肺结核(III型)最常见于成人。故选C。解题关键:原发型肺结核最常见于小儿,浸润型肺结核最常见于成人。

39. D。骨盆底由多层肌肉和筋膜所组成,封闭骨盆出口,承托盆腔脏器。骨盆底的前方为耻骨联合下缘,后方为尾骨尖,两侧为耻骨降支、坐骨升支及骨结节。两侧坐骨结节前缘的连线将骨盆底分为前部:称尿生殖三角,有尿道和阴道通过;后部:称肛门三角,有肛管通过。

40. A。肛门、直肠、乙状结肠镜检查及治疗要采取膝胸卧位。故答案为A。

41. A。降温速度决定病人的预后,通常应在1小时内使直肠温度降至 38°C 左右,常采用的方法是物理降温与药物降温。

42. D。用手指轻压病人指甲末端或以玻片轻压病人口唇黏膜,可使局部发白,当心脏收缩时则局部又发红,随心动周期局部发生有规律的红白交替即为毛细血管搏动征。见于主动脉瓣重度关闭不全或外周毛细血管壁扩张。故选D。解题关键:心脏瓣膜病病人的护理。

43. A。末梢型感觉障碍:表现为袜子或手套型痛觉、温觉、触觉减退,见于多发性周围神经病。

44. E。女病人月经期一般不宜留取小便送检,以免经血混入小便,造成血尿的假象。故选E。解题关键:尿标本采集的方法。

45. C。自主性、知情同意,保护隐私和秘密,尊重原则是指医务人员要尊重病人及其做出的理性决定。

46. B。病人常存在的心理问题有:①焦虑、急躁:由于疾病来得突然,自觉症状明显,病人没有足够的思想准备,因而往往产生紧张及焦虑。故选B。有的病人病情重,害怕疾病恶化,表现出急躁情绪。②恐惧及忧虑:病人对入院后进行的必要诊断方法和综合治疗措施不了解,可产生恐惧和不安心理。部分需要长期治疗的慢性病人也会产生忧虑。③丧失信心:内科疾病病程长,常反复发作,药物疗效差,病人往往对疾病的恢复缺乏信心。解题关键:内科病人的心理护理。

47. D。全方位的关怀和照顾因而建立起的一种相互影响的关系。

48. E。心室颤动(VF)是由于许多相互交叉的折返电活动波引起,其心电图表现为混乱的记录曲线。心室颤动表现为形态、频率及振幅完全不规则的颤动波,频率为 $150\sim 250$ 次/分。颤动波大者为粗颤,颤动波纤细者为细颤。无法分出QRS波、ST段。病人意识丧失,触不到大动脉搏动、无呼吸。故选E。解题关键:心室颤动的特征。

49. E。对构成犯罪行为的医务人员,依法追究刑事责任。

50. C。老年男性,颈部孤立肿块,随吞咽上下移动,质硬,表面不光滑, ^{131}I 扫描为冷结节均提示为甲状腺的恶性肿瘤。故选C。解题关键:颈部肿块的鉴别。

51. C。护士不注重病人的主诉或尊严,引起病人的不满,属于侵权行为(侵犯病人的生命权和隐私权)。

52. D。护理学是一门在自然科学与社会科学理

论指导下的综合性应用学科,是研究有关预防保健与疾病防治过程中的护理理论与技术的科学。它以病人及其家属为研究对象,通过对他们进行有目的、有计划、有评价的教育活动,提高他们的自我保健和自我护理的能力。故选 D。

53. E。采集标本不能从输液针头或输液的同一血管抽血,否则所测结果极不准确。应尽量缩短止血带压迫血管的时间,压迫时间过长,可以使局部静脉扩张、淤血,血液中的某些成分的含量会有所变化。避免人为溶血,办法为:注射器及针头应洁净干燥,止血带不要束缚太紧,针刺时不能使局部组织损伤过多,不能用手挤压局部组织迫使血液流出。抽得血液后,应先将针头卸掉,再将血液沿试管壁徐徐注入试管内,以免用力挤压出或冲击致使红细胞破坏而溶血。

54. A。护理健康教育以病人及其家属为研究对象,对他们进行有目的、有计划、有评价的教育活动,提高其自我保健和自我护理的能力,故选 A。

55. C。本题考核了腹式呼吸的目的,通过加强腹肌训练,可使呼吸阻力减低,肺泡通气量增加,提高呼吸效率。

56. E。纽曼提出健康系统模式;佩皮劳提出人际关系模式;汉斯·塞利提出压力学说;马斯洛提出“人的基本需要层次论”;奥瑞姆提出自我照顾模式。故选 E。

57. C。螺内酯和氢氯噻嗪属于利尿剂,白蛋白和血浆可以提高血浆胶体渗透压。甘露醇属于导泻药,可以通过肠道排出水分。

58. A。马斯洛的需要层次论中生理需要是人类与生俱来的最基本的维持人生命与生存的需要,包括空气、水分、食物、排泄、休息、睡眠等。生理需要位于“金字塔”形需要层次的最底部,是需要首先给予满足的需要。故答案为 A。

59. C。中枢神经系统白血病多发生在疾病的缓解期,出现脑膜和中枢神经系统症状。因化疗药不易透过血-脑屏障,隐藏在中枢神经系统的白血病细胞不能被有效杀死,所以在化疗缓解期出现中枢神经系统症状,最可能是发生了中枢神经系统白血病。

60. E。自我护理能力训练内容有:日常生活能力训练、自数脉搏训练、自测尿糖定性训练、胸腔闭式引流自我护理训练等,戒烟训练不属于自我护理能力训练的范畴,故选 E。

61. E。心血管病变、肾脏病变、神经病变、眼部病变均为糖尿病慢性并发症,只有糖尿病酮症酸中毒为糖尿病急性并发症。

62. D。因病人为双眼白内障手术,暂时不能看见事物,用手势或面部表情和文字是无法进行交流沟通的。看不见东西后对发出的声响很敏感,护士应及时作出解释,为有效的沟通方式,故正确答案为 D。解题关键:掌握沟通技巧。

63. D。有机磷中毒中枢神经系统症状早期可有头晕、头痛、乏力,逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐和昏迷,严重时可发生呼吸中枢衰竭或脑水肿而死亡。

64. B。无盐低钠饮食一般用于水肿较重病人,除食物内自然含钠量外,烹调时不放食盐,饮食中含钠量 $<0.7\text{g/d}$;低钠饮食需控制摄入食品中自然存在的含钠量,一般应 $<0.5\text{g/d}$;两者均禁食腌制食品、含钠食物和药物,如油条、挂面、汽水、碳酸氢钠药物等。故正确答案为 B。

65. B。人体各系统的发育顺序遵循一定规律,有各自生长特点,如神经系统发育最早,脑在生后 2 年发育较快,淋巴系统在儿童期迅速生长,于青春期达高峰,生殖系统发育较晚,至青春期才迅速发育。

66. B。心脏触诊包括心尖冲动及心前区震颤和心包摩擦感;腹部触诊包括腹部皮肤弹性、皮疹颜色及加压后变化,腹壁静脉血流方向,结节的深浅、活动度和触痛情况,腹壁紧张度,压痛和反跳痛,腹部包块,液波震颤及肝脾等腹腔脏器情况。心包摩擦音为听诊的内容,故选 B。解题关键:触诊是通过手的感觉感知病人身体某部位有无异常的检查方法。

67. B。妊娠中后期,羊水的主要来源是胎尿,量的调节与产生的量及吸收量的平衡有关。

68. D。肌力分为以下六级:0 级:肌肉完全麻痹,触诊肌肉完全无收缩力;1 级:肌肉有主动收缩力,但不能带动关节活动(可见肌肉轻微收缩);2 级:可以带动关节水平活动,但不能对抗地心引力(肢体能在床上平行移动);3 级:能对抗地心引力做主动关节活动,但不能对抗阻力(肢体可以克服地心吸引力,能抬离床面);4 级:能对抗较大的阻力,但比正常者弱(肢体能做对抗外界阻力的运动);5 级:正常肌力(肌力正常,运动自如)。故选 D。

69. B。感染是 DIC 最常见的原因。感染可使血