

 北京名医世纪传媒

当代 抗肿瘤 妙方

DANGDAI

KANGZHONGLIU

MIAOFANG



主 编 李世文 康满珍

第 八 版

中原出版传媒集团
大地传媒

 河南科学技术出版社


当代抗肿瘤妙方

DANGDAI KANGZHONGLIU MIAOFANG

第5版

主 编 李世文 康满珍

编 者 (以姓氏笔画为序)



李世文
康满珍

河南科学技术出版社

• 郑州 •

内容提要

本书作者从近年来国内医药文献所载的大量中医药方中,精选了经临床验证疗效显著,且制作简单、药材易得的抗肿瘤药方1600余首,按各部位、各系统肿瘤及肿瘤并发症等分类编排,涉及良、恶性肿瘤60余种。每首药方包括药物组成、制用法及疗效等,并附参考文献。本书内容翔实可靠,方法简明实用,适于各科临床医师,特别是肿瘤科医师和基层医务人员工作中参考,亦可供肿瘤患者及其家庭成员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

当代抗肿瘤妙方/李世文,康满珍主编. —5版. —郑州:
河南科学技术出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5349-8991-9

I. ①当… II. ①李… ②康… III. ①肿瘤—验方—汇编
IV. ①R289.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第227265号

出版发行:河南科学技术出版社

北京名医世纪文化传媒有限公司

地址:北京市丰台区丰台北路18号院3号楼511室 邮编:100073

电话:010-53556511 010-53556508

策划编辑:杨磊石

文字编辑:刘新瑞

责任审读:邓为

责任校对:龚利霞

封面设计:吴朝洪

版式设计:王新红

责任印制:陈震财

印刷:北京盛通印刷股份有限公司

经销:全国新华书店、医学书店、网店

幅面尺寸:140 mm×203 mm 印张:10.875 字数:274千字

版次:2018年1月第5版 2018年1月第1次印刷

定价:33.00元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系并调换

第5版前言

肿瘤,特别是恶性肿瘤,像一个可怕的魔鬼,正在严重威胁着人们的生命。为了解决这一世界性的医疗难题,各国医学科学家研究出了一系列的抗癌药物,但由于这些药物不良反应大,并且药品昂贵,许多肿瘤患者难以接受。目前医务人员的眼光,正在移向中国的瑰宝——中医药,希望中医药在治疗肿瘤方面发挥出巨大的作用。

《当代抗肿瘤妙方》一书,汇名老中医药专家之精华,集八十年中医文献抗肿瘤之妙方。为医者之必备,为患者所急需,此为编者著书之根本。精心摘取中医药典籍、杂志中的治病妙方,为广大医生指明方向,为肿瘤病友带来希望。

本次修订,删除了年代较久,制作繁杂,药材难得,不易使用的处方,增加了最新研究成果以及疗效显著、使用方便的方剂。使本书犹如一丝丝春风扑来,带来无尽的勃勃生机。

读者在使用本书方剂中,建议在中医(药)师的指导下,充分结合临证施治,切忌滥用,以防不测。

在编写过程中,李红辉、袁红梅、李金、肖艳、康祥贞协助查找资料,康尚忠、康振华、刘素珍、张百艳、晏娟帮助校对,做了大量的工作,在此深表谢意。

祖国医学,浩如烟海。由于作者水平有限,此次修订尽管做出了巨大努力,仍难免出现美中不足,祈盼读者予以雅教,不胜感激万分。

李世文 康满珍

2017年6月28日于湖南新化

第 1 版前言

肿瘤是一种常见多发病,特别是恶性肿瘤,由于病死率高,常让人们谈之色变。目前治疗肿瘤,多采用手术、放疗、化疗和中医药等综合疗法;后者由于适应证广,对人体无创伤且不良反应少,因而临床应用更广泛。

中医学源远流长,早在 2000 多年前,就已开始运用传统药物治疗类似肿瘤的疾病。新中国成立后,我国肿瘤临床治疗逐渐形成了一套中西医两法彼此配合,取长补短,相互协同的独特治疗方法,将许多肿瘤患者从死神手里挽救过来,并且能使中晚期患者明显地减轻痛苦,延长寿命,提高生存质量。为了进一步探讨中医药治疗肿瘤的知识,更好地为广大病人服务,我们利用几年的时间,翻阅了大量的医学期刊,编写了这本《当代抗肿瘤妙方》。

《当代抗肿瘤妙方》一书,按系统分类,分为头颈部肿瘤,胸部肿瘤,消化系统肿瘤,泌尿及生殖系统肿瘤,脑肿瘤及恶性肉芽肿,造血及淋巴系统肿瘤,妇科肿瘤,皮肤肿瘤,骨肿瘤,癌症疼痛及防治放、化疗不良反应,肿瘤并发症等共 11 章 68 种疾病,较全面地反映了我国近年来中医药防治肿瘤的成果。

本书载方 2000 余首,所载方剂均是从 1987—2003 年国内医药文献所载的中医药方中,精选的经临床验证疗效显著,制作简单,药材易得的方剂。每首药方包括药物组成、制用法、疗效等,并附参考文献。

读者在运用本书方剂中,建议在中医(药)师的指导下使用,切

忌马虎从事，以防不测。

在编写过程中，李祥佑、何清桃、吴九英、康祥珍、刘素珍、袁红梅协助查找资料，李红辉、康尚忠、康振华、李金、康深韬协助校对，做了大量的工作，在此一并致以谢意。

限于作者水平有限，时间仓促，难免有差错之处，恳请读者批评指正。

李世文 康满珍

2004年1月于湖南新化梅岭

目 录

第1章 头颈部肿瘤	(1)
一、小脑脑桥角肿瘤	(1)
二、头颈部复发癌	(3)
三、颅内肿瘤	(4)
四、眼睑癌	(6)
五、腮腺癌	(7)
六、上颌窦癌	(8)
七、鼻咽癌	(10)
八、上颌窦软组织肉瘤	(16)
九、甲状腺良性肿块	(16)
十、甲状腺腺瘤	(18)
十一、甲状腺囊肿	(26)
十二、甲状腺癌	(28)
十三、舌癌	(30)
十四、口腔癌	(30)
第2章 胸部肿瘤	(33)
一、肺癌	(33)
二、纵隔恶性肿瘤	(48)
三、乳腺癌	(49)
四、恶性胸腔积液	(57)
第3章 消化系统肿瘤	(69)
一、食管癌	(69)
二、贲门癌	(82)
三、胃癌	(87)



四、原发性肝癌·····	(99)
五、十二指肠癌·····	(118)
六、结肠癌·····	(119)
七、大肠癌·····	(123)
八、胰腺癌·····	(133)
九、胰头肿瘤·····	(138)
十、晚期消化道恶性肿瘤·····	(140)
第4章 泌尿及生殖系统肿瘤·····	(146)
一、膀胱癌·····	(146)
二、肾癌·····	(149)
三、前列腺癌·····	(150)
第5章 骨与关节肿瘤·····	(157)
一、骨肿瘤·····	(157)
二、骨囊肿·····	(162)
三、骨转移癌·····	(163)
四、膝关节骨区细胞瘤·····	(169)
第6章 脑肿瘤及恶性肉芽肿·····	(171)
一、脑肿瘤·····	(171)
二、脑癌·····	(175)
三、脑垂体肿瘤·····	(177)
四、脑胶质细胞瘤·····	(178)
五、恶性肉芽肿·····	(179)
第7章 造血及淋巴系统肿瘤·····	(181)
一、多发性骨髓瘤·····	(181)
二、血管瘤·····	(185)
三、恶性淋巴瘤·····	(186)
四、非霍奇金淋巴瘤·····	(194)
五、急性白血病·····	(196)
六、类白血病·····	(207)



七、慢性粒细胞性白血病	(207)
八、复发性难治性白血病	(212)
第8章 妇科肿瘤	(213)
一、子宫肌瘤	(213)
二、子宫体癌	(226)
三、卵巢癌	(233)
四、卵巢囊性肿瘤	(239)
五、恶性葡萄胎	(250)
六、绒毛膜上皮癌	(251)
七、盆腔肿块	(252)
第9章 皮肤肿瘤	(255)
一、假黄色素瘤	(255)
二、皮肤癌	(255)
三、恶性黑色素瘤	(258)
第10章 癌症疼痛及放、化疗不良反应	(260)
一、癌症疼痛	(260)
二、防治化疗不良反应	(275)
三、防治放疗不良反应	(290)
第11章 肿瘤并发症	(307)
一、恶性肿瘤发热	(307)
二、癌性腹水	(315)
三、癌症呃逆	(321)
四、顺铂所致延迟呕吐	(323)
五、消化道肿瘤术后腹泻	(323)
六、癌症盗汗	(324)
七、癌性溃疡	(326)
八、癌性肠梗阻	(328)
九、晚期肿瘤并发褥疮	(331)
十、改善晚期恶性肿瘤患者生活质量	(332)

第 1 章 头颈部肿瘤

一、小脑脑桥角肿瘤

小脑脑桥角(CPA)是颅内肿瘤最好发的部位之一。由于 CT 扫描在检查颅后窝肿瘤时受到颅后窝区骨伪影的影响而不能满意地显示病灶,因此 MRI 对该区肿瘤的检出和定性诊断优于 CT。

小脑脑桥角肿瘤多为听神经瘤,其次可见于上皮样囊肿及脑膜瘤。临床上表现为小脑脑桥角综合征,出现三叉神经痛,听神经、面神经、展神经、舌咽神经、迷走神经、舌下神经及小脑受损后的功能障碍。少数病人还可出现轻度偏瘫及半身感觉障碍。

处方 1

[组成] 黄芪 40g,当归、白花蛇舌草、夏枯草、葛根各 30g,赤芍、白芍各 15g,桃仁、川芎、地龙、天麻各 12g,丹参 25g,胆南星、生甘草各 10g。

[制用法] 每日 1 剂,水煎 3 次后合并药液,分早、中、晚内服。用至症状消失。

[疗效] 据报道,用本方治疗小脑脑桥角肿瘤,效果显著。患者,男,39 岁。1985 年 7 月 18 日就诊,1 个月前头晕耳鸣、呕恶,经治 7 周无效,并突发剧烈头痛,面部及左侧肢体麻木,口眼喎斜。经某院头颅 CT 扫描诊断为小脑脑桥角肿瘤。辨证为气血两虚,



瘀血夹痰。以本方加减服 40 余剂,诸症好转,生活基本自理,继以该方加滋补肝肾之品调理并巩固疗效。1 年后随访,病情稳定,症状缓解,未见复发。1986 年 6 月 27 日复查头颅 CT 提示:肿瘤阴影缩小一半。

处方 2

〔组成〕 七星丹。

〔制用法〕 均经手术及放化疗等治疗后,用七星丹〔含白花蛇舌草、三棱各 15g,半枝莲、昆布各 30g,预知子 20g,夏枯草、蒺藜、莪术各 12g,柴胡、制穿山甲(代,下同)、泽泻、黄芩、全蝎各 10g,蜈蚣 5g,猪苓 45g〕每次 10~15g,每日 3 次,餐后服;1 个月为 1 个疗程。

〔疗效〕 用七星丹治疗晚期恶性肿瘤(病种包括脑瘤,肝、肺、胃及胰腺癌等)138 例,用 2 个疗程,随访 3 年,治愈 44 例,完全缓解 51 例,部分缓解 22 例,稳定 19 例,无效 2 例^[1]。

处方 3

〔组成〕 白附子、牵牛子、白芷、白术、石菖蒲、赤芍、牡丹皮各 10g,川芎、莪术、郁金、僵蚕、守宫各 15g,蜈蚣 3 条,全蝎 5g,黄芪 50g,谷芽、鳖甲、麦芽各 20g,薏苡仁 30g,大黄、桂枝、炮姜各 6g。

〔制用法〕 治疗组 53 例与对照组 50 例,均手术切除后 1 个月,开始放疗;继用亚硝脲、长春新碱及铂类药化疗。治疗组放化疗后用本方。随症加减,每日 1 剂,水煎服;1 年后,改 1~2 日 1 剂,第 3 年后,每 3 天用 1 剂(或用 1 个月,间隔 1 个月),洗净脐区,用冰片、面粉各 0.5g,用 75%乙醇调成饼状,置于脐区,上覆塑料薄膜,纱布固定,每天换药 1 次,并支持疗法及对症处理。

〔疗效〕 用上药治疗神经胶质瘤患者,两组分别有效 45 例,42 例;2 年、3 年的生存率及复发率治疗组均优于对照组($P < 0.05$)^[2]。



参考文献

- [1] 张启明.七星丹治疗晚期恶性肿瘤 138 例.河北中医,2000,22(8):598
- [2] 胡淑霞.脑瘤汤防治神经胶质瘤综合治疗后复发的疗效观察.新中医,2010,42(6):74-75

二、头颈部复发癌

头颈部肿瘤包括源于除脑、眼、耳、甲状腺和食管外头颈部任何组织或器官的肿瘤,应包括颈部肿瘤、耳鼻咽喉科肿瘤及口腔颌面肿瘤三大部分。头颈部所发生的肿瘤,其原发部位和病理类型之多,居全身肿瘤之首。超过 90% 的头颈部肿瘤为鳞状细胞癌。最近 10 年全球头颈部鳞状细胞癌(SCCHN)的发病率明显上升,特别是女性。

处方

[组成] 党参、灵芝、茯苓、山药、薏苡仁、五加皮、丹参各 30g,黄芪 60g,地黄 20g,当归 15g。

[制用法] 将上药水煎 3 次后合并药液,分早、中、晚内服。用至电化疗后 1 个月。并在局麻下,用 BK92A 电化学治疗仪 2~10 根电极,插入瘤体,经皮套管针,电压 6~10V,电流 40~80mA,每直径 1cm 瘤体电量 80~100C,每次 2~4 小时;瘤体大的分次治疗。

[疗效] 中药配合电化学疗法治疗头颈部复发癌(病种包括颈部恶性淋巴瘤、鼻咽癌、上颌窦癌、舌癌、软腭癌、腮腺癌、颌下腺癌、牙龈癌及转移癌)20 例,完全缓解 2 例,部分缓解 11 例,无变化 4 例,无效 3 例。生存 3~18 个月 13 例。出现不良反应 4 例

[孟令占.电化学疗法与中药配合治疗头颈部复发癌.现代中西医



结合杂志,2002,11(16):1564]。

三、颅内肿瘤

颅内肿瘤发生于大脑半球的机会最多,其后依次为蝶鞍区、小脑、桥小脑角、脑室内、脑干。成人及1岁以下婴儿的颅内肿瘤以幕上瘤居多数,1—12岁儿童的颅内肿瘤以幕下者居多。颅内肿瘤在小儿发病率比较高,发病年龄以5—8岁居多。

处方1

[组成] 僵蚕、胆南星各9g,全蝎、白芷各6g,蜈蚣3条,黄精、石决明(先煎)、大蓟各30g,夏枯草15g,车前子(包)60g,天麻、蔓荆子各12g。

[制用法] 本方亦可随症加减。每日1剂,水煎3次后合并药液,分早、中、晚内服。并取穴:涌泉、神阙。用照应膏(含密陀僧、白矾各30g,细辛3g等。研细粉,加醋或麻油,调糊。浙江省杭州市小营医院研制)贴敷穴位,每日1次。

[疗效] 据报道,用虫蝎搜瘤煎为主治疗颅内肿瘤30例,显效(肿块明显缩小,症状消失;随访5年,无复发)5例,有效24例,无效1例,总有效率为97%^[1]。

处方2

[组成] 脑瘤散(含川芎、黄芪、泽泻、生附子、防己、鳖甲等。天津中医药大学第二附属医院研制)。

[制用法] 治疗组15例,用脑瘤散5g,每日3次,口服;用6天,停1天,1个月为1个疗程,用6个疗程,与对照组16例,均用PCV方案:洛莫司汀(环己亚硝脒)110mg/m²,第1天;丙卡巴肼(甲基苄肼)60mg/m²,第8~21天;口服。长春新碱1.4mg/m²,第8和第29天,静脉滴注。6~8周为1个周期,用3个周期。



[疗效] 应用上药治疗复发性脑胶质瘤,两组分别完全缓解2例、1例,部分缓解8例、7例,稳定3例、4例,病变进展2例、4例。不良反应发生率治疗组低于对照组($P<0.05$)^[2]。

处方3

[组成] 丹参酮ⅡA注射液(10mg/2ml。上海第一生化药业有限公司提供)。

[制用法] 治疗组108例,于放疗全程用丹参酮ⅡA注射液40~50mg,加5%葡萄糖液250ml,静滴,每日1次。与对照组104例,均KPS评分 ≤ 70 分,年龄 >75 岁行立体定向放疗;KPS评分 ≥ 70 分、年龄 ≤ 75 岁行全颅放疗联合立体定向放疗。均酌情抽腹水、利尿、用激素等。

[疗效] 应用上药治疗老年脑转移瘤患者,两组分别完全缓解24例、20例,部分缓解56例、48例,无变化20例、28例,进展各8例,总有效率为92.6%、92.3%。生存时间分别为2~21、1~20个月;0.5年及1年生存率、中位生存时间治疗组均高于对照组,但差异无统计学意义。急性放射性脑损伤发生率、发生时间、中断例数治疗组均优于对照组($P<0.05$)。随访3~6个月,脑水肿加重、脑坏死分别为24例、41例($P<0.01$),12例、20例^[3]。

处方4

[组成] 石菖蒲、郁金、桃仁泥各10g,半夏、川芎、川牛膝、山慈菇各12g,制天南星9g,红花、全蝎各6g,泽泻15g,瓜蒌、白花蛇舌草各30g,大黄6g。

[制用法] 每日1剂,用水煎服,分2~3次内服。

[疗效] 有人用自拟中药涤痰化瘀通窍汤治疗脑部肿瘤34例,其中临床治愈7例,显效13例,稳定10例,无效4例,总有效率为88.1%^[4]。



参考文献

- [1] 潘苏白.虫蝎搜瘤煎为主治疗颅内肿瘤 30 例.新中医,2001,33(1):54
- [2] 周洁.脑瘤散治疗复发性脑胶质瘤的临床研究.天津中医药,2008,25(4):277-279
- [3] 段玉龙.丹参酮ⅡA 联合放疗治疗老年脑转移瘤疗效观察.中国实用医刊.2011,38(2):101-102
- [4] 张贺,梁新安,等.中医药治疗脑瘤的研究进展.湖南中医杂志,2014,30(5):170-171

四、眼 睑 癌

眼睑上皮癌为发生在眼睑及附件的恶性肿瘤,多发生于 50—75 岁。眼睑癌往往呈多形性。临床上按病理类型可分为基底细胞癌、睑板腺癌和鳞状细胞癌。现代医学认为本病病因尚不清楚,可能与经常接受某些致癌物质,眼镜框对鼻梁眼睑间皮肤所造成的刺激,烧伤瘢痕、寻常狼疮、乳头状瘤、老年角化病等因素有关。

处方 1

〔组成〕 白花蛇舌草、半枝莲、半边莲、仙鹤草、败酱草、蒲公英各 60g,重楼、金银花各 45g,白英、山豆根、玄参、甘草各 30g。

〔制用法〕 将上药水煎,分 3~4 次口服。每日 1 剂。30 剂为 1 个疗程。服药 1 个疗程后,再停药 2~3 日,然后服下 1 个疗程。

〔疗效〕 用上药治疗眼睑板腺癌 13 例,经用药 3~5 个疗程后,全部获得治愈。随访 5~10 年,未见复发。据现代药理学研究证明,本方中药物对实验性肿瘤均有一定的抑制作用。



处方 2

〔组成〕 三棱、莪术、山豆根、重楼、川黄连、党参、生黄芪、忍冬藤、野菊花、海藻各 100g, 半枝莲、龙葵各 200g, 制马钱子、穿山甲、制蜈蚣、紫草、熟大黄各 50g, 山豆根、山慈菇各 70g。

〔制用法〕 将上药分别研为极细末, 混合均匀后, 炼蜜为丸, 每次服 9g, 每日服 2~3 次。本方为 1 剂药, 可连续服 2~3 剂药。

〔疗效〕 运用上药治疗眼睑癌患者 6 例, 经用药 2~3 剂后, 全部治愈。经随访 6~11 年, 未见复发。

处方 3

〔组成〕 半边莲、半枝莲、白花蛇舌草、仙鹤草各 90g, 重楼、藤梨根(猕猴桃根)各 45g, 山豆根、白英、玄参各 30g。

〔制用法〕 每日 1 剂, 水煎服。

〔疗效〕 用上药治疗眼睑板腺癌 2 例, 均获治愈。随访 2~8 年未见复发[胡照明. 中国中医秘方大全(下卷). 上海: 文汇出版社, 1996: 621-622]。

五、腮 腺 癌

腮腺癌是发生于腮腺的恶性肿瘤, 是属于涎腺癌中发生率最高的一种恶性肿瘤。一般多于无意中或体检时发现, 以耳垂为中心的下方或后方有生长缓慢的无痛性肿块, 多呈结节状, 表面平整或略圆, 质地硬度不一, 活动大小为 3~5cm, 有包膜, 病史长, 除局部酸胀感外, 无面神经损伤、区域淋巴结肿大及其他不适。现代医学对本病的病因, 目前尚未明确。有学者认为与病毒或感染有关。

处方 1

〔组成〕 石见穿、夏枯草、王不留行、生牡蛎、生鳖甲、天花粉、



蒲公英、龙葵各 30g,海藻、昆布、丹参、瓜蒌子、百部、板蓝根各 15g,红花、桃仁、生地黄、露蜂房、苦参各 10g。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液,分早、中、晚口服。每日 1 剂。1 个月为 1 个疗程。疗程间隔 2 日后,再行下 1 个疗程。

〔疗效〕 用上药治疗腮腺癌患者 18 例,经用药 5~8 个月后,其中治愈 10 例,显效 3 例,无效 5 例。治愈者,经随访 5~10 年,均未见复发。

处方 2

〔组成〕 蒲公英、板蓝根、败酱草、白花蛇舌草各 40g,海藻、昆布、丹参、穿山甲各 20g,百部、茯苓、瓜蒌子、生地黄、路路通各 15g,川黄连、黄芩、玄参、沙参各 10g。

〔加减〕 若气血两虚者,加党参、黄精、金樱子、鸡血藤各 15g;若白细胞低者,加补骨脂、生黄芪、紫河车、女贞子、枸杞子各 10g;若食欲减退,舌苔黄腻者,加薏苡仁、佩兰、藿香、焦山楂、焦神曲、焦麦芽各 15g。

〔制用法〕 将上药水煎,分 3 次口服,每日 1 剂。2 个月为 1 个疗程。

〔疗效〕 用上药治疗腮腺癌患者 6 例,经用药 3~6 个疗程后,随访 5~10 年,病情稳定,肿块显著缩小。

六、上颌窦癌

上颌窦癌是鼻旁窦恶性肿瘤中最常见者。本病初期症状无特殊性,病变局限于窦腔时可无明显阳性特征,鼻窦及异常分泌物为先驱症状,继而出现牙痛、牙脱落等口腔症状及眼、耳等头面部症状和向其他脏器转移,现代医学认为本病病因尚不清楚,可能与病毒、遗传和环境因素有关。