



2017

国家医师资格考试
考前冲刺系列

最佳畅销书

临床执业医师 资格考试冲刺试卷 (第五版)

医师资格考试命题研究专家组 编写

- ▶ 紧扣考纲精选试题
全面覆盖考试重点
- ▶ 高效押题精选解析
提高考前冲刺效率

中国医药科技出版社



2017 国家医师资格考试考前冲刺系列

临床执业医师资格考试冲刺试卷

(第五版)

医师资格考试命题研究专家组 编写

编委 (按姓氏笔画排序)

尹桂君	付涛	任义	任辉
刘颖	刘葆陞	阮志平	杨勤
杨水兵	杨明华	李颖	沈夏
宋常建	张萍	张仁君	张志军
张树成	张道明	陈俊	季恩
胡留城	侯荣	姚江	袁伟
袁华国	唐扬军	康钦利	梁琼
蒋太春	曾勇	曾婷	曾兴文
雍永金	魏保生		

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为 2017 国家医师资格考试考前冲刺系列之一,由医师资格考试命题研究专家组按照最新临床执业医师考试大纲和要求,参照历年考题精心编写而成。全书包括 3 套模拟试卷,每套试卷有 4 个单元,题目类型,数量,试卷结构及难度与实际考试一致,后附详细的试题解析。全书体例清晰,内容严谨,针对性,实用性强,适合参加 2017 年临床执业医师的考生参阅使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

临床执业医师资格考试冲刺试卷/医师资格考试命题研究专家组编写. —5 版. —北京:中国医药科技出版社, 2017. 3

2017 国家医师资格考试考前冲刺系列

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9077 - 2

I. ①临… II. ①医… III. ①临床医学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 030202 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm ¹/₁₆

印张 20 ¹/₂

字数 579 千字

初版 2009 年 11 月第 1 版

版次 2017 年 3 月第 5 版

印次 2017 年 3 月第 1 次印刷

印刷 北京九天众诚印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9077 - 2

定价 48.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

目 录

冲刺试卷一	1
第一单元	1
第二单元	13
第三单元	27
第四单元	40
冲刺试卷二	53
第一单元	53
第二单元	65
第三单元	78
第四单元	91
冲刺试卷三	103
第一单元	103
第二单元	115
第三单元	128
第四单元	141
答案与解析	153
冲刺试卷一参考答案	153
第一单元	153
第二单元	154
第三单元	155
第四单元	156
冲刺试卷一试题解析	157
第一单元	157
第二单元	166
第三单元	176
第四单元	188
冲刺试卷二参考答案	201
第一单元	201
第二单元	202

第三单元	203
第四单元	204
冲刺试卷二试题解析	205
第一单元	205
第二单元	217
第三单元	228
第四单元	238
冲刺试卷三参考答案	250
第一单元	250
第二单元	251
第三单元	252
第四单元	253
冲刺试卷三试题解析	254
第一单元	254
第二单元	268
第三单元	286
第四单元	305

冲刺试卷一

第一单元

【A1 型题】

- 属于酪氨酸衍生物的物质是
 - 组胺
 - 精胺
 - 腐胺
 - 5-羟色胺
 - 多巴胺
- 有关生物转化作用的描述,错误的是
 - 有些物质经过生物转化毒性增强
 - 肝是进行生物转化量最重要器官
 - 使非极性物质的极性增强
 - 作用的实质是裂解生物活性物质
 - 使疏水性物质水溶性增加
- 下列关于酶促反应调节的叙述,正确的是
 - 温度越高反应速度越快
 - 反应速度不受底物浓度的影响
 - 底物饱和时,反应速度随酶浓度增加而增加
 - 在最适 pH 下,反应速度不受酶浓度影响
 - 反应速度不受酶浓度的影响
- 维系蛋白质二级结构稳定的主要化学键是
 - 盐键
 - 氢键
 - 疏水作用
 - 肽键
 - 二硫键
- 不属于体内甘油酯类正常生理功能的是
 - 保持体温
 - 传递电子
 - 参与维生素的吸收
 - 构成生物膜
 - 参与信息传递
- 关于真核生物 mRNA 的描述,错误的是
 - 5'-端有特殊的内含子
 - 3'-端有特殊的“尾”结构
 - 3'-端存在非翻译序列
 - 5'-端有特殊“帽子”结构
 - 含有开放阅读框架区
- 食物蛋白质的营养互补作用是
 - 蛋白质的营养价值与脂肪酸的作用互补
 - 营养必需氨基酸与营养必需微量元素的互补
 - 营养必需氨基酸之间的互相补充
 - 营养必需氨基酸和非营养必需氨基酸互补
 - 营养物质与非营养物质的互补
- 在线粒体中进行的代谢过程是
 - 脂肪酸合成
 - 糖酵解
 - 糖原合成
 - 氧化磷酸化
 - 核糖体循环
- 成熟红细胞利用葡萄糖的主要代谢途径是
 - 磷酸戊糖途径
 - 无氧酵解
 - 有氧氧化
 - 三羧酸循环
 - 糖原分解
- 帕金森病的主要发病原因是
 - 黑质-纹状体多巴胺通路受损
 - 纹状体受损
 - 丘脑底核受损
 - 大脑皮层-纹状体通路受损
 - 大脑皮层运动区受损
- 用阈下刺激即可诱发心肌细胞产生期前收缩的兴奋性周期时相是
 - 绝对不应期
 - 相对不应期
 - 低常期
 - 局部反应期
 - 超常期
- 衰老红细胞难以通过微小血管和孔隙的主要原因是
 - 渗透脆性增加
 - 细胞体积增大
 - 悬浮稳定性下降
 - 血红蛋白减少
 - 变形能力减退
- 参与构成视觉细胞内感光物质的维生素是
 - 维生素 D
 - 维生素 A
 - 维生素 B₂
 - 维生素 B₆



E. 维生素 C

14. 与排卵后基础体温升高有关的激素是

- A. 卵泡雌激素
- B. 缩宫素
- C. 雌激素
- D. 黄体生成素
- E. 孕激素

15. 与血浆凝固酶阴性葡萄球菌无关的疾病是

- A. 食物中毒
- B. 败血症
- C. 股骨头置换术后感染
- D. 急性膀胱炎
- E. 细菌性心内膜炎

16. 最容易发生变异的呼吸道病毒是

- A. 甲型流感病毒
- B. 副流感病毒
- C. 麻疹病毒
- D. 腮腺炎病毒
- E. 呼吸道合胞病毒

17. 反复输血的个体进行实体器官移植时易发生的现象是

- A. 异种移植排斥反应
- B. 慢性排斥反应
- C. 超急性排斥反应
- D. 自体移植排斥
- E. 急性排斥反应

18. 肿瘤细胞被细胞毒性 T 细胞杀伤的关键条件是

- A. 表达黏附分子
- B. 表达 MHC I 类分子
- C. 表达 CD 分子
- D. 分泌细胞因子
- E. 表达 MHC II 类分子

19. 不属于免疫缺陷病的疾病是

- A. X-连锁慢性肉芽肿病
- B. 艾滋病
- C. 遗传性血管神经性水肿
- D. 系统性红斑狼疮
- E. X 连锁无丙种球蛋白血症

20. 与黏膜免疫应答密切相关的免疫球蛋白是

- A. IgG
- B. IgA
- C. IgE
- D. IgD
- E. IgM

21. 可通过抗原非特异性方式杀伤病毒感染细胞的

免疫细胞是

- A. 中性粒细胞
- B. T 细胞
- C. B 细胞
- D. 肥大细胞
- E. NK 细胞

22. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎增生的主要细胞是

- A. 肾小球周围的成纤维细胞及系膜细胞
- B. 肾球囊壁层上皮细胞及毛细血管内皮细胞
- C. 肾小球毛细血管系膜细胞和内皮细胞
- D. 肾球囊脏层上皮细胞及系膜细胞
- E. 肾球囊脏层上皮细胞及壁层上皮细胞

23. 不引起肉芽肿性炎的病原体是

- A. 结核杆菌
- B. 痢疾杆菌
- C. 麻风杆菌
- D. 梅毒螺旋体
- E. 伤寒杆菌

24. 原发性高血压时细动脉病理改变是

- A. 血管壁平滑肌萎缩
- B. 血管纤维化
- C. 血管痉挛
- D. 内膜下蛋白性物质沉积
- E. 血管腔狭窄

25. 不属于血栓结局描述的是

- A. 溶解
- B. 钙化
- C. 软化
- D. 机化
- E. 硬化

26. 具有缓解胃肠痉挛作用的自主神经递质受体阻断剂是

- A. 阿替洛尔
- B. 阿托品
- C. 酚妥拉明
- D. 育亨宾
- E. 筒箭毒碱

27. 不属于地塞米松药理作用的是

- A. 刺激骨髓造血功能
- B. 抑制毛细血管和成纤维细胞增生
- C. 增强机体对细菌内毒素的耐受力
- D. 抑制体内环氧化酶
- E. 稳定溶酶体膜

28. 青霉素 G 的主要不良反应是

- A. 肾损害
- B. 过敏

- C. 听力减退 D. 肝损害
E. 胃肠道反应
29. 不属于氯丙嗪临床应用的选项是
A. 精神分裂症
B. 感染中毒性精神病
C. 顽固性呃逆
D. 洋地黄引起的呕吐
E. 前庭刺激所致晕动症
30. 患者表现平静, 客观面对患病现实, 关注自身疾病, 遵行医嘱所体现的患者角色行为类型为
A. 角色行为冲突 B. 角色行为减退
C. 角色行为异常 D. 角色行为缺如
E. 角色行为适应
31. 医学心理学对于健康和疾病的基本观点不包括
A. 认知评价的观点
B. 个性特征作用的观点
C. 情绪因素作用的观点
D. 被动适应的观点
E. 心身统一的观点
32. 不适合接受心理治疗的疾病是
A. 焦虑症
B. 恐惧症
C. 精神分裂症急性发作
D. 强迫症
E. 创伤后应激障碍
33. 某心理治疗师婉拒治疗的患者请吃饭的邀请, 其遵循的原则是
A. 保密原则 B. 真诚原则
C. 关系限定原则 D. 回避原则
E. 客观中立原则
34. 卫生服务反应性中的“对人的尊重”包括
A. 尊严, 自主性和保密性
B. 尊严、及时性和社会支持
C. 社会支持、及时性和保密性
D. 社会支持、自主性和保密性
E. 自主性、保密性和及时性
35. 医学人道观的基本内容不包括
A. 尊重患者的平等医疗保健权
B. 消除或减轻影响患者健康的危险因素
C. 对患者尽量使用高新技术
D. 尊重患者的人格
E. 尊重患者的生命
36. 医学伦理学中尊重原则所涵盖的权利不包括
A. 自主选择权 B. 社会免责权
C. 个人隐私权 D. 知情同意权
E. 人格尊严权
37. 实施主动安乐死的首要社会条件是
A. 家属的主动要求
B. 安乐死的合法化
C. 患者的主动要求
D. 能够减轻患者的痛苦
E. 维护患者的尊严
38. 医师在诊疗活动中, 不过度医疗所体现的医师行为规范是
A. 规范行医 B. 严格极限
C. 救死扶伤 D. 重视人文
E. 规范文书
39. 人体试验道德的首要原则是
A. 医学目的原则 B. 随机对照原则
C. 信息公开原则 D. 知情同意原则
E. 维护受试者利益原则
40. 人的社会性需要不包括
A. 劳动 B. 求知
C. 饮食 D. 交往
E. 尊重
41. 按照临床诊疗道德的最优化原则, 医务人员不需要考虑的是
A. 患者的地位 B. 医疗安全
C. 医疗效果 D. 诊疗费用
E. 患者的痛苦
42. 《精神卫生法》规定承担精神障碍患者再次诊断的精神科执业医师人数是
A. 5人 B. 2人
C. 4人 D. 1人
E. 3人



43. 医务人员特别是护理人员最常见的安全事件是
A. 化学伤害 B. 锐器伤
C. 生物伤害 D. 电离辐射
E. 中毒
44. 根据《放射诊疗管理规定》，非特殊需要，不得对受孕一定时间段的育龄妇女进行下腹部放射影像检查。该时间段是
A. 受孕后 28~34 周 B. 受孕后 34~36 周
C. 受孕后 8~15 周 D. 受孕后 36~38 周
E. 受孕后 16~28 周
45. 医疗结构为预防传染病院内播散应承担的职责是
A. 实施传染病预防控制规划
B. 收集和分析传染病疫情信息
C. 对传染病预防工作进行指导
D. 流行病学调查
E. 医疗废物处置
46. 对收受药品生产经营企业或其代理人财物且情节严重的医师，卫生计生行政部门应当做出的处理是
A. 注销执业证书 B. 暂停执业活动
C. 吊销执业医师证书 D. 记过
E. 警告
47. 医疗机构保存住院病历的最低期限是
A. 30 年 B. 15 年
C. 20 年 D. 50 年
E. 10 年
48. 卫生计生行政部门可以责令发生医疗事故的医务人员暂停执业活动的期限是
A. 1 个月以上 3 个月以下
B. 6 个月以上 1 年以下
C. 1 年以上 3 年以下
D. 3 个月以上 6 个月以下
E. 1 年以上 18 个月以下
49. 依照我国《人体器官移植条例》，下列可以为其直系血亲捐献肾脏的是
A. 27 周岁的未婚男性
B. 35 周岁的严重智力低下患者
C. 17 周岁的健康中学生
D. 25 周岁的乙肝患者
E. 22 周岁的精神病患者
50. 具有麻醉药品处方权的执业医师被追究法律责任的情形是
A. 未依照规定进行麻醉药品处方专册登记
B. 未依照规定保存麻醉药品专用处方
C. 未依照规定储存麻醉药物
D. 紧急借用麻醉药品后未备案
E. 不按照临床指导原则使用麻醉药品
51. 母婴保健工作人员出具虚假医学证明，即使未造成严重后果，仍应承担一定的法律责任。该法律责任是
A. 暂停执业 B. 行政处分
C. 吊销执业证书 D. 通报批评
E. 注销执业注册
52. 在生产过程中形成的呼吸性粉尘是指
A. 能随呼吸进入人体并沉积于呼吸道的粉尘
B. 分散度较小的粉尘
C. 直径小于 $5\mu\text{m}$ 的粉尘
D. 分散度较大的粉尘
E. 直径小于 $15\mu\text{m}$ 的粉尘
53. 我国社区卫生服务体系建设内容不包括
A. 坚持公益性质，完善社区卫生服务功能
B. 建设大型综合性医院
C. 加强社区卫生服务队伍建设与完善社区卫生服务运行机制
D. 建立社区卫生服务机构与预防保健机构、医院合理的分工协作关系
E. 坚持政府主导、鼓励社会参与，建立健全社会卫生服务网络
54. 对于大多数在小学里学习成绩中等的孩子而言，可以判断其智力水平处于正常范围，这一心理健康判断的角度为
A. 文化学角度 B. 社会学角度
C. 人类学角度 D. 统计学角度
E. 病理学角度
55. 属于第二级预防措施的是
A. 遗传咨询 B. 疾病筛检
C. 病后康复 D. 健康促进

- E. 疫苗接种
56. “水平膳食宝塔”提示, 每口每人大豆类摄入量相当于干豆 50g, 其目的主要是
- 保证膳食纤维摄入
 - 保证水苏糖的摄入
 - 提高必需脂肪酸摄入水平
 - 提高膳食蛋白质质量
 - 补充人体必需氮损失
57. 对儿童进行乙型肝炎疫苗接种的临床试验研究, 为评价其流行病学预防效果, 最好选用的指标是
- 发病率
 - 效果指数
 - 感染率
 - 死亡率
 - 病死率
58. 筛检的目的是
- 对可疑病人进行确诊
 - 评价筛检试验的敏感度
 - 验证病因
 - 评价筛检试验的特异度
 - 从表面健康的人群中, 查出可疑患者或高危人群
59. 疾病的三间分布是指
- 国家、地区和城乡分布
 - 职业、家庭和环境分布
 - 短期波动、季节性和周期性分布
 - 年龄、性别和种族分布
 - 时间、地区和人群
60. 在健康信念模式中, 促进个体行为改变的关键事件和暗示称为
- 对疾病易感性的认识
 - 自我效能
 - 行为能力
 - 对疾病严重性的认识
 - 行为线索
61. 肺癌最常见的转移部位是
- 脾
 - 脑
 - 肠
 - 胃
 - 肾
62. 原发性肺结核和继发性肺结核病均可见的病理类型是
- 慢性纤维空洞型肺结核
 - 浸润性肺结核
 - 结核球
 - 局灶性肺结核
 - 粟粒性肺结核
63. 临床上用于判断肺通气功能的较好指标是
- 补吸气量/用力肺活量
 - 潮气量/肺活量
 - 无效腔量/潮气量
 - 用力呼气量/用力肺活量
 - 潮气量/功能余气量
64. 最有可能引起副肿瘤综合征的肺癌类型是
- 小细胞癌
 - 鳞状细胞癌
 - 腺鳞癌
 - 肉瘤样癌
 - 乳头状腺癌
65. 由于 V2 受体缺陷引起的肾性尿崩症, 其相关的水孔蛋白是
- AQP-4
 - AQP-1
 - AQP-2
 - AQP-5
 - AQP-3
66. 糖尿病一般不会出现血管病变是
- 玻璃样变性
 - 淀粉样变性
 - 纤维素样坏死
 - 纤维化
 - 钙化
67. 两样本均数比较的 t 检验, 差别有统计学意义时, P 越小, 说明
- 两总体均数的差别不大
 - 两总体均数的差别越大
 - 越有理由认为两总体均数的差别很大
 - 越有理由认为两样本均数不同
 - 越有理由认为两总体均数不同
68. 根据心身疾病的定义, 以下不属于心身疾病的是
- 原发性高血压
 - 腹股沟斜疝
 - 神经性皮炎
 - 消化性溃疡
 - 支气管哮喘



69. 在环境卫生评价中, 剂量-反应关系是指
- 随暴露量增加引起个体效应严重程度不同的规律
 - 不同的暴露引起不同疾病的规律
 - 人群健康效应谱发生的规律性变化
 - 暴露人群分布变化的规律
 - 人群发病率随暴露因素的剂量增加而呈规律性变化
70. 构成传染病流行过程的必备因素有
- 宿主, 环境, 病因
 - 传染源、传播途径、易感人群
 - 寄生虫, 中间宿主, 终末宿主
 - 社会因素, 自然因素, 遗传因素
 - 病原体及机体
71. 不属于 HIV 传播途径的是
- 母婴传播
 - 性接触
 - 器官移植
 - 呼吸道传播
 - 输血
72. 确定食物中毒的可疑食物主要是根据
- 在同一场所同一时间未发病者未进食的食物
 - 潜伏期最短者
 - 病人的潜伏期特有中毒症状
 - 病人的潜伏期呕吐物和排泄物
 - 发病者的临床症状
73. 男, 72 岁。乏力、走路不稳 3 个月。查体: 肌张力减低, 共济失调, 意向性震颤, 指鼻试验阳性。该患者最可能的病变部位是
- 小脑
 - 皮层运动区
 - 脑干
 - 基底神经节
 - 脊髓
74. 男, 45 岁。右利手。因头痛和言语障碍 6 月余就诊。头颅 MRI 显示左侧中央前回底部前方有占位性病变, 脑膜瘤可能性大。该患者的言语障碍最可能是
- 失写
 - 失读
 - 感觉性失语
 - 超导性失语
 - 运动性失语
75. 男, 18 岁。因终末肾脏病行肾脏移植手术, 其母亲为其供肾者, 这种移植类型是
- 同基因移植
 - 同种异体移植
 - 异种移植
 - 同系移植
 - 自体移植
76. 男, 48 岁。右季肋区疼痛 3 月。既往有乙型病毒性肝炎病史 10 年。B 超检查见肝右叶巨大肿块。血 AFP 增高。符合该肿瘤病理学特点的是
- 肿瘤组织间质较多
 - 癌细胞呈腺管状排列
 - 癌细胞分泌黏液且血管少
 - 癌细胞与肝细胞类似
 - 发生于肝内胆管上皮最多见
77. 小李, 男, 25 岁。硕士研究生毕业后参加工作。半年来对上级领导布置的任务总感觉不能胜任, 屡屡出错, 受到多次批评后内心受挫, 选择了辞职。小李的这种选择在应激反应属于
- 认知反应
 - 生理反应
 - 情绪反应
 - 行为反应
 - 防御反应
78. 女, 45 岁。大学教授。因车祸导致颅脑损伤, 智力测验显示其智商为 85 分。同时有一位农民测得智商也是 85 分。心理治疗师认为前者的智力出现了问题, 而后者正常。这一判断所遵循的原则是
- 客观性原则
 - 中立性原则
 - 操作性原则
 - 保密性原则
 - 标准化原则
79. 一位服用了 60 多片安定的精神病患者被送到医院急救, 患者父母表示无力承担抢救费用。按照急救伦理的要求, 医生应该选择的处理措施是
- 在家属和院内上级领导的同意下, 赶快救治
 - 在征得患者父母同意的情况下, 放弃治疗
 - 放弃治疗, 让患者父母将其接回家
 - 向民政部门反映, 争取社会支持, 并由他们决定是否抢救
 - 仅给予患者家庭能够承受费用的支持疗法
80. 主治医师邱某经过抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训并考核合格后, 被授予限制使用

- 级抗菌药物处方权。但不久，邱某因违反《抗菌药物临床应用管理办法》的相关规定，受到医院警告并限制其上述处方权。医院处理邱某的依据是
- 多次使用非限制使用级抗菌药物
 - 使用价格相对较高的抗菌药物
 - 在紧急情况下越级使用抗菌药物
 - 无正当理由开具抗菌药物超常处方3次以上
 - 在门诊使用限制使用级抗菌药物
81. 某人因病住院20天，治疗费用共53000元，结算费用时被告知其中50000元以下的部分由医保支付，另外3000元需个人支付，该案例中的50000是
- 起付线
 - 封顶线
 - 自付线
 - 共同付费
 - 封底线
82. 某医师从医院辞职到一家药品生产企业从事营销工作，后因事业不顾，想重回医院工作，但因其中止执业活动已满法定期限被卫生行政部门注销注册。该法定期限是
- 2年
 - 3年
 - 4年
 - 1年
 - 6个月
83. 某中年男性因突发急症在大街上摔倒并昏迷，由路人送至附近医院，被确诊为脑出血，急需手术，但医务人员无法联系到其亲属。在此情况下，可以决定为其急诊手术的人员是
- 医院所任地民政部门负责人
 - 医院所在地派出所负责人
 - 为其接诊医师的上级医师
 - 院长或其授权人
 - 目击者
84. 若用统计图直观地表示某城市在8年中肝炎的发病率随时间的变化情况，宜选择
- 圆图
 - 直条图
 - 普通线图
 - 直方图
 - 散点图
85. 某糖尿病患者为了控制血糖，在医生的建议下准备和营养师一起定制一份饮食计划。她虽然知道饮食控制的好处，但总认为无法管住自己，计划难以实施。对于这样患者的干预重点是
- 要提高其自身效能
 - 培养行为能力
 - 提高结果预期
 - 提供社会支持
 - 建立支持性环境
86. 已知某省山区、丘陵、湖区婴幼儿体格发育有较大的差异，现需制定该省婴幼儿体格发育有关指标的参考值范围，抽样方法最好采取
- 分层抽样
 - 整群抽样
 - 系统抽样
 - 机械抽样
 - 单纯随机抽样
87. 某煤矿职工医院欲探讨二、三期矽肺患者肺部的阴影密度级别（+、++、+++、++++、+++++）间是否不同，可选择
- 线性回归
 - 成组设计比较的秩和检验
 - 直线相关
 - 两样本t检验
 - 四个表 χ^2 检验
88. 某医师为评价某新药对流感的治疗效果，共收治了100例流感病人，一周后治愈的有90例，由此认为该新药对流感疗效显著。针对此实验，正确的观点是
- 结论正确，因为治愈率达90%
 - 结论不能肯定，因为未作重复试验
 - 结论不能肯定，因为未设对照组
 - 结论不能肯定，因为未作统计学处理
 - 结论不能肯定，因为实验样本含量较少
89. 女，43岁。发热、咳嗽、少量脓痰2周。既往健康。查体未见明显异常。血常规大致正常，ESR 45mm/h。胸部X线片示右上肺渗出性病变伴不规则空洞，无液平。为明确诊断，宜首选的检查是
- 痰细菌培养+药敏
 - 支气管镜肺活检
 - 痰涂片抗酸染色
 - 痰涂片单兰染色
 - PPD皮试
90. 男，75岁。慢性阻塞性肺疾病急性加重反复出现，抗感染治疗时，为覆盖铜绿假单胞菌，下列抗菌药物中宜首选的是



- A. 莫西沙星 B. 阿米卡星
C. 头孢他啶 D. 阿奇霉素
E. 阿莫西林
91. 男, 56 岁。因“肺部感染、休克”入监护室治疗。血气分析提示该患者“代谢性酸中毒, I 型呼吸衰竭”为保护患者组织, 此时不宜快速纠正酸中毒, 其主要原因在于酸中毒时
- A. 组织氧摄取能力增加
B. 血红蛋白结合氧增加
C. 肺部获得更多的氧
D. 组织氧耗量减少
E. 导致氧离曲线右移
92. 女, 79 岁。咳嗽、咳痰 20 年, 气促 10 年, 加重 5 天, 查体: 桶状胸, 呼气相延长, 血气分析提示: pH 7.0, PaO₂ 55mmHg, PaCO₂ 54mmHg, 该患者的发病机制, 下列不包括
- A. 阻塞性肺通气功能障碍
B. 弥散功能障碍
C. 无效腔增加
D. 限制性通气功能障碍
E. 通气/血流比例失衡
93. 女, 37 岁。因阵发性室上性心动过速行射频消融治疗, 术中患者突然出现胸闷、烦躁、呼吸困难。查体: BP 80/70 mmHg, 颈静脉怒张, 两肺呼吸音清, 心界向两侧扩大。心率 120 次/分, 律齐。各瓣膜听诊区未闻及杂音, 奇脉 (+)。导致其临床表现的机制是
- A. 心排血量增加, 静脉压升高
B. 心排血量不变, 静脉压升高
C. 心排血量下降, 静脉压降低
D. 心排血量增加, 静脉压降低
E. 心排血量下降, 静脉压升高
94. 男, 16 岁。阵发性心悸 1 年余, 突发突止, 发作期间心电图正常, 10 分钟前再次发作, 心电图示快速、规则的 QRS 波群, 形态正常, 未见明显 P 波。急诊医师在患者右胸锁乳突肌内缘甲状软骨水平按摩数秒钟后, 心律突然恢复正常。该治疗手法的作用机制是
- A. 减弱心迷走神经紧张
B. 加强心迷走神经冲动
C. 加强心交感神经冲动
D. 原因不明
E. 兴奋颈动脉体
95. 男, 55 岁。反复活动时胸痛, 快步行走及上楼梯可诱发, 休息可缓解。冠状动脉造影见前降支阻塞 80%。血管病变的始动环节是
- A. 糖尿病
B. 高血压
C. 上皮细胞受损及功能失调
D. 内皮细胞受损及功能失调
E. 内皮下脂质沉积
96. 男, 40 岁。上腹部不适伴纳差 1 个月。既往体健。胃镜检查结果为黏膜相关性淋巴样组织淋巴瘤。与该病发生密切相关的病原体是
- A. 军团菌 B. 粪肠球菌
C. 幽门螺杆菌 D. 产气肠杆菌
E. 大肠埃希菌
97. 男, 70 岁。上腹痛一年, 进食后加重, 大便 10 次/天, 可见脂肪滴。查体: 上腹中部压痛 (+)。腹部 B 超: 胰腺多发钙化灶。需要给予
- A. 钙通道阻滞剂 B. 质子泵抑制剂
C. 抗胆碱药物 D. 胰酶制剂
E. H₂ 受体拮抗剂
98. 男, 72 岁。反酸、烧心 36 年。呼吸困难, 乏力 2 个月。间断口服质子泵抑制剂治疗, 起初有效, 近 2 个月效果不佳。胃镜检查示: 食管下段及贲门区隆起溃疡性病变, 质脆、易出血。最有可能的活组织检查为
- A. 淋巴瘤 B. 神经内分泌肿瘤
C. 胃肠间质瘤 D. 鳞癌
E. 腺癌
99. 男, 33 岁。消化性溃疡反复发作并出血 3 年。再出血 1 周, 内科治疗无效, 行手术治疗。术中见胃皱襞显著增厚, 组织病理学检查发现明显的壁细胞增生。最可能导致该病变的内源性物质是
- A. 转化生长因子 α B. 促胃液素
C. 促胰液素 D. 生长抑素
E. 乙酰胆碱
100. 男, 68 岁。恶心、上腹隐痛、呕吐少量咖啡

- 样液体 2 天。高血压、血脂异常病史 2 年，长期口服阿司匹林 100mg/d。胃镜检查可见胃窦黏膜多发糜烂，表面附着血性黏液。最适应的治疗药物是
- A. 多潘立酮 B. 奥美拉唑
C. 枸橼酸铋钾 D. 硫糖铝
E. 法莫替丁
101. 女，70 岁。冠心病、高血压、糖尿病患者。近 1 个月调整用药为阿司匹林、比索洛尔、辛伐他汀、二甲双胍。近 3 天双下肢无力及疼痛，双侧足背动脉搏动一致。实验室检查：血 CK 2200U/L，cTnI 0.01ng/ml，血肌酐 368 $\mu\text{mol/L}$ 。出现双下肢无力及疼痛的最可能原因是
- A. 糖尿病病足 B. 主动脉夹层
C. 间歇性跛行 D. 横纹肌溶解
E. 腰椎间盘突出症
102. 糖尿病患者，女，65 岁，家庭主妇，初中文化程度。医生给予的饮食建议，容易理解和执行的说法是
- A. “您每天摄入热量不能超过 1200 千卡。”
B. “您必须严格控制饮食，要低盐、低脂、低糖饮食。”
C. “每顿饭主食 2 两，少吃油腻的。”
D. “不吃甜食。稀饭、甘蔗、西瓜、甜饮料，少吃肉、油，可吃点粗粮”
E. “您一定要管住自己的嘴，原来爱吃的都不能吃了。”
103. 某心外科医生在实施一例先天性心脏病手术之前的晚上，在自己脑海中反复想象手术的过程、路径以及手术以外的应对措施等，这种思维方式是
- A. 聚合思维 B. 形象思维
C. 发散思维 D. 抽象思维
E. 创造思维
104. 男，41 岁。腹泻 1 天。1 天前进食海产品后出现腹泻。大便 30 余次，为米泔样便。查体：P 110 次/分，BP 80/50mmHg，皮肤干皱，弹性稍差，眼窝凹陷。血常规：Hb 162g/L，WBC $13.7 \times 10^9/\text{L}$ ，N 0.85，PLT $142 \times 10^9/\text{L}$ 。该患者腹泻的发生机制是
- A. 肠黏膜细胞内 cAMP 水平升高，过度分泌水及电解质
B. 胆汁分泌减少引起胃肠功能紊乱
C. 主要由于结肠、乙状结肠肠管麻痹
D. 主要由于脏器的实质性损害
E. 与致病菌引起的侵袭性病变有关
105. 女，18 岁。持续发热 10 天，于 9 月 2 日来诊，体温逐日升高，伴乏力，纳差。查体：T 39.8℃，P 80 次/分，精神萎靡，腹部可见 6 个充血性皮疹，腹部胀气，脾肋下可及。实验室检查：血 WBC $3.7 \times 10^9/\text{L}$ 。此患者所患疾病的主要病理特点是
- A. 基本病变是小血管炎
B. 全身单核-吞噬细胞系统增生性反应
C. 小肠黏膜苍白、水肿
D. 主要病变在淋巴结和胸腺
E. 肠黏膜呈弥漫性纤维蛋白渗出性炎症
106. 男，40 岁。右下肢肿胀、剧痛 3 小时。1 天前用粪便在农田施肥时，右足被扎伤，半夜感胀裂样痛，症状加重，出现下肢肿胀，皮肤由紫红变成黑紫、水肿有水疱。查体：局部皮下有捻发音，伤口处有的血性浆液渗出。最可能的致病菌是
- A. 乙型溶血性链球菌 B. 大肠埃希菌
C. 表皮葡萄球菌 D. 梭状芽孢杆菌
E. 结核杆菌
107. 女，50 岁。右乳头皮肤脱屑、结痂半年。去除痂皮可见糜烂样创面，刮片细胞学检查：可见大而异型、胞质透明的肿瘤细胞。这种细胞称为
- A. 镜影细胞 B. L&H 型细胞
C. 陷窝细胞 D. Paget 细胞
E. 多核瘤巨细胞
108. 男，70 岁。右侧肢体动作迟缓伴震颤半年。查体：右侧肢体静止性震颤，肌张力齿轮样增高。病变可能的部位是
- A. 大脑皮质 B. 黑质
C. 小脑 D. 内囊
E. 脑桥
109. 女，30 岁。腹痛、腹泻伴里急后重 3 天。最



初为稀便，2天后为黏液脓血便，偶见片状灰白色膜状物排出。此病变最可能的炎症类型是

- A. 纤维素性炎
- B. 变质性炎
- C. 浆液性炎
- D. 出血性炎
- E. 化脓性炎

110. 女，19岁。因急性白血病接受骨髓移植治疗，术后被安置于无菌病房中，根据病情，需限制亲属探视，在此期间患者常常出现心情烦躁、不安，针对此情况，心理治疗师指导其采用冥想结合深呼吸的方法来改善自己的情绪，这种应对方式属于

- A. 取得社会支持
- B. 消除应激来源
- C. 调整认知评价
- D. 心理防御机制
- E. 自我调节放松

111. 某电视台编辑求助于一家心理治疗中心，希望在该电视台上播放韦氏智力测验的具体内容，以引起公众对心理学的兴趣，但被心理中心的工作人员婉言拒绝，该工作人员遵循的原则是

- A. 保密原则
- B. 稳定性原则
- C. 标准化原则
- D. 回避原则
- E. 客观原则

112. 男，56岁。上腹胀痛不适10年，常于进食后半小时加重，可自行缓解。近3个月来体重减轻5kg，胃镜检查示胃小弯侧直径3cm溃疡病灶，取活组织标本行病理检查。能够诊断溃疡病灶属恶性的病理形态学依据是

- A. 细胞质出现空泡
- B. 胞质黏液明显增多
- C. 细胞核大小一致
- D. 核仁清楚
- E. 细胞异型性明显

113. 男，13岁，学生。持续畏寒、发热1周，神志不清半天。病前有右足刺伤史。查体：T 39.5℃，P 123次/分，BP 65/45mmHg，右足跟部红肿，血常规 WBC 24.3×10^9 ，N 0.89，L 0.11。导致本病最可能的病原体是

- A. 革兰阴性菌
- B. 真菌
- C. 革兰阳性菌
- D. 病毒
- E. 寄生虫

114. 女，40岁。右上腹胀痛伴畏寒、发热2天，

巩膜黄染1天。查体：T 39℃，P 100次/分，右上腹部压痛、反跳痛及肌紧张明显，肝区叩击痛阳性，血 WBC $18.2 \times 10^9/L$ ，N 0.85。B超示胆囊及胆总管结石，该患者最可能感染的致病菌是

- A. 草绿色链球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 肺炎链球菌

115. 某村卫生室私自从“不法药贩”处购入药品用于患者的治疗，险些造成患者死亡。事发后，经有关部门调查检测，认定该药品为假药。该认定依据的事实是

- A. 药品标签未标明有效期
- B. 药品擅自添加着色剂
- C. 直接接触药品的包装材料未经批准
- D. 药品超过有效期
- E. 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符

【A3/A4型题】

(116~117题共用题干)

男，18岁。双下肢及颜面水肿1周。尿沉渣镜检：RBC 0~2个/HP，尿蛋白定量12.2g/d。血 ALB 18g/L，Scr 79μmol/L，ANA(-)，乙型肝炎病毒标志物均(-)。

116. 该患者最可能的肾脏病理类型是

- A. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
- B. 微小病变型肾病
- C. 膜性肾病
- D. 膜增生性肾小球肾炎
- E. 局灶节段性肾小球硬化

117. 如果经足量糖皮质激素治疗12周无效，其病理类型最可能是

- A. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
- B. 微小病变型肾病
- C. 膜性肾病
- D. 膜增生性肾小球肾炎
- E. 局灶节段性肾小球硬化

(118~120题共用题干)

用钼靶X线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验，分别检查了100名经活检确诊的乳腺癌妇女和100名未患乳腺癌的妇女，结果如下表：

活检确诊结果

筛检结果	乳腺癌	非乳腺癌	合计
阳性	64	16	80
阴性	36	84	120
合计	100	100	200

118. 此项筛检试验中灵敏度为

- A. 16% B. 84%
C. 64% D. 36%
E. 74%

119. 此项筛检试验中特异度为

- A. 16% B. 84%
C. 64% D. 36%
E. 74%

120. 此项筛检试验的粗一致率为

- A. 36% B. 16%
C. 84% D. 74%
E. 64%

(121 ~ 133 题共用题干)

连某因患严重的躁狂抑郁障碍，正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化，患者出现伤人毁物等行为，医院在没有其他可替代措施的情况下，对其实施了约束身体的措施，但实施后没有及时通知连某的监护人。连某的父亲作为监护人探视时，看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。

121. 依照《精神卫生法》对患者连某实施的约束行为的性质属于

- A. 治疗性措施
B. 惩罚性措施
C. 保护性医疗措施
D. 诊断性措施
E. 警告性措施

122. 对患者连某实施身体约束而未告知其监护人的做法，侵犯的患方权利是

- A. 生命权 B. 健康权
C. 认知权 D. 知情权
E. 名誉权

123. 该案例中所形成的医患关系模式是

- A. 主动-被动型 B. 指导-合作型
C. 契约许可型 D. 指导参与型
E. 共同参与型

(124 ~ 125 题共用题干)

男，40岁。体检发现空腹血糖升高2个月。2次查空腹血糖分别为7.8mmol/L、7.4mmol/L，无口干、多饮、多食、多尿、体重下降。查体：身高170cm，体重90kg，BMI 31.1，余无异常。实验室检查：HbA1c 7.8%。

124. 该患者首选的治疗药物是

- A. 罗格列酮 B. 胰岛素
C. 阿卡波糖 D. 二甲双胍
E. 格列苯脲

125. 药物治疗2个月后，空腹血糖降至6.2mmol/L，餐后2小时血糖9~10mmol/L，拟采用药物联合治疗，首选的治疗药物是

- A. 罗格列酮 B. 格列苯脲
C. 胰岛素 D. 二甲双胍
E. 阿卡波糖

【B型题】

(126 ~ 127 题共用备选答案)

- A. 阿卡波糖 B. 胰岛素
C. 格列美脲 D. 比格列酮
E. 二甲双胍

126. 主要减少肝糖输出的药物是

127. 属于过氧化物酶增殖体活化因子受体 γ 激动剂的是

(128 ~ 130 题共用备选答案)

- A. 散点图 B. 圆图
C. 直条图 D. 直方图
E. 线图

128. 用于描述连续型变量资料频率分布的统计图是

129. 可用于描述两连续型变量之间相关关系的统计图是

130. 描述事物内部各组成部分所占比重宜使用

(131 ~ 132 题共用备选答案)

- A. 支气管哮喘 B. 血清病
C. 药物过敏性休克 D. 接触性皮炎
E. 自身免疫性溶血性贫血

131. 属于Ⅱ型超敏反应的疾病是

132. 属于Ⅲ型超敏反应的疾病是

(133 ~ 135 题共用备选答案)

- A. 主要为收缩压升高



- B. 收缩压与舒张压均升高
- C. 主要为舒张压升高
- D. 收缩压降低, 舒张压升高
- E. 收缩压升高, 舒张压可降低

133. 严重甲状腺功能亢进患者的动脉血压变化特点是

134. 正常老年人动脉血压的生理性变化特点主要是为

135. 以小动脉硬化为主的患者动脉血压变化特点是

(136 ~ 137 题共用备选答案)

- A. 列兵样排列
- B. 形成管状结构
- C. 形成乳头状结构
- D. 有角化珠
- E. 有假菊形团结构

136. 最符合小细胞癌组织学特点的是

137. 最符合高分化鳞癌组织学特点的是

(138 ~ 139 题共用备选答案)

- A. 氧化与磷酸化的偶联
- B. CO 对电子传递的影响
- C. 能量的贮存与利用
- D. $2H^+$ 与 $1/2 O_2$ 的结合
- E. 乳酸脱氢酶催化的反应

138. 与 ADP 和 ATP 相互转变相关的过程是

139. 与 ATP 生成有关的主要过程是

(140 ~ 141 题共用备选答案)

- A. 直肠息肉形成
- B. 脾脏白色锥形病灶
- C. 回盲部肠腔狭窄
- D. 胃壁溃疡形成
- E. 肝脏肿大

140. 肺外结核病最常引起的形态改变是

141. 慢性肺淤血可引起的脏器改变是

(142 ~ 143 题共用备选答案)

- A. 丙酮酸羧化
- B. 乙酰 CoA 缩合
- C. 糖原分解
- D. 黄嘌呤氧化
- E. 糖原合成

142. 生成酮体的中间反应是

143. 三羧酸循环中草酰乙酸的来源是

(144 ~ 145 题共用备选答案)

- A. 开具抗菌药物处方牟取不正当利益
- B. 发生抗菌药物不良事件
- C. 出现开具抗菌药物超常处方 3 次以上且无正当理由
- D. 因紧急情况越级使用抗菌药物
- E. 使用的抗菌药物明显超出规定用量

144. 医疗机构对医师提出警告并限制其特殊使用级抗菌药物处方权的情形是

145. 医疗机构取消医师抗菌药物处方权的情形是

(146 ~ 148 题共用备选答案)

- A. 勇担风险, 团结协作
- B. 掌握手术指征, 动机纯正
- C. 以健康、稳定的情绪影响患者
- D. 对症下药, 剂量安全
- E. 减轻痛苦, 加速康复

146. 手术后治疗的伦理要求是

147. 心理治疗的伦理要求是

148. 临床急救的伦理要求是

(149 ~ 150 题共用备选答案)

- A. 抗 - HBs
- B. 抗 - HBc IgM
- C. 抗 - HBc IgG
- D. 抗 - HBe
- E. 抗 - HDV

149. 乙型肝炎的保护性抗体是

150. 提示体内乙型肝炎病毒处于复制状态的抗体是