



国家护士(师)资格考试



直通车系列

2018

护理学(主管护师)考试 考点难点解析

主编 张红 成丽

- ▶ **高含金量** 高频考点全覆盖, 含历年真题
- ▶ **高针对性** 常见考点难点深度剖析
- ▶ **高附加值** 附赠3套押题卷, 网络试题免费试做
- ▶ **高含金量+高针对性+高附加值=高通过率**

中国医药科技出版社

国家护士(师)资格考试直通车系列

2018

护理学(主管护师)考试 考点难点解析

主编	张 红	成 丽	
编者	梁燕飞	杨仕宁	潘学成
	周红妮	费旭静	梅春丽
	张莉莉	李 辉	王 月
	韩 燕	梁轶群	
组织	覃丽洁	杨丽芬	

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为国家护士(师)资格考试直通车系列图书之一,全书共7章,分别为内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理健康教育学、医院感染护理学和护理管理学。书后有综合复习测试练习。各章的习题紧扣考试大纲,包含常考知识点、重点、难点等,除极个别题目外,都有详细的解析、全面的考点分析、答题思路和方法,以帮助考生尽快理解、掌握知识点,并能做到举一反三,使考生在做题过程中查漏补缺、巩固知识。

图书在版编目(CIP)数据

2018 护理学(主管护师)考试考点难点解析 / 张红,成丽主编. —北京:中国医药科技出版社,2017.7

国家护士(师)资格考试直通车系列

ISBN 978-7-5067-9278-3

I. ①2… II. ①张… ②成… III. ①护理学-资格考核-自学参考资料 IV. ①R47

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第087006号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm¹/₁₆

印张 11¹/₂

字数 287千字

版次 2017年7月第1版

印次 2017年7月第1次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-9278-3

定价 28.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



前 言

护理学（主管护师）考试是为贯彻原人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年正式开始实行。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，是单位聘任相应技术职务的必要依据。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，我们特组织有关专业教师编写了《2018 护理学（主管护师）考试考点难点解析》。本书严格按照实际考试的题型分布进行编写，能有效地帮助考生进行考前自测，考查和反馈复习成果，对考生应试有较强的针对性和指导性。本书依托考试大纲、历年常考知识点、重点和难点进行选题，并对试题进行详细的解析，全面地分析考点，指出答题思路和方法，以帮助考生尽快理解、掌握知识点和能做到举一反三。特别是本书包含了部分历年真题中的重点、难点试题，供考生参考复习。

《2018 护理学（主管护师）考试考点难点解析》全书的亮点：

1. 专业的编写委员会。编写成员均是在高校任职的一线教师兼在医院任职，对护理学（护师、主管护师）专业技术资格考试有着十多年的教学、培训经验。特别感谢西安交通大学医学院附属红会医院及广西科技大学等单位参与编写本书的各位老师。

2. 试题的含金量高。全书紧扣考试大纲，精选历年常考知识点、重点、难点。书中还包含历年真题、冲刺试题。

3. 解析全面详细、举一反三。

4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

预祝各位考生，搭乘本“直通车”，顺利通过考试。

编 者
2017 年 3 月

目 录

第一章 内科护理学	1
第二章 外科护理学	42
第三章 妇产科护理学	74
第四章 儿科护理学	96
第五章 护理健康教育学	110
第六章 医院感染护理学	117
第七章 护理管理学	126
测试练习	132

第一章 内科护理学

一、A1/A2 型题

1. β_2 受体激动剂治疗哮喘时首选的给药方式为
A. 口服 B. 吸入
C. 肌内注射 D. 静脉滴入
E. 直肠给药
2. 肺源性心脏病心力衰竭可出现以下常见症状和体征,除了
A. 水肿 B. 尿少
C. 颈静脉充盈 D. 咳粉红色泡沫痰
E. 肝大及压痛
3. 下列哪项可用来估计慢性左心衰竭的严重程度
A. 发绀的程度
B. 持续低流量吸氧时间
C. 咳嗽、咳痰的频率和量
D. 病人采取的坐位的高低
E. 情绪状态
4. 超声雾化吸入操作正确的是
A. 水槽内加冷蒸馏水 50ml
B. 用冷蒸馏水稀释药液至 10ml
C. 添加药液应先关机
D. 治疗毕,先关电源开关
E. 雾化罐、螺纹管治疗必须浸泡消毒
5. 与支气管哮喘发作有关的免疫球蛋白是
A. IgE B. IgG
C. IgA D. IgD
E. IgM
6. 支气管扩张大咯血窒息病人,应采取的正确卧位是
A. 头低位 B. 俯卧位
C. 平卧位 D. 端坐卧位
E. 半坐卧位

7. 肺炎球菌肺炎病人,出现哪种表现提示有并发症发生
A. 体温退后复升 B. 体温持续上升
C. 体温先升后退 D. 咳铁锈色痰
E. 咳粉红色泡沫样痰
8. 病态窦房结综合征有症状者的治疗方法是
A. 安装起搏器 B. 介入治疗
C. 射频消融术 D. 电复律治疗
E. 手术治疗
9. 持续心房颤动最有效的复律手段为
A. 洋地黄
B. 同步直流电复律术
C. 导管消融术
D. 植入起搏器
E. 维拉帕米
10. 风湿性心脏病病人出现下列何种临床征象,可提示脑动脉栓塞发生
A. 休克 B. 咯血
C. 偏瘫 D. 腰痛、血尿
E. 剧烈胸痛
11. 胸廓两侧呼吸运动减弱见于
A. 肺气肿 B. 肺不张
C. 肺炎 D. 胸膜粘连
E. 气胸
12. 促进长期卧床病人排痰的有效措施是
A. 负压吸引 B. 提高机体免疫力
C. 翻身叩背 D. 体液引流
E. 药物祛痰
13. 关于急性心肌梗死后心律失常的处理措施不妥的是
A. 持续阵发性室性心动过速,首选利多卡因静脉注射

- B. 室上性快速心律失常多用维拉帕米
- C. 快速型心律失常时可用阿托品
- D. 发生二度Ⅱ型或三度房室传导阻滞, 可植入人工心脏起搏器
- E. 持续多形性室性心动过速时, 应尽快采用非同步直流电除颤

14. 高血压病人眼底出现下列何种情况, 提示高血压严重度分级为Ⅱ级

- A. 视网膜动脉痉挛
- B. 视网膜动脉狭窄
- C. 眼底出血
- D. 眼底絮状渗出
- E. 视盘水肿

15. 下列急性肺水肿的护理措施中, 哪项不正确

- A. 指导病人取坐位或半坐卧位双腿下垂
- B. 给予持续低流量吸氧
- C. 遵医嘱给予毛花苷丙缓慢静脉注射
- D. 皮下注射或静脉推注吗啡
- E. 给予氨茶碱缓慢静脉推注

16. 慢性阻塞性肺疾病突发胸痛考虑的并发症是

- A. 慢性肺源性心脏病
- B. 肺结核
- C. 自发性气胸
- D. 肺部感染
- E. 呼吸衰竭

17. 下列关于急性上呼吸道感染的描述错误的是

- A. 成人普通感冒多由细菌感染引起
- B. 普通感冒主要表现为咽干、喉痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞, 一般肺部无干、湿性啰音
- C. 急性细菌性扁桃体炎病人可有高热、咽部明显充血, 扁桃体肿大、充血, 表面常有黄色点状渗出物
- D. 感冒病人如出现耳痛、耳鸣、听力减退、外耳道流脓等常提示并发中耳炎
- E. 受凉、淋浴、过度疲劳常为急性上呼吸道感染的诱因

18. 呼吸衰竭缺氧伴 CO_2 潴留病人不可能出现

- A. 呼吸浅快
- B. 发绀
- C. 心率、血压变化
- D. 皮肤干燥

E. 球结膜充血、水肿

19. 呼吸衰竭病人表现为头痛头胀, 日轻夜重, 昼眠夜醒, 神志恍惚等, 应考虑

- A. 窒息先兆
- B. 休克早期
- C. 肺性脑病
- D. 呼吸性酸中毒
- E. 脑疝出现

20. 病人, 男性, 68岁, 患高血压20余年, 近半年来常于劳累后出现呼吸困难, 休息后可以很快缓解, 体力活动不受限制, 诊断为慢性心功能不全。该病人的心功能属于

- A. 心功能Ⅰ级
- B. 心功能Ⅱ级
- C. 心功能Ⅲ级
- D. 心功能Ⅳ级
- E. 心功能Ⅴ级

21. 病人, 男, 60岁, 近1个月劳累时感胸前区疼痛, 诊为冠心病, 心绞痛。目前病人一般体力活动明显受限, 步行一段路或登楼梯一层即可发生心绞痛。根据加拿大心血管学会分级, 该病人心绞痛严重度分级属于

- A. Ⅰ级
- B. Ⅱ级
- C. Ⅲ级
- D. Ⅳ级
- E. Ⅴ级

22. 当病人吸入氧气流量为 $5\text{L}/\text{min}$ 时其氧浓度是

- A. 29%
- B. 33%
- C. 37%
- D. 41%
- E. 45%

23. 肺气肿病人最具特征性的体征是

- A. 肋间隙饱满
- B. 呼吸运动减弱
- C. 触觉语颤减弱
- D. 双肺叩诊呈过清音
- E. 听诊呼吸音减弱, 呼气延长

24. 慢性支气管炎最常见的并发症是

- A. 支气管扩张
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 肺脓肿
- D. 慢性呼吸衰竭
- E. 支气管肺炎

25. 大便隐血试验阳性, 说明上消化道出血量约为

- A. $>1\text{ml}$
- B. $>5\text{ml}$
- C. $>20\text{ml}$
- D. $>50\text{ml}$

E. >100ml

26. 雷尼替丁抑制胃酸分泌的作用机制是

- A. 与溃疡面结合形成保护屏障
- B. 抑制壁细胞分泌 H^+ 的 H^+ , K^+ - ATP 酶
- C. 与盐酸作用形成盐和水
- D. 通过选择性竞争结合 H_2 受体, 使壁细胞分泌胃酸减少
- E. 可刺激局部内源性前列腺素的合成

27. 急性胰腺炎止痛应禁用哪种药物

- A. 西咪替丁
- B. 吗啡
- C. 生长抑素
- D. 阿托品
- E. 哌替啶

28. 属于节律异常的脉搏是

- A. 缓脉
- B. 丝脉
- C. 绌脉
- D. 洪脉
- E. 速脉

29. 导致心包炎最常见的病原体是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 军团菌
- C. 结核杆菌
- D. 支原体
- E. 真菌

30. 心力衰竭控制后责任护士向病人及家属进行健康教育, 其内容哪项不妥

- A. 适量运动, 以不出现心悸、气短为度
- B. 少量多餐, 以减轻心脏负荷
- C. 食谱选择不受限制, 以促进食欲
- D. 坚持服药, 定期门诊复查
- E. 积极防治风湿热, 避免心力衰竭诱因, 做好防寒保暖

31. 导致二尖瓣狭窄病人死亡的主要原因是

- A. 栓塞
- B. 肺部感染
- C. 心肌梗死
- D. 心力衰竭
- E. 呼吸衰竭

32. 病人, 女性, 46 岁, 3 年前出现皮肤瘙痒和黄疸, 诊断为原发性胆汁性肝硬化, 近 1 周黄疸加深, 出现大量腹水, 在护理中不正确的是

- A. 按医嘱给予利尿剂
- B. 指导病人取半卧位以减轻呼吸困难
- C. 定期测量腹围
- D. 进水量限制在 1000ml/d 左右, 准确记录每

日出入量

E. 低盐饮食, 限制每日食盐 5g

33. 病人, 女性, 38 岁, 因十二指肠溃疡出血急诊入院治疗。呕血时应指导病人采取何种体位

- A. 平卧位
- B. 侧卧位
- C. 头低脚高位
- D. 头高脚低位
- E. 半坐位

34. 镜下血尿是指新鲜尿离心沉渣后每高倍镜视野红细胞数

- A. 0~3 个
- B. 超过 3 个
- C. 超过 5 个
- D. 超过 7 个
- E. 超过 10 个

35. 终止心绞痛发作最有效的药物是

- A. 硝苯地平
- B. 普萘洛尔
- C. 阿司匹林
- D. 硝酸甘油
- E. 阿托品

36. 下面对于心绞痛病人的用药指导, 不妥的是

- A. 坚持服用预防心绞痛发作的药物
- B. 发生心动过缓时应暂停服用并到医院就诊
- C. 随身携带硝酸甘油片
- D. 硝酸甘油应避光保存, 放置在固定地点
- E. 每年更换一次药物

37. 肾病综合征病人 24 小时尿蛋白量为

- A. 大于 150mg
- B. 小于 0.5g
- C. 小于 1.0g
- D. 1~3g
- E. 大于 3.5g

38. 导致肾衰竭病人发生纤维囊性肾炎的病因是

- A. 骨化三醇缺乏
- B. 代谢性酸中毒
- C. 营养不良
- D. 继发性甲状旁腺功能亢进
- E. 铝中毒

39. 下列属于 II 度房室传导阻滞心电图表现的是

- A. P-R 间期进行性延长, 直至 QRS 波群脱落
- B. P-R 间期超过 0.20 秒, 无 QRS 波群脱落
- C. P-P 间期相等, R-R 间期相等

- D. P 波频率大于 QRS 波频率
- E. QRS 波群形态取决于阻滞部位

40. 肥厚型心肌病的特征为

- A. 心脏扩大为主,累及左右心室
- B. 心力衰竭
- C. 心肌非对称性肥厚,心室腔变小
- D. 以左心受累为主,伴有不同程度的肥厚
- E. 心室收缩功能减低

41. 下列对于高血压诊断的说法正确的是

- A. 不同时间测量两次血压,一次超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- B. 测量两次血压,均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- C. 测量三次血压,均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- D. 不同时间测量三次血压,均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- E. 不同时间测量三次血压,一次超过正常血压值的高限可诊断为高血压

42. 缩窄性心包炎病人心影的特点是

- A. 心影大小正常,呈三角形
- B. 心影明显增大,呈三角形
- C. 心影大小正常,呈烧瓶样
- D. 心影明显增大,呈烧瓶样
- E. 心影大小正常,呈梨形

43. 出现下列何种情况,提示高血压分期为Ⅱ期

- A. 头晕、耳鸣
- B. 蛋白尿
- C. 心绞痛
- D. 血肌酐 $>177\mu\text{mol/L}$
- E. 视网膜出血

44. 心电图检查时红色导联线应连接在

- A. 右上肢
- B. 右下肢
- C. 左下肢
- D. 胸前
- E. 左上肢

45. 病人,男性,56岁,因糖尿病肾病致慢性肾衰竭,责任护士对病人的饮食指导中,不妥的是

- A. 低蛋白饮食, $20\sim40\text{g/d}$
- B. 摄入高生物效价蛋白如豆制品等
- C. 保证充足的热量供给
- D. 每日液体入量应按前1天出液量加 $500\sim$

600ml 来计算

- E. 尿量在 1000ml/d 以上而又无水肿者,可不限制饮水

46. 根据血红蛋白下降程度,中度贫血是指

- A. $\text{Hb} < 150\text{g/L}$
- B. 男性 $\text{Hb} < 120\text{g/L}$, 女性 $\text{Hb} < 110\text{g/L}$
- C. $\text{Hb} < 90\text{g/L}$
- D. $\text{Hb} < 60\text{g/L}$
- E. $\text{Hb} < 30\text{g/L}$

47. 下列哪项不是慢性粒细胞白血病病人进入加速期的表现

- A. 不明原因高热
- B. 原有效药物无效
- C. 乏力、消瘦、盗汗
- D. 出血突然加重
- E. 脾迅速肿大

48. 急性心肌梗死病人急需住院治疗,住院处护送人员首先应

- A. 办理入院手续,卫生处置
- B. 进行护理诊断
- C. 介绍医院规章制度
- D. 氧气吸入,立即用平车送病人入病区
- E. 留尿便标本进行检验

49. 某高血压病病人,同时患有支气管哮喘,他不能使用以下哪种降压药物

- A. 呋塞米
- B. 卡托普利
- C. 硝苯地平
- D. 阿替洛尔
- E. 哌唑嗪

50. 扩张型心肌病第一阶段的临床表现为

- A. 无症状, X 线检查可有心脏轻度增大
- B. 极度疲劳、乏力症状
- C. 气促、心悸等症状
- D. 肝大、水肿
- E. 腹水等充血性心力衰竭表现

51. 长期无保护地接触 X 线可造成

- A. 表皮灼伤
- B. 肺结核
- C. 骨髓受抑制
- D. 营养不良
- E. 骨脱钙

52. 下列关于造血干细胞移植病人的护理,描

述错误的是

- A. 移植前复查血象、骨髓象、血生化、肝肾功能、心电图等, 清除感染灶
- B. 入室前3天开始口服肠道不吸收的抗生素, 进行肠道消毒
- C. 移植前预处理的目的是杀灭肿瘤或白血病细胞; 抑制免疫反应, 减少排斥; 腾空骨髓造血龕, 以利植入
- D. GVHD分为急、慢性两型, 一般2个月以内发生的为急性GVHD。2个月以后发生的为慢性GVHD
- E. 急性GVHD易发生在移植后20天左右、白细胞逐渐回升时, 要注意观察耳后、手掌、脚心等部位的皮肤改变

53. 护士对于心力衰竭控制后扩张型心肌病病人的健康教育不正确的是

- A. 注意观察病情变化, 症状加重时及时就医
- B. 长期休息, 适当限制体力活动
- C. 加强锻炼和体力活动, 增加活动耐力
- D. 避免诱发因素
- E. 坚持药物治疗

54. 左心衰竭进展为全心衰竭时, 有所减轻的症状是

- A. 发绀
- B. 呼吸困难
- C. 水肿
- D. 疲乏
- E. 心悸

55. 心力衰竭病人的饮食, 下列哪项不妥

- A. 低盐
- B. 富含维生素
- C. 高热量
- D. 适量纤维素
- E. 少量、多餐

56. 一位58岁男性高血压病病人, 夜间突然惊醒, 被迫坐起, 烦躁不安, 咳嗽、气急, 咳粉红色泡沫痰, 若采取以下护理措施, 哪项不妥

- A. 置双腿下垂半坐位
- B. 乙醇湿化面罩加压给氧
- C. 肌内注射吗啡2mg
- D. 硝酸甘油片0.3mg舌下含化
- E. 静脉注射呋塞米(速尿)20mg

57. 按照《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》, 肥胖是指BMI大于等于

- A. 18.5
- B. 20
- C. 21
- D. 23
- E. 25

58. 下列属于甲亢病人特征性表现的是

- A. 怕热多汗、多食消瘦
- B. 大便呈糊状
- C. 肝功能异常
- D. 肠鸣音亢进
- E. 大便次数多

59. 甲状腺功能亢进代谢率增高综合征不包括

- A. 食欲亢进
- B. 体重增加
- C. 低热
- D. 多汗
- E. 腹泻

60. 急性心包炎病人当心影向两侧扩大, 呈烧瓶样时提示心包积液量

- A. 大于50ml
- B. 大于100ml
- C. 大于150ml
- D. 大于300ml
- E. 大于250ml

61. 双气囊三腔管压迫止血适用于

- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 急性出血性糜烂性胃炎出血
- C. 胃癌并出血
- D. 胆道出血
- E. 消化性溃疡并出血

62. 甲状腺功能亢进病人具有特征性的神经系统症状是

- A. 神经过敏
- B. 兴奋性增高
- C. 烦躁多虑
- D. 注意力分散
- E. 双手平伸时手指细颤

63. 甲硫氧嘧啶的作用机制是

- A. 抑制甲状腺素的合成
- B. 降低甲状腺激素效价
- C. 抑制甲状腺对碘的吸聚
- D. 抑制甲状腺释放甲状腺激素
- E. 增加肝对甲状腺激素的降解

64. 护理甲状腺危象病人高热时, 应禁用

- A. 异丙嗪
- B. 酒精擦浴

- C. 温水擦浴 D. 布洛芬
E. 阿司匹林

65. 能反映病人取血前 8 ~ 12 周血糖水平的检查是

- A. 尿糖
B. 随机血糖
C. 口服葡萄糖耐量试验
D. 糖化血红蛋白
E. 餐后 2 小时血糖

66. 溃疡性结肠炎病人最常见的护理诊断是

- A. 体液不足 B. 皮肤完整性受损
C. 焦虑 D. 腹泻
E. 有感染的危险

67. 紧急胃镜检查应在上消化道出血后

- A. <24 小时 B. 24 ~ 48 小时
C. 48 ~ 72 小时 D. >72 小时
E. 出血停止

68. 关于肝性脑病，正确的是

- A. 一期脑电图轻度异常
B. 二期 Babinski 征阳性
C. 三期腱反射减弱或消失
D. 四期有扑翼样震颤
E. 一期病人出现精神症状

69. 糖尿病酮症酸中毒的特征性表现为

- A. 呼吸加深加速
B. 皮肤黏膜干燥
C. 昏迷
D. 二氧化碳结合力下降
E. 呼气有烂苹果味

70. 一昏迷病人由警察送来急诊，无法询问病史，但病人呼吸时有烂苹果味，查血糖 33.6mmol/L，可拟诊何病

- A. 酒醉
B. 有机磷农药中毒
C. 糖尿病酮症酸中毒
D. 蛛网膜下隙出血
E. 癔症

71. 血清氨基转移酶水平反映

- A. 肝细胞变性或坏死程度

- B. 肝脏纤维化程度
C. 肝细胞再生程度
D. 肝脏解毒功能
E. 胆汁排泄功能

72. 下列哪个选项不属于肝性脑病的临床分期

- A. 前驱期 B. 昏迷前期
C. 昏睡期 D. 昏迷期
E. 昏迷后期

73. 肝硬化病人出现持续性白细胞减少，与哪个选项关系最大

- A. 脾功能亢进 B. 营养吸收障碍
C. 上消化道出血 D. 肝肾综合征
E. 低蛋白血症

74. 抢救糖尿病酮症酸中毒病人时，失水失钠纠正后，当血糖已下降至 14mmol/L 左右，若需输 5% 葡萄糖盐水 1000ml，应同时输入多少速效胰岛素

- A. 8U B. 16U
C. 24U D. 32U
E. 40U

75. 系统性红斑狼疮最常见的皮肤损害发生在

- A. 颈部 B. 胸部
C. 腹部 D. 暴露部位
E. 腿部

76. 原发性肝癌肝外血行转移最多见于

- A. 肺 B. 骨
C. 脑 D. 皮肤
E. 肾

77. 三腔管充气后，管末端牵引的重量为

- A. 0.25kg B. 0.75kg
C. 0.50kg D. 1.00kg
E. 1.25kg

78. 关于美曲磷酯（敌百虫）中毒病人的急救措施不妥的是

- A. 对受污染的皮肤和头发用大量清水擦洗
B. 口服中毒者用清水反复洗胃
C. 喷洒农药时中毒病人应马上脱去污染衣物
D. 眼部污染者用 2% 碳酸氢钠连续冲洗
E. 早期足量反复给予阿托品解毒

79. 每种传染病检疫期的确定是根据该病的
- 最长潜伏期
 - 平均潜伏期
 - 最短潜伏期
 - 前驱期
 - 症状明显期
80. 下列关于 HIV 的描述, 错误的是
- 属反转录病毒
 - 属单链 DNA 病毒
 - 可感染单核-巨噬细胞
 - 具有嗜神经性
 - 对热及化学消毒剂敏感
81. 消化性溃疡的治疗原则是
- 消除紧张情绪
 - 抑制胃酸
 - 阻止胆汁反流
 - 增强黏膜更新
 - 丰富胃壁血液
82. 消化性溃疡最重要的护理诊断是
- 疼痛
 - 焦虑
 - 知识缺乏
 - 活动无耐力
 - 营养失调
83. 对肝硬化呕血病人的正确护理措施是
- 消除恐惧心理
 - 吸氧
 - 给予半卧位
 - 温凉流质饮食
 - 苯巴比妥镇静
84. 在护理肝硬化严重腹水的病人时, 其饮食应注意给予
- 无盐低钠饮食
 - 低脂饮食
 - 低蛋白饮食
 - 高蛋白饮食
 - 高热量饮食
85. 流行性出血热低血压休克期多出现在病程的
- 第 1~3 日
 - 第 2~4 日
 - 第 4~6 日
 - 第 4~8 日
 - 第 5~8 日
86. 流行性脑脊髓膜炎 (流脑) 的主要传播途径是
- 空气、飞沫传播
 - 玩具及用品传播
 - 动物传播
 - 食物和水传播
 - 蚊子传播
87. 病人, 男性, 24 岁, 8 年前发现 HIV 抗体 (+), 40 余天前无明显诱因出现发热, 体温波动在 $38.0 \sim 38.5^{\circ}\text{C}$, 伴咳嗽、咳痰, 入院诊断为“卡氏肺孢子虫肺炎”。目前该病人的艾滋病分期最可能的是
- 潜伏期
 - 急性感染期
 - 无症状感染期
 - 持续性全身淋巴结肿大综合征期
 - 典型艾滋病期
88. 病人, 男性, 30 岁, 6 天前出现发热、食欲减退、腹胀, 查: $T 39.5^{\circ}\text{C}$, $P 75$ 次/分, 胸部可见 3 个皮疹, 压之褪色, 诊断为伤寒。为减轻病人的腹胀, 下列做法错误的是
- 停食产气类食物
 - 肛管排气
 - 补钾
 - 松节油腹部热敷
 - 给予新斯的明
89. 腹膜透析常见的并发症不包括下列哪项
- 腹痛
 - 腹膜炎
 - 引流不畅
 - 血压升高
 - 水、电解质紊乱
90. 慢性肾衰竭病人需严格记录出入液量是因为病人有
- 脱水
 - 水肿
 - 脱水或水肿
 - 低钾血症
 - 低钠血症
91. 急性白血病人发热 38°C 是由于
- 感染
 - 吸收热
 - 红细胞破坏
 - 白细胞破坏
 - 血小板过少
92. 慢性粒细胞白血病化疗首选
- 羟基脲
 - 白消安
 - 靛玉红
 - MTX
 - CTX
93. 判断病人意识障碍程度时, 所评估的主要内容不包括
- 瞳孔对光反射
 - 肌力
 - 吞咽反射
 - 角膜反射

E. 对疼痛刺激的反应

94. 腰椎穿刺的禁忌证，不包括

- A. 颅内压明显增高
- B. 穿刺部位皮肤感染
- C. 合并糖尿病
- D. 全身有感染性疾病
- E. 病情危重、躁动不安

95. 对脑组织有保护功能，且能防止脑血管痉挛的钙拮抗剂是

- A. 硝苯地平
- B. 美托洛尔
- C. 尼莫地平
- D. 硝酸甘油
- E. 多巴胺

96. 癫痫病人可参加的工作或活动是

- A. 驾驶
- B. 游泳
- C. 打太极拳
- D. 高空作业
- E. 登高

97. 淋巴细胞经胸腺作用后称 T 淋巴细胞，参与

- A. 吞噬作用
- B. 体液免疫
- C. 细胞免疫
- D. 造血
- E. 活化细胞

98. 缺铁性贫血治疗最重要的是

- A. 补充铁剂
- B. 病因治疗
- C. 脾切除
- D. 少量输血
- E. 肌肉注射维生素 B₁₂

99. 急性再生障碍性贫血病人一般不会出现

- A. 进行性贫血
- B. 肝、脾、淋巴结肿大
- C. 出血
- D. 全血细胞减少
- E. 感染

100. 中年女性，因头痛来门诊就医，询问病史时，病人突然主诉右上肢有蚁走感，经检查无异物刺激存在，病人可能出现了哪种类型的感觉障碍

- A. 感觉过敏
- B. 感觉异常
- C. 疼痛
- D. 感觉倒错
- E. 感觉过度

101. 下列关于库式呼吸困难的描述，正确的是

- A. 呼吸表浅，频率较快

B. 呼吸变深，节律规整

C. 呼吸与呼吸暂停相交替

D. 呼吸急促，有屏气现象

E. 呼吸急促、快慢不一

102. 急性白血病病人出现头痛、恶心、呕吐、颈项强直等症状常提示

- A. 颅内出血
- B. 败血症
- C. 上消化道出血
- D. 脑膜白血病
- E. 脑栓塞

103. 对白血病病人进行健康教育的内容中，哪项错误

- A. 化疗期间每天尿量至少达 2000ml
- B. 坚持服药、了解不良反应
- C. 化疗前后 2 小时内避免进食
- D. 注意保暖，预防感染
- E. 少量多餐

104. 下列哪项可以准确反映体内储存铁的情况

- A. 血清铁
- B. 血清铁蛋白
- C. 血红蛋白
- D. 红细胞计数
- E. 肌红蛋白

105. 最严重的输血反应是

- A. 空气栓塞
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 循环负荷过重
- E. 枸橼酸钠中毒

106. 气管内吸痰时，每次插管吸痰时间不宜超过

- A. 5 秒
- B. 10 秒
- C. 15 秒
- D. 30 秒
- E. 1 分钟

107. 关于结核菌素试验检查的意义，不正确的是

- A. 阴性提示肯定没有结核分枝杆菌感染
- B. 阳性仅表示感染，不一定患病
- C. 结核分枝杆菌感染的 4~8 周内，结核菌素试验可为阴性
- D. 应用免疫抑制剂者可为阴性
- E. 严重结核病人对结核菌素试验可无反应

108. 下列关于支原体肺炎的描述错误的是

- A. 病人以儿童和青年人居多

- B. 多为干咳
- C. 有明显的肺实变体征
- D. 血清学检查是诊断肺炎支原体感染常用的检测手段
- E. 治疗首选红霉素类

109. 急性白血病病人容易发生感染，主要原因是

- A. 白细胞增多
- B. 继发性营养不良
- C. 成熟粒细胞缺乏
- D. 长期贫血导致机体抵抗力下降
- E. 化疗药副作用

110. 急性白血病化疗诱导缓解后病人发生头痛、呕吐、视力障碍甚至瘫痪，是发生了

- A. 中枢神经系统白血病
- B. 脑出血
- C. 脑血栓形成
- D. 脑膜炎
- E. 蛛网膜下隙出血

111. 进行腹式呼吸锻炼时，下列动作中应予以纠正的是

- A. 吸气时腹部挺出
- B. 呼气时腹部尽力收缩
- C. 深吸快呼
- D. 鼻吸口呼
- E. 深吸慢呼

112. 病人，女性，16岁，支气管哮喘发作1小时，烦躁，发绀，呼吸26次/分，心率120次/分，律齐，以下哪项措施不当

- A. 协助病人采取舒适的座位
- B. 给予吸氧3U/min
- C. 守候病人床旁，安慰病人
- D. 忌用普萘洛尔（心得安）
- E. 禁用氨茶碱

113. 皮肤白皙的贫血病人就诊，护士检查时最能反映贫血的部位是

- A. 面颊皮肤及上腭黏膜
- B. 手背皮肤及口腔黏膜
- C. 耳郭皮肤
- D. 颈部皮肤及舌面

E. 睑结膜、指甲、口唇

114. 病人，女性，24岁。贫血1年。血红蛋白78g/L，红细胞 $3 \times 10^{12}/L$ ，网织红细胞0.006，白细胞、血小板正常。经口服铁剂治疗7天后，血红蛋白不升，网织红细胞升为0.014。最可能的诊断是

- A. 溶血性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 巨幼细胞贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 脾功能亢进

115. 心源性呼吸困难最先出现的是

- A. 急性肺水肿
- B. 阵发性夜间呼吸困难
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 心源性哮喘
- E. 端坐呼吸

116. 急性心肌梗死病人疼痛缓解后出现四肢厥冷、脉快细弱、血压仍然下降、尿少或无尿表现时，应考虑发生了

- A. 肺部感染
- B. 低血压
- C. 心源性休克
- D. 心力衰竭
- E. 心律失常

117. 使用药物氢氯噻嗪降压治疗的过程中，护士应尤其注意观察

- A. 心率
- B. 血压
- C. 血氧饱和度
- D. 血钾
- E. 肾功能

118. 甲状腺性甲亢中最多见的是

- A. 多结节性毒性甲状腺肿
- B. 弥漫性甲状腺肿甲状腺功能亢进（Graves病）
- C. 毒性腺瘤
- D. 甲状腺癌
- E. 碘甲亢（地方性甲状腺肿）

119. 手术治疗甲状腺功能亢进的禁忌证

- A. 中、重度甲状腺功能亢进，药物治疗无效
- B. 甲状腺功能亢进复发或不愿长期服药
- C. 妊娠早期和晚期
- D. 结节性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进
- E. 胸骨后甲状腺肿伴甲状腺功能亢进

120. 库欣综合征最常见的原因是

- A. 异位 ACTH 分泌过多
- B. 异位 CRF 分泌过多
- C. 肾上腺皮质腺瘤
- D. 肾上腺皮质腺瘤
- E. 肾上腺皮质腺增生

121. 电复律治疗心房颤动, 术后护理不恰当的是

- A. 持续 24 小时心电监护
- B. 按时服用抗心律失常药
- C. 常规低流量吸氧
- D. 禁食至清醒后 2 小时
- E. 术后应立即下床活动

122. 病人, 女性, 49 岁, 风湿性心脏病二尖瓣狭窄 10 年, 近半个月重体力劳动时出现呼吸困难而入院治疗。今日凌晨病人睡眠中突然憋醒, 被迫坐起, 伴大汗, 咳嗽, 咳粉红色泡沫痰, 心率 118 次/分, 两肺满布湿啰音及哮鸣音。责任护士给予病人吸氧的正确方法是

- A. 鼻导管吸入 2 ~ 4ml/min 纯氧并经 20% ~ 30% 酒精湿化
- B. 鼻导管吸入 4 ~ 6ml/min 纯氧并经 20% ~ 30% 酒精湿化
- C. 鼻导管吸入 8 ~ 10ml/min 纯氧并经 20% ~ 30% 酒精湿化
- D. 鼻导管吸入 6 ~ 8L/min 纯氧并经 20% ~ 30% 酒精湿化
- E. 鼻导管吸入 20 ~ 40ml/min 纯氧并经 20% ~ 30% 酒精湿化

123. 对肠结核病人的护理措施不妥的是

- A. 活动性肠结核病人需卧床休息, 以减少机体消耗
- B. 摄入高热量、高蛋白、高维生素且易于消化的食物
- C. 腹泻病人要多吃些豆制品和牛奶
- D. 监测病人腹痛程度和性质的变化
- E. 病人用过的餐具和用品要进行消毒

124. 下列药物中抑制胃酸分泌作用最强的是

- A. 西咪替丁
- B. 雷尼替丁
- C. 奥美拉唑
- D. 硫糖铝
- E. 枸橼酸铋钾

125. 下列关于系统性红斑狼疮 (SLE) 的临床表现说法错误的是

- A. 紫外线照射可使皮损恶化
- B. 妊娠可使病情好转
- C. 一般不引起关节畸形
- D. 几乎所有病人都有不同程度的蛋白尿、血尿、水肿、高血压等肾脏受累的表现
- E. 呼吸系统受累以胸膜炎最多见

126. 与系统性红斑狼疮发病有关的因素不包括

- A. 遗传因素
- B. 性激素
- C. 药物作用
- D. 潮湿刺激
- E. 阳光照射

127. 系统性红斑狼疮病人发生口腔真菌感染时, 可选用的漱口液为

- A. 1% ~ 4% 碳酸氢钠溶液
- B. 2% ~ 3% 硼酸溶液
- C. 1% ~ 3% 过氧化氢溶液
- D. 0.1% 乙酸溶液
- E. 0.08% 甲硝唑

128. 肝性脑病病人发生便秘时, 灌肠时应禁

- A. 生理盐水
- B. 肥皂水
- C. 新霉素液
- D. 弱酸性溶液
- E. 液状石蜡

129. 急性胰腺炎腹痛病人应禁食、禁水的时限是

- A. 1 ~ 3 天
- B. 36 小时
- C. 24 小时
- D. 8 小时
- E. 12 小时

130. 系统性红斑狼疮下列损害发生率最高的是

- A. 肾脏
- B. 心血管
- C. 肺与胸膜
- D. 消化系统
- E. 神经系统

131. 系统性红斑狼疮 (SLE) 常见的皮损是

- A. 紫癜
- B. 玫瑰疹
- C. 蝶形红斑
- D. 荨麻疹
- E. 血肿

132. 下面有关食管胃底静脉曲张破裂出血病人的饮食护理不妥的是

- A. 出血期间应禁食

- B. 止血后即可渐进高热量、高蛋白饮食
- C. 避免粗糙、坚硬食物
- D. 避免刺激性食物
- E. 应细嚼慢咽

133. 腹膜透析过程中发生引流不畅时, 下列哪项护理措施不当

- A. 嘱病人改变体位
- B. 多饮水以充盈膀胱
- C. 服导泻剂或灌肠以加强肠蠕动
- D. 肝素加生理盐水向腹膜透析管内快速注射并保留, 以促使纤维块溶解
- E. 若上述处理不能改善, 应向医生报告

134. 下列关于腹膜透析病人的饮食护理, 不当的是

- A. 蛋白质摄入量为 $0.6 \sim 0.8 \text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$, 50% 以上为优质蛋白质
- B. 能量供应为 $125.5 \text{U}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
- C. 脂肪占供能的 30% ~ 40%
- D. 钠的摄入量为 $1 \sim 2.5 \text{g}/\text{d}$
- E. 注意补充锌、铁、多种维生素等

135. 与类风湿关节炎的临床表现不符的是

- A. 多数病人起病缓慢
- B. 肾脏损害多见
- C. 主要侵犯小关节
- D. 关节痛往往是最早的关节症状
- E. 关节畸形多见于较晚期病人

136. 类风湿关节炎最常侵犯的关节是

- A. 双手腕关节
- B. 双腿踝关节
- C. 双腿膝关节
- D. 双手掌指关节远端
- E. 双手掌指关节近端

137. 下列关于经皮穿刺肾活组织检查的术后护理中错误的是

- A. 定时观察病人的生命体征及尿的颜色
- B. 注意有无腰痛、腹痛等情况
- C. 平卧 12 小时并在床上大小便
- D. 嘱病人多饮水以免血块阻塞尿路
- E. 遵医嘱术后 3 天使用止血药及抗生素等

138. 病人, 女性, 25 岁, 孕 28 周, 今晨突然出现畏寒、高热, 体温达 40°C , 伴下腹坠痛, 排尿疼痛, 尿常规示大量白细胞, 诊断为急性肾盂肾

炎。引起该病最常见的致病菌为

- A. 葡萄球菌
- B. 变形杆菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 副大肠埃希菌
- E. 粪链球菌

139. 女性, 28 岁, 妊娠 6 个月, 因头晕、心悸、气短、面色苍白入院, 诊断为营养性巨幼细胞性贫血, 应多补充的食物不包括

- A. 乳制品
- B. 动物肝、肾
- C. 新鲜水果
- D. 绿叶蔬菜
- E. 紫菜、木耳、香菇

140. 有机磷杀虫药吸收后浓度最高的脏器是

- A. 肝
- B. 肾
- C. 脑
- D. 肺
- E. 肌肉

141. 有机磷农药中毒不用油类泻药是因为

- A. 可致肠痉挛
- B. 可致幽门梗阻
- C. 有机磷溶于油更易吸收
- D. 减少腹泻速度
- E. 减轻腹痛

142. 护理接受化学治疗的白血病病人, 最重要的措施是

- A. 防止和治疗感染
- B. 缓解疼痛
- C. 消除病人的忧虑
- D. 鼓励病人摄入蛋白质饮食
- E. 缓解体征

143. 下列关于巨幼细胞性贫血的描述, 错误的是

- A. 是一种大细胞性贫血
- B. 是一种小细胞低色素性贫血
- C. 由叶酸缺乏引起者最多见
- D. 由维生素 B_{12} 缺乏引起者多为内因子缺乏所致
- E. 可表现为“牛肉舌”

144. 甲状腺功能亢进病人排便次数多, 是因为

- A. 肠蠕动过快
- B. 甲状腺素过少
- C. 高热
- D. 饮水过多

E. 进食纤维素过多

145. 癫痫病人服药最不应

- A. 服药量太小
- B. 只在夜间服药
- C. 服药次数多
- D. 突然停药
- E. 两药同服

146. 下列关于癫痫的治疗要点，不正确的是

- A. 全身抽搐、意识丧失时，首先要立即用药以控制发作
- B. 积极预防外伤和并发症
- C. 开始用药时，剂量要由小到大，逐步增加
- D. 可以停药时，要缓慢减量
- E. 一般情况下尽量避免同时使用多种药物

147. 下列不符合癫痫发作的药物治疗原则是

- A. 药物剂量由小到大，逐步增加
- B. 根据发作类型选择最佳药物
- C. 定期监测血常规及肝肾功能 and 药物浓度
- D. 一般情况不主张联合用药
- E. 撤换药物要果断、迅速

148. 在抢救甲状腺功能亢进症危象病人时应首先选下列哪种药物

- A. 甲巯咪唑
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 复方碘液
- D. 糖皮质激素
- E. 大量普萘洛尔

149. 下列哪项不是糖尿病酮症酸中毒的诱因

- A. 感染
- B. 外伤及手术
- C. 妊娠及分娩
- D. 饮食不当
- E. 胰岛素过量

150. 糖尿病酮症酸中毒病人经注射胰岛素及静脉滴注生理盐水后，血糖降低、失水纠正、尿量增多，此时最应注意防止

- A. 低钠血症
- B. 低钾血症
- C. 低钙血症
- D. 低血糖
- E. 低血压

151. 脑出血最常见的发病部位是

- A. 延髓
- B. 内囊
- C. 小脑
- D. 脑室
- E. 脑叶

152. 脑出血病人应绝对卧床休息

- A. 1 周
- B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

153. 按照《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》，体重过低是指 BMI 小于

- A. 18.5
- B. 20
- C. 21
- D. 23
- E. 25

154. 类风湿关节炎急性期后的护理措施中重要的是

- A. 休息
- B. 关节疼痛减轻后及时进行活动
- C. 限制活动
- D. 抬高头部
- E. 抬高膝部

155. 护士为有机磷中毒病人注射碘解磷定时病人出现了暂时性呼吸抑制，其原因是

- A. 剂量过大
- B. 注射速度过快
- C. 药物浓度过高
- D. 药物的副作用
- E. 药物中毒

156. 关于切断传播途径的措施，下列概念哪项是错误的

- A. 经皮肤传染的疾病主要应搞好个人防护，如在血吸虫病流行区下水前涂防护剂
- B. 对接触性传染病首先应接种疫苗
- C. 对虫媒传染病应因地制宜采取药物或其他措施，以防虫、杀虫、驱虫
- D. 对呼吸道传染病应保持室内空气流通，戴口罩，必要时进行空气消毒
- E. 对肠道传染病应着重做好“三管一灭”措施

157. 根据 2004 年新修订的《传染病防治法》，我国法定传染病应分为

- A. 甲类 2 种，乙类 22 种
- B. 甲类 2 种，乙类 11 种，丙类 22 种
- C. 甲类 2 种，乙类 22 种，丙类 11 种
- D. 甲类 3 种，乙类 22 种，丙类 10 种
- E. 甲类 2 种，乙类 25 种，丙类 10 种

158. 下列方法中，能将 HAV 彻底杀灭的是

- A. 60℃，4 小时
- B. 100℃，5 分钟