



最佳畅销书

2018

全国卫生专业技术资格考试
应 | 试 | 题 | 库

内科主治医师

资格考试精选题集

卫生专业职称考试研究专家组 编写

(第三版)

应试题库，覆盖全部考纲考点
精编题集，集锦高频易错考题
增值服务，随时随地网上学习

中国医药科技出版社



2018 全国卫生专业技术资格考试应试题库

内科主治医师 资格考试精选题集

第三版

卫生专业职称考试研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是“2018全国卫生专业技术资格考试应试题库”之一，是由具有丰富教学和考前辅导经验的专家、老师在深入分析了内科主治医师资格考试的考纲考点和历年真题的命题规律基础上精心编写而成，具有高度的针对性和权威性。书中按章节编创试题，以试题梳理考点知识。出题角度多样，考点覆盖全面，可帮助考生熟悉考试题型，检验复习效果，及时查漏补缺，成功通过考试。本书是参加2018年内科主治医师考试考生的首选参考书。

图书在版编目（CIP）数据

内科主治医师资格考试精选题集/卫生专业职称考试研究专家组编写. —3 版.
—北京：中国医药科技出版社，2017.8
2018 全国卫生专业技术资格考试应试题库
ISBN 978 - 7 - 5067 - 9538 - 8
I. ①内… II. ①卫… III. ①内科学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R5 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 206335 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm ¹/₁₆

印张 13 ³/₄

字数 307 千字

初版 2015 年 1 月第 1 版

版次 2017 年 8 月第 3 版

印次 2017 年 8 月第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9538 - 8

定价 35.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编 委 会

(按姓氏笔画排序)

丁 立	丁 雷	丁丝露	丁洪磊	方 艳
方姜玉	邓桂芳	付燕红	边晓为	华 昊
江 璇	吴春虎	何子骏	何艳新	何康敏
陈 巧	陈 俊	陈 雪	陈 琴	陈东文
陈思凡	陈晓清	范红雨	范俊平	金 瑾
胡 珀	胡 敏	胡向欣	胡慧颖	柏宏军
段婉茹	侯亚男	侯峰岩	姜小梅	姜明宇
姜娉婷	费 威	贺 星	耿 蔚	耿东伟
高 眇	高 磊	高晓雪	郭 勇	郭如峰
黄 帅	黄 韶	黄丽臻	曹 剑	曹 洋
曹庆隽	龚 盟	龚雪霄	崔立华	崔玲玲
董 静	董广艳	董茜茜	董强波	蒋 京
韩 博	戴惠祥			

P 前 言

REFACE

卫生专业技术资格考试是由人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会（简称卫计委）共同组织实施的全国性卫生专业职称考试，包括西医、中医、计生类等 50 多个专业。由卫计委人才交流中心负责报名、资格审核等全部考务工作。考试每年进行一次，一般在 5 月下旬举行。其考试科目包括“基础知识”“相关专业知识”“专业知识”“专业实践能力”等 4 项。考试成绩在各科目中以 100 为满分计算，每科目成绩达到 60 分为合格，考试成绩有效期为 2 年。所有 4 个科目在 2 年内全部合格者可申请该级专业技术资格。

现在的您，还在为卫生专业技术资格考试而一筹莫展吗？还在为找不到复习重点而无从下手吗？我们组织了有丰富教学和考前辅导经验的专家老师，深入研究多年来的命题规律，围绕最新考试大纲，精心编写了《内科主治医师资格考试精选题集》，为您的职场晋升提供助力。

本书依据考试大纲，分章节组织题目，考点全面覆盖，题量丰富，题型设置与卫生技术资格考试对该级别的要求完全一致，内容针对性强，可有效地帮助您熟悉学科内容，梳理考点知识，把握考试重点，成功过关！本书是参加内科主治医师资格考试考生的首选参考书。

为帮助您在繁忙的工作中提高复习效率，更好地利用碎片时间学习，我们还推出了在线精选题库，可扫描封面上的二维码，登陆我们的网站，进行随时随地复习。

为了更好地为大家服务，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将在今后的工作中不断修订完善。

愿本书陪伴您一起度过快乐、充实的学习时光！

编 者

2017 年 8 月



CONTENTS

第一单元 基础知识	1
第一章 常见症状与体征	1
第二章 体格检查	4
第三章 常见疾病的病因、发病机制、病理、药理	7
第四章 医学伦理学	10
第五章 医疗机构从业人员行为规范	20
综合复习题一	21
第二单元 相关专业知识	39
第六章 呼吸内科	39
第七章 心血管内科	46
第八章 消化内科	54
第九章 肾内科	59
第十章 血液病	63
第十一章 内分泌学	68
第十二章 风湿与临床免疫学	71
第十三章 神经内科	73
第十四章 传染病	78
第十五章 结核病	81
第十六章 职业病	85
综合复习题二	87
第三单元 专业知识	95
第十七章 呼吸内科	95
第十八章 心血管内科	99
第十九章 消化内科	109
第二十章 血液病	120
第二十一章 风湿与临床免疫学	124
第二十二章 神经内科	125
第二十三章 结核病	130



第二十四章 传染病	133
第二十五章 肾内科	136
第二十六章 职业病	140
综合复习题三	141
第四单元 专业实践能力	168
第二十七章 案例分析题	168
综合复习题四	196

第一单元 基础知识

第一章 常见症状与体征

【A1/A2型题】

1. 关于痰的性状和痰量，正确的描述为
 - A. 痰的性状可分为黏液性、浆液性、血性和乳糜性
 - B. 铁锈色痰多见于支气管扩张症
 - C. 白色黏痰常见于肺水肿
 - D. 肺泡癌可出现大量浆液性泡沫样痰
 - E. 支气管胸膜瘘很少有痰
2. 咯血最常见于
 - A. 支气管扩张症
 - B. 血小板减少性紫癜
 - C. 支原体肺炎
 - D. 周围型肺癌
 - E. 风湿热
3. 咯血伴皮肤黏膜出血，在下列疾病中不常见的是
 - A. 肺癌并纵隔淋巴结侵犯
 - B. 血液病
 - C. 肺出血型钩端螺旋体病
 - D. 风湿热
 - E. 流行性出血热
4. 常见的呼吸频率变化有
 - A. 呼吸过速
 - B. 间歇呼吸
 - C. 潮式呼吸
 - D. 叹气样呼吸
 - E. 暂停呼吸
5. 深度昏迷与中度昏迷最有价值的鉴别是
 - A. 深、浅反射均消失
 - B. 对各种刺激无反应
 - C. 无自主运动
 - D. 大小便失禁
 - E. 意识丧失
6. 体温在39℃以上，波动幅度大，24小时内波动范围超过2℃，但都在正常水平以上，称为
 - A. 间歇热
 - B. 稽留热
 - C. 波状热
 - D. 回归热
 - E. 弛张热
7. 关于胆汁淤积性黄疸的实验室检查，错误的是
 - A. 尿胆原增加
 - B. 总胆红素增加
 - C. 结合胆红素>50%~60%
 - D. 碱性磷酸酶显著增加
 - E. 尿胆红素明显增加
8. 以下均为分泌性腹泻的疾病，除外
 - A. 霍乱
 - B. 副霍乱
 - C. 血管活性肽瘤
 - D. 甲状腺功能亢进
 - E. 胃泌素瘤
9. 急性腹膜炎所致呕吐属于
 - A. 神经性呕吐
 - B. 反射性呕吐
 - C. 中枢性呕吐
 - D. 胃肠源性呕吐
 - E. 周围性呕吐
10. 脑内高压症所致呕吐的特点是
 - A. 喷射性，有恶心，呕吐后轻松
 - B. 喷射性，无恶心，呕吐后不轻松
 - C. 非喷射性，有恶心，呕吐后不轻松



- D. 非喷射性，无恶心，呕吐后轻松
E. 喷射性，无恶心，呕吐后轻松
- 11. 肾源性水肿的特点是**
- A. 先消瘦，后水肿
 - B. 低蛋白血症
 - C. 首先出现于身体下垂部位
 - D. 肝大
 - E. 颈静脉怒张
- 12. 上消化道出血出现黑便时，出血量至少为**
- A. < 5 ~ 7ml
 - B. < 50 ~ 70ml
 - C. > 50 ~ 70ml
 - D. > 5 ~ 7ml
 - E. > 250ml
- 13. 关于血尿病因的描述，错误的是**
- A. 98% 由泌尿系统疾病引起
 - B. 急性盆腔炎
 - C. 急进性高血压
 - D. 环磷酰胺引起的出血性膀胱炎
 - E. 急性肠炎
- 14. 服盐类泻药引起腹泻的原因是**
- A. 肠黏膜分泌增多
 - B. 肠腔内渗透压增高
 - C. 肠黏膜吸收障碍
 - D. 肠蠕动过快
 - E. 肠腔内渗透压低
- 15. 暗红色果酱样血便多见于**
- A. 急性细菌性痢疾
 - B. 阿米巴痢疾
 - C. 急性胃肠炎
 - D. 急性出血坏死性肠炎
 - E. 上消化道出血
- 16. 中度脾肿大的标准为**
- A. 脾肋下 2cm
 - B. 脾肋下 > 2cm，在脐平以上
 - C. 脾肋下 > 5cm，在脐平以下
 - D. 脾脏达脐平以下，但未达盆腔
 - E. 脾脏大，超过前正中线
- 17. 肝源性水肿发生的原因，不正确的是**
- A. 有效血量减少
 - B. 门脉高压症
 - C. 低蛋白血症
- D. 肝淋巴液回流障碍
E. 继发醛固酮增多
- 18. 消化性溃疡活动时，下列说法错误的是**
- A. 疼痛可放射至背部
 - B. 疼痛性质不一，常为持续性钝痛、灼痛、饥饿痛
 - C. 疼痛可呈慢性、节律性、周期性特点
 - D. 少数胃溃疡可癌变
 - E. 并发大出血后，疼痛常加剧
- 19. 心源性水肿患者，常先出现水肿的部位是**
- A. 眼睑
 - B. 胸腔
 - C. 腹腔
 - D. 人体最低部位
 - E. 全身
- 20. 上消化道出血伴慢性、节律性、周期性上腹痛，考虑诊断为**
- A. 消化性溃疡
 - B. 反流性食管炎
 - C. 急性胃黏膜病变
 - D. 食管静脉曲张破裂
 - E. 胆道出血
- 21. 右上腹剧痛、寒战高热、黄疸，被称为**
- A. Gilbert 综合征
 - B. Charcot 三联征
 - C. Rotor 三联征
 - D. Dubin - Johnson 三联征
 - E. Crigler - Najjar 综合征
- 22. 食用过多含胡萝卜素的食物可使皮肤黄染，但一般不发生在**
- A. 足底
 - B. 前额
 - C. 手掌
 - D. 巩膜和口腔黏膜
 - E. 双颊部
- 23. 隐性黄疸时，血中胆红素浓度为**
- A. < 17 μmol/L
 - B. > 17 μmol/L, < 34 μmol/L
 - C. > 34 μmol/L
 - D. > 17 μmol/L, < 24 μmol/L
 - E. > 24 μmol/L
- 24. 某中年男子，反复上腹隐痛半年，多在空腹**

- 出现，有时夜间出现腹痛，进食后缓解，最可能的诊断是**
- 胃溃疡
 - 急性胃炎
 - 十二指肠溃疡
 - 急性胰腺炎
 - 急性胆囊炎
- 25. 患者，男性，40岁，黄疸，肝脾肿大半年，进食时突然呕吐暗红色液体300ml，其病因可能为**
- 食管静脉曲张破裂
 - 食管贲门黏膜撕裂综合征
 - 食管癌
 - 急性胃黏膜损伤
 - 胃体上部溃疡
- 26. 患者，女性，肝硬化失代偿期，大量腹水，下列选项中与腹水无关的体征是**
- 移动性浊音
 - 脐疝
 - 振水音
 - 蛙腹状
 - 液波震颤
- 27. 患者，男性，18岁，心脏检查发现胸骨左缘第1、2肋间有连续性震颤，并可闻及机器样连续性杂音，考虑为**
- 房间隔缺损
 - 室间隔缺损
 - 肺动脉瓣狭窄
 - 动脉导管未闭
 - 肺动脉瓣关闭不全
- 28. 急性心肌梗死患者最常见的血细胞异常为**
- 红细胞增多
 - 淋巴细胞增多
 - 中性粒细胞增多
 - 中性粒细胞缺乏
 - 中性粒细胞减少
- 29. 患者，男性，47岁，进食油煎鸡蛋后出现右上腹剧痛，并放射至右肩胛区，伴畏寒、发热，应考虑的诊断为**
- 急性胆囊炎
 - 急性胃肠炎
 - 急性心肌梗死
 - 急性胰腺炎
 - 十二指肠球部溃疡
- 30. 该患者临床诊断首先考虑**
- 风湿性心脏病
 - 主动脉瓣关闭不全
 - 动脉导管未闭
 - 肺源性心脏病右心衰竭
 - 甲亢性心脏病
- 31. 该患者临床表现不具备的特点是**
- 交替脉
 - 肝颈静脉回流征(+)
 - 可闻及右心室奔马律
 - 三尖瓣收缩期杂音
 - 剑突下收缩期搏动
- 32. 该患者确诊最有价值的检查是**
- 胸部X线检查
 - 胸部CT
 - 心脏彩超
 - 心电图
 - 动态血压测定
- 33. 该患者治疗首选**
- 利尿
 - 扩血管
 - 洋地黄强心治疗
 - 二尖瓣置换术
 - 抗感染、吸氧

(34~35题共用题干)

患者，男性，20岁，有受凉或进食冷硬食物后上腹隐痛史。突然呕吐咖啡渣样液体约150ml，伴头昏、心悸、乏力，面色苍白，心率100次/分，急查肝功能未见明显异常。

34. 急诊胃镜检查可能的发现为

- 急性胃炎
- 食管静脉曲张破裂
- 食管癌
- 胃癌
- 消化性溃疡

35. 该患者的出血量约为

- <200ml
- 200~400ml
- 500~1000ml
- >1500ml
- >2000ml

(36~37题共用题干)

患者，男性，32岁，胸闷、气急、发热就诊。查体：右下肺呼吸音微弱，叩诊发浊。初步怀疑肺炎或胸腔积液。

[A3/A4型题]

(30~33题共用题干)

患者，男性，58岁，慢性咳嗽、咳痰15年，合并喘息5年，间断双下肢水肿1年，近来

3



36. 对鉴别诊断没有价值的体征是
A. 叩诊音变化 B. 气管偏向一侧
C. 语音传导改变 D. 呼吸频率改变
E. 异常支气管呼吸音
37. 该患者如果查体发现气管左移，则提示
A. 少量胸腔积液 B. 大量胸腔积液
C. 没有胸腔积液 D. 胸水合并阻塞性肺不张
E. 大叶性肺炎
- (38 ~ 39 题共用题干)
患者，男性，49岁，腹胀黄疸8个月。查体：腹部膨隆，肝脾肿大，移动性浊音阳性，1天前进食时突然呕吐暗红色液体300ml，肝功能检查可见显著异常。
38. 其可能的病因为
A. 食管贲门黏膜撕裂综合征
B. 食管静脉曲张破裂
C. 食管癌
D. 急性胃黏膜损伤
E. 胃体溃疡
39. 下列哪项治疗不正确
A. 卧床休息
B. 进食高蛋白、高热量食物
C. 禁酒
D. 利尿剂
E. 输新鲜血

【B型题】

(40 ~ 44 题共用备选答案)

- A. 呼气有氨味

- B. 呼气有肝腥味
C. 呼气有烂苹果味
D. 呼气有刺激性大蒜味
E. 呼气有浓烈酒味

40. 糖尿病酮症酸中毒**41. 肝昏迷****42. 醉酒****43. 有机磷农药中毒****44. 尿毒症****(45 ~ 48 题共用备选答案)**

- A. 上腹剧烈刀割样疼痛
B. 中上腹持续性剧痛
C. 右上腹阵发性绞痛
D. 阵发性剑突下钻顶样疼痛
E. 持续广泛性剧烈腹痛，板状腹

45. 胆道蛔虫症表现为**46. 急性腹膜炎表现为****47. 胆石症表现为****48. 胃溃疡合并穿孔表现为****参考答案**

1. D 2. A 3. A 4. A 5. A 6. E
7. A 8. D 9. B 10. B 11. B 12. C
13. E 14. B 15. B 16. B 17. A 18. E
19. D 20. A 21. B 22. D 23. B 24. C
25. A 26. D 27. D 28. C 29. A 30. D
31. A 32. C 33. E 34. E 35. C 36. D
37. B 38. B 39. B 40. C 41. B 42. E
43. D 44. A 45. D 46. E 47. C 48. A

第二章 体格检查

【A1/A2型题】

1. 乳头血性分泌物最常见于
A. 乳腺癌 B. 急性乳腺炎
C. 乳腺纤维瘤 D. 乳腺小叶增生
- E. 乳腺导管内良性乳突状瘤
2. 面具面容见于
A. 肢端肥大症 B. 震颤麻痹
C. 甲亢 D. 破伤风

- E. 长期应用糖皮质激素
- 3. 毕奥呼吸常见于**
- A. 急性喉炎
 - B. 呼吸中枢功能障碍
 - C. 情绪激动
 - D. 右心功能不全
 - E. 左心功能不全
- 4. 发热伴皮肤黏膜出血、淋巴结肿大常见于**
- A. 病毒性肝炎
 - B. 斑疹伤寒
 - C. 干酪性肺结核
 - D. 急性白血病
 - E. 胆道感染
- 5. 外耳道中有血性或清亮液体流出，应考虑**
- A. 急性中耳炎
 - B. 脑疝
 - C. 胆脂瘤
 - D. 颅底骨折
 - E. 外耳道炎
- 6. 导致 Austin Flint 杂音的情况是**
- A. 主动脉瓣关闭不全
 - B. 器质性二尖瓣狭窄
 - C. 主动脉瓣狭窄
 - D. 二尖瓣关闭不全
 - E. 动脉导管未闭
- 7. 心源性哮喘常见于**
- A. 尿毒症
 - B. 肺梗死
 - C. 心肌病
 - D. 肺炎
 - E. 重症贫血
- 8. 正常心尖搏动位于第 5 肋间锁骨中线内侧**
- A. 0.1 ~ 0.4cm
 - B. 0.5 ~ 1.0cm
 - C. 1.1 ~ 1.4cm
 - D. 1.5 ~ 1.9cm
 - E. 2.0 ~ 2.4cm
- 9. 急性呕吐伴上腹痛、发热、皮肤发黄，应考虑**
- A. 急性胃肠炎
 - B. 急性胆囊炎合并胆道梗阻
 - C. 急性胰腺炎
 - D. 肠梗阻
 - E. 胃癌
- 10. 有关体位的描述错误的是**
- A. 破伤风可出现角弓反张
 - B. 肾结石可出现辗转体位
 - C. 急性左心衰竭出现强迫仰卧位
 - D. 先天性发绀性心脏病可出现强迫蹲位
 - E. 严重哮喘可出现强迫坐位
- 11. 关于皮下气肿，下列选项中不正确的是**
- A. 系胸部皮下组织积存气体
 - B. 用手按压时有摩擦感
 - C. 偶见局部产气杆菌感染
 - D. 多见于胸肺、气管或胸膜受损后
 - E. 严重时向头颈及腹部蔓延
- 12. 与心脏瓣膜开放有关的心音或附加音是**
- A. 第四心音
 - B. 收缩中期喀喇音
 - C. 第三心音
 - D. 收缩早期喷射音
 - E. 第二心音
- 13. 肺癌最可能出现的浅表淋巴结肿大的是**
- A. 腹股沟淋巴结
 - B. 颌下淋巴结
 - C. 颈前淋巴结
 - D. 右锁骨上淋巴结
 - E. 左锁骨上淋巴结
- 14. 心悸伴发热见于下列疾病，除外**
- A. 心肌炎
 - B. 心绞痛
 - C. 急性传染病
 - D. 心包炎
 - E. 风湿热
- 15. 关于蜘蛛痣的概念，下述错误的是**
- A. 大小不一
 - B. 多出现在上腔静脉分布区内
 - C. 蜘蛛痣的出现与肝对雌激素的灭活作用减弱有关
 - D. 蜘蛛痣常见于急、慢性肝炎或肝硬化
 - E. 查体发现蜘蛛痣便可诊断肝硬化
- 16. 有关正常心音的描述，不正确的是**
- A. 正常只能听到第一心音 (S_1) 和第二心音 (S_2)
 - B. S_1 音调低钝，强度较响
 - C. S_2 音调较高而脆，在心底部最响
 - D. 部分儿童和青少年可闻及 S_4
 - E. S_3 出现在心室舒张早期
- 17. 下列哪项体征提示有大量腹水存在**
- A. 水坑征
 - B. 移动性浊音
 - C. 液波震颤
 - D. 振水音



E. 蠕动波

18. 患者，女性，46岁，睡眠差，呼吸困难，常在正常呼吸中出现一次深大呼吸，其呼吸类型为

- A. 间歇性呼吸
- B. Kussmaul呼吸
- C. 潮式呼吸
- D. 呼吸暂停
- E. 叹气样呼吸

19. 某患者，胸闷气急1个月。查体：右胸廓较左侧塌陷，呼吸运动减弱，叩诊实音，语颤消失，呼吸音消失，气管及心脏右移。最可能的诊断为

- A. 右下肺脓肿
- B. 右侧大叶性肺炎
- C. 右侧支气管肺癌并肺不张
- D. 右侧大量胸腔积液
- E. 右侧支气管扩张并感染

20. 患者，青年男性，突发胸闷气急1天，感胸部不适，轻微咳嗽，系弯腰抬物后出现。1个月前查体无异常。提示最可能的病因为

- A. 自发性气胸
- B. 气管异物
- C. 左心衰竭
- D. 支气管哮喘
- E. 右心衰竭

21. 患者，女性，15岁，受凉后1周出现双下肢对称性皮肤瘀点、瘀斑，无四肢关节肿痛、血尿和水肿。血小板计数 $30 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断为

- A. 过敏性紫癜
- B. 血友病
- C. 维生素K缺乏症
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 重症肝炎

【A3/A4型题】

(22~25题共用题干)

患者，女性，25岁，活动后气急5年，夜间不能平卧、痰中带血1个月，近1天咳较多白色泡沫痰，并有少量咯血。家人描述近年来患者面部发红，当地医院听到“心脏杂音”。

22. 该患者最可能的诊断是

- A. 肺源性心脏病
- B. 支气管扩张
- C. 冠心病
- D. 风湿性心脏病

E. 支气管哮喘

23. 该患者心肺听诊最可能的发现是

- A. 心尖区舒张期隆隆样杂音
- B. 收缩期吹风样杂音
- C. 局限性湿啰音
- D. 哮鸣音
- E. 三尖瓣区收缩期杂音

24. 该患者对诊断最有价值的检查是

- A. 心电图
- B. 胸部X线检查
- C. 胸部高分辨CT
- D. 心脏彩超
- E. 动态血压测定

25. 该患者当前最适宜的治疗是

- A. 静脉滴注抗生素
- B. 口服止血药
- C. 静脉滴注硝酸甘油
- D. 中药治疗
- E. 静脉滴注氨茶碱

(26~28题共用题干)

患者，男性，27岁，右侧持续胸痛1周，疼痛为烧灼样，有时需口服止痛药。深呼吸对胸痛无影响，但上身转动时胸痛加重，能正常工作，无咳嗽、咳痰、痰血和呼吸困难。

26. 该患者胸部查体的是

- A. 胸壁视诊
- B. 心脏有无杂音
- C. 肺部有无啰音
- D. 肺部有无哮鸣音
- E. 肺部有无胸膜摩擦音

27. 该患者胸肺查体最可能发现的异常是

- A. 胸膜摩擦音
- B. 心脏杂音
- C. 肺部湿啰音
- D. 肺部哮鸣音
- E. 胸壁有疱疹

28. 该患者最可能的诊断为

- A. 纤维素性胸膜炎
- B. 肋骨骨折
- C. 气胸

- D. 带状疱疹
E. 肺癌胸壁转移

【B型题】

(29~32题共用备选答案)

- A. 大量气胸
B. 法洛(Fallot)四联症
C. 休克
D. 缩窄性心包炎
E. 贫血

29. 发绀伴杵状指

30. 发绀伴呼吸困难

31. 发绀伴意识障碍

32. 发绀伴颈静脉怒张

(33~37题共用备选答案)

- A. 振水音阳性
B. 移动性浊音阳性
C. 脐周可见明显的蠕动波
D. Murphy征阳性
E. 尺压试验阳性

33. 腹腔积液的表现是

34. 小肠梗阻的表现是

35. 急性胆囊炎的表现是

36. 幽门梗阻的表现是

37. 卵巢囊肿的表现是

(38~42题共用备选答案)

- A. 扩张型心肌病
B. 二尖瓣狭窄
C. 缩窄性心包炎

- D. 轻中度肺动脉瓣狭窄
E. 二尖瓣脱垂

38. 表现为收缩早期喷射音的是

39. 表现为开瓣音的是

40. 表现为舒张早期奔马律的是

41. 表现为心包叩击音的是

42. 表现为收缩中、晚期喀喇音的是

(43~45题共用备选答案)

- A. McBurney点压痛
B. Murphy征阳性
C. 中上腹压痛
D. 脐周压痛
E. 下腹正中压痛

43. 急性胆囊炎的表现是

44. 急性阑尾炎的表现是

45. 急性胰腺炎的表现是

参考答案

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. E | 2. B | 3. A | 4. D | 5. D | 6. A |
| 7. C | 8. B | 9. B | 10. C | 11. B | 12. D |
| 13. D | 14. B | 15. E | 16. D | 17. C | 18. E |
| 19. C | 20. A | 21. D | 22. D | 23. A | 24. D |
| 25. C | 26. A | 27. E | 28. D | 29. B | 30. A |
| 31. C | 32. D | 33. B | 34. C | 35. D | 36. A |
| 37. E | 38. D | 39. B | 40. A | 41. C | 42. E |
| 43. B | 44. A | 45. C | | | |

第三章 常见疾病的病因、发病机制、病理、药理

【A1/A2型题】

1. 甲状腺功能亢进症的临床表现，不正确的是

- A. 高代谢综合征
B. 紧张焦虑，手和眼睑震颤
C. 心动过速，心律失常
D. 便秘，排便次数减少
E. 可出现周期性瘫痪和肌无力

2. 左心功能不全时出现呼吸困难的原因主要是

- A. 体循环淤血
B. 肺淤血
C. 腹水
D. 肺小动脉压力降低
E. 膈肌活动障碍



3. 典型的支气管哮喘的症状是

- A. 反复咳嗽、咯痰
- B. 发作性喘息
- C. 胸闷
- D. 吸气样呼吸，活动后缓解
- E. 活动后气急

4. 患者，女性，30岁。查体时测量血压为150/100mmHg，为确诊是否有高血压，进一步应做的检查是

- A. 同一日上、下午测定血压，每次测定2个测量值
- B. 同一日上、下午测定血压，每次测定3个测量值
- C. 非同日测定血压2次
- D. 非同日测定血压1次
- E. 非同日测定血压5次

5. 关于周围神经病变的描述不正确的是

- A. 仅单独影响一支神经
- B. 可影响两支或多支神经
- C. 主要受到损害的可能是轴索或是髓鞘
- D. 有些神经病变主要累及运动纤维
- E. 反复的小的损伤也能产生局灶性神经病变

6. 患者，男性，34岁，骤起高热，持续几小时后大汗，体温降至正常，1天后再次出现高温骤起骤降，此患者诊断优先考虑

- A. 败血症
- B. 伤寒
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 疟疾
- E. 大叶性肺炎

7. 关于血行播散型肺结核，下列错误的是

- A. 多由原发型肺结核发展而来
- B. 患者免疫力下降时易发病
- C. 大量结核菌在较短时间内多次侵入血液循环
- D. 结核菌进入肺间质、侵入肺实质后形成粟粒大小的结节
- E. 急性血行播散型肺结核多见于老年人，少见于儿童和青少年

8. 高血压的病理改变正确的是

- A. 高血压不易合并冠心病
- B. 高血压易导致脑卒中

- C. 慢性肾衰竭不易发生

- D. 高血压心脏病不易出现左心室肥厚和扩张
- E. 视网膜小动脉晚期才出现痉挛

9. 有关支气管肺炎的临床特点，以下不正确的是

- A. 病原体主要引起细支气管、终末细支气管和肺泡的炎症
- B. 常继发于肺部其他疾病
- C. 常见于长期卧床的危重患者
- D. 查体多有肺实变体征
- E. X线表现为斑片状阴影，边缘密度浅而模糊

10. 下列哪项不是高碳酸血症的病因

- A. 气管阻塞狭窄
- B. 局部肺间质纤维化
- C. 严重肺结核
- D. 昏迷合并肺部重症感染
- E. 慢性阻塞性肺疾病

11. 患者，青年女性，间断发热20天，体温37.8~39.3℃，查体面部蝶形红斑，肝脾大，此患者最可能的诊断为

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 伤寒
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 疟疾
- E. 军团菌肺炎

12. 关于乙型脑炎的描述错误的是

- A. 经蚊传播的急性传染病
- B. 脑膜炎球菌和淋球菌是主要病原体
- C. 蚊是其主要传播媒介
- D. 人群普遍易感
- E. 接种疫苗后有持久免疫力

13. 以下内容正确的是

- A. 丁型肝炎病毒必需和乙型肝炎病毒在一起才可以感染人
- B. 戊型肝炎是通过血制品传播的
- C. 戊型肝炎黄疸型较多
- D. 丙型肝炎危害最大
- E. 乙肝疫苗没有保护作用

14. 甲亢患者，FT₃增高，FT₄、TT₄正常，应诊

断为

- A. T_3 型甲亢
- B. T_4 型甲亢
- C. 亚临床型甲亢
- D. 轻型甲亢
- E. 功能型甲亢

15. 心绞痛的发病机制和临床表现中不正确的是

- A. 稳定型心绞痛常发生于劳力负荷增加时
- B. 多数患者年龄在 40 岁以下
- C. 情绪激动和饱食为常见诱因
- D. 主要发生部位在胸骨后部
- E. 根本原因是冠状动脉固定性严重狭窄

16. 关于慢性肾衰竭的描述，下述不正确的是

- A. 肾脏结构和功能异常在 3 个月以上
- B. 肾小球滤过率下降即提示肾衰竭
- C. 糖尿病肾病是主要的病因之一
- D. 原发性肾小球肾炎是最主要的发病原因
- E. 尿毒症期需要透析治疗

17. 关于特发性血小板减少性紫癜的病因，下述不正确的是

- A. 对某些致敏物质过敏
- B. 细菌或病毒感染
- C. 可能与雌激素有关
- D. 脾功能亢进
- E. 免疫因素

18. 关于急性肾衰竭的病因，下述正确的是

- A. 急性肾衰竭在 6 个月内发生
- B. 主要表现是血尿素氮升高和肌酐降低
- C. 一般无少尿表现
- D. 急性肾功能衰竭分肾前、肾性和肾后性三种
- E. 急性肾小管坏死是根本的原因

19. 关于慢性支气管炎的主要发病相关因素，下述不正确的是

- A. 大气污染
- B. 吸烟
- C. 支气管哮喘
- D. 职业性粉尘和化学物质
- E. 感染

20. 关于肾病综合征的诊断标准，下述不正确的是

- A. 尿蛋白大于 3.5g/d

B. 血脂降低

- C. 水肿
- D. 血浆白蛋白低于 30g/L
- E. 可分为原发性及继发性

21. 关于消化性溃疡的发病机制，下述不正确的是

- A. 幽门螺杆菌感染是重要病因
- B. 非甾体药通过削弱黏膜防御功能发挥作用
- C. 胃酸在溃疡发生中起决定性作用
- D. 吸烟与溃疡发生无关
- E. 应激反应可以导致溃疡

22. 患者，女性，21岁，间断咳嗽咳痰 3 个月，偶有午后低热，咳少量黄色黏痰，偶有痰带血。查体：右肺闻及吸气性干鸣音。提示最可能的病因是

- A. 支气管扩张
- B. 急性支气管炎
- C. 肺结核合并支气管内膜结核
- D. 慢性支气管炎
- E. 肺脓肿

23. 特发性血小板减少性紫癜的主要发病机制是

- A. 抗血小板抗体产生
- B. 骨髓巨核细胞生成增加
- C. 雌激素抑制血小板生成
- D. 脾吞噬血小板增多
- E. 骨髓巨核细胞生成减少

[A3/A4 型题]

(24 ~ 26 题共用题干)

患者，中年男性，醉酒后呕吐、误吸，出现咳嗽、咳痰，呼吸困难，胸片提示双肺毛玻璃样改变，吸氧 4L/min 条件下，血气分析 pH 7.46, PaO₂ 52mmHg, PaCO₂ 28mmHg。

24. 该患者的氧合指数 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) 是

- A. 100mmHg
- B. 140mmHg
- C. 180mmHg
- D. 220mmHg
- E. 240mmHg

25. 该患者最恰当的诊断是

- A. 急性肺损伤，I 型呼吸衰竭，代谢性酸中毒



- B. 急性肺损伤，I型呼吸衰竭，呼吸性碱中毒
C. ARDS，I型呼吸衰竭，呼吸性碱中毒
D. ARDS，I型呼吸衰竭，代谢性酸中毒
E. ARDS，II型呼吸衰竭，呼吸性碱中毒

26. 该患者治疗上不适宜的措施为

- A. 气管插管呼吸机辅助呼吸
B. 间断吸痰
C. 防治肺部感染
D. 大量补液
E. 防治消化道出血

(27~29题共用题干)

患者，男性，54岁，肝区疼痛3个月。查体：肝肋下3cm，质硬，表面有大小不等结节，边缘钝而不整齐，有压痛。

27. 此患者最可能的诊断是

- A. 胰腺癌 B. 酒精性肝硬化
C. 肝癌 D. 肾癌
E. 胃癌

28. 以下检查中对确定该患者诊断最有价值的是

- A. HBV-DNA检查 B. 腹部超声
C. 腹部平片 D. 肝功能
E. 乙肝两对半

29. 此类患者效果最差的治疗方法是

- A. 放射治疗 B. 化学治疗
C. 手术切除 D. 动脉栓塞化疗
E. 肝移植

【B型题】

(30~34题共用备选答案)

- A. 粉红色泡沫样痰
B. 脓血痰
C. 砖红色胶冻样痰
D. 铁锈色痰
E. 腻臭痰

30. 原发性肺脓肿出现

31. 大叶性肺炎出现
32. 金黄色葡萄球菌肺炎出现
33. 克雷伯杆菌感染出现
34. 左心衰肺水肿出现

参考答案

1. D 2. B 3. B 4. C 5. A 6. D
7. E 8. B 9. D 10. B 11. A 12. B
13. A 14. A 15. B 16. B 17. A 18. D
19. C 20. B 21. D 22. C 23. A 24. B
25. C 26. D 27. C 28. B 29. A 30. E
31. D 32. B 33. C 34. A

第四章 医学伦理学

【A1/A2型题】

1. 目前广泛应用的人类生育控制技术不包括

- A. 避孕 B. 人工流产
C. 绝育 D. 产前优生学诊断
E. 克隆

2. 下述关于执行脑死亡标准的伦理意义的提法中，最具有说服力的是

- A. 有利于科学地确定死亡，真正维护人的生命
B. 有利于医生对病人积极抢救还是放弃治疗进行正确抉择

- C. 有利于节约医疗卫生资源

- D. 有利于公正分配卫生资源
E. 有利于器官移植的开展

3. 我国提出建立医院伦理委员会的主张是哪一年代

- A. 20世纪20年代 B. 20世纪60年代
C. 20世纪80年代 D. 20世纪90年代
E. 21世纪初

4. 医患关系出现物化趋势的最主要原因是

- A. 医生对物理、化学等检测诊断手段的依赖性