

GUOJIA YAODIAN ZHONGYAO CAISE TUJIAN

编著 ● 刘永新

以《中华人民共和国药典(2015年版)》为蓝本

600余种常用中药材

1200余幅高度清晰彩色图片



中医古籍出版社

Publishing House of Ancient Chinese Medical Books

国家药典 中药

图彩
鉴色



以《中华人民共和国药典（2015年版）》为蓝本

国家药典中药

彩色图鉴

GUO JIA YAO DIAN ZHONG YAO
CAI SE TU JIAN

编著 刘永新

下卷



中医古籍出版社

草豆蔻 CAODOUKOU

别名

豆蔻, 草蔻, 草蔻仁, 草果, 草蔻, 草蔻仁, 扣仁。

基源

草豆蔻为姜科 (Zingiberaceae) 植物草豆蔻的干燥近成熟种子。

植物形态

草豆蔻 *Alpinia katsumadai* Hayata.

多年生丛生草本, 高 1 ~ 2m。根茎粗壮, 红棕色。茎绿色, 粗壮。叶二列, 有短柄, 长约 2cm, 叶鞘抱茎, 叶舌革质, 卵形, 有粗柔毛; 叶片狭椭圆形或披针形, 长 45 ~ 60cm, 宽 4 ~ 10cm, 先端渐尖, 基部楔形, 全缘, 有缘毛, 两面有疏毛或无毛。总状花序顶生, 总梗长达 30cm, 花序轴密被黄白色粗柔毛; 花疏生, 花梗被柔毛; 苞片白色, 宽椭圆形, 先端钝圆, 有短尖头, 基部连合, 被粗毛; 萼钟形, 白色, 长 1.5 ~ 2cm, 顶端 3 钝齿, 外生疏长柔毛, 宿存; 花冠白色, 裂片 3, 长圆形, 上部裂片较大, 长约 3.5cm, 宽约 1.5cm; 唇瓣三角状卵形, 白色, 长约 4cm, 宽约 3.5cm, 先端 2 浅裂, 边缘有缺刻, 前部有红色或红黑色条纹, 后部有淡紫色斑点; 雄蕊 1, 花丝扁平; 子房下位, 被绢毛, 有附属体, 柱头锥状, 有缘毛。蒴果圆球形, 直径 3.5cm, 不开裂, 有粗毛, 熟时黄色。花期 4 ~ 6 月。果期 6 ~ 8 月。

生境分布

生于沟谷、河边、林缘阴湿处或草丛中。分布于广东、海南、广西等省、自治区。

采收加工

夏、秋二季采收, 晒至九成干, 或用水略烫, 晒至半干, 除去果皮, 取出种子团, 晒干。

药材鉴别

草豆蔻长圆形或圆球形, 直径 1.5 ~ 3cm。灰棕色或灰褐色, 中间有黄白色隔膜, 将种子团分成 3 瓣, 每瓣有种子多枚, 粘连在一起, 不易散落。种子为卵圆状多面体, 长 3 ~ 5mm, 直径约 3mm, 外被淡棕色腊质假种皮, 种脊有 1 条纵沟, 一端有种脐。质坚, 种仁灰白色。气香, 味辛、微苦。

炮制及饮片

除去杂质。用时捣碎。

性味功能

味辛, 性温。有燥湿健脾, 温胃止呕的功能。

主治用法

用于胃寒腹痛, 脘腹胀满, 冷痛, 暖气, 呕吐, 呃逆, 食欲不振等症。用量 3 ~ 6g, 水煎服。



草豆蔻花枝 *Alpinia katsumadai*



草豆蔻仁 *Alpinia katsumadai*

草果 CAOGUO

别名

草果仁, 草果子, 老蔻。

基源

草果为姜科 (Zingiberaceae) 植物草果的成熟干燥果实。

植物形态

草果 *Amomum tsao-ko* Crevost et Lemarie.

多年生丛生草本, 全株有辛辣气味。根茎短粗, 横走, 绿白色。茎粗壮, 直立或稍倾斜。叶二列; 叶鞘开放, 抱茎,

淡绿色, 被疏柔毛, 边缘膜质; 叶舌先端圆形, 膜质, 锈褐色, 被疏柔毛; 叶片长椭圆形或披针状长圆形, 40 ~ 70cm, 宽 5 ~ 18cm, 先端渐尖, 基部楔形, 全缘, 边缘干膜质。花序从茎基部抽出, 卵形或长圆形; 苞片长圆形至卵形, 先端钝圆, 浅橙色; 花冠白色; 唇瓣中肋两侧具紫红色条纹。蒴果长圆形或卵状椭圆形, 顶端具宿存的花柱残基, 果皮熟时红色, 干后紫褐色, 有不规则的纵皱纹 (维管束); 基部有宿存的苞片。花期 4 ~ 5 月, 果期 6 ~ 9 月。



草果果序 *Amomum tsao-ko*

生境分布

生于山坡疏林下。有栽培。分布于广西、云南和贵州等省区。

采收加工

8~9月果熟时摘取果实，晒干。过晚则果实开裂。

药材鉴别

草果呈长椭圆形，具三钝棱，长2~4cm，直径1~2.5cm。灰棕色至红棕色，具纵沟及棱线，顶端有圆形突起的柱基，基部有果梗或果梗痕。果皮质坚韧，易纵向撕裂。剥去外皮，中间有黄棕色隔膜，将种子团分成3瓣，每瓣有种子多为8~11粒。种子呈圆锥状多面体，直径约5mm；表面红棕色，外被灰白色膜质的假种皮，种脊为一



草果仁 *Amomum tsao-ko*

条纵沟，尖端有凹状的种脐；质硬，胚乳灰白色。有特异香气，味辛、微苦。

炮制及饮片

1. 草果仁 取草果，清炒至焦黄色并微鼓起，去壳，取仁。用时捣碎。
2. 姜草果仁 取净草果仁，加适量姜汁，炒干。用时捣碎。

性味功能

味辛、性温。有燥湿温中，除痰截疟的功能。

主治用法

用于寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐，疟疾寒热。用量3~6g，水煎服。

荔枝核 LIZHIHE

别名

荔枝，荔仁，大荔枝，枝核。

基源

荔枝核为无患子科 (Sapindaceae) 植物荔枝的种子。

植物形态

荔枝 *Litchi chinensis* Sonn.

常绿乔木，高6~20m。树皮灰绿色，光滑，有褐色斑点，小枝有白色小斑点，微被柔毛。双数羽状复叶互生；小叶2~5对；小叶柄长4~8mm；小叶革质，长椭圆形至长圆状披针形，长6~16cm，宽3~6cm，先端渐尖，基部楔形，稍偏斜，全缘，上面亮绿色，有光泽，下面稍带白粉。圆锥花序顶生，花小，绿白色或淡黄色，杂性；花梗长2~4mm；花被杯状，4裂，密被锈色柔毛；雄蕊6~10，通常多为8，长4~6mm，着生于花盘上，花丝被柔毛，花盘环状，肉质；雌蕊着生于花盘中央，密被柔毛，子房2~3室，每室有1胚珠，通常只有1胚珠发育，花柱线形，先端2短裂。核果卵圆形，长3~4.5cm，果皮干硬而薄，



荔枝果枝 *Litchi chinensis*

表面有瘤状突起，熟时鲜红色或暗红色。种子外被白色假种皮，肉质。种子长圆形，有光泽。花期2~3月。果期6~7月。

生境分布

产亚热带地区，为栽培果树。分布于福建、台湾、浙江、广东、海南、广西、四川、云南等省区。

采收加工

6~7月果皮变红时采摘，除去果皮及果肉，洗净晒干。

药材鉴别

荔枝核长圆形或卵圆形，稍扁，长1.5~2.2cm，宽0.5~1.5cm，棕红色或紫棕色，有光泽，稍有凹陷的波纹；种脐类圆形或椭圆形，质坚硬，用水浸润剖开后，可见肥厚子叶2，橙黄色或棕黄色，与种皮紧密结合。气微，味微甘，苦，涩。

炮制及饮片

1. 荔枝核 除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。
2. 盐荔枝核 取净荔枝核，捣碎后加盐水拌匀，闷透，置锅内，以文火加热，炒干，取出，放凉。每100kg净荔枝核，用食盐2kg。

性味功能

味甘，微苦，涩，性温。有理气，祛寒，散结，止痛的功能。



荔枝核 *Litchi chinensis*

主治用法

用于胃脘痛，疝气痛，妇女气滞血瘀，腹痛。用量4.9~9g，水煎服。体虚者忌服。

萆薢 BIBA

基 源

为胡椒科植物萆薢的干燥成熟果穗。

植物形态

多年生攀援藤本，枝有粗纵棱和沟槽。叶互生，纸质；叶片卵圆形、卵形或卵状长圆形，先端渐尖，基部心形或耳状，基出脉5~7条。花单性，雌雄异株，排成与叶对生的穗状花序，无花被；雄蕊2，花丝粗短；雌花序果期延长，子房上位，无花柱，柱头3。浆果卵形。花期7~9月，果期10月至翌年春季。

生境分布

分布于印尼、菲律宾、越南、印度、尼泊尔，斯里兰卡。我国云南省德宏州盈江、瑞丽、潞西等县亦有野生，广西、广东、福建有栽培。

采收加工

当果实近成熟，由黄变红褐色时采下果穗，晒干。

药材鉴别

本品呈圆柱形，稍弯曲，由多数小浆果集合而成，长1.5~3.5cm，直径0.3~0.5cm。表面黑褐色或棕色，有斜向排列整齐的小突起，基部有果穗梗残余或脱落痕；质硬而脆，易折断，断面不整齐，颗粒状。小浆果球形，直径约1mm。有特异香气，味辛辣。

炮制及饮片

拣除杂质，去柄，筛净灰屑，用时捣碎。



萆薢 *Piperlongum* L.

性味功能

味辛，性热。有温中散寒，行气止痛的功能。

主治用法

用于脘腹冷痛，呕吐，泄泻，偏头痛，牙痛。用量1.5~3g。

萆澄茄 BICHENGQIE

别名

萆茄，澄茄，山苍子。

基源

澄茄子为樟科 (Lauraceae) 植物山鸡椒的果实。

植物形态

山鸡椒 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers. 别名：萆澄茄，山苍树，山姜，木姜。

落叶灌木或小乔木，高3~10m。树皮幼时黄绿色，老则灰褐色；小枝细长，绿色，无毛，有香气。叶互生；薄纸质，叶柄长4~12mm，叶披针形或长椭圆形，长4~11cm，宽1.5~2.5cm，先端尖，基部楔形，全缘，上面深绿色，下面带绿苍白色，无毛。雌雄异株，花成腋生的伞形束状聚伞花序，先叶而出，总花梗纤细，有花4~6朵；花小，花被片6，椭圆形，长约2mm，雄花具能育雄蕊9，内向，3轮，每轮3枚，第3轮雄蕊基部有2腺体，花药4室，瓣裂，中央有退化雌蕊；雌花具有退化雄蕊6~12，呈舌状，柱头呈头状而扁宽，花柱短，子房卵圆形。浆果核果近球形，直径4~5mm，熟时黑色，果梗长3~5mm，总梗长7~10mm。花期4~5月，果期7~11月。

生境分布

生于向阳山坡、丘陵、林缘、灌丛及疏林中。分布于江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、云南、贵州、四川等省。

采收加工

秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

药材鉴别


澄茄子类球形，直径4~6mm。棕褐色至黑褐色，有网状皱纹。基部偶有宿萼及细果梗。除去外皮可见硬脆的果核，种子1，子叶2，黄棕色，富油性。气芳香，味稍辣而微苦。

性味功能

味辛，性温。有温中下气，散寒止痛的功能。

主治用法

用于胃寒呕吐呃逆，气滞胸腹胀痛，寒疝腹痛，寒证小便不利，小便浑浊等。用量1.5~3g，水煎服。



萆澄茄果枝 *Litsea cubeba*



萆澄茄 *Litsea cubeba*

轻粉 QINGFEN

别名

水银粉，汞粉，峭粉，腻粉，银粉。

基源

为粗制氯化亚汞结晶。

矿物形态

片状结晶。

生境分布

产湖北、河北、湖南、云南等地。

采收加工

将硫酸汞 15 份与汞 10 份混合，使成为硫酸亚汞。加食盐 3 份，混合均匀，升华即得。升华物呈结晶状，与中药传统方法制得者相似，多供外用。

药材鉴别

白色有光泽的鳞片状或雪花状结晶，或结晶性粉末；遇光颜色缓缓变暗。无臭，几乎无味。

炮制及饮片

除去杂质，研细粉，过 80 目筛。

性味功能

辛，寒；有毒。归大肠、小肠经。外用杀虫，攻毒，敛疮；内服祛痰消积，逐水通便。

主治用法

外治用于疥疮，顽癣，脓疮，梅毒，疮疡，湿疹；内服用于痰涎积滞，水肿膨胀，二便不利。用法用量，外用适量，研末掺敷患处；内服每次 0.1 ~ 0.2g，一日 1 ~ 2 次，多入丸剂或装胶囊服，服后漱口。



轻粉

重楼 CHONGLOU**别名**

蚤休，重台根，草河车，土三七。

基源

重楼为百合科 (Liliaceae) 植物华重楼、云南重楼的干燥根茎。


植物形态

1. 华重楼 *Paris polyphylla* Smith var. *chinensis* (Franch.) Hara. 别名：七叶一枝花。

多年生草本，高 30 ~ 100cm。根茎肥厚，黄褐色，结节明显，生须根，粗达 3cm。茎直立，圆柱形，基部带紫红色，有 1 ~ 3 片膜质叶鞘包茎。叶 5 ~ 8，通常 7 片轮生于茎顶；叶柄长 0.5 ~ 1.8cm；叶片纸质或膜质，长圆状披针形或倒披针形，长 7 ~ 17cm，宽 2.5 ~ 5cm，先端渐尖，基部楔形。花黄绿色，花葶由茎顶抽出。花两性，外轮花被片 4 ~ 6，叶状，长卵形或卵状披针形，长 3 ~ 7cm；内轮花被片 4 ~ 6，细线形，短于外轮花被片；雄蕊 8 ~ 10，花丝较短，花药长为花丝的 3 ~ 4 倍；子房近球形，有棱；花柱短，有向外反卷的分枝，蒴果球形，成熟时瓣裂；种子多数，有鲜红色多汁外种皮。花期 5 ~ 7 月。果期 8 ~ 9 月。

2. 云南重楼 *Paris polyphylla* Smith var. *yunnanensis* (Franch.) Hand. ~Mazz. 别名：滇重楼，重楼一枝箭，一把伞。

与华重楼区别，本种根茎较粗大，粗达 3.5cm。叶 6 ~ 10 片轮生，叶片厚纸质，叶披针形、卵状长圆形或倒卵形，长 5 ~ 11cm，宽 2 ~ 4.5cm。外轮花被片披针形或长卵形，绿色；内轮花被片线形或近披针形，蓝色。花期 6 ~ 7 月。果期 9 ~ 10 月。

云南重楼花 *Paris polyphylla* var. *yunnanensis*

生境分布

1. 华重楼生于山坡林下或山谷溪边阴湿外，分布于华中、华南及江苏、浙江、江西、福建、台湾等省区。

2. 云南重楼生于山地林下或路旁草丛中阴湿处，分布于分布于福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州及云南等省区。

采收加工

全年均可采挖，以秋季采者为好。挖取根茎，洗净泥沙，晒干或切片晒干。

药材鉴别

重楼根茎圆柱形，稍扁，结节状；长2~12cm，直径1~3cm。黄棕色或棕褐色，有密生粗环纹，背面有须根及须根痕，顶端有茎残基及鳞叶。质坚硬，断面粉性，灰白色或浅棕色，稍角质状。气微，味微苦。

炮制及饮片

除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。

性味功能

味苦，性微寒。有小毒。有清热解毒，消肿止痛，熄风定惊的功能。

主治用法

用于疔肿痈肿，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，跌打伤痛，惊风抽搐，流行性乙型脑炎，胃痛，阑尾炎，淋巴结核，扁桃体炎，腮腺炎，乳腺炎等症。用量3~9g。外用适量，研末调敷。



重楼饮片 (云南重楼 *Paris polyphylla* var. *yunnanensis*)

钟乳石 ZHONGRUSHI

别名

石钟乳、滴乳石

基源

为碳酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙。

矿物形态

为方解石类中的一种钟乳状的集合体，呈圆柱形或圆锥形。常见于石灰岩山洞中。系含碳酸钙的水溶液从岩石裂隙滴下，经水分蒸发后淀积而成，自上向下逐渐增长，倒垂于洞顶。

生境分布

产广西、广东、湖北、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、山西等地。

采收加工

采收后，除去杂石，洗净，晒干。

药材鉴别

略呈圆锥形或圆柱形。表面白色、灰白色或棕黄色，粗糙，凹凸不平。体重，质硬，断面较平整，白色至浅灰白色，对光观察具闪星状的亮光，近中心常有一圆孔，圆孔周围有多数浅橙黄色同心环层。无臭，味微咸。

炮制及饮片

1. 钟乳石 洗净，砸成小块，干燥。
2. 煅钟乳石 取净钟乳石块，照明煅法煅至红透。



钟乳石

性味功能

甘，温。归肺、肾、胃经。温肺，助阳，平喘，制酸，通乳。

主治用法

用于寒痰喘咳，阳虚冷喘，腰膝冷痛，胃痛泛酸，乳汁不通。用法用量3~9g。

钩藤 GOUTENG

别名

大钩丁，双钩藤。

基源

钩藤为茜草科 (Rubiaceae) 植物钩藤、大叶钩藤、毛钩藤、无柄果钩藤和华钩藤的干燥带钩茎枝。

植物形态

1. 钩藤 *Uncaria rhynchophylla* (Miq.) Jacks. 别名：双钩藤，钩藤，圆钩藤。

攀援藤本，长达 10m。钩与枝光滑无毛，幼时有白粉，变态枝呈钩状，成对或单生于叶腋，钩长 1 ~ 2cm，向下弯曲，钩基部扁宽。叶对生，叶柄长 8 ~ 12mm，托叶 2 深裂，裂片线状锥形，长 6 ~ 12mm；叶纸质，椭圆形，长 6 ~ 11cm，宽 3 ~ 6cm，先端尾尖，基部宽楔形，全缘，上面光滑，下面脉腋内有束毛，稍带白粉，干后变褐红色。头状花序单生叶腋或为顶生总状花序，花序梗上有线形小苞片 4 ~ 6；花冠长管状漏斗形，黄色，先端 5 裂，外生粉末状柔毛；雄蕊 5；子房下位，2 室，花柱伸出花冠外。蒴果倒圆锥形，长 7 ~ 10mm，有疏柔毛。花期 5 ~ 7 月。果期 10 ~ 11 月。

2. 大叶钩藤 *Uncaria macrophylla* Wall. 别名：钩藤，方钩藤。


藤本，长 12 ~ 15m；小枝稍扁，老枝四棱柱形。叶对生，革质，宽椭圆形或长椭圆形，长 10 ~ 16cm，宽 6 ~ 12cm，顶端急尖或圆，基部圆形或心形，上面光滑或沿中脉被短毛，下面被褐色短粗毛；叶柄粗壮，长 6 ~ 10mm；托叶 2 裂，长 8 ~ 10mm。头状花序球形，腋生和顶生，直径 4 ~ 4.5cm；总花梗长 3.5 ~ 6.5cm，与叶柄同被黄色粗毛；花 5 数，被褐色粗毛，有香气；萼筒筒状，裂片条状披针形，长约 3mm；花冠淡黄色，长约 15mm，裂片卵形，长约 2mm。蒴果具明显的柄，纺锤形，长 10 ~ 15mm，被毛。

3. 毛钩藤 *Uncaria hirsuta* Havil.


藤本，长 3 ~ 5m；小枝四棱柱形或近圆柱形，初时与钩同被白毛，以后毛逐渐脱落。叶对生，革质，椭圆形或卵状披针形，长 8 ~ 12cm，宽 4 ~ 7cm，基部圆形或浅心形，上面近无毛或粗糙，下面被长粗毛；叶柄长 5mm；托叶 2 裂。头状花序，球形，单个腋生或顶生，直径 4.5 ~ 5cm；总花梗被毛，长 3 ~ 5cm，中部着生 6 枚以上的苞片；花 5 数；花萼长 6 ~ 8mm，密被粗毛；花冠淡黄或淡红色，长 1.5cm，外面密被粗毛；尤以裂片上较密。蒴果纺锤形，长 10 ~ 12mm，直径约 5mm，被疏粗毛。

4. 无柄果钩藤 *Uncaria sessilifructus* Roxb. 别名：白钩藤。

大藤本，嫩枝较纤细，略有 4 棱角或方柱形，微被短柔毛。叶近革质，卵形、椭圆形或椭圆状长圆形，长 8 ~ 12cm，宽 4 ~ 6.5cm，顶端短尖或渐尖，基部圆至楔形，



钩藤生境 *Uncaria rhynchophylla*



钩藤 *Uncaria rhynchophylla*

两面均无毛，下面常有蜡被，干时常为粉白色；侧脉4~7对，下面脉上无毛或被短柔毛，脉腋窝陷，其中有黏液毛；叶柄长5~10mm，无毛；托叶窄三角形，深2裂达全长2/3以上，外面无毛或疏被短柔毛，内面基部有黏液毛，裂片窄三角形。头状花序不计花冠直径5~10mm，单生叶腋，总花梗具一节，或成单聚伞状排列，总花梗腋生，长达15cm；小苞片线形或有时近匙形；花无梗；花萼管长1~2mm，外面有稠密苍白色毛，萼裂片线状长圆形，顶端钝，长1mm，通常有稀疏或稠密短柔毛；花冠黄白色，高脚碟状，花管长6~10mm，外面无毛或被疏柔毛，花冠裂片长圆形，长2mm，外面有明显苍白色或金黄色的绢毛；花柱伸出冠喉外，柱头长棒状。果序直径2.5~3.5cm；小蒴果长10~14mm，微被短柔毛，宿存萼裂片舌状，长约1mm，略呈星状展开。花果期3~12月。

5. 华钩藤 *Uncaria sinensis* Havil.

木质藤本，高达3m，小枝四方形，全体光滑无毛；钩近于叶腋生，长约1.5cm。叶对生；叶片卵形或卵状椭圆形，先端渐尖，基部圆形，全缘；叶柄长约1cm；托叶膜质，圆形，外反。头状花序。花序柄长5~8cm，无毛；花萼管状，先端5裂，裂片长椭圆形或卵形，密被灰色小粗毛；花冠管状，先端5裂，裂片圆形；雄蕊5，生于花冠管喉部，花丝比花药短；子房下位，花柱线形，伸出花冠管外。蒴果棒状，被紧贴的长柔毛。种子细小，两端有翅，花期6~7月，果期10~11月。

生境分布

1. 钩藤生于山谷疏林中，分布于陕西、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省区。

2. 大叶钩藤生于潮湿林下或灌丛，分布于广东、广西、云南等省区。

3. 毛钩藤生于山谷林下，溪畔或灌丛中，分布于台湾、福建、广东、广西、贵州等省区。

4. 无柄果钩藤生于密林下或林谷灌丛中，分布于广西、云南等省区。

5. 华钩藤生于山谷疏林中，分布于湖南、湖北、广西、四川、贵州、云南等省区。

采收加工

春、秋季，割下带钩的藤，除去叶片，晒干，或置锅内蒸后再晒干，使其色泽油润光滑。

药材鉴别

钩藤茎枝呈圆柱形或类方柱形，长2~3cm，直径0.2~0.5cm。表面红棕色至紫红色者具细纵纹，光滑无毛，黄绿色至灰褐色者有时可见白色点状皮孔，被黄褐色柔毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩（不育花序梗），或仅一侧有钩，另一侧为凸起的疤痕；钩略扁或稍圆，先端细尖，基部较阔；钩基部的枝上可见叶柄脱落后的窝点状痕迹和环状的托叶痕。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性，髓部



钩藤 *Uncaria rhynchophylla*



大叶钩藤 *Uncaria macrophylla*



钩藤药材 (大叶钩藤 *Uncaria macrophylla*)

黄白色或中空。无臭，味淡。

性味功能

味甘，性凉。有清热平肝，息风定惊的功能。

主治用法

用于头痛眩晕，感冒夹凉，惊悸，惊痫抽搐，妊娠子病，高血压症等。用量 3 ~ 12g，水煎服。入煎剂宜后下。

韭菜子 JIUCAIZI

别名

韭子，韭菜仁。

基源

韭菜子为百合科(Liliaceae)植物韭菜的干燥成熟种子。

植物形态

韭菜 *Allium tuberosum* Rottl. ex Spreng.

多年生草本。具倾斜的横生根状茎。鳞茎簇生，近圆柱形；鳞茎外皮黄褐色，破裂成网状或近网状的纤维质。叶线形，基生，扁平，实心，比花茎短，叶边缘平滑。花茎圆柱状，常具 2 纵棱，下部被叶鞘；总苞 2 裂，比花序短，宿存；伞形花序，半球形或近球形；花柄基部具小苞片；花白色或微带红色；花被片 6，狭卵形至长圆状披针形；雄蕊 6，花丝基部合生并与花被贴生；子房倒圆锥状球形，具 3 圆棱。蒴果，具倒心形的果瓣。花、果期 7~9 月。

生境分布

全国各地均有栽培。

采收加工

秋季果实成熟时采收果序，晒干，搓出种子，除去杂质。

药材鉴别

韭菜子扁卵形或近三角状扁卵形，稍扁，长 2~4mm，宽 1.5~3mm。黑色，一面凸起，粗糙，有细密的网状皱纹，另一面微凹，皱纹不甚明显。顶端钝，基部稍尖，有点状突起的种脐。质硬。胚乳灰白色，胚白色弯曲，子叶 1。气特异，味微辛。

炮制及饮片

1. 韭菜子 除去杂质。
2. 盐韭菜子 取净韭菜子，加盐水拌匀，闷透，置锅内，以文火加热，炒干，取出，放凉。每 100kg 净韭菜子，用食盐 2kg。

性味功能


味辛、甘，性温。有温补肝肾，暖腰膝，壮阳固精的功能。

主治用法

用于阳痿遗精，腰膝酸痛，遗尿，尿频，冷痛，白带过多，淋浊等。用量 3~9g，水煎服，或入丸、散。



韭菜花株 *Allium tuberosum*



左为盐韭菜子，右为韭菜子 *Allium tuberosum*

首乌藤 SHOUWUTENG

别名

夜交藤，田猪头，铁称陀。

基源

首乌藤为蓼科(Polygonaceae)植物何首乌的干燥藤茎。

植物形态

何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb.

多年生草本。块根肥大。茎缠绕，多分枝，下部稍木质化，上部较细，有时成淡红色，具纵条纹，中空，无毛。叶卵状心形，长4~9cm，宽3~6cm，先端渐尖，基部心形或近心形，全缘，两面较粗糙，无毛。托叶鞘短筒状，膜质，无缘毛，常早落。花序圆锥状，顶生或腋生，开展，结果时长可达30cm；苞片卵形，中部绿色，边缘膜质透明，无毛；苞片内生白色小花2~4朵；花被5深裂，不等大，结果时外轮3片增大、肥厚，背部生宽翅，翅下延至花梗的节处；雄蕊8，短于花被；花柱3，柱头头状。瘦果3棱形，黑色，具光泽，包于宿存的花被内。花期6~9月，果期8~10月。

生境分布

生于山坡、石缝、林下。分布于河北、河南、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省。

采收加工

秋、冬二季采割，除去残叶，捆成把，干燥。

药材鉴别

首乌藤长圆柱形，稍扭曲，具分枝，长短不一，直径4~7mm。紫红色至紫褐色，粗糙，具扭曲的纵皱纹。节部略膨大，有侧枝痕。外皮菲薄，可剥离。质脆，易折断，断面皮部紫红色，木部黄白色或淡棕色，导管孔明显，髓部疏松，类白色。无臭，味微苦涩。

炮制及饮片

除去杂质，洗净，切段，晒干。

性味功能

味甘，性平。有养血安神，祛风通络的功能。

主治用法

用于失眠多梦，血虚身痛，风湿痹痛；外治皮肤瘙痒。用量9~15g；外用适量，煎水洗患处。



何首乌花枝 *Polygonum multiflorum*



首乌藤饮片 *Polygonum multiflorum*

香加皮 XIANGJIAPU

别名

香五加，羊奶藤，羊桃梢，羊奶子。

基源

香加皮为萝藦科 (Asclepiadaceae) 植物杠柳的根皮。

植物形态

杠柳 *Periploca sepium* Bge. 别名：北五加皮，香加皮。

落叶蔓生灌木，高达 2m，全株有乳汁。茎深紫色或灰褐色，小枝多对生，有皮孔。叶对生，叶柄长约 3mm，叶卵状长圆形、披针形或长圆状披针形，长 4 ~ 10cm，宽 1 ~ 2.5cm，先端渐尖，基部楔形，全缘，上面深绿色，有光泽。聚伞花序腋生，花数朵；总花梗细长、小花梗稍短；花萼 5 深裂，裂片卵圆形，花萼内面基部有 10 枚小腺体；花冠紫红色，5 深裂，裂片内有长柔毛，外有紫褐斑，近边缘密被白色细长毛，花开放后裂片向外卷；副花冠环状 10 裂，其中 5 裂延伸，丝状，被短柔毛；雄蕊 5，着生于副花冠内面并合生，花药粘连并包围柱头，背面被长柔毛。心皮离生，柱头盘状。果 2，圆柱状，长 7 ~ 12 cm，成熟时褐色。种子长圆形，长约 7 mm，黑褐色，顶端有白色绢质种毛，长约 3 cm。花期 5 ~ 6。果期 7 ~ 9 月。

生境分布

生于山坡林缘、沟边或路旁。分布于吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、河南、山东、江苏、江西、贵州、四川等省区。

采收加工

春、秋两季采挖根部，趁湿敲打，抽取木心，晒干根皮。

药材鉴别

香加皮单卷筒状、槽状或碎片状，长 3 ~ 15cm，直径 1 ~ 2cm，厚 1 ~ 5mm。外面灰棕色或黄棕色，粗糙，栓皮常呈层状剥落；内面淡黄色或黄棕色，平滑，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面黄白色。有特异浓香气，味苦。

炮制及饮片

除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。

性味功能

味辛、苦，性温。有毒。有祛风湿，壮筋骨，利小便的功能。

主治用法

用于风湿筋骨疼痛，腰膝酸软，心悸气短，下肢浮肿，小儿筋骨软弱，脚步痿行迟，水肿小便不利等。用量 3 ~ 6g，水煎服。本品有毒，服用不可过量。



杠柳花枝 *Periploca sepium*



香加皮饮片 *Periploca sepium*



莎草植株 *Cyperus rotundus*

别名

香附米，莎草根，三棱草根。

基源

香附为莎草科 (Cyperaceae) 植物莎草的块茎。

植物形态

莎草 *Cyperus rotundus* L. 别名：香附子。


多年生宿根草本，高 15 ~ 50cm。匍匐根茎细长，顶端或中部膨大成纺锤形块茎，块茎紫黑色，有棕毛或黑褐色毛状物。茎直立，三棱形，基部块茎状。叶基生，短于秆，叶鞘棕色，常裂成纤维状；叶片窄线形，长 20 ~ 60cm，宽 2 ~ 5mm，先端尖，全缘，具平行脉。苞片 2 ~ 4，叶状，长于花序；长侧枝聚伞花序单出或复出，有 3 ~ 6 个开展的辐射枝；小穗线形，3 ~ 10 个排成伞形；鳞片紧密，中间白色，两侧赤褐色；每鳞片内有 1 花，雄蕊 3，子房上位，柱头 3，伸出鳞片外。小坚果椭圆形，具 3 棱。花期 6 ~ 8 月，果期 7 ~ 11 月。

生境分布

生于山坡草地、路边荒地、田间沟边等向阳处。分布于全国大部分省区。

采收加工

春、秋采收块茎，用火燎去须根，沸水稍煮或蒸透后



香附饮片 *Cyperus rotundus*

晒干，撞去毛须；或直接晒干后撞去毛须。

药材鉴别

香附纺锤形或稍弯曲，长 1.5 ~ 3.5cm，直径 0.5 ~ 1cm。紫棕色或焦黑色，有不规则纵皱纹，具 6 ~ 10 个隆起的环节，节间长 2 ~ 5 mm，节上有未去尽毛须及须根断痕。质硬，断面较平坦，蒸煮者断面角质样，棕黄色或棕红色；生晒者断面粉性，类白色；内皮层棕色，皮层及中柱可见维管束点痕。气香，味苦、辛。

炮制及饮片

1. 香附 除去毛须及杂质，碾碎或切薄片。
2. 醋香附 取香附粒（片），加醋拌匀，闷透，置锅内，炒干，取出，放凉。每 100kg 净香附，用醋 20kg。

性味功能

味辛、微苦、甘，性平。有理气解郁，调经止痛的功能。

主治用法

用于胸脘胀满，两胁疼痛，月经不调，痛经等症。用量 6 ~ 12g，水煎服。

香橼 XIANGYUAN

别名

钩橼子，香橼柑。

基源

香橼为芸香科 (Rutaceae) 植物香圆和枸橼的干燥成熟果实。

植物形态

1. 香圆 *Citrus wilsonii* Tanaka. 别名：陈香圆。常绿乔木，高4~6m，分枝较多，有短刺。叶互生，革质，单身复叶，叶柄有倒心形阔翼，翼长1~4cm，宽0.3~2cm；叶长椭圆形，长5~12cm，宽2~5cm，先端短钝或渐尖，基部钝圆，全缘或有波状锯齿，上面深绿色，下面淡绿色，两面有半透明腺点。花单生或1~3朵簇生，有时成总状花序，生于枝顶或叶腋，花萼杯状，裂片5，三角形；雄蕊25~36，生于花盘周围，花丝结合，长于柱头；子房上位，扁圆，10~12室，花柱圆柱形，柱头头状。柑果圆形、长圆形或扁圆形，直径5~7cm，顶端有乳头状突起，橙黄色，果皮粗糙而有皱纹或平滑，有香气，味酸苦。种子多数，扁卵形。花期4~5月。果期10~11月。

2. 枸橼 *Citrus medica* L. 别名：香橼。常绿小乔木或灌木。枝有短硬棘刺，幼枝带紫红色。叶互生，有短叶柄，无翼或稍有痕迹，无明显关节；叶长圆形或倒卵状长圆形，长8~15cm，宽3~6.5cm，边缘有锯齿，有半透明油点。总状花序或有3~10花丛生于叶腋；花两性或雌花退化为雄性花，有短柄；花萼浅杯状，5浅裂；花瓣5，外面淡紫色，内面白色；雄蕊多数；子房上位，10~13室，每室胚珠多数，花柱宿存，肥大。柑果长圆形，芳香，瓢囊小。种子卵圆形。花期4~5月。果期10~11月。

生境分布

1. 香圆栽培于园圃内、村旁，分布于陕西、江苏、浙江、江西、湖北、四川等省。

2. 枸橼栽培于低山或丘陵，江苏、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南等省区有栽培。

采收加工

秋季果实成熟时采收，鲜时横切成片状或纵切片，晒干或低温干燥。亦可整个剖两瓣晒干。

药材鉴别

1. 香圆 为类球形、半球形或圆片，直径4~7cm。表面黑绿色或黄棕色，密被凹陷的小油点及网状隆起的粗皱纹，顶端有花柱残痕及隆起的环圈，基部有果梗残基。质坚硬。剖面或横切薄片，边缘油点明显；中果皮厚约0.5cm，瓢囊9~11室，棕色或淡红棕色，间或有黄白色种子。气香，味酸而苦。

2. 枸橼 为圆形或长圆形片，直径4~10cm，厚0.2~0.5cm。横切片外果皮黄色或黄绿色，边缘波状，散有凹入的油点；中果皮厚1~3cm，黄白色，有不规则的



枸橼果枝 *Citrus medica*



香橼饮片 (枸橼 *Citrus medica*)

网状突起维管束；瓢囊10~17室。纵切片中心柱较粗壮。质柔韧。气清香，味微甜而苦辛。

炮制及饮片

未切片者，打成小块；切片者润透，切丝，晾干。

性味功能

味辛、苦、酸，性温。有理气舒肝，和胃止痛，化痰功能。

主治用法

用于胸胁脘腹胀痛，胃脘痞满，食欲不振，嗝气，气逆呕吐，痰多咳嗽，胃痛，消化不良等。用量4.5~9g，水煎服。

香薷 XIANGRU

别名

香菜, 香薷, 石香薷。

基源

香薷为唇形科 (Labiatae) 植物石香薷全草。

植物形态

石香薷 *Mosla chinensis* Maxim. 别名: 江香薷, 青香薷, 细叶香薷。

直立草本, 茎高 55 ~ 65cm, 基部分枝较长, 向上分枝渐短。茎四棱形, 基部类圆形, 中上部茎具细浅纵槽数条, 棱上疏生长柔毛, 槽内为卷曲柔毛。叶对生, 叶柄长 0.7 ~ 1cm。叶披针形, 长 3 ~ 6cm, 宽 0.6 ~ 1cm, 先端渐尖, 基部渐狭, 边缘具 5 ~ 9 个锐浅锯齿, 侧脉明显, 上面黄绿色, 被短柔毛, 间有长绵毛, 下面色较浅, 主脉上生长柔毛, 余为短柔毛, 两面均具凹陷腺点。总状花序密集成穗状, 长 2 ~ 3.5cm, 苞片覆瓦状排列, 倒卵圆形或圆卵形, 长 5 ~ 6mm, 宽 4 ~ 4.5mm, 先端短尾尖, 全缘, 边缘长睫毛, 7 ~ 9 条脉自基部掌状生出。花梗长 1 ~ 1.5mm, 被短柔毛。花萼钟形, 长 4mm, 宽 2 ~ 2.5mm, 外被白色柔毛及凹陷腺点, 内面在喉部以上被白色绵毛, 下部无毛, 萼齿 5, 钻形或披针形近相等, 约为全长 2/3, 果时基部膨大; 花冠淡紫色, 稀为白色, 长 0.6 ~ 0.8cm, 伸出苞外, 外被微柔毛, 内面在下唇之下方冠筒上簇生长柔毛, 冠筒基部具 1 圈长毛环, 余部脉上具疏短毛茸, 下唇中裂片边缘具不规则圆或尖锯齿, 先端凹入。雄蕊、雌蕊内藏, 退化雄蕊 2, 发育 2 药室近相等, 花丝极短无毛, 着生于花冠筒内。柱头 2 裂, 反卷。花盘前方指状膨大。小坚果扁圆球形, 直径 0.9 ~ 1.4mm, 表面具疏网纹。网眼内平坦, 具疣状突起。花期 6 月。

生境分布

生长于荒地、田边、山边草丛等地; 有栽培。分布于长江流域以南各省区。

采收加工

夏季开花前, 采收全草。除去根部, 晒干。

药材鉴别

香薷全长 26 ~ 30cm。茎方柱形或近圆形, 直径 1 ~ 2mm, 基部紫棕色, 上部黄绿色, 节间长 3 ~ 5cm。叶多皱缩或脱落, 灰绿色或绿色, 展开后叶片呈披针形, 边缘有疏齿, 两面被疏柔毛及腺点, 总状花序头状。质脆易碎。气香, 味辛凉。以枝嫩, 穗多, 香气浓者为佳。

炮制及饮片

除去残根及杂质, 切段。

性味功能

味辛, 性微温。有发汗解表, 祛暑化湿, 利尿消肿的功能。



石香薷植株 *Mosla chinensis*



香薷饮片 *Mosla chinensis*

主治用法

用于暑湿感冒, 发热无汗, 头痛, 腹痛吐泻, 水肿。用量 3 ~ 9g, 水煎服。

骨碎补 GUSUIBU

别名

猴姜, 石毛姜, 过山龙。

基源

骨碎补为水龙骨科 (Polypodiaceae) 植物槲蕨的根茎。

植物形态

槲蕨 *Drynaria fortunei* (Kunze) J. Smith. 别名: 爬岩姜。

多年生附生草本, 高 20~40cm。根茎粗壮, 肉质, 横走, 密生棕黄色钻状披针形鳞片, 有睫毛。叶二型, 营养叶多数, 厚革质, 红棕色或灰褐色, 无柄, 宽卵形, 长 5~7cm, 宽 3~6cm, 边缘羽状浅裂, 叶脉明显。孢子叶绿色, 厚纸质, 有短柄, 柄有翅, 叶长圆形或长椭圆形, 长 20~40cm, 宽 10~20cm, 羽状深裂, 裂片互生, 披针形, 长 4~10cm, 宽 1.5~2.5cm, 先端尖, 边缘有不规则浅波状齿; 叶脉网状。孢子囊群圆形, 黄褐色, 生于小脉交叉点, 沿中脉两侧各排成 2~3 行, 无囊群盖。

生境分布

附生于树干、山林石壁或墙上, 分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南等省区。

采收加工

全年可采根茎, 除去叶片及泥沙, 晒干或蒸熟后晒干, 或再用火燎毛茸。

药材鉴别

根茎扁平长条状, 多弯曲, 有分枝, 长 4~15cm, 宽 1~1.5cm, 厚 2~4mm。表面淡棕色或暗棕色, 密生棕色柔软如毛小鳞片, 经火燎者呈棕色或暗褐色, 两侧和上面有凸起叶痕及少数叶柄残基, 下面残留短须根。质轻脆, 易折断, 断面红棕色, 维管束黄色, 排列成环状。气微, 味淡, 微涩。

炮制及饮片

1. 骨碎补 除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 干燥。
2. 烫骨碎补 取洁净河砂置锅内, 一般用武火炒热后, 加入净骨碎补或片, 不断翻动, 烫至表面鼓起, 取出, 筛去河砂, 放凉, 撞去毛。

性味功能

味苦, 性温。有补肾, 壮骨, 祛风湿, 活血止痛的功能。



槲蕨孢子囊 *Drynaria fortunei*



骨碎补饮片 *Drynaria fortunei*

主治用法

用于肾虚腰痛, 久泻, 风湿性关节炎, 跌打损伤, 瘀血作痛, 牙痛, 耳鸣, 阑尾炎; 外用于斑秃, 鸡眼。用量 3~10g。鲜品 6~15g。外用适量研末敷或酒浸涂患处, 也可用鲜品切断擦或捣粒敷患处。

鸦胆子 YADANZI

别名

老鸦胆, 鸦蛋子, 小苦楝, 苦参子, 老鸦胆。

基源

鸦胆子为苦木科 (Simaroubaceae) 植物鸦胆子的干燥成熟果实。

植物形态

鸦胆子 *Brucea javanica* (L.) Merr.

半常绿灌木, 高达 3m。全株密被淡黄色柔毛。单数羽状复叶, 叶柄长达 14cm; 小叶对生, 7~11 片, 有短柄, 小叶长卵形或长卵状披针形, 长 4~11cm, 宽 2~5cm, 先