



国家护士（师）资格考试



直通车系列

2018

# 护理学(主管护师)考试 易混易错 2000 题

主编 成丽 张红

高含金量

高频考点全覆盖，含历年真题

高针对性

2000个易混易错知识点深度剖析（含真题）

高附加值

赠送《考试宝典》体验卡

高含金量+高针对性+高附加值=高通过率

中国医药科技出版社

国家护士(师)资格考试直通车系列

2018

# 护理学(主管护师)考试 易混易错 2000 题

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| 主编 | 成 丽 | 张 红 |     |
| 编者 | 周红妮 | 费旭静 | 梅春丽 |
|    | 李 辉 | 王 月 | 张莉莉 |
|    | 梁燕飞 | 杨仕宁 | 潘学成 |
|    | 韩 燕 | 梁轶群 |     |
| 组织 | 覃丽洁 | 杨丽芬 |     |

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本书为国家护士（师）资格考试直通车系列图书之一，全书共 20 套单元测试卷，每套测试卷的题型划分均按考试标准进行，试题紧扣考试大纲。全书依托《考试宝典》的海量题库和强大的考生后台数据，选取 2000 道考生易错易混淆知识点试题，由名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，使考生更容易去区分、掌握这些易错易混淆的知识点，提高考生做题正确率。

### 图书在版编目（CIP）数据

2018 护理学（主管护师）考试易混易错 2000 题 / 成丽，张红主编. —北京：中国医药科技出版社，2017.7

国家护士（师）资格考试直通车系列

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9276 - 9

I. ①2… II. ①成… ②张… III. ①护理学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 087669 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 [www.cmstp.com](http://www.cmstp.com)

规格 889 × 1194mm <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 15

字数 380 千字

版次 2017 年 7 月第 1 版

印次 2017 年 7 月第 1 次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9276 - 9

定价 35.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前 言

护理学（主管护师）考试是为贯彻原人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年正式开始实行。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，我们特组织有关专业教师编写了《2018 护理学（主管护师）考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足考试大纲。全书依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取 2000 道考生易错、易混淆知识点试题，由名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点，特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生参考复习。

《2018 护理学（主管护师）考试易混易错 2000 题》全书的亮点：

1. 专业的编写委员会。编写成员均是在高校任职的一线教师兼在医院任职，对护理学（护师、主管护师）专业技术资格考试有着十多年的教学、培训经验。特别感谢西安交通大学医学院附属红会医院及广西科技大学等单位参与编写本书的各位老师。

2. 试题的含金量高。全书紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。

3. 解析全面详细、举一反三。

4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

预祝各位考生，搭乘本“直通车”，顺利通过考试。

编 者  
2017 年 3 月

# 目 录

|            |     |
|------------|-----|
| 单元一 .....  | 1   |
| 单元二 .....  | 13  |
| 单元三 .....  | 25  |
| 单元四 .....  | 36  |
| 单元五 .....  | 47  |
| 单元六 .....  | 58  |
| 单元七 .....  | 69  |
| 单元八 .....  | 82  |
| 单元九 .....  | 95  |
| 单元十 .....  | 107 |
| 单元十一 ..... | 119 |
| 单元十二 ..... | 130 |
| 单元十三 ..... | 141 |
| 单元十四 ..... | 152 |
| 单元十五 ..... | 164 |
| 单元十六 ..... | 175 |
| 单元十七 ..... | 186 |
| 单元十八 ..... | 197 |
| 单元十九 ..... | 210 |
| 单元二十 ..... | 224 |

# 单元一

## 一、A1/A2 型题

1. 新生儿期是指
  - A. 自出生脐带结扎到 1 周岁
  - B. 自受孕到出生脐带结扎时
  - C. 自出生脐带结扎开始到满 28 天
  - D. 自出生后第一天到生后第 30 天
  - E. 自出生后第一天到生后第 40 天
2. 4 个月小儿, 来院进行发育检查, 结果正常。母亲询问何时开始会爬, 正确的回答是
  - A. 3 个月
  - B. 6 个月
  - C. 7 个月
  - D. 8 个月
  - E. 10 个月
3. 慢性阻塞性肺疾病(COPD)最确切的定义是指
  - A. 单纯性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
  - B. 喘息性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
  - C. 具有气道阻塞特征的慢性支气管炎和肺气肿
  - D. 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿及肺源性心脏病
  - E. 支气管哮喘合并阻塞性肺气肿及肺源性心脏病
4. 导致心包炎最常见的病原体是
  - A. 金黄色葡萄球菌
  - B. 军团菌
  - C. 结核杆菌
  - D. 支原体
  - E. 真菌
5. 给休克病人快速大量输血补液时, 掌握量和速度, 根据以下哪一项指标
  - A. 面色和肢端温度
  - B. 颈静脉充盈情况
  - C. 根据已丧失量
  - D. 血压和脉搏
  - E. 尿量和中心静脉压
6. 6 个月小儿, 按照计划免疫程序规定接种疫苗

苗, 此时应当接种

- A. 麻疹疫苗第一针
  - B. 卡介苗第一针
  - C. 乙肝疫苗第三针
  - D. 百白破疫苗第二针
  - E. 脊髓灰质炎疫苗第二次
7. 肺炎链球菌肺炎的铁锈色痰的最主要原因
  - A. 痰里有大量红细胞
  - B. 痰里混有大量肺泡巨噬细胞
  - C. 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
  - D. 红细胞破坏后释放含铁血黄素
  - E. 以上都不是
8. 严重创伤后, 血压降低, 脉搏细速, 面色苍白, 诊断为休克。治疗时重点应注意
  - A. 避免使用血管收缩药
  - B. 及时使用甘露醇
  - C. 药物对各脏器的毒性
  - D. 及时扩充血容量
  - E. 急性肾衰竭的发生
9. 构成血红蛋白、肌蛋白、细胞色素和其他酶系统主要成分的元素是
  - A. 钙
  - B. 磷
  - C. 铁
  - D. 铜
  - E. 锌
10. 原发性肝癌最常见的首发症状是
  - A. 肝区疼痛
  - B. 肝大
  - C. 肝性脑病
  - D. 乏力、消瘦
  - E. 黄疸
11. 6 个月以内小儿的最佳食品是
  - A. 母乳
  - B. 牛乳
  - C. 羊乳
  - D. 全脂奶粉
  - E. 乳儿糕

12. 硬膜外麻醉最严重的并发症是

- A. 全脊髓麻醉
- B. 血管扩张
- C. 尿潴留
- D. 呼吸变慢
- E. 血压下降

13. 预防全身麻醉病人发生误吸的主要措施是

- A. 术前禁食禁水
- B. 术前放置胃管
- C. 选择静脉麻醉
- D. 术前用阿托品
- E. 术前用止吐药

14. 外阴局部受伤易形成水肿的部位是

- A. 阴阜
- B. 小阴唇
- C. 大阴唇
- D. 阴蒂
- E. 阴道前庭

15. 下列急性肺水肿的护理措施中, 哪项不正确

- A. 指导病人取坐位或半坐卧位双腿下垂
- B. 给予持续低流量吸氧
- C. 遵医嘱给予毛花苷 C 缓慢静脉注射
- D. 皮下注射或静脉推注吗啡
- E. 给予氨茶碱缓慢静脉推注

16. 贯穿骨盆各平面中心点的假想曲线称为

- A. 耻骨弓
- B. 坐骨结节连线
- C. 骨盆轴
- D. 骨盆中线
- E. 髂耻线

17. 下列关于急性上呼吸道感染的描述错误的是

- A. 成人普通感冒多由细菌感染引起
- B. 普通感冒主要表现为咽干、喉痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞, 一般肺部无干、湿性啰音
- C. 急性细菌性扁桃体炎病人可有高热、咽部明显充血, 扁桃体肿大、充血, 表面常有黄色点状渗出物
- D. 感冒病人如出现耳痛、耳鸣、听力减退、外耳道流脓等常提示并发中耳炎
- E. 受凉、淋浴、过度疲劳常为急性上呼吸道感染的诱因

18. 下列对于高血压诊断的说法正确的是

- A. 不同时间测量两次血压, 一次超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- B. 测量两次血压, 均超过正常血压值的高限可诊断为高血压
- C. 测量三次血压, 均超过正常血压值的高限可

诊断为高血压

D. 不同时间测量三次血压, 均超过正常血压值的高限可诊断为高血压

E. 不同时间测量三次血压, 一次超过正常血压值的高限可诊断为高血压

19. 妇女一生中最长的阶段是

- A. 新生儿期
- B. 幼儿期
- C. 青春期
- D. 更年期
- E. 性成熟期

20. 急性肺脓肿最主要的临床表现是

- A. 畏寒、高热
- B. 不同程度咯血
- C. 胸痛与呼吸运动相关
- D. 肺部干湿性啰音
- E. 咳大量脓、臭痰

21. 非感染性病理性黄疸中最常见的病因是

- A. 药物性黄疸
- B. 新生儿溶血病
- C. 先天性胆道闭锁
- D. 胎粪延迟排出
- E. 母乳性黄疸

22. 集体儿童机构保健的原则不包括

- A. 合理的生活作息
- B. 加强饮食管理
- C. 合理教养
- D. 父母定期探视
- E. 健全防病制度

23. 导致营养不良的重要原因是

- A. 喂养不当
- B. 消化吸收障碍
- C. 需要量增加
- D. 消耗量过大
- E. 先天畸形

24. 胎产式是指

- A. 胎儿先露部与母体纵轴的关系
- B. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系
- C. 胎儿纵轴与母体骨盆的关系
- D. 胎儿在母体内的姿势
- E. 胎儿先露部与母体骨盆轴的关系

25. 重型腹泻与轻型腹泻的主要区别是有无

- A. 发热
- B. 粪便大量水分
- C. 每日十余次大便
- D. 水、电解质紊乱
- E. 食欲下降

26. 肝性脑病的诱发因素, 应除外下列哪项

- A. 大量排钾利尿
- B. 多次灌肠和导泻
- C. 上消化道出血
- D. 反复放腹水
- E. 高蛋白饮食

27. 如无特殊情况, 正常小儿适宜断母乳的年龄是

- A. 10~12 个月
- B. 18 个月
- C. 20 个月
- D. 1.5~2 岁
- E. 2~2.5 岁

28. 急性心肌梗死发生心室颤动的先兆是

- A. 室性期前收缩频发成对多源
- B. 室上性阵发性心动过速
- C. 房性期前收缩
- D. 二度房室传导阻滞
- E. 心房纤颤

29. 以人为中心, 以护理程序为基础, 以现代化护理观为指南, 对人实施生理、心理和社会各个方面的护理, 从而使入达到最佳健康状况的是

- A. 个案护理
- B. 功能制护理
- C. 小组护理
- D. 责任制护理
- E. 整体护理

30. 心肺复苏应该在何种地方进行

- A. 柔软的床上
- B. 地板上
- C. 地板的软垫上
- D. 硬板床上
- E. 水泥地上

31. 上消化道呕出大量鲜红色血, 且不易控制的常见病为

- A. 消化性溃疡出血
- B. 应激性溃疡出血
- C. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- D. 急性出血性胃炎出血
- E. 胃癌出血

32. 世界上第一所正式护士学校创建于

- A. 1854 年, 意大利, 佛罗伦萨
- B. 1860 年, 英国, 伦敦
- C. 1888 年, 中国, 福州
- D. 1920 年, 德国, 开塞维慈
- E. 1921 年, 法国, 巴黎

33. 上消化道出血特征性的表现为

- A. 失血性周围循环衰竭
- B. 呕血与黑便
- C. 失血性贫血
- D. 氮质血症
- E. 发热

34. 按医疗技术水平划分可将医院分为

- A. 综合性医院
- B. 专科医院
- C. 个体所有制医院
- D. 企业医院
- E. 一级、二级、三级医院

35. 胃壁分为黏膜层、黏膜下层、肌层、浆膜层等 4 层, 其中黏膜层主要由下列哪几种细胞组成

- A. 主细胞
- B. 壁细胞
- C. 黏液细胞
- D. B 细胞
- E. 主细胞、壁细胞和黏液细胞

36. 消化系统疾病最常见的症状和体征包括

- A. 呕血及黑便
- B. 腹痛
- C. 腹泻
- D. 黄疸、恶心、呕吐
- E. 以上都是

37. 能预防局部麻醉药中毒的术前用药是

- A. 氯丙嗪
- B. 异丙嗪
- C. 阿托品
- D. 哌替啶
- E. 苯巴比妥钠

38. 慢性胃炎病人的实验室检查异常, 错误的是

- A. 胃液分析时多灶萎缩性胃炎病人胃酸正常或增多
- B. 自身免疫性胃炎病人胃酸缺乏
- C. 自身免疫性胃炎病人血清促胃泌素水平常明显升高, 伴恶性贫血时更甚
- D. 慢性胃炎病人血清中可测得抗壁细胞抗体和抗内因子抗体
- E. 多灶萎缩性胃炎病人血清促胃泌素水平升高

39. 消化性溃疡的护理诊断不包括

- A. 焦虑
- B. 潜在并发症有胃穿孔、上消化道出血
- C. 营养失调
- D. 腹痛
- E. 预感性悲哀

40. 对结核杆菌正确的消灭方法是

- A. 5% 苯酚浸泡 12 小时
- B. 5% 漂白粉浸泡 24 小时
- C. 干热 80℃ 20 分钟
- D. 湿热 65℃ 30 分钟
- E. 冰冻 4 周

41. 肝硬化病人腹水的形成与下列哪项因素无关

- A. 门静脉压力增高
- B. 淋巴液生成过多
- C. 继发性醛固酮和抗利尿激素减少
- D. 低蛋白血症
- E. 排尿减少

42. 将健康问题提到各级各部门的议事日程上, 促进健康公共政策的多样互补, 使之了解其决策对健康的影响并承担健康责任, 属于健康促进领域中的

- A. 创造支持环境
- B. 制定促进健康的公共政策
- C. 调整卫生服务方向
- D. 加强社区行动
- E. 发展个人技能

43. 肝硬化失代偿期最突出的临床表现是

- A. 晚期肝脏质地坚硬
- B. 肝掌和蜘蛛痣
- C. 腹水
- D. 脾大
- E. 侧支循环建立和开放

44. 原发性肝癌病人最突出的体征是

- A. 脾大和腹水
- B. 腹膜刺激征
- C. 肝脏进行性肿大
- D. 黄疸与发热
- E. 营养不良

45. 女性骨盆入口前后径的正常平均值是

- A. 9cm
- B. 11cm
- C. 13cm
- D. 15cm
- E. 17cm

46. 腰椎间盘突出症的最常见症状是

- A. 坐骨神经痛
- B. 马尾神经受压
- C. 腰痛
- D. 下肢触觉减退
- E. 腰椎侧突

47. 下列行为属于日常健康行为的是

- A. 平衡膳食
- B. 戒烟
- C. 预防接种
- D. 开车系安全带
- E. 定期体检

48. 腰椎间盘突出最主要的体征是

- A. 棘突压痛
- B. 棘突间压痛
- C. 棘突旁压痛
- D. 直腿抬高试验阳性

E. 直腿抬高试验和加强试验阳性

49. 颅内压增高的主要表现为

- A. 头痛、抽搐、偏瘫
- B. 头痛、呕吐、感觉障碍
- C. 头痛、恶心、食欲下降
- D. 头痛、呕吐、视盘水肿
- E. 头痛、抽搐、血压增高

50. 以下情况标志女性青春期开始的是

- A. 骨盆变宽
- B. 乳房丰满
- C. 月经初潮
- D. 阴毛出现
- E. 音调变高

51. 急性胰腺炎病人应禁用的药物为

- A. 雷尼替丁
- B. 吗啡
- C. 生长抑素
- D. 阿托品
- E. 抑肽酶

52. 肺气肿的主要症状是

- A. 突然出现的呼吸困难
- B. 夜间阵发性呼吸困难
- C. 逐渐加重的呼吸困难, 尤以活动后为著
- D. 发绀
- E. 心悸

53. 女性, 32 岁, 因双侧腰背酸痛, 尿频, 尿急, 尿痛 7 天就诊。T 39.5℃, 双肾叩击痛(++), 尿检: 蛋白(+), 脓细胞(+++), 红细胞(+), 诊断为急性肾盂肾炎, 下列哪项不是其护理诊断

- A. 体温过高
- B. 排尿异常
- C. 焦虑
- D. 知识缺乏
- E. 预感性悲哀

54. 在我国导致慢性肾衰竭主要原因为

- A. 梗阻性肾病
- B. 糖尿病肾病
- C. 原发性肾小球病
- D. 狼疮性肾炎
- E. 高血压肾疾病

55.  $\beta_2$ 受体激动剂治疗哮喘时首选的给药方式为

- A. 口服
- B. 吸入
- C. 肌内注射
- D. 静脉滴入
- E. 直肠给药

56. 淋巴瘤的首发症状多为

- A. 腋下淋巴结肿大
- B. 颈部或锁骨上淋巴结无痛性肿大
- C. 长期不明原因发热
- D. 肝、脾大
- E. 深部淋巴结肿大

57. 最有助于诊断肺脓肿的症状是

- A. 畏寒、高热
- B. 呼吸困难
- C. 咳嗽、咯血
- D. 咳大量脓臭痰
- E. 剧烈胸痛

58. 妊娠合并病毒性肝炎不宜应用的抗生素是下列哪一种

- A. 头孢唑啉
- B. 氨苄西林
- C. 青霉素
- D. 四环素
- E. 红霉素

59. 诊断急性白血病的主要依据是

- A. 出血、贫血、感染
- B. 全血细胞减少
- C. 肝脏、淋巴结肿大
- D. 骨髓像见较多原始及早幼白细胞
- E. 白细胞计数极度增加

60. 支气管扩张最有意义的体征是

- A. 贫血貌
- B. 杵状指
- C. 局限性哮鸣音
- D. 局限性湿啰音
- E. 消瘦

61. 关于血友病, 下列说法错误的是

- A. 血友病 A 和 B 都是 X 染色体隐性遗传
- B. 多自幼即有轻微损伤后出血倾向
- C. 反复关节腔出血不会遗留后遗症
- D. 主要表现为软组织、肌肉和负重关节出血
- E. 出血症状出现越早病情越重

62. 男性, 35 岁, 平素体健。4 天前淋雨, 2 天前突然高热 40℃, 伴寒战, 咳铁锈色痰伴呼吸困难, 胸片示右下肺大片密度均匀的实变影。该病人最可能的诊断是

- A. 结核性胸膜炎
- B. 大肠埃希菌肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 军团菌肺炎

63. DIC 最常见的病因是

- A. 肿瘤性疾病
- B. 感染性疾病

- C. 广泛性手术
- D. 产科疾病
- E. 烧伤

64. DIC 典型的临床表现不包括

- A. 全身瘀斑
- B. 淋巴结、肝脾肿大
- C. 休克
- D. 巩膜黄染
- E. 肺栓塞

65. 以下人群中体液含量占体重比例最少的是

- A. 老人
- B. 中年人
- C. 青年
- D. 儿童
- E. 婴儿

66. 下列类型的甲状腺功能亢进中, 哪项不宜手术治疗

- A. 甲状腺巨大, 有压迫症状
- B. 中至重度 Graves 病, 长期服药无效者
- C. 妊娠早期
- D. 结节性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进
- E. 胸骨后甲状腺肿伴甲状腺功能亢进

67. 某医院护理部制定了本院的护理技术操作规范, 属于计划的何种表现形式

- A. 目的或任务
- B. 策略
- C. 规程
- D. 规则
- E. 规划

68. 病人男性, 23 岁。4 天前出现频繁干咳, 伴有胸骨后不适, 乏力, 未予重视。昨日起出现咳嗽, 咳黏液性脓痰, 痰中偶有血丝。体检: 肺部散在干、湿啰音, X 线检查示肺纹理增粗。该病人最可能的诊断是

- A. 普通感冒
- B. 急性病毒性支气管炎
- C. 急性气管 - 支气管炎
- D. 肺结核
- E. 支气管肺癌

69. 病人男性, 58 岁。有慢性支气管炎、肺气肿病史多年, 于阵咳后突然出现呼吸困难、右胸痛, 并逐渐加重。该病人最可能的诊断是

- A. 气胸
- B. 呼吸衰竭
- C. 支气管哮喘
- D. 慢性支气管炎急性发作
- E. 急性心肌梗死

70. 对于一个护理人力严重不足的医院, 护士长只能选择的护理工作方式是

- A. 小组护理
- B. 责任制护理
- C. 综合护理
- D. 功能制护理
- E. 个案护理

71. 关于正常人皮质醇节律, 下述哪项最正确

- A. 清晨最高, 午夜最低
- B. 清晨最高, 下午最低
- C. 午夜最高, 清晨最低
- D. 下午最高, 午夜最低
- E. 午夜最高, 下午最低

72. 女性病人, 腹部损伤后, 精神紧张、烦躁不安、面色苍白、尿量减少、脉压小。应首先给予

- A. 强心药
- B. 利尿剂
- C. 静脉补液
- D. 术前准备
- E. 血管收缩药

73. 关于醛固酮的生理作用描述正确的是

- A. 维持有效血容量
- B. 抗炎作用
- C. 抑制蛋白质合成
- D. 强烈收缩血管, 使血压升高
- E. 免疫抑制

74. 护士在对哮喘性支气管炎所采取的护理措施当中, 不妥当的是

- A. 患儿处于半卧位, 以利于呼吸通畅
- B. 保持室内空气新鲜, 注意适时通风换气
- C. 室内湿度以 60% 为宜
- D. 就餐时让患儿吃饱
- E. 给予患儿心理支持

75. 下列关于库式呼吸困难的描述, 正确的是

- A. 呼吸表浅, 频率较快
- B. 呼吸变深, 节律规整
- C. 呼吸与呼吸暂停相交替
- D. 呼吸急促, 有屏气现象
- E. 呼吸急促、快慢不一

76. 急性肾小球肾炎患儿, 护士正确的护理措施是

- A. 绝对卧床休息 1 个月
- B. 严格限制蛋白质摄入
- C. 无盐饮食

D. 应用庆大霉素抗感染

E. 观察血压、尿量, 发现潜在并发症

77. 以下属于“医患关系的技术性方面”的是

- A. 往中的社会方面的关系
- B. 医患交往中的治疗方面的关系
- C. 医患交往中的伦理方面的关系
- D. 医患交往中的心理方面的关系
- E. 医患交往中的人文关怀

78. 当病人出现下列哪种情况时, 可判断其心功能为Ⅲ级

- A. 体力活动不受限, 日常活动不引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状
- B. 一般体力活动稍受限制, 休息时无自觉症状
- C. 不能从事任何体力活动, 休息时宜有症状, 体力活动后加重
- D. 应绝对卧床休息
- E. 体力活动明显受限, 休息时无症状, 轻微的活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状

79. 降低血钾浓度效果最好的方法是

- A. 应用阳离子交换树脂
- B. 输入葡萄糖酸钙 + 乳酸钠 + 葡萄糖 + 胰岛素
- C. 输入 5% 碳酸氢钠溶液
- D. 输入葡萄糖溶液和胰岛素
- E. 透析疗法

80. 在医护实践中, 尊重原则主要是指对能够自主的病人尊重其

- A. 健康
- B. 自主性
- C. 隐私
- D. 人格
- E. 疾病

81. 初产妇, 妊娠 37 + 3 周, 前置胎盘, 正确的处理方法是

- A. 有阴道出血时, 进行止血、输血等, 待 38 周后终止妊娠
- B. 临产后勤肛查
- C. 凡胎儿死亡均从阴道分娩
- D. 温肥皂水灌肠
- E. 大出血时, 不需阴道检查即行剖宫手术

82. 在医学伦理学中, 不伤害原则要求在医疗护理实践中努力使病人的伤害及风险

- A. 最大化
- B. 降到零
- C. 最小化
- D. 趋于下降
- E. 保持平衡

83. 暴发型流行性脑脊髓膜炎抗休克扩容治疗时, 应进行病情观察的内容是

- A. 血压改变
- B. 有无肺底啰音
- C. 有无呼吸困难
- D. 准确记录 24 小时出入量
- E. 有无泡沫痰

84. 硬膜外麻醉的禁忌证是

- A. 高血压
- B. 婴幼儿和老人
- C. 凝血功能不全
- D. 颅内高压
- E. 头痛

85. 医护人员应当力促诊疗利益最大化指的是医学伦理学中的什么原则

- A. 尊重原则
- B. 不伤害原则
- C. 公平原则
- D. 有利原则
- E. 公正原则

86. 物体表面监测的采样面积为

- A. 被采表面  $< 100\text{cm}^2$ , 取其  $1/2$  表面积
- B. 被采表面  $> 100\text{cm}^2$ , 取  $30\text{cm}^2$
- C. 被采表面  $> 100\text{cm}^2$ , 取  $50\text{cm}^2$
- D. 被采表面  $> 100\text{cm}^2$ , 取  $60\text{cm}^2$
- E. 被采表面  $> 100\text{cm}^2$ , 取  $100\text{cm}^2$

87. 医疗行为中, 医务人员有责任为病人的隐私保密, 这主要是体现医学伦理原则中的什么原则

- A. 不伤害原则
- B. 有利原则
- C. 尊重原则
- D. 公正原则
- E. 人道主义原则

88. 护理健康教育学属于

- A. 护理学科
- B. 教育学科
- C. 人文学科
- D. 综合应用学科
- E. 交叉应用学科

## 二、A3 型题

(89~91 题共用题干)

患儿, 男, 4 岁, 面部及双下水肿 2 周收入院。查体: 精神可, 眼睑颜面水肿, 心肺腹无异常, 阴

囊中度水肿, 下肢可凹性水肿。实验室检查: 尿蛋白(++++), 血浆总蛋白及白蛋白明显减少, 血胆固醇明显升高, 补体  $\text{C}_3$  正常。

89. 该患儿正确的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 先天性肾病
- C. 单纯性肾病
- D. 肾炎性肾病
- E. 泌尿系感染

90. 该患儿当前的饮食中蛋白质的供给量宜为

- A. 每日  $1\text{g/kg}$
- B. 每日  $2\text{g/kg}$
- C. 每日  $3\text{g/kg}$
- D. 每日  $4\text{g/kg}$
- E. 每日  $5\text{g/kg}$

91. 治疗该患儿首选的药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 青霉素
- C. 利尿剂
- D. 白蛋白
- E. 钙剂

(92~94 题共用题干)

李女士, 20 岁, 因发热、咽痛 1 周, 经血象和骨髓象检查, 诊断为急性淋巴细胞白血病, 入院接受化学治疗。

92. 入院体格检查发现下列体征, 其中哪项是白血病细胞浸润所致

- A. 皮肤紫癜
- B. 扁桃体充血、肿大
- C. 胸骨下段压痛
- D. 心尖区吹风样杂音
- E. 两肺湿啰音

93. 医师选用 VLDP 作诱导缓解治疗及 MTX 作缓解后治疗。有关这些药物主要不良反应的叙述, 错误的是

- A. 长春新碱——末梢神经炎
- B. 甲氨蝶呤——口腔黏膜溃疡
- C. 柔红霉素——心脏毒性
- D. 泼尼松——类库欣综合征
- E. 阿糖胞苷——出血性膀胱炎

94. 护士发现静脉注射柔红霉素时, 药液渗出血管外, 立即做如下处理, 其中哪项错误

- A. 尽量回抽局部渗液
- B. 外渗局部以 0.5% 普鲁卡因封闭
- C. 外渗局部注射氢化可的松注射液
- D. 外渗局部热敷
- E. 抬高患肢

## 三、B 型题

(95~97 题共用备选答案)

- A. 目标冲突、认知冲突、感情冲突、程序冲突
- B. 建设性冲突、破坏性冲突
- C. 个人冲突、人际冲突、群体冲突
- D. 人际冲突、群体冲突、组织间冲突
- E. 积极性冲突、消极性冲突

95. 根据内容划分, 冲突可以分为  
 96. 根据影响划分, 冲突可以分为  
 97. 根据范围划分, 冲突可以分为

(98~100 题共用备选答案)

- A. 自发性气胸
  - B. 中耳炎
  - C. 慢性阻塞性肺疾病
  - D. 支气管扩张
  - E. 阻塞性肺气肿
98. 急性上呼吸道感染易并发  
 99. 慢性支气管炎易并发  
 100. 慢性支气管炎肺气肿易并发

(101~102 题共用备选答案)

- A. 减慢心率, 降低心肌收缩力, 减少心肌耗氧量
  - B. 通过抑制钙离子进入冠脉、周围血管壁平滑肌细胞内而扩张冠脉及周围血管
  - C. 抑制血小板聚集
  - D. 改善心肌营养与代谢
  - E. 扩张冠脉及外周血管, 减轻心脏负担
101. 硝酸异山梨醇酯治疗心绞痛的作用原理是  
 102. 美托洛尔治疗心绞痛的作用原理是

## 答案与解析

## 一、A1/A2 型题

1. C. 新生儿是指从脐带结扎至生后 28 天内的婴儿。出生后 7 天内的新生儿是早期新生儿。  
 2. D. 小儿 8~9 个月时可用上肢向前爬; 12 个月左右爬行时手膝并用; 18 个月时可爬上台阶。

3. C. 慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 最确切的定义是指: 一种具有气流受限特征的可以预防和治疗肺部疾病, 气流受限不完全可逆, 呈进行性发展, 须有气道阻塞的慢性支气管炎和肺气肿。

4. C. 急性心包炎 (acute pericarditis) 为心包脏层和壁层的急性炎症, 可由细菌、病毒、肿瘤、自身免疫、物理、化学等因素引起。综合国外的两个较大样本的报道, 急性心包炎的主要病因为: 急性特发性 (78%~86%)、肿瘤性 (6%~7%)、结核性 (4%)、其他感染 (3%)、结缔组织病性 (0.5%~3%)、其他原因 (0.5%~5%)。在发展中国家继发性心包炎占多数, 以结核性、化脓性和风湿性较为常见。国内一组 2999 例心包炎的荟萃分析资料表明, 前 10 位的病因及构成比分别为: 结核性 (34.14%)、肿瘤性 (15.44%)、特发性 (10.33%)、尿毒症性 (8.66%)、化脓性 (7.27%)、原因不明 (6.67%)、结缔组织病性 (4.33%)、风湿性 (3.50%)、甲状腺功能减退症 (2.5%)、心肌梗死 (2.03%)、其他少见病因 (4.39%, 包括外伤、放射性、化学性、真菌性及寄生虫等)。结合我国国情, 本题最佳答案为 C。

5. E. 给休克病人快速大量输血补液时, 根据尿量和中心静脉压来掌握量和速度, 尿量正常说明组织灌注好, 中心静脉压正常, 说明心脏负荷不大。

6. C. 乙肝疫苗接种年龄是 0、1、6 月龄; 麻疹疫苗接种年龄是 8 月龄; 卡介苗是出生时; 百白破是 3、4、5 月龄, 18~24 月龄; 脊髓灰质炎疫苗接种年龄 2、3、4 月龄, 4 周岁。

7. D. 肺炎链球菌性肺炎病人之所以咳铁锈色痰, 是因为肺泡内浆液渗出和红细胞、白细胞浸润, 当红细胞破坏后释放大量含铁血黄素。

8. D. 解析略。

9. C. 钙: 为凝血因子, 能降低神经-肌肉的兴奋性, 构成骨髓、牙齿。磷: 是骨骼、牙齿、细胞核蛋白、各种酶的主要成分, 协助糖、脂肪、蛋白质的代谢, 参与缓冲系统、维持酸碱平衡。铁: 血红蛋白、肌蛋白、细胞色素和其他酶系统的主要成分, 帮助氧的运输。铜: 对制造红细胞, 合成血红蛋白和铁的吸收起很大作用。锌: 为不少酶的组成部分。

10. A. 原发性肝癌起病隐匿, 早期缺乏典型症状, 肝区疼痛是肝癌最常见的症状, 半数以上病人

有肝区疼痛,多呈持续性胀痛或钝痛。

11. A. 母乳是婴儿最理想的食物。一般健康母亲的乳汁分泌量可满足4~6个月内婴儿营养的需要。

12. A. 硬膜外麻醉最严重的并发症是全脊髓麻醉,容易导致病人死亡。

13. A. 预防全身麻醉病人发生误吸的主要措施是术前禁食禁水。

14. C. 因大阴唇有很厚的皮下脂肪层,内含丰富的血管、淋巴管和神经。当局部受伤时,易发生出血,可形成大阴唇血肿。故选C。

15. B. 急性肺水肿病人应立即给予高流量吸氧。

16. C. 连接骨盆各平面中点的假想曲线,称为骨盆轴。此轴上端向下向后,中段向下,下端向下向前。分娩时,胎儿沿此轴娩出。故选C。

17. A. 急性上呼吸道感染70%~80%由病毒所致。

18. D. 休息30分钟以上、不吸烟状态下,非同日不同时间测量三次血压,均超过正常血压值的高限可诊断为高血压。

19. E. 又称生育期,约从18岁开始,持续30年左右。此期的特征为卵巢功能成熟并分泌性激素,引起周期性排卵和行经。故选E。

20. E. 解析略。

21. B. 非感染性病理性黄疸中最常见的病因为新生儿溶血病。

22. D. 集体儿童机构保健的原则包括:合理的生活作息、合理教养、健全防病制度和加强饮食管理。

23. A. 长期摄入不足,喂养不当是导致婴儿营养不良的主要原因。

24. B. 胎产式是指胎儿纵轴与母体纵轴的关系。

25. D. 重型腹泻由于腹泻次数多,易出现体液及小肠液丢失而导致水、电解质紊乱。

26. B. 多次灌肠和导泻可以减少肠道氨的生成和吸收,是治疗肝性脑病的措施之一。

27. A. 婴儿生后4~6个月开始引入半固体食物,并逐渐减少哺乳次数,增加引入食物的量,一般于10~12个月完全断奶。

28. A. 频发的、成对出现的、多源性或呈R-on-T现象的室性期前收缩以及短阵室性心动过速常为心室颤动的先兆。

29. E. 整体护理是一种护理行为的指导思想或称护理观念,是以人中心,以现代护理观为指导,以护理程序为基础框架,并且把护理程序系统化地运用到临床护理和护理管理中去的指导思想,整体护理的目标是根据人的生理、心理、社会、文化、精神等多方面的需要,提供适合人的最佳护理。

30. D. 解析略。

31. C. 上消化道出血最常见的病因依次是:溃疡病、肝硬化所致的食管胃底静脉曲张破裂、急性胃黏膜损害、胃癌。其中,食管胃底静脉曲张破裂的发病与门静脉压力呈正相关。一般发病急,出血量大,病情危重,复发率高,病死率亦高。

32. B. 1860年,南丁格尔在英国伦敦圣多马医院开办了世界上第一所正规护士学校,命名为南丁格尔护士训练学校。

33. B. 上消化道出血是指屈氏韧带以上的消化道,包括食管、胃、十二指肠、胰腺、胆道或胃空肠吻合术后的上段空肠等病变引起的出血。呕血和黑便是上消化道出血的特征性表现。

34. E. 按医疗技术水平划分可将医院分为一级、二级、三级医院。

35. E. 胃壁黏膜层有丰富的腺体分泌胃液。腺细胞有壁细胞、主细胞、黏液细胞、未分化细胞和内分泌细胞,分泌电解质、蛋白酶原和黏液。

36. E. 消化系统疾病最常见的症状和体征有恶心、呕吐、腹胀、腹痛、腹泻、呕血与黑便等。

37. E. 苯巴比妥钠为镇静催眠药、抗惊厥药,麻醉前给予巴比妥类药物,以提高毒性阈值。

38. E. 解析略。

39. E. 消化性溃疡的护理诊断有:①营养失调:低于机体需要量,与畏食、消化吸收不良有关。②知识缺乏,缺乏对消化性溃疡病因及防治知识的了解。③焦虑与病情反复、病情迁延有关。④潜在并发症,穿孔、幽门梗阻、癌变。

40. D. 结核菌对湿热敏感,65℃30分钟即可灭活,干热100℃20分钟灭活,痰液内结核菌用5%苯酚(石炭酸)或20%漂白粉须经24小时处理才被杀灭。冰冻1年半仍保持活力。

41. C. 肝硬化病人腹水的形成机制:①门静脉压力增高。②低白蛋白血症。③淋巴液生成过多。④抗利尿激素分泌增多致水的重吸收增加。⑤继发性醛固酮增多致肾钠重吸收增加。⑥有效循环血容

量不足致交感神经活动增加,前列腺素、心钠素及激肽释放酶、激肽活性降低,从而导致肾血流量、排钠和排尿量减少。

42. B。将健康问题提到各级各部门的议事日程上,促进健康公共政策的多样互补,使之了解其决策对健康的影响并承担健康责任,属于健康促进领域中的制定促进健康的公共政策。

43. C。解析略。

44. C。原发性肝癌的体征包括肝脏进行性增大,肝硬化征象如腹水、脾大,晚期因侵犯或压迫胆管可出现黄疸。此外,还有恶性肿瘤的全身性表现,如消瘦、发热、恶病质等,其中最突出的是肝脏进行性增大。

45. B。入口前后径也称真结合径,耻骨联合上缘中点至骶岬前缘正中间的距离,平均值约为 11cm 是胎先露部进入骨盆入口的重要径线,其长短与分娩关系密切。

46. C。95% 以上的腰椎间盘突出(脱)出症病人有腰痛症状。

47. A。解析略。

48. A。腰椎间盘突出最主要的体征是棘突压痛。

49. D。颅内压增高的主要表现为头痛、呕吐、视盘水肿(颅高压三主征)。

50. C。从月经初潮至生殖器官逐渐发育成熟的时期称青春期,一般 13~18 岁。月经初潮是青春期的一个重要标志。

51. B。西咪替丁为  $H_2$  受体拮抗剂,可抑制胃酸分泌,从而减少胰液分泌;生长抑素可抑制胰液分泌;阿托品可用于急性胰腺炎病人解痉及止痛;哌替啶可用于急性胰腺炎病人止痛治疗。急性胰腺炎病人禁用吗啡止痛治疗,因吗啡可引起十二指肠乳头水肿从而加重病情。

52. C。本题主要考查肺气肿的临床症状。早期可无症状或者仅在劳动、运动时感到气短。随着肺气肿进展,呼吸困难随之加重,以至于稍活动或者休息时仍感气短。典型的肺气肿病人胸廓前后径增大,呈桶状胸,呼吸运动减弱,语音震颤减弱。叩诊过清音,心浊音界缩小,肝浊音界下移,呼吸音减弱。因此选 C。

53. E。T 39.5℃ 高于正常,故 A 正确;尿检:蛋白(+),脓细胞(+++),红细胞(+),故 B 正确;另外可有焦虑、知识缺乏等。预感性悲哀

是癌症病人的常见诊断。

54. C。解析略。

55. B。 $\beta_2$ 受体激动剂为控制哮喘急性发作的首选药物,用药方法有定量气雾剂吸入、干粉吸入、持续雾化吸入等,也可用口服或静脉注射,首选定量吸入法。

56. B。淋巴瘤的首发症状多为无痛性进行性颈部或锁骨上淋巴结肿大或局部肿块,同时可有相应器官压迫的症状。

57. D。肺脓肿的主要临床特征为高热、咳嗽和咳大量脓臭痰。

58. D。妊娠不宜使用四环素,因为孕妇服用四环素可透过胎盘屏障进入胎儿体内,沉积在牙齿和骨的钙质区内,引起胎儿牙齿变色,牙釉质再生不良及抑制胎儿骨骼生长,该类药物在动物中有致畸胎作用。

59. D。骨髓象是诊断急性白血病(AL)的主要依据和必做检查。FAB 协作组提出原始细胞 $\geq$ 骨髓有核细胞(ANC)的 30% 为急性白血病的诊断标准,WHO 分类将骨髓原始细胞 $\geq$ 20% 定为 AL 的诊断标准。

60. D。支气管扩张临床特点为慢性咳嗽、咳大量脓痰和(或)反复咯血。早期或干性支气管扩张症状无异常肺部体征,病变重或继发感染时,在下胸部、背部可闻及固定而持久的局限性粗湿啰音,有时可闻及哮鸣音,部分病人伴有杵状指(趾)。故应选 D。

61. C。解析略。

62. D。肺炎球菌肺炎临床起病急骤,以高热、寒战、咳嗽、血痰(24~48 小时后可成铁锈色痰)和胸痛为特征。

63. B。感染是 DIC 最常见的原因。因为感染可使血管内皮细胞损伤,激活凝血因子 XII,启动内源性凝血系统;又能使血小板损伤,促进血小板聚集和释放血小板第 3 因子,加速凝血酶原的激活而促进凝血。

64. B。DIC 的典型临床表现有:①出血,是最常见的早期表现之一,可导致巩膜黄染。慢性出血常为反复发作的瘀斑或血肿。②血管栓塞,内脏栓塞以肺、肾最为常见,也可累及脑、心及胃肠等。③微循环障碍,低血压或休克多见于急性病人,可突然出现血压下降甚至休克,尿少或闭尿,呼吸及循环衰竭等症状。④微血管性溶血。临床可表现为

进行性贫血,贫血程度与出血不成比例。但无淋巴结、肝、脾大。

65. A. 解析略。

66. C. 解析略。

67. C. 护理技术操作规范是属于规程,它是实施计划的顺序,指导行动、执行任务的具体实施步骤。

68. C. 病人为青年男性,仅咳嗽、咳痰4天,为急性感染,排除肺结核可能;肺部已出现啰音,排除普通感冒;X线检查显示肺纹理增粗,未见明显圆形或类圆形阴影,再结合病人年龄,排除肺癌可能;病人无发热,排除急性病毒性支气管炎;而选项C急性气管-支气管炎的主要临床表现即频繁咳嗽,咳黏液性脓痰,痰中偶有血丝,伴有胸骨后不适,乏力,体检:肺部散在干、湿啰音,X线检查示肺纹理增粗,与题干相符,故应选C。

69. A. 病人有气胸的潜在病因:有慢性支气管炎、肺气肿病史多年。COPD晚期的一个典型病理改变就是肺大疱形成。咳嗽时胸膜腔压力增大,易造成肺大疱破裂,造成气胸,其典型临床表现是出现呼吸困难、胸痛。

70. D. 本题考查临床护理组织方式。功能制护理节省人力、经费、设备、时间,护士长便于组织工作。有利于提高护士技能操作的熟练程度,工作效率较高。另外,分工明确,有利于按护士的能力分工。

71. A. 解析略。

72. C. 失血性休克首先补充血容量。

73. A. 醛固酮是肾上腺皮质球状带分泌的最重要的盐皮质激素,在维持机体钠平衡中起着十分重要的作用,而钠又是维持晶体渗透压的重要因素,因此可维持有效血容量。

74. D. 饱餐会使机体耗氧量增加,而哮喘性支气管炎患儿气道痉挛本身就已经出现机体缺氧,故宜少食多餐。

75. B. 库斯莫尔呼吸,简称(库式呼吸、酸中毒深大呼吸、深长呼吸),是一种深而规则的大呼吸,见于糖尿病酮症酸中毒和尿毒症酸中毒等。因此,答案为B。

76. E. 急性肾小球肾炎典型者表现为急性肾炎综合征(起病急、血尿、蛋白尿、尿少、水肿、高血压),严重者可出现急性肾衰竭和充血性心力衰竭。

77. B. 医患交往中的治疗关系才属于医患关系的技术性方面。

78. E. 心功能Ⅲ级是指体力活动明显受限,休息时无症状,轻于日常的活动即可出现明显的心悸、气短、呼吸困难等,休息较长时间后症状可缓解。应严格限制一般的体力活动,每天有充分的休息时间,但日常生活可以自理或在他人协助下自理。

79. E. 降低血钾浓度效果最好的方法是透析疗法。

80. B. 尊重原则是指对自主的人及其自主性的尊重。在医护实践中,尊重原则主要是指对能够自主的病人自主性的尊重。

81. E. 治疗原则为期待疗法:适于妊娠不足36周或估计胎儿体重小于2300g、阴道出血量不多,孕妇全身情况良好、胎儿存活者。终止妊娠适用于入院时出血性休克者,或期待疗法中发生大出血或出血量虽少,但妊娠已近足月或已临产者。

82. C. 在医学中,不伤害是指在诊治、护理过程中不使病人的身体、心灵和精神受到损伤。在医护实践中,不伤害的义务还包括避免或减少伤害和造成伤害的风险。

83. E. 休克扩容治疗期间大量输液,短时间内会增加心脏前负荷而诱发急性心力衰竭,护理人员应严密观察有无急性心力衰竭的表现等。

84. C. 硬膜外麻醉的禁忌证是凝血功能不全,容易形成血肿,压迫脊髓。

85. D. 在临床护理实践中,有利原则是指护士履行对病人有利的德行。有利原则是医护人员的基本义务,医护人员应当力促诊疗利益最大化。

86. E. 若采样面积大于等于 $100\text{cm}^2$ ,应连续采样四个点(即采样 $100\text{cm}^2$ )。

87. C. 尊重原则是指对能够自主的病人自主性的尊重,通过尊重病人在求医过程中的各种权利而得以体现,包括尊重病人的知情同意权、隐私保护权。

88. E. 解析略。

## 二、A3型题

89~91. CBA. 单纯性肾病发病年龄多为2~7岁,主要表现为全身可凹性水肿,以颜面、下肢、阴囊为明显,病初患儿一般状况尚好,继之出现面色苍白、疲倦、厌食,水肿严重者可少尿,一般无高血压。尿液检查蛋白定性多为(+++~++++),血液检查血浆总蛋白及白蛋白明显减少,白、球比例倒置;胆固醇明显增多;血沉明显增快。大量蛋

白尿期间蛋白摄入量不宜过多,以控制在每日 2g/kg 为宜。肾上腺皮质为激素治疗肾病较有效的首选药物。

92~94. C E D。急性淋巴细胞白血病细胞增殖浸润的表现包括淋巴结和肝脾大、常有胸骨下段局部压痛、关节或骨骼疼痛、绿色瘤、牙龈增生肿胀、皮肤蓝灰色斑丘疹或紫蓝色结节、中枢神经系统白血病、睾丸出现无痛性肿大。阿糖胞苷的主要不良反应是骨髓抑制。化疗药液渗出血管外时,可局部冷敷,防止药物扩散。

### 三、B 型题

95~97. A E D。根据内容划分,冲突可以分为目标冲突、认知冲突、感情冲突、程序冲突。根据

影响划分,冲突可以分为建设性冲突、破坏性冲突。根据范围划分,冲突可以分为人际冲突、群体冲突、组织间冲突。

98~100. B C A。急性上呼吸道感染易并发急性鼻窦炎、中耳炎、气管-支气管炎;慢性支气管炎易并发慢性阻塞性肺疾病;慢性支气管炎肺气肿易并发自发性气胸、肺源性心脏病等。

101~102. E A。硝酸异山梨醇酯属于硝酸酯类药物,治疗心绞痛的作用原理是扩张冠脉及外周血管,减轻心脏负荷;美托洛尔属于 $\beta$ 受体阻断剂,治疗心绞痛的作用原理是减慢心率,降低心肌收缩力,减少心肌耗氧量,改善心脏血氧的供需矛盾。